

Rudolf Dehner

Wolfgang Dornberger

Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) bei Niederstetten

Am 31.8.1981 gegen 18 Uhr wurde im Rahmen einer regelmäßigen Vogelberingung bei Niederstetten (49.25 N 9.54 E) in einem Acker-Hecken-aufgelassenen Weinberg-Gelände eine dies-jährige S p e r b e r g r a s m ü c k e gefangen, beringt, vermessen und freigelassen.

Im Vergleich mit den gleichzeitig gefangenen Garten-, Mönch- und Dorngrasmücken (*S. borin*, *S. atricapilla* und *S. communis*), der mitgeführten Bestimmungsliteratur (Svensson: Identification Guide to European Passerines, Stockholm 1975) und den biometrischen Meßdaten, Flügellänge 86,0 mm, Flügelspitzenlänge 22,4 mm, Schwanzlänge 70,0 mm und Gewicht 23,0 gr., Augenfarbe graubraun und die Unterschwanzdecken zeigten eine angedeutete Wellung, fiel uns die Artbestimmung leicht.

Nach HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN, WESTERMANN (Anz.orn.Ges. Bayern 9, 1970, Sonderheft), Informationsbrief Avifauna Baden-Württemberg und Rundschreiben Vogelwarte Radolfzell ist die Sperbergrasmücke in Baden-Württemberg als unregelmäßiger Durchzügler (in den letzten dreißig Jahren 14 Nachweise aus den Monaten April (2), Mai (1), August (10) und September (1) einzustufen.

In der Bundesrepublik Deutschland gehört die Sperbergrasmücke zu den vom Aussterben bedrohten Vogelarten (Dtsch.Sekt.Int.Rat.Vogelschutz 1976). Sie gilt als europäisch-turkestanischer Faunentyp mit einer zentralpalaarktischen Gesamtverbreitung (VOOUS 1962, Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Hamburg und Berlin). Ihr Vorkommen im norddeutschen Raum ist ausgesprochen lokal (NEUSCHULZ, J.Orn. 122, 1981: 221-257).

Nach Auswertung von Ringfunden gibt ZINK (Der Zug der europäischen Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel, 1973, 1.Lief.Möggingen) eine Herbstzugrichtung nach SE bis SSE an um in die Winterquartiere nach Ostafrika zu gelangen.

Anschriften der Verfasser:

Rudolf Dehner, Schöntaler Berg 10, 6994 Niederstetten

Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 6994 Niederstetten

Nachtrag: Am 10.9.81 konnten wir im selben Geländekomplex aus ca. 2 mtr. Distanz ein adultes Männchen der Sperbergrasmücke beobachten.

Wolfgang Dornberger und Egbert Schmid

Ornithologischer Sammelbericht Altkreis Bad Mergentheim (Zeitabschnitt 1980 - 31. 8. 1981)

Mit dem vorliegenden Sammelbericht soll der aktiven Gruppe von Ornithologen im gesamten Main-Tauber-Kreis die Möglichkeit zur jährlichen Veröffentlichung von Beobachtungen ge-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Dehner Rudolf, Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [Sperbergrasmücke \(*Sylvia nisoria*\) bei Niederstetten 16](#)