Hermann GEHRING

Bruterfolg beim Kiebitz (Vanellus vanellus) in den Jahren 2006 und 2007 auf drei Kontrollflächen, Gemarkung Creglingen, Main-Tauber-Kreis

Fortführung der Beobachtungen aus dem Jahre 2005 (GEHRING & DORNBERGER 2005). Mit einbezogen wurde das Kontrollgebiet Hochfläche Münster-Archshofen.

Ergebnisse:

2006	Blumweiler/Weiler	Schmerbach	Münster/Archshofen
23.3.	250 Ex., ca 8 Ex. Separat	2 Ex(Paar)	----
27.3	ca 10 Ex	----	1 Ex
30.3.	9 Ex	3 Ex	----
11.4.	8 Ex; 3 Brutverdacht	1 Ex	----
15.4.	2 Ex; was ist passiert?	4 Ex	----
17.4.	5 Ex	5 Ex	----
18.4.	2 Ex, 1 brütet	3 Ex	----
20.4.	2 Ex, 1 brütet in Weizen	3 Ex	----
21.4.	Nest leer, Kiebitze weg!	3 Ex	1 Ex
24.4.	keine Kiebitz	7 Ex	----
01.5.	2 Ex; einer fliegt weit weg	7 Ex; 2 sitzend	----
02.5.	keine Kiebitz	7 Ex; 2 Brutverdacht	----
07.5.	keine Kiebitz	5-6; 3 Brutverdacht	----
16.5.	keine Kiebitz	5-6; 3 Brutverdacht	----
24.5.	keine Kiebitz	5-6; 2 Bruten	----
29.5.	keine Kiebitz	4 Ex; keine Brut/juv.	----
02.6.	keine Kiebitz	2 Ex.	----
08.6.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	keine Kiebitz

Bemerkungen:

15.4.: Acker ist leer; Kiebitze müssen vertrieben sein (Rehe).

17.4.: Trupp mit Rehe im Acker.

21.4.: Der eine Kiebitz in Münster/Archshofen fliegt hoch weg in Richtung Osten.

01.5.: 1 Kiebitz in Blumweiler fliegt hoch weg nach Westen.

16.5.: 2 brütende Weibchen im bisherigen Acker, 1 brütet in neuem Acker über der Straße.

24.5.: 1 Nachgelege (3 Eier), 1 fest sitzend, 2 Ex jenseits der Straße nicht brütend.

29.5.: Keine Kiebitz jenseits der Straße, keine Junge, starker Regen.

08.6.: Keine Kiebitz; abgezogen ohne Bruterfolg!

2007	Blumweiler/Weiler	Schmerbach	Münster/Archshofen
28.3.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	2 Paare
31.3.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	7-8 Ex; viel in der Luft
05.4.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	5 Ex; 2 Paare
20.4.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	4 Ex; 1 brütet
25.4.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	5 Ex; 1 Gelege (4 Eier)
27.4.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	3 Ex: 1 brütet
04.5.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	3 Ex; Nest leer!
10.5.	4 Ex	keine Kiebitz	3 Ex ca 200 m weiter
18.5.	6 Ex; 3 Brutverdacht	keine Kiebitz	2 Ex mit 1 Pulli
24.5.	5 Ex.;1 Gelege(4 Eier)	keine Kiebitz	1 Ex mit 1 Pulli
30.5.	5 Ex., separat 2 Ex	keine Kiebitz	2 Ex mit 1 Jungen
08.6.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	2 Ex mit flügg. Jungen
17.6.	keine Kiebitz	keine Kiebitz	keine Kiebitz

Bemerkungen:

25.4.: Kiebitze sind teils in Wiese, dort weiteres Gelege?

27.4.: abseits brütendes Ex wird von Partner besucht.

04.5.: Nest leer, keine Pulli gesehen.

30.5.: Gelege in Blumweiler mit 4 Eier ist leer. Paar verhält sich aber sehr territorial warnend, jedoch keine Pulli gesehen.

17.6.: Beobachtungen durch hohen Mais erschwert; keine Kiebitze mehr gesehen.

Literatur:

GEHRING, H. & W. DORNBERGER (2005): Ansiedlung, Schlupf- und Aufzuchterfolg beim Kiebitz (Vanellus vanellus). Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 23: 12-16

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Hermann Gehring, Triebweg 15, D-97993 Creglingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: 24-25

Autor(en)/Author(s): Gehring Hermann

Artikel/Article: Bruterfolg beim Kiebitz (Vanellus vanellus) in den Jahren 2006 und 2007 auf drei Kontrollflächen, Gemarkung Creglingen, Main-Tauber-Kreis 14-15