

Faun. u. flor. Mitt. „Taubergrund" 2, 1982:75

Horst M I E S

Schwalbenbestand 1979 bis 1982 in Edelfingen

In den Jahren 1979 bis 1982 wurde in Edelfingen, Main-Tauber-Kreis, der Bestand von Rauch- und Mehlschwalbe (*Hirundo rustica* und *Delichon urbica*) möglichst genau erfaßt durch zählen der besetzten Nester. Edelfingen liegt im Taubertal (207 m NN) und die Kulturflächen werden fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt.

Tab. 1: Die Entwicklung des Bestandes der Rauchschalbe (RS) und Mehlschalbe (MS) über 4 Jahre (1979-1982).

Jahr	Zahl der besetzten Nester	
	RS	MS
1979	61	110
1980	78	135
1981	78	136
1982	67	115

Das Verhältnis Rauchschalbe zu Mehlschalbe beträgt im Durchschnitt 1 : 1,75. Für Streusiedlungsgebiete auf der Südwestalb (RS : MS = 1 : 1,5) (KROYMANN & MATTES, Anz.orn.Ges.Bayern 11, 1972: 64-69) und in Würth/Donau (RS : MS = 1 : 1,7) (SCHWAIGER, Garm.vogelkdl.Ber.1, 1976: 42-46) wurden ähnliche Verhältnisse festgestellt.

Anschrift des Verfassers:

Horst M I E S

Steinbronnenstraße 22

D-6990 Bad Mergentheim-Edelfingen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Mies Horst

Artikel/Article: [Schwalbenbestand 1979 bis 1982 in Edel fingen 75](#)