

Ornithologischer Sammelbericht für Rheinland-Pfalz 2008 und 2009

zusammengestellt von

CHRISTIAN DIETZEN, JULIA BAYER, DOMINIK BECKER, HANS-GEORG FOLZ,
PETER RAMACHERS und MICHAEL SCHMOLZ

Inhalt

Abstract

- 1 Einleitung
- 2 Danksagung und Mitarbeiter
- 3 Material und Methoden
- 4 Übersicht zur Verwaltungsgliederung des Landes und der naturräumlichen Einheiten
- 5 Klimadaten 2008 und 2009
- 6 Artkapitel
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Artenregister

Abstract

Ornithological report for the Rhineland-Palatinate 2008 and 2009

The following report contains data of 272 bird species recorded in the Rhineland-Palatinate in 2008 and 2009. Among the most outstanding records were the first Greater Spotted Eagle (*Aquila clanga*), the second records of Golden Eagle (*Aquila chrysaetus*) and Sardinian Warbler (*Sylvia melanocephala*), the third Sociable Lapwing (*Vanellus gregaria*) and Alpine Accentor (*Prunella collaris*), the fourth Pygmy Cormorant (*Phalacrocorax pygmeus*), the fifth Grey Phalarope (*Phalaropus fulicarius*), the fifth and sixth Richard's Pipit (*Anthus richardi*), the 8th Cattle Egret (*Ardeola ibis*), the 11th Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*), the 14th Scops Owl (*Otus scops*), the 15th Stone Curlew (*Burhinus oedicephalus*) and the 16th Spoonbill (*Platalea leucorodia*). With another three Common Loons (*Gavia immer*) the total increases to 20 records, while three more Lapland Buntings (*Calcarius lapponicus*) bring the total to 25 records for this species. Also notable was a returning Short-toed Eagle (*Circaetus gallicus*) for a late summer break in Rhinehassia. A large influx of Red-footed Falcons (*Falco vespertinus*) to Central Europe, led to an unusually high number of records in the Rhineland-Palatinate in 2008. Among the breeding birds, the number of European Bee-eaters (*Merops apiaster*) slightly increased further, while formerly regular breeding birds like Lapwing (*Vanellus vanellus*), Common Snipe (*Gallinago gallinago*), Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) or Penduline Tit (*Remiz pendulinus*) show continuous declines. Despite this high number of outstanding records, there is a lack of data submission for many species and reliable conclusions on occurrence and population development cannot be drawn with confidence.

1 Einleitung

Nach etwas längerer Pause – deutlich länger als eigentlich geplant – legen wir hiermit den achten landesweiten Jahresbericht für Rheinland-Pfalz vor, der entgegen der bisherigen Praxis gleich zwei Jahre abdeckt (2008 und 2009). Die Gründe für die zeitlichen Verzögerungen sind vielfältig und auch wenn sie teilweise außerhalb des Einflussbereichs unseres Teams lagen, möchten wir uns trotzdem für die lange Wartezeit entschuldigen und uns für das Vertrauen bedanken! Auch wenn rein äußerlich zunächst keine großen Veränderungen auffallen, so hat

sich hinter den Kulissen doch einiges getan. Die wesentlichste Veränderung ist sicherlich die Erweiterung des Redaktionsteams zur Entlastung Einzelner und besseren Verteilung der Aufgaben. Die Neueinsteiger profitieren dabei von den „alten Hasen“ und werden sicherlich in den kommenden Jahren selbst die notwendige Routine entwickeln, um die Abläufe weiter zu beschleunigen. Die Gesamtkoordination lag nun wieder hauptverantwortlich in den Händen der GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ (GNOR). Die Anzahl der eingegangenen Daten ist im Vergleich zum Berichtsjahr 2007 zunächst etwa gleich geblieben, aber 2009 dann nochmal abgesunken. Daraus ergeben sich natürlich einige Datenlücken und die eine oder andere Auswertung konnte nicht so detailliert erfolgen, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Das „Eintreiben“ der Daten macht nach wie vor sehr viel Arbeit, aber es besteht die Hoffnung, dass mit der Inbetriebnahme von *www.ornitho.de* durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) die Datenaufbereitung zumindest erleichtert und vielleicht ja auch gesteigert werden kann. Wenn alles gut geht und vor allem, wenn auch Sie weiterhin gut mitarbeiten, dann erscheint der nächste Bericht für das Jahr 2010 turnusmäßig im Herbst 2011 (die ersten Daten liegen bereits vor).

2 Danksagung und Mitarbeiter

Die nachfolgende Zusammenstellung beruht auf der Mitarbeit zahlreicher Beobachter/innen (n = 327), die erfreulicherweise ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Allen nachfolgend aufgeführten Meldern gebühren Anerkennung und Dank für die Erhebung, Archivierung und Meldung ihrer wertvollen Daten! Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle all denen aussprechen, die durch sorgfältige Dokumentation und Meldung an die Avifaunistische Kommission (AKRP) die solide Datenqualität gewährleisten!

Da mittlerweile viele Melder von unserer Datenvorlage Gebrauch machen, hat sich der zeitliche Aufwand zur Datenverarbeitung zwar z. T. verringert, dafür nimmt allerdings die erforderliche Überzeugungsarbeit, Beobachter zum Melden zu bewegen, weiterhin zu.

R. ALBERT	C. BROWNSEA	D. EGGERT
B. ANDREAS	S. BRÜCHER	M. EGGERT
T. ANNELL	R. BUCH	H. EHMANN
M. ANTONY	R. BUCHHARD	H. EICHHORN
M. BASEN	M. BUCHHEIT	G. ELLWANGER
J. BAYER	C. BURDICK	J. ENGLER
D. BECKER	HR. u. FR. BURCKHARD	P. ERLEMANN
H. BECKER	R. BUSCH	H.-J. ESPER
K.-H. BECKER	C. BUSSEN	G. FAHL
M. BECKER	C. CASPARI	H.-P. FELTEN
Mf. BECKER	S. CASPARI	M. FEUERSENGER
N. BECKER	M. CHRISTIAN	M. FINK
M. BEENSEN	A. CHRISTOPH	T. FICHTNER
M. BICKEL	B. CRUSAN	B. FISCHER
H. BIRK	H. DEICHFUB	R. FISCHER
W. BITTMANN	FR. DENGLER	W. FISCHER
K. BITTNER	A. DER	B. FLECK
G. BIVER	B. DIEFENTHAL	H.-G. FOLZ
N. BÖHM	P. DIEKER	L. FOLZ
H. BODES	J. DIETZE	S. FRÄNZEL
T. BORNHÜTTER	C. DIETZEN	E. FRAGSTEIN
J. BOSSELMANN (†)	W. DIETZEN	F. FRENZEL
H. BOTT	A. DIEBOLD	A. FREITAG
A. BRÄUNLICH	P. DINGELS	T. FRITZ
M. BRAUN	P. DÖRHÖFER	A. FRITZEN
U. BRAUN	T. DOLICH	C. FRÖHLICH
C. BRAUNBERGER	W. DREYER	F. J. FUCHS
T. BRÖDER	A. DUHR	H.-P. GEISSEN

N. GIERENZ
 D. GLITZ
 H. GÖPPEL
 H.-P. GOERLICH
 L. GOLDAMMER
 B. GOLL
 G. GRAF V. PLETTENBERG
 F. GRIMM
 U. GROH
 M. GRUND
 T. GRUNWALD
 C. HACKENBERG
 G. HAHN
 R. HANSEN
 J. HANSMANN
 A. HANTGE
 V. HARRIES
 V. HARTMANN
 V. HÄSELBARTH
 H. HAUENSTEIN
 H. HAUPTLORENZ
 C. HEBER
 E. HEIDRICH
 D. HEILIG
 M. HEINZ
 J. HELLEN
 P. HELLENTHAL
 M. HENNECKE
 E. HENß
 J. HERZER
 Y. HESSELD AHL
 W. HEUSER
 K.-H. HEYNE
 M. HEYNE
 S. HEYNE
 J. HILLEN
 F. HILSENDEGEN
 A. HOCHKIRCH
 J. HÖFER
 D. HOFFMANN
 L. HOFFMANN
 U. HOFFMANN
 R. HOLLEITNER
 P. HOLZ
 B. HOOS
 E. HUBER
 S. IDELBERGER
 T. INSTINSKY
 Hr. ROTH
 W. JAKOB
 B. JAKOBS
 J. JANSMANN
 U. JANZ
 H. JEGEN
 K. JENNERICH
 H. JÖNCK
 M. JÖNCK
 E. JUNK
 P. KELLER
 H. KETTERING
 O. KIFFEL
 S. KILL
 T. KIRCHEN
 R. KLAESER
 A. KLEIN
 V. KLEIN
 R. KLENK
 F. KLÖPFER
 H. KLÜPPELBERG
 W. KLUGER
 M. KNÖDLER
 A. KÖNEN
 C. KÖNIG
 A. KONRAD
 K. KRÄMER
 M. KROHNE
 J. KUCHINKE
 A. KUNZ
 W. KUNZ
 G. KURZ
 K. LAUX
 E. LEESE
 H. LEMKE
 L. LENZ
 K.-H. LEY
 P. LIESER
 U. LINK
 P. LINSCHIED
 E. LIPPOK
 T. LOOSE
 P. LORGÉ
 M. LOTZE
 A. LUHMER
 F. MADER
 A. MAIER
 T. MAIWALD
 S. MANNSCHOTT
 K. MANTEL
 G. MAY
 W. MAY
 P. MENDE
 J. MEYER
 G. MICHELS
 J. MICHELS
 H. MOCK
 Hr./Fr. MOERSIG
 G. MÖHNEN
 B. MÖDDER
 R. MOHRS-JÖNCK
 F. MOLITOR
 W. MOLL
 S. MOSTER
 T. MÜLLEN
 T. MÜLLER
 M. MÜNCH (†)
 L. MUNSCH
 A. NEIDHÖFER
 H. NEIDHÖFER
 Hr./Fr. NEUHAUS
 M. NIEHUIS
 OAG TRIER
 G. OEHMICHEN
 G. ÖSTERMANN
 W. PANTSER
 J. PAUWELS
 H. PEHL
 B. PICKAN
 G. PICKER
 R. PICKEL
 R. PITTOCOPITIS
 H. PLÄN
 V. PLATZ
 J. PODSZUN
 W. PODSZUN
 A. PORN
 M. POST
 D. PRAUST
 P. RAMACHERS
 C. RANDLER
 K. RAPP
 T. RAUTENBERG
 D. RECH
 H. RECH
 J. REUFENHEUSER
 M. REUTER
 J. RICHARZ
 G. RINDCHEN
 D. RINNE
 M. RINNE
 D. RIPPBERGER
 F. ROBECK
 M. ROBECK
 S. RÖSNER
 J. ROSENBAUM-FOLZ
 E. ROSLEFF SÖRENSEN
 H. ROSS
 N. ROTH
 K. RUBLACK
 H. SAUER
 D. SAUERBORN
 M. SCHÄFER
 E. SCHALLER
 R. SCHEID
 M. SCHELLER
 P. SCHIEFENHÖVEL
 M. SCHLEUNIG
 H. SCHLIERIKE
 M. SCHLIERIKE
 M. SCHMALEN
 L. SCHMID
 E. SCHMIDT
 K. SCHMIDT
 P. SCHMIDT
 V. SCHMIDT
 S. SCHMIDT-FASEL
 Hr. SCHMITT
 M. SCHMITZ
 M. SCHMÖLZ
 F. SCHMOLTZI
 U. SCHMOLTZI
 T. SCHNEIDER
 FR. SCHÖN
 V. SCHÖNFELD
 M. SCHOLL
 M. SCHORR
 J. SCHRUBA
 H. SCHULZ
 U. SCHULZ
 M. SCHWARZ
 H.-J. SCHYGULLA
 E. SEFRIN
 J. SIGMUND

L. SIMON	J. THEIMER	T. WEBER
P. SPIELER	A. THIELE	M. WEIDENFELLER
K. STÄGER	F. THOMAS	J. WEIB
R. STEINHAUSEN	H. THOME	S. WEITER
M. STEVERDING	A. TORKLER	H. WEITZ
A. STÖHR	S. TWIETMEYER	J. WIEGAND
U. STÖHR	U. UHL	S. WIEGAND
F.-J. STÖLB	L. VAN DEN HOMBERGH	M. WINK
S. STÖLB	G. VIETZEN	W. WITZEL
C. STOHL	W. VOGEDES	P. WOLF
L. STOHL	B. VOLLMAR	T. WOLF
R. STEIGER	J.-R. VOS	F. ZELL
K. STREIT	G. WAGNER	F. ZIERZ
T. STREIT	S. WAGNER	H.-J. ZIMMERMANN
K. STREITEL	J. WAHL	M. ZIMMERMANN
O. STRUB	E. C. WALTER	J. ZÜRKER
H. STRUNK	N. WALTER	
I. STRUNK	F. WASSER	

RENÉ LEUBECHER, ANNEMARIE PORTLOCK, SANDY SCHNEIDER und MELANIE WAGNER gaben einen Großteil der Daten aus dem Internetforum (www.birdnet-rlp.de) und Rundschreiben ein und ergänzten fehlende Informationen. Kritische Anmerkungen, Korrekturen und Ergänzungen am Manuskript verdanken wir K.-H. HEYNE, S. IDELBERGER, A. KUNZ, T. MÜLLEN, N. ROTH und V. SCHMIDT. M. WAGNER erstellte die Verbreitungskarten. Dank gebührt außerdem allen Fotografen, die ihre (Beleg-)Fotos zur Verfügung stellten, die wir aus Platzgründen leider nicht alle drucken können: J. BAYER, D. BECKER, M. BECKER, R. BUSCH, C. DIETZEN, C. HEBER, E. LEESE, E. LIPPOK und M. SCHÄF.

3 Material und Methoden

Die Artkapitel wurden bearbeitet von:

Schwäne bis Enten, Taucher, Ammern
 Schreitvögel bis Kormoran, Kranich bis Rallen
 Greifvögel, Falken, Wiesenschmätzer
 Limikolen
 Möwen bis Wiedehopf
 Hühnervögel, Spechte, Singvögel und Hybriden

DOMINIK BECKER
 MICHAEL SCHMOLZ
 PETER RAMACHERS
 CHRISTIAN DIETZEN
 HANS-GEORG FOLZ
 JULIA BAYER

Die hier zusammengestellten und ausgewerteten Daten stammen aus den folgenden Quellen:

- direkte Meldungen an die Autoren;
- Beobachtungs-Mitteilungen von GNOR-Mitgliedern (z. B. regionale Rundbriefe Region Trier);
- an ausgewählte Beobachtungsforen im Internet gemeldete Daten (vor allem www.ornithologie-rlp.de bzw. www.birdnet-rlp.de);

Alle verfügbaren Daten aus den Jahren 2008 und 2009 wurden sorgfältig geprüft und ausgewertet. Beobachtungen von Seltenheiten wurden nur übernommen, wenn bei der AKRP oder der DSK eine vollständige Dokumentation vorlag (s. a. LIPPOK & DIETZEN 2003, 2011). Diese strikte Vorgehensweise führte dazu, dass einige Daten, internationalen Standards folgend, hier erneut nicht übernommen werden konnten, da die Dokumentation noch nicht erfolgt ist. Zwar tragen die Beobachter für die Richtigkeit ihrer Angaben selbst die Verantwortung, trotzdem haben wir uns vorbehalten, einige sehr ungewöhnliche Feststellungen auszusortieren, wenn die Richtigkeit der Artdiagnose nicht verifiziert werden konnte. Es sei darauf hingewiesen, dass auch jahreszeitlich ungewöhnliche Feststellungen von Zugvögeln mit einer kurzen Beschreibung bei der AKRP dokumentiert werden sollen (vgl. DIETZEN et al. 2008).

Zweifelhafte Daten aus unseriösen Quellen (verschiedene Internetseiten, Jahresberichte) mussten bewusst ignoriert werden.

Ihre Daten aus 2010 melden Sie bitte bis **30. April 2011** an:

DOMINIK BECKER (Region Trier), eMail: BeckerDominik@web.de

EWALD LIPPOK (Region Koblenz), Wismarer Str. 9, 56075 Koblenz, Tel. 0261-51212,
eMail: egh.lippok@t-online.de

HANS-GEORG FOLZ (Region Rheinhessen), Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt, Tel. 06130-6754,
eMail: folz-engelstadt@gmx.de

GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ e.V. (GNOR-Süd),
c/o Melanie Wagner, Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach bei Dahn, Tel. 06393-993406,
eMail: melanie.wagner@gnor.de

Alle Beobachtungsdaten sollten bevorzugt als Microsoft Excel-Datei oder damit kompatibler Software übermittelt werden. Eine Vorlage kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Hinweise zum Aufbau der Datenbank finden sich in den Einleitungen der älteren Jahresberichte (z. B. DIETZEN et al. 2004) und werden hier nicht mehr wiederholt.

Aus biogeographischen Gründen sind zum Teil Daten aus benachbarten Bundesländern enthalten (z. B. Hessen), wenn die Beobachtungen im unmittelbaren Grenzbereich erfolgten (z. B. Inselrhein zwischen Mainz und Bingen).

Die Reihenfolge und Nomenklatur der Arten richtet sich nach BARTHEL & HELBIG (2005). In den Überschriften der einzelnen Artkapitel haben wir grobe Statusbeschreibungen eingefügt, um dem Leser die Einordnung zu erleichtern. Dabei bedeuten:

- rBV** regelmäßiger und meist verbreiteter Brutvogel
- uBV** unregelmäßiger Brutvogel, nicht in jedem Jahr brütend und dann meist an unterschiedlichen Örtlichkeiten
- IBV** lokaler Brutvogel, meist jährlich brütend, aber nur in wenigen, eng begrenzten Brutgebieten
- rDZ** regelmäßiger Durchzügler, meist alljährlich und landesweit durchziehend
- uDZ** unregelmäßiger Durchzügler, nicht alljährlich oder nur an bestimmten Orten auftretend
- A** Ausnahmerecheinung
- GF** Gefangenschaftsflüchtling
- rBV (GF)** regelmäßiger Brutbestand, der aber überwiegend auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgeht
- rBV, rDZ** regelmäßiger Brutvogel, der unsere Region nach der Brutzeit verlässt oder Populationen aus anderen Regionen ziehen regelmäßig durch

Für detailliertere Statusangaben sei auf die aktuell gültige Artenliste der Vögel in Rheinland-Pfalz verwiesen (DIETZEN et al. 2008).

Die Einzelbeobachtungen werden aufgeführt mit Datum, Anzahl, Beobachtungsort/Landkreis und Beobachter. Bei Brutmeldungen mit Anzahl der Brutpaare/ Brutverdacht/Brutzeitbeobachtungen/Reviere, Beobachtungsort, Nummer der Topo-graphischen Karte 1:25.000/Minutenfeld und Beobachter. Dabei bedeutet z. B. 5707/49 eine Feststellung auf der Topographischen Karte Nr. 5707 im Minutenfeld 49 oder 5707/SO auf der Karte Nummer 5707 im südöstlichen Quadranten (s. auch Abb. 4). Je nach Datenlage und Vogelart enthalten die Artbearbeitungen Angaben zur Brutverbreitung, zum jahreszeitlichem Auftreten, Beobachtungsort (getrennt nach Naturräumen oder Landkreisen) und den Beobachtern (alphabetisch).

Um die Einordnung der aktuellen Daten zu erleichtern, haben wir an den entsprechenden Stellen (z. B. Erst-, Letztbeobachtungen bei Zugvögeln, Maximalzahlen) in Klammern die entsprechenden Vergleichsdaten der vorangegangenen Jahre angegeben (DIETZEN & SCHMIDT 2002, DIETZEN et al. 2003, 2004, 2005, 2006, DIETZEN & FOLZ 2008a, b), z. B. „Erstbeobachtungen (25.04.-03.05.)“, bedeutet, dass sich die Erstbeobachtungen 2001 bis 2007 zwischen dem 25. April und 03. Mai verteilen.

Die nachfolgende Auswertung listet die wesentlichen Eckdaten auf, z. B. neue Brutnachweise, phänologische Erst- und Letztbeobachtungen und Maximalzahlen. Dabei wurde versucht, möglichst auch regionale Aspekte zu berücksichtigen und nicht nur die landesweiten Extreme aufzulisten. In Einzelfällen, wenn ausreichend neue Daten vorlagen, wurden die bekannten Verbreitungskarten und Diagramme aktualisiert (Abb. 1). Weitere Details zur Phänologie und Verbreitung können den älteren Berichten entnommen werden (z. B. DIETZEN & FOLZ 2008a) bzw. werden in die geplante Avifauna einfließen.

Die folgenden Abkürzungen werden im Text verwendet:

*	an Seltenheitenkommission gemeldet, noch nicht anerkannt	JK	Jugendkleid
1. Som.	1. Sommerkleid	juv.	juvenil (Jungvogel)
1. W.	1. Winterkleid	K1, K2	erstes Kalenderjahr usw.
Abb.	Abbildung	km	Kilometer
abz.	abziehend	m.	mit
ad.	adult (Altvogel)	mind.	mindestens
AKRP	Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz	m üNN	Meter über Normalnull
Beob.	Beobachtung(en)	N, NO	nördlich, nordöstlich etc.
Bp.	Brutpaar(e)	NSG	Naturschutzgebiet
bes.	besetzte (Horste, Nester)	O	östlich
Bv.	Brutverdacht	PK	Prachtkleid
Bz.	Brutzeitbeobachtung(en)	pull.	Pullus/Pulli (Dunenjunge(s))
bzw.	beziehungsweise	Rev.	Revier(e)
ca.	circa	s. (a.)	siehe (auch)
dj.	diesjährig	sing.	singend
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission	SK	Schlichtkleid
dz.	durchziehend	S, SW	südlich, südwestlich etc.
Ex.	Exemplar(e)	u. a.	und andere
Fml.	Familie(n)	vgl.	vergleiche
GF	Gefangenschaftsflüchtling	vj.	Vorjährig
HAK	Hessische Avifaun. Komm.	VSG	Vogelschutzgebiet
immat.	immatur	W	westlich
Ind.	Individuum	wf.	weibchenfarben
		z. B.	zum Beispiel
		zw.	zwischen

Noch nicht abschließend beurteilte Seltenheitenbeobachtungen (*) dürfen erst nach Anerkennung durch die zuständige Seltenheitenkommission zitiert werden (bisher DSK, ab 01.01.2010 ist die DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) zuständig, s. KRÄTZEL & KRIEGS 2011) und sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Bereits anerkannte Nachweise sind nicht mehr besonders hervorgehoben (vgl. auch LIPPOK & DIETZEN 2011, in diesem Heft), d. h. alle nicht besonders gekennzeichneten Beobachtungen wurden geprüft und können zitiert werden.




Abb. 1: Kartengrundlage zur Darstellung der Verbreitung auf TK25-Quadranten-Basis. Bewaldete Flächen sind grau hinterlegt.

4 Übersicht zur Verwaltungsgliederung des Landes und der naturräumlichen Einheiten

Landkreise und Kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz und benachbarten Regionen (s. Abb. 2):

AK	Landkreis Altkirchen	LU	Stadt Ludwigshafen
AW	Landkreis Ahrweiler	MYK	Landkreis Mayen-Koblenz
AZ	Landkreis Alzey-Worms	MZ	Landkreis Mainz-Bingen sowie Stadt Mainz
BIR	Landkreis Birkenfeld	NR	Landkreis Neuwied
BIT	Eifelkreis Bitburg-Prüm	NW	Stadt Neustadt/Weinstraße
COC	Landkreis Cochem-Zell	PS	Landkreis Südwestpfalz / Stadt Pirmasens
DAU	Landkreis Vulkaneifel	RP	Rhein-Pfalz-Kreis (vormals LU)
DÜW	Landkreis Bad Dürkheim	RÜD	Rheingau-Taunuskreis (Hessen)
EMS	Rhein-Lahn-Kreis	SIM	Rhein-Hunsrück-Kreis
EU	Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen)	SP	Stadt Speyer
FT	Stadt Frankenthal/Pfalz	SÜW	Landkreis Südliche Weinstraße
GER	Landkreis Germersheim	TR	Landkreis Trier-Saarburg sowie Stadt Trier
KH	Landkreis Bad Kreuznach	WI	Wiesbaden (Hessen)
KIB	Donnersbergkreis	WIL	Landkreis Bernkastel-Wittlich
KL	Landkreis sowie Stadt Kaiserslautern	WO	Stadt Worms
KO	Stadt Koblenz	WW	Westerwaldkreis
KUS	Landkreis Kusel	ZW	Stadt Zweibrücken
LD	Stadt Landau		

Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz nach KUNZ & SIMON (1987; s. Abb. 3):

1. Süderbergland	8. Gutland
1.1 Siegerland	8.1 Bitburger Gutland
1.2 Mittelsieg-Bergland	8.2 Ferschweiler Plateau
2. Westerwald	8.3 Saar-Mosel-Gau
2.1 Hoher Westerwald	9. Moseltal
2.2 Oberwesterwald	9.1 Unteres Saartal
2.3 Rheinwesterwald = Niederwesterwald	9.2 Mittleres Moseltal
3. Lahntal	9.3 Wittlicher Senke
3.1 Unteres Lahntal	10. Hunsrück
3.2 Limburger Becken	10.1 Saar-Ruwer-Hunsrück
4. Taunus	10.2 Mosel-Hunsrück
4.1 Westlicher Hintertaunus	10.3 Hunsrück-Hochfläche
5. Mittelrheintal	10.4 Hoch- und Idarwald
5.1 Unterer Mittelrhein	10.5 Simmerner Mulde
5.2 Mittelrheinbecken (mit Neuwieder Becken, Pellenz und Maifeld)	10.6 Rheinhunsrück
5.3 Oberer Mittelrhein	11. Saar-Nahe-Bergland
6. Osteifel	11.1 Oberes Nahetal = Oberes Nahebergland
6.1 Ahreifel	11.2 Soonwald-Vorland
6.2 Kalkeifel	11.3 Nordpfälzisches Bergland
6.3 Östliche Hocheifel	11.4 Landstuhler Bruch
6.4 Moseleifel = Niedereifel	12. Saarländisch-Pfälzische-Muschelkalkplatte
6.5 Waldeifel	12.1 Westrich
7. Westeifel	13. Pfälzerwald
7.1 Westliche Hocheifel (mit Schneifel)	13.1 Dahner Felsenland
7.2 Islek	

- | | | | |
|------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 14. | Rhein-Main-Tiefland | 15.3 | Vorderpfälzisches Tiefland |
| 14.1 | Ingelheimer Rheinebene | 15.4 | Haardt |
| 15. | Nördliche Oberrheinebene | 15.5 | Nördliche Oberrheinaue |
| 15.1 | Unteres Nahetal | | |
| 15.2 | Rheinhesisches Tafel- und Hügelland | | |




Abb. 2: Grenzen der Landkreise und Kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz (aus KUNZ & SIMON 1987). Der Rhein-Pfalz-Kreis wird jetzt mit RP statt LU abgekürzt, d. h. LU ist nun beschränkt auf die Stadt Ludwigshafen.




Abb. 3: Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz (aus KUNZ & SIMON 1987). Erläuterung siehe Text S. 12-13.




Abb. 4: Blattübersicht der Topographischen Karten 1:25.000 für Rheinland-Pfalz (Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz).

5 Klimadaten 2008 und 2009

Die nachfolgende Zusammenstellung der klimatischen Daten aus dem Berichtszeitraum 2008 und 2009 basiert auf zwei Stationen, für die Daten im Internet (<http://www.dwd.de>) erhältlich sind:

Barweiler, Nürburg/AW (Eifel)	485 m ü.NN
Petrisberg/TR (Moseltal)	265 m ü.NN

Der generelle Temperaturverlauf war an beiden Stationen sehr ähnlich und dürfte für das gesamte Land repräsentativ sein. Das Jahr 2008 begann sehr mild und die Temperaturen lagen besonders im Januar und Februar deutlich über dem langjährigen Trend. Nach mittelmäßigem März und April stiegen die Temperaturen im Mai dann wieder stark an und lagen um 3,7° (Trier) bzw. 3,6° (Nürburg) über dem langjährigen Mittel (und damit – im Falle von Trier – nur um 0,8° kühler als ein gewöhnlicher August). Auch von Juni bis August blieb das Thermometer meist über dem Durchschnitt, der Unterschied war aber nicht mehr so stark. Erst im September zeichnete sich eine deutlich Abkühlung ab und im letzten Jahresdrittel wurden in drei Monaten (September, Oktober, Dezember) merklich zu niedrige Temperaturen gemessen. Im Dezember war es bisweilen winterlich kalt und die Tiefstwerte erreichten in Trier immerhin -8,2°C und in Nürburg -7,4°C. Lediglich der November war wieder etwas zu warm für die Jahreszeit.

Das Jahr 2009 begann sehr frostig und der Januar war durchweg zu kalt. Erst im Februar und März stiegen die Monatsmittel über den langjährigen Trend. Im April kam es dann zu einer regelrechten Hitzewelle und der Monatsdurchschnitt lag mehr als vier Grad über dem Mittel. In der Eifel wich der April um +4,7° vom langjährigen Mittel ab und in Trier waren es 4,2°. Einem eher normalen Sommer mit geringer Abweichung vom langjährigen Trend, folgten in der zweiten Jahreshälfte weitere vergleichsweise warme Monate (August, November). An der Station Nürburg wurde im November eine Abweichung von +4,1° und in Trier von +3,9° registriert. Dazwischen lagen die Temperaturen mal leicht über (September) oder leicht unter (Oktober, Dezember) dem langjährigen Trend.

Die Niederschlagsmengen lagen in 2008 insgesamt unter den Werten der vergangenen Jahre und in sieben Monaten wurden an beiden Stationen unterdurchschnittliche Mengen gemessen. Größere Niederschlagsmengen gab es im Februar-März, Juli und September-Oktober an beiden Stationen. Besonders von April bis Juni und dann wieder von November bis Dezember waren die gemessenen Niederschläge überall vergleichsweise niedrig. Die Gesamtniederschläge beliefen sich auf 633 mm (Nürburg) und 729 mm (Mosel). Die Gesamtniederschlagsmengen waren 2009 nur unwesentlich höher als im Jahr davor und trockenere Phasen wechselten regelmäßig mit niederschlagsreicheren Perioden ab. Im Gegensatz zum Vorjahr zeigten sich 2009 an beiden Stationen vielfach gegensätzliche Trends. In der Eifel waren besonders März-April, Juni und November durch überdurchschnittliche Niederschlagsmengen geprägt, wohingegen an der Mosel Juni-Juli und November-Dezember ausgiebigere Niederschläge brachten. Besonders trocken war in beiden Regionen der August mit weniger als 50% der üblichen Menge. Die Gesamtniederschläge beliefen sich 2009 auf 666 mm (Nürburg) und 799 mm (Mosel).

Somit ergaben sich vordergründig für die Brutzeit durch geringe Niederschläge und warme Temperaturen 2008 gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Brutgeschäft, jedoch kann es durch lokale Ereignisse wie Starkregen, Hagel, starke Windböen oder ungünstige Niederschlagsverteilung (Dauerregen), zu negativer Beeinflussung des Bruterfolgs kommen. Durch die deutlich zu warme Witterung in Januar und Februar hatten Überwinterer bessere Überlebensbedingungen. Für die Kernbrutzeit vieler Vogelarten ergaben sich, besonders im Juni 2009, sehr ungünstige Bedingungen mit vergleichsweise niedrigen Temperaturen und gleichzeitig hohen Niederschlägen. Auch die anhaltende Frostperiode Anfang 2009 hat bei einigen Arten zu erheblichen Einbußen geführt. Die anhaltend relativ milden Temperaturen im Herbst führten bei vielen Arten zu späteren Abzugsdaten.




Abb. 5: Monatsmittelwerte der Temperatur im Vergleich zum langjährigen Mittel an zwei verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2008 und 2009 (oben), sowie die Abweichung der Monatsmittelwerte vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre (unten). [Quelle: DWD.]




Abb. 6: Monatliche Niederschlagssummen an zwei verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2008 und 2009. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. [Quelle: DWD.]

6 Artkapitel

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die Auswertung der Beobachtungsdaten (n = 46.500) von 272 Vogelarten, die 2008 und 2009 in Rheinland-Pfalz festgestellt wurden. Darunter befanden sich wieder einige herausragende Beobachtungen, wie der erste Schelladler in Rheinland-Pfalz, jeweils der zweite Nachweis für Steinadler und Samtkopfgrasmücke, der dritte Steppenkiebitz und die dritte Alpenbraunelle, die vierte Zwergscharbe, das fünfte Thorshühnchen, der fünfte und sechste Spornpieper, der achte Kuhreiher, der 11. Graubrust-Strandläufer, die 14. Zwergohreule, der 15. Triel und der 16. Löffler. Drei weitere Feststellungen des Eistauchers bringen die Anzahl der Nachweise auf mittlerweile 20 und auch von der Spornammer gibt es mit drei weiteren Beobachtungen nun insgesamt schon 25. Der Schlangeadler aus dem Vorjahr kehrte für einen weiteren Spätsommeraufenthalt nach Rheinhessen zurück. Im Jahr 2008 erbrachte ein Einflug des Rotfußfalke nach Mitteleuropa auch ungewohnt zahlreiche Beobachtungen in Rheinland-Pfalz. Unter den Brutvögeln nimmt der Bestand des Bienenfressers weiterhin leicht zu, während ehemals weiter verbreitete Brutvögel wie Kiebitz, Bekassine, Schilfrohrsänger und Beutelmeise starke Einbußen zeigen. Trotz der zahlreichen Highlights zeigen sich für viele Arten erhebliche Meldedefizite und verlässliche Aussagen sind hier kaum möglich.

Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)

GF

Diese Art wurde ungewohnt zahlreich beobachtet und im Berichtszeitraum gelangen fast so viele Feststellungen, wie zuvor insgesamt aus Rheinland-Pfalz vorlagen.

22.01.-23.03.08	1 ♂	Kistnerweiher Neuhofen/RP	J. BAYER, H. BOTT, C. DIETZEN, T. DOLICH, V. HARRIES, U. JANZ, R. STEINHAUSEN R. BUSCH
22.03.-07.04.08	1 ♂	Wiesensee bei Pottum/WW	R. BUSCH
11.-18.01.09	1 ♀	Rheinhafen Brohl/AW	G. ELLWANGER, M. JÖNCK, M. ZIMMERMANN

Schwarzschan (*Cygnus atratus*)

GF

18.01.08	1 Ex.	Teiche bei Holzappel/EMS	P. ERLEMANN
20.08.08	1 dj.	Silbersee, Roxheim/RP (dz. mit Kanadagänsen)	J. BAYER
08.09.08	1 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
Sep.-29.11.08	max. 2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, H. BOTT, V. HARRIES, C. RANDLER, M. WINK

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

rBV, rDZ

In den beiden Berichtsjahren wurde der Bestand nur unvollständig erfasst. Ein TK25-Quadrant wurde 2008 neu besetzt (6516/NW). Für das Jahr 2008 wurden 21 Brutpaare mit 68 Pulli gemeldet, wobei aber nicht für jedes Paar der Bruterfolg gemeldet wurde. Für das Jahr 2009 wurden 13 Brutpaare mit 46 Pulli mitgeteilt.

Maximalzahl (47-160):

20.02.08	53 Ex.	Wörther Altrhein/GER	U. JANZ
11.09.09	86 Ex.	Bingen/MZ	B. VOLLMAR

Ringfund:

2008 brütete ein Weibchen in Ludwigshafen/LU, welches als Pullus im Jahr 2001 in der Tschechoslowakei beringt worden war (J. BAYER).

Singschwan (*Cygnus cygnus*)**uDZ**

Zunächst drei, später neun Vögel hielten sich in den Rheinauen bei Bingen-Gaulsheim/MZ auf. Ein Vogel trug ein gelbes Halsband mit der Markierung „1R24“. Der Vogel war in Polen markiert worden.

31.12.08-17.01.09 bis 9 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH, D. RINNE, V. SCHMIDT, u. a.
-----------------------------	-------------------------------	---

Kanadagans (*Branta canadensis*)**rBV (GF)**

Für das Jahr 2008 wurden 38 Brutpaare gemeldet. Bei 30 Brutpaaren ist der Bruterfolg mit insgesamt 94 Pulli bekannt. Für 2009 wurden lediglich 15 Brutpaare mit 61 Pulli gemeldet. Auf vier TK25-Quadranten konnten erstmals Vorkommen festgestellt werden (Abb. 7).

Maximalzahl (60-350):

18.10.08	193 Ex.	Neuburg/GER	F.-J. SCHYGULLA
18.11.09	250 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	R. STEINHAUSEN

Ein beringter Jungvogel der Unterart *B. c. minima*, welcher am 12.08.2008 am Silbersee Roxheim/RP beobachtet wurde, entstammte zweifellos aus einer Vogelhaltung (J. BAYER).

Ringfunde:

Ring Hiddensee BA009158, beringt am 11.06.1998 in Ludwigshafen, Ring abgelesen am 15.03.2008 ebenda an der Großen Blies als brütender Vogel. Dieses Individuum war eine der ersten Kanadagänse, die im Zuge des Neozoen-Beringungsprogramms (s. www.kanadagans.de) in Rheinland-Pfalz beringt worden waren (O. GEITER mdl.).

Ring Hiddensee BA011981, beringt am 02.06.2002 in Ludwigshafen, Ring abgelesen am 19.05.2008, Ludwigshafen, Große Blies, ebenfalls ein Brutvogel (J. BAYER).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)**rDZ (GF)**

Für einige Vögel ist eine Herkunft aus Gefangenschaft sicher (#) oder sehr wahrscheinlich. In vielen Fällen bleibt die Herkunft aber unklar.*

#01.01.08-31.12.09 max. 3 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, H. BOTT, C. DIETZEN, C. RANDLER, R. STEINHAUSEN, M. WINK
10.02.08	1 Ex.	Rhein bei Heidenfahrt/MZ B. VOLLMAR
#24.03.08	1 Ex.	Schwarzbach/ZW C. BRAUNBERGER
17.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ B. VOLLMAR
03.05.08	2 Ex.	Polder Ingelheim/MZ H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
#04.09.-11.09.08	2 Ex.	Schottel Osterspai/EMS M. u. U. BRAUN
31.12.08-02.01.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP E. SEFRIN
04.-17.01.09	1 Ex.	Kenner und Ehranger Flur/TR K.-H. HEYNE, M. u. F. ROBECK, S. WIETMEYER




Abb. 7: Brutverbreitung der Kanadagans (*Branta canadensis*) in Rheinland-Pfalz 2001-2009 (besetzte TK25-Quadranten).

24.01.-15.03.09	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
#24.07.09	1 Ex.	Schottel Osterspai/EMS	M. u. U. BRAUN
#16.08.-15.11.09	1 Ex.	Gewässer im Westerwald/WW	J. KUCHINKE, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, M. SCHÄFER
#14.09.09	3 Ex.	Rheindürkheim/WO (m. Kanadagänsen N ziehend)	J. BAYER
07.11.09	1 Ex.	Baggersee, Ippesheim/KH	B. VOLLMAR
21.11.09	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK
30.11.09	2 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
26.-31.12.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
26.-27.12.09	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Ringelgans (*Branta bernicla*)**A**

Zwei Beobachtungen während der Heim- und Wegzugperiode 2008 stellen die Nachweise Nr. 27 und 28 für Rheinland-Pfalz dar, zuletzt waren im Jahr 2004 Ringelgänse beobachtet worden. Beide Vögel sind der Nominatform zuzuschreiben.

05.03.08	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	R. SCHEID
21.11.08	1 Ex.	Kistnerweiher Neuhofen/RP	J. BAYER

Saatgans (*Anser fabalis*)**rDZ**

Die Meldungen betreffen überwiegend den derzeit wichtigsten Rastplatz in den Mechttersheimer Tongruben/RP (H. BOTT, C. DIETZEN, T. DOLICH, C. HEBER, E. SEFRIN, M. WINK). Es wurden nur ‚Tundrasaatgänse‘ *A.f.rossicus* gemeldet.

Letztbeobachtungen Heimzug (04.03-19.03):

28.02.08	10 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
01.03.09	ca. 160 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Erstbeobachtungen Wegzug (15.10.-20.10):

08.11.08	2 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
14.10.09	6 Ex.	dz. Otterstätter Altrhein/RP	A. u. U. STÖHR

Maximalzahlen (1.200-1.500):

27.01.08	1.750 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
26.12.09	2.000 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Sonstige Beobachtungen:

07.12.08	1 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	D. RINNE
01.-18.01.09	max. 245 Ex.	Engenser Feld und Urmitzer Werth/NR	M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK
02.01.09	2 Ex.	Viehweiden SW Hachenburg/WW	A. KUNZ
03.-28.01.09	max. 178 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.-17.01.09	34 Ex.	Kenner u. Ehranger Flur/TR	K.-H. HEYNE, M. u. F. ROBECK, S. TWIETMEYER
18.-25.01.09	3 Ex.	Kesten/WIL	M. BECKER
22.01.09	1 Ex.	Rheinlache bei Koblenz/KO	M. u. U. BRAUN
01.02.09	2 Ex.	Laacher See/AW	E. LIPPOK
19.10.09	4 Ex.	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
24.10.09	2 Ex.	Kannsee/NR	J. JANSMANN
31.10.09	9 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
14.11.09	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
04.12.09	5 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
07.12.09	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
26.12.09	150 Ex.	Kiefweiher, Altrip/RP	J. BAYER

Blässgans (*Anser albifrons*)**rDZ**

Die Meldungen betreffen, wie bei der Saatgans, überwiegend die Mechttersheimer Tongruben (H. BOTT, C. DIETZEN, T. DOLICH, C. HEBER, E. SEFRIN, M. WINK).

Letztbeobachtungen Heimzug (13.02.-06.05.):

25.03.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	R. STEINHAUSEN
04.04.09	1 Ex.	Mosel in Cochem/COC	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Wegzug (13.10.-21.11.):

08.11.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK
13.10.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen (23-120):

24.02.08	69 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
24.01.09	85 Ex.	Heidenfahrt Mariannenu/MZ	W. HEUSER

Sonstige Beobachtungen:

27.01.08	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
21.03.08	12 Ex.	Steinbruch bei Neu-Bamberg/KH	M. KNÖDLER
30.11.08	8 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
03.-18.01.09	52 Ex.	Engerser Feld, Urmitzer Werth/NR	M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK
03.-11.01.09	max. 40 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. BICKEL, H.-G. FOLZ, D. RINNE, V. SCHMIDT
04.-17.01.09	3 ad., 1 juv.	Kenner u. Ehranger Flur/TR	K.-H. HEYNE, M. u. F. ROBECK, S. TWIETMEYER
18.-25.01.09	1 Ex.	Kesten/WIL	M. BECKER
18.01.-05.05.09	1 Ex.	Wasserbilligerbrück u. Langsur/TR	K.-H. HEYNE, M. SCHORR, S. TWIETMEYER,
27.03.09	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
13.10.-29.11.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher u. Postweiher/WW	A. KUNZ
17.10.09	6 Ex.	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
24.10.09	9 Ex.	Kannsee/NR	J. JANSMANN
28.11.09	1 Ex.	GF, Mosel bei Oberbillig	F.-J. STÖLB
06.12.09	6 ad., 1 juv.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
25.12.09	40 Ex.	Steinsee/NR	R. SCHEID
27.12.09	2 ad., 4 juv.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
28.12.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
31.12.09	2 Ex.	NSG Untere Nahe/MZ	B. VOLLMAR

Graugans (*Anser anser*)

rBV, rDZ

Das Verbreitungsbild hat sich in den beiden Berichtsjahren kaum verändert. Der Inselrhein bildet weiterhin den Verbreitungsschwerpunkt. Erstmals fand 2008 eine Brut in der Region Trier, außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes, statt (Kiesgruben Kenner Flur/TR, 6106/SW, S. TWIETMEYER, J. ENGLER). Ebenfalls erstmalig besetzt war der TK25-Quadrant 6815/60.

Im Jahr 2008 wurden 65 Brutpaare mit 229 Pulli beobachtet. 2009 wurden lediglich 18 Brutpaare mit 89 Pulli gemeldet. Der Unterschied beruht wesentlich auf dem höheren Erfassungsgrad im Jahr 2008.

Maximalzahlen (620-2.300):

07.12.08	1.500 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
07.11.09	2.200 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK

Streifengans (*Anser indicus*)

GF

01.01.08-20.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, M. FEUERSENGER, R. STEINHAUSEN, N. WALTER, M. WINK
08.02.-19.07.08	bis 3 Ex.	Neuburg, Kiese Wolf & Müller/GER	H.-J. SCHYGULLA, L. SIMON
17.09.08	4 Ex.	Laubenheimer Ried/MZ	M. SCHMOLZ
22.01.09	1 Ex.	Wasserbilligerbrück/TR	K.-H. HEYNE, S. TWIETMEYER
08.05.-07.09.09	1 Ex.	Hagenbach/GER	H.-J. SCHYGULLA
11.07.-10.11.09	1 Ex.	Mosel Römerbrücke Trier/TR	R. KLAESER, S. TWIETMEYER
08.09.09	2 Ex.	Maximiliansau/GER	H.-J. SCHYGULLA
11.-24.10.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	T. DOLICH, M. WINK

Schwanengans (*Anser cygnoides*)

GF

Die Beobachtungen konzentrieren sich auf den Roxheimer Altrhein, wo sich seit Jahren eine Gruppe mit flugfähigen Individuen der domestizierten Form („Höckergans“) aufhält (Maximalzahl: 13 Ex. am 01.01. und 04.11.2008, Beobachter: J. BAYER, H. BOTT, C. DIETZEN, M. FEUERSENGER, C. RANDLER, R. STEINHAUSEN, M. WINK).

Weitere Beobachtungen:

10.01.08	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
10.02.08	2 Ex.	Wasserbilligerbrück/TR	S. TWIETMEYER
22.02.-29.04.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN, E. SEFRIN, M. WINK
24.05.08	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	M. WINK
03.10.08	2 Ex.	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN
26.10.08	2 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	M. WINK
13.-26.12.08	2 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN, M. WINK
24.01.09	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
16.05.09	1 Ex.	Ludwigshafen, Parkinsel/LU	J. BAYER
13.12.09	1 Ex.	Kiesgrube Jungbluth, Urmitz/MYK	M. JÖNCK
26.-27.12.09	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

rBV (GF)

Bruten:

Der Brutbestand nimmt weiterhin zu und 2008/2009 wurden mindestens acht neue TK25-Quadranten besetzt (s. Abb. 8). Zunahmen zeigten sich vor allem an der Mosel im nördlichen Rheinland-Pfalz. Erste jungführende Altvögel gab es bereits am 06.03.2008 (ein Paar mit sieben frisch geschlüpften Pulli) an der Großen Blies/LU (J. BAYER).

Auch die Maximalzahlen haben im Vergleich zu den Vorjahren spürbar zugenommen.

Maximalzahlen (12-131):

16.09.08	272 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
07.11.09	253 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK




Abb. 8: Brutverbreitung der Nilgans (*Alopochem aegyptiaca*) in Rheinland-Pfalz 2001-2009 (besetzte TK25-Quadranten).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

IBV, rDZ

Bruten:

An den Klärteichen bei Offstein/DÜW (6315/54) brütete 2008 ein Paar mit drei Jungen (H. BOTT, R. STEINHAUSEN, B. VOLLMAR) und 2009 ein Paar mit fünf Jungen (M. WINK) erfolgreich.

Erstbeobachtung im Brutgebiet (10.01.-24.03.):

27.01.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
01.02.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Letztbeobachtung im Brutgebiet (28.08.-31.12.):

07.08.08	2 dj.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
22.08.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Beobachtungen abseits des Brutgebietes:

28.03.08	8 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.04.08	2 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	R. SCHEID
07.04.08	2♂, 4♀	Steinsee/NR	R. SCHEID
11.04.08	2 Ex.	Steinsee/NR	W. VOGEDES
14.-15.04.08	1 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, R. SCHEID, W. VOGEDES
28.04.08	4 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
08.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
12.-13.05.08	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER
13.05.08	2 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.05.08	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
13.-29.06.08	max. 11 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
27.06.08	10 Ex.	überfl. Sangweiher/DAU	D. BECKER
17.07.08	4 ad., 5 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
18.-28.07.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	D. BECKER, P. ERLEMANN, C. KÖNIG, E. LIPPOK, T. RAUTENBERG
17.08.08	1 ♀	Mussbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
07.12.08	3 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
03.-04.01.09	1 Ex.	Schäferweiher, Lingenfeld/GER	E. SEFRIN
14.02.09	8 Ex.	Urmitzer Werth/NR	W. VOGEDES
18.04.09	5 Ex.	Kannsee/NR	W. VOGEDES
08.05.09	1 ♂	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
21.-23.05.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
25.06.09	1 ♀	Sangweiher/DAU	H. BODES
28.06.09	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
13.12.09	2 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

GF

26.10.08	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	M. WINK
01.03.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
11.09.09	1 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Moschusente (*Cairina moschata*)

GF

Vom 25.01. bis 13.04.2008 hielt sich ein Exemplar am Postweiher/WW auf (A. KUNZ) und vom 01.03. bis Ende 2008 konnten zwei Exemplare an der Großen Blies in Ludwigshafen/LU beobachtet werden (J. BAYER).

Brautente (*Aix sponsa*)

GF

14.09.08	1 ♀	Otterstädter Altrhein/RP	T. DOLICH
17.03.09	1 ♂	Berg/GER	H.-J. SCHYGULLA
11.11.09	1 ♀	Wörth/GER	H.-J. SCHYGULLA
15.11.09	1 ♀	Teiche bei Hof Roth, Giershofen/NR	J. KUCHINKE

Mandarinente (*Aix galericulata*)

IBV (GF)

Bruten:

Der Bestand am Weiher Remstecken/KO scheint rückläufig. Ein Brutnachweis konnte jedoch an anderer Stelle erbracht werden:

2 ♀ m. 4 u. 8. juv. (2008)	Schottel Osterspai/EMS	5711/38	M. u. U. BRAUN
1 ♀ m. 4 juv. (2009)	Weiherr Remstecken/KO	5611/53	M. u. U. BRAUN

Maximalzahl außerhalb der Brutzeit:

31.08.09	15 Ex.	Weiherr Remstecken/KO	M. u. U. BRAUN
----------	--------	-----------------------	----------------

Sonstige Beobachtungen:**Nördliches Rheinland-Pfalz:**

25.02.08	3 ♂, 2 ♀	Kreuznacher Stadtwald/KH	B. VOLLMAR
17.03.08	1 ♂, 1 ♀	Lahnstein, Lahn-mündung/EMS	M. u. U. BRAUN
06.04.08	1 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.04.08	2 ♂	Lahnstein/EMS	M. u. U. BRAUN
03.05.08	1 ♂	Große Nister bei Nister/WW	A. KUNZ
20.10.08	1 ♂	Rhein bei Lahnstein/EMS	M. u. U. BRAUN
25.12.08-03.01.09	1 ♀	Saartalarm bei Wiltingen/TR	D. BECKER, F.-J. STÖLB
28.12.08	1 ♂, 1 ♀	Mosel bei Koblenz-Moselweiß/KO	E. LIPPOK
01.01.-18.12.09	1 ♂	Saar u. Mosel bei Konz/TR	D. u. Mf. BECKER, N. BÖHM, K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB
18.01.u. 01.02.09	2 ♂, 2 ♀	Mosel bei Koblenz/KO	E. LIPPOK
18.03. u. 14.04.09	1 ♂	Rhein bei Lahnstein/EMS	M. u. U. BRAUN
10.04.09	1 ♂, 1 ♀	Schottel Osterspai/EMS	M. u. U. BRAUN
20.11.09	3 ♂, 1 ♀	Friedrichsseggen/EMS	M. u. U. BRAUN
24.12.-30.12.09	1 ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Südliches Rheinland-Pfalz:

03.02.08	1 ♂, 1 ♀	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
13.-15.11.08	1 ♂	Mechtersheimer Tongruben/RP	H. BOTT, E. SEFRIN
25.01.09	1 ♂	Mainz, Winterhafen/MZ	M. SCHMOLZ
01.05.09	1 ♂, 1 ♀	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN
24.05.09	1 ♂, 2 ♀	Lingenfelder Altrhein/GER	C. HEBER
02.-18.11.09	1 ♂	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
12.11.09	1 ♂	Kiefweiher Altrip/RP	J. BAYER
20.12.09	2 ♂, 2 ♀	Mundenheimer Altrheinhafen/LU	J. BAYER

Schnatterente (*Anas strepera*)**uBV, rDZ****Bruten:**

2008:			
2 ♀ m. 7 u. 6 pull.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	6416/NW	J. BAYER
5 ♀ m. 2, 4, 9, 10, 10 pull.	Neuhofener Altrhein/RP	6516/SO	J. BAYER
2009:			
3 ♀ m. 7, 5, 5 pull.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	6416/NW	J. BAYER

Maximalzahlen (252-698):

13.01.08	78 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
16.01.08	8 ♂, 5 ♀	Kiesgruben Kenner Flur und Mosel/TR	S. TWIETMEYER
19.01.08	260 Ex.	Wörther Altrhein/GER	U. JANZ
03.-07.10.08	ca. 300 Ex.	Herbstbalz Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
16.11.08	60 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
23.11.08	32 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.01.09	141 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
14.01.09	53 Ex.	Ingelheim, Rhein bei Jungaue/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	579 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	T. DOLICH
15.11.09	10 ♂, 12 ♀	Kiesgruben Kenner Flur/TR	D. BECKER
09.12.09	43 Ex.	Dreifelder Weiherr/WW	A. KUNZ
13.12.09	15 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK

Pfeifente (*Anas penelope*)**rDZ**Letztbeobachtungen Heimzug (17.04.-09.05.):

07.05.08	1 ♂	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
26.04.09	1 ♂, 1 ♀	Sangweiher/DAU	D. BECKER

Erstbeobachtungen Wegzug (15.08.-24.09.):

31.08.08	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	G. FAHL
08.09.09	1 ♂	Ulmener Jungferweiher/COC	H. BODES

Maximalzahlen (72-158):

24.02.08	15 Ex.	Rheinhafen Andernach/MYK	M. JÖNCK
12.10.08	10 ♂, 15 ♀	Neuburg, Kiessee Wolf & Müller/GER	H.-J. SCHYGULLA
14.11.08	13 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
14.11.08	70 Ex.	Rodder Maar/AW	M. u. U. BRAUN
18.11.08	60 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	R. STEINHAUSEN
23.11.08	3 ♂, 11 ♀	Kiesgruben Riol/TR	D. BECKER, K.-H. HEYNE
23.11.08	13 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
06.01.09	74 Ex.	Rhein bei Jungaue, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.03.09	18 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
31.10.09	80 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
15.11.09	53 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
13.12.09	64 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
27.12.09	3 ♂, 5 ♀	Trittenheim/WIL	K.-H. HEYNE

Krickente (*Anas crecca*)**IBV, rDZ**Bruten:

1 BP m. 9 pull. (2008)	Seebach Rheindürkheim/WO	6216/SW	L. SIMON
1 BP m. 2 pull. (2009)	Kiesgruben Großlittgen/WIL	5906/57	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen (205-1.120):

06.01.08	315 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
27.01.08	140 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
03.02.08	64 Ex.	Klärteiche Mehren/DAU	W. VOGEDES
07.09.08	40 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
19.10.08	294 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
23.11.08	23 Ex.	Steinsee/NR	E. LIPPOK
10.09.09	29 Ex.	Kiesgruben Großlittgen-Heeg/WIL	D. RECH
03.10.09	25 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
09.10.09	52 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
13.10.09	403 Ex.	Wiesensee/WW	A. KUNZ
13.11.09	100 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER
15.11.09	350 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Stockente (*Anas platyrhynchos*)**rBV, rDZ**

Brutnachweise der Art werden weiterhin nur sehr unvollständig gemeldet. Für den Berichtszeitraum wurden für insgesamt 11 TK25-Quadranten erstmals Brutvorkommen gemeldet. Dennoch gibt die in der Karte gezeigte Verbreitung nur einen groben Überblick und enthält erhebliche Kenntnislücken (Abb. 9).

Maximalzahlen (480-3.000):

06.01.08	500 Ex.	Schäferweiher/GER	M. WINK
19.09.09	923 Ex.	Wiesensee/WW	J. KUCHINKE




Abb. 9: Brutverbreitung der Stockente (*Anas platyrhynchos*) in Rheinland-Pfalz 2001-2009 (besetzte TK25-Quadranten).

Spießente (*Anas acuta*)

rDZ

Letztbeobachtungen Heimzug (22.04.-18.05.):

25.04.08	1 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
13.04.09	1 ♂	Kannsee/NR	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Wegzug (11.08.-20.09.):

16.08.08	1 ♂	Sangweiher/DAU	M. BECKER, C. HACKENBERG
18.09.09	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER

Maximalzahlen (6-47):

08.03.08	5 ♂, 6 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BIRK, F. ZIERZ
14.03.08	11 Ex.	Steinsee/NR	M. u. U. BRAUN
14.03.09	10 ♂, 10 ♀	Polder Ingelheim/MZ	V. HÄSELBARTH

Knäkente (*Anas querquedula*)**uBV, rDZ**

Sicherlich bedingt durch den ungewöhnlich warmen Winter (vgl. Abb. 5), lagen die Erstbeobachtungen 2008 außerordentlich früh.

Erstbeobachtungen Heimzug (01.03.-17.03.):

23.02.08	1 ♂	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK
24.02.08	1 ♂, 1 ♀	Nahemündung Bingen/MZ	B. VOLLMAR
14.03.09	2 ♂	Tongruben Binsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
14.03.09	2 ♂, 1 ♀	Schottel Osterspai/EMS	M. u. U. BRAUN
14.03.09	1 ♂, 1 ♀	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen Heimzug (13.05.-31.05.):

24.05.08	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
16.05.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Sommerbeobachtung:

08.06.08	1 ♂, 1 ♀	Altrich, Regenrückhaltebecken/WIL	M. BECKER
----------	----------	-----------------------------------	-----------

Erstbeobachtungen Wegzug (02.07.-09.08.):

02.07.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.07.09	6 Ex.	Kiesgruben Großlittgen-Heeg/WIL	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Wegzug (08.10.-24.11.):

08.10.08	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
15.09.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Maximalzahlen (16-32):

16.03.08	5 ♂, 1 ♀	Kannsee/NR	E. LIPPOK
05.04.08	4 ♂, 2 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
10.08.08	6 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
14.03.09	10 ♂, 2 ♀	Polder Ingelheim/MZ	V. HÄSELBARTH

Löffelente (*Anas clypeata*)**uBV, rDZ**

Weder 2008 noch 2009 gab es Bruten im Land. Der letzte Brutnachweis wurde 2005 erbracht.

Letztbeobachtungen Heimzug (11.05.-17.06.):

14.06.08	7 ♂, 3 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.06.09	1 ♂	Sangweiher/DAU	M. BECKER

Erstbeobachtungen Wegzug (16.06.-01.08.):

02.07.08	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
05.07.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Maximalzahlen (59-127):

15./16.03.08	8♂, 3♀	Kiesgruben Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
30.03.08	74 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
05.04.08	34 Ex.	Kannsee/NR	R. SCHEID
05.04.08	9♂, 7♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
12.04.08	12♂, 11♀	Nahe zw. Gensingen und Ippenheim/KH	B. VOLLMAR
12.04.08	26♂, 15♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.04.09	23 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
10.04.09	9♂, 6♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK
03.10.09	4♂, 4♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.11.09	35 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
27./28.11.09	8 Ex.	Mosel bei Schloss Monaise, Trier/TR	F.-J. STÖLB

Kolbenente (*Netta rufina*)**IBV, rDZ****Brutnachweise:**

2008:			
1 ♀ m. 9 juv.	Holzscher Weiher, Ludwigshafen/LU	6516/14	J. BAYER
2 ♀ m. 4 u. 1 juv.	Ludwigshafen, Große Blies/LU	6516/16	J. BAYER
2 juv. ohne ♀ m. Stockentenfamilie	Kistnerweiher, Neuhofen/RP	6516/47, 48	J. BAYER
4 juv. ohne ♀ m. Stockentenfamilie	Neuhofener Altrhein/RP	6516/48	J. BAYER
2009:			
1 Bp. m. 4 juv.	Steinsee/NR	5510/49, 50	M. u. U. BRAUN
1 ♀ m. 3 juv.	Ludwigshafen, Große Blies/LU	6516/16	J. BAYER
1 ♀ m. 4 juv.	Neuhofener Altrhein/RP	6516/48	J. BAYER
1 Bp. m. 9 juv.	Marxweiher, Altrip/RP	6516/SO	E. SEFRIN
1 Bp. m. 5 juv.	Mechtersheimer Tongruben/RP	6716/26	E. SEFRIN

Sonstige Beobachtungen (Maximalzahlen):**Nördliches Rheinland-Pfalz:**

26.12.08-09.02.09	1♂	versch. Gewässer bei Trier/TR	D. BECKER, K.-H. HEYNE, P. LIESER, A. LUHMER, F.-J. STÖLB, S. TWIETMEYER
27.09.09	5♂, 1♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
22.11.09	1 Ex.	Laacher See/AW	P. LIESER
20.-27.12.09	1♀	Steinsee/NR	E. LIPPOK

Südliches Rheinland-Pfalz:

05.02.08	28♂, 13♀	Kistnerweiher, Neuhofen/RP	V. HARRIES
03.08.08	37 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK
15.11.08	11 Ex.	Ludwigshafen, Große Blies/LU	J. BAYER
03.-21.01.09	3♂, 1♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
16.08.09	32 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
18.09.09	77 Ex.	Kistnerweiher, Neuhofen/RP	T. DOLICH

Moorente (*Aythya nyroca*)**rDZ**

13.01.-24.02.08	1♀	Rheinhafen Andernach/MYK	M. JÖNCK
27.01.-16.02.08	1♂	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
09.-30.03.08	1♂	Wiesensee/WW	R. BUSCH
23.05.08	1 Ex.	Wölferlinger Weiher/WW	R. BUSCH
04.-20.07.08	1♂	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, H. BOTT, V. SCHMIDT, M. WINK,
20.-22.07.08	1♂	Tongrube Hüblingen/WW	R. BUSCH
14.-29.11.08	1♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

10.01.-11.02.09	1 ♀	Rheinhafen Andernach/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
11.09.09	1 ♂	Wiesensee/WW	R. BUSCH
30.12.09	1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
31.12.09	1 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, V. SCHMIDT, M. WINK

Tafelente (*Aythya ferina*)**uBV, rDZ**Bruten (2008):

1 ♀ m. 6 juv.	Hinterer Roxheimer Altrhein/RP	6416/NW	J. BAYER
2 ♀ m. 2 u. 1 juv.	Mechtersheimer Tongruben/RP	6716/26	E. SEFRIN

Maximalzahlen (300-1.050):

01.01.08	418 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	C. DIETZEN
06.01.08	400 Ex.	Schäferweiher/GER	M. WINK
04.02.08	128 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
09.-22.03.08	200 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
01.11.08	530 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
29.11.08	30 Ex.	Saaraltarm bei Wiltingen/TR	K.-H. HEYNE
30.11.08	61 ♂, 22 ♀	Uhlernborn, Teichgebiet/MZ	W. HEUSER
01.01.09	114 Ex.	Steinsee/NR	M. JÖNCK
14.01.09	85 Ex.	Ingelheim, Rhein bei Jungaue/MZ	H.-G. FOLZ
07.02.09	250 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	M. WINK
09.02.09	38 ♂, 8 ♀	Saaraltarm bei Wiltingen/TR	D. BECKER
12.12.09	576 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
13.12.09	156 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Ringfund:

Vom 01.-05.03.2009 hielt sich ein auf dem Oberschnabel farbmarkierter Erpel auf der Mosel bei Igel/TR auf (D. BECKER, S. TWIETMEYER). Die hellgrüne Markierung trug die Aufschrift „NO-A-ON“. Der Vogel war am 25.10.2006 in St. Philbert-de-Grand-Lieu (Frankreich) markiert worden. Die Entfernung zum Wiederfundort beträgt 680 Kilometer.

Reiherente (*Aythya fuligula*)**rBV, rDZ**

2009 gelang der erste Brutnachweis für die Region Trier am Eichholzmaar bei Steffeln-Auel/DAU (C. HACKENBERG).

Brutnachweise:

2008:

1 ♀ m. 6 juv.	Stauweiher Nistersägewerk/WW	5313/12	A. KUNZ
1 Bp. m. 6 juv.	Rennerod, Löschteich/WW	5314/45	R. BUSCH
1 Bp. m. 5 juv.	Willingen/WW	5314/SW	R. BUSCH
1 Bp. m. 3 juv.	Dorfteich, Urbach/WW	5411/26	J. KUCHINKE
1 Bp. m. 5 juv.	M&P Weiher, Herschbach/WW	5412/14	J. KUCHINKE
1 Bp. m. 9 juv.	Flachwasser, Herschbach/WW	5412/24	J. KUCHINKE
1 Bp. m. 2 juv.	Hüblingen Tongrube/WW	5414/26	R. BUSCH
1 ♀ m. 2 juv.	Nahe zw. Gensingen/MZ u. Ippesheim/KH	6113/NO	B. VOLLMAR
2 ♀ m. 4 u. 1 juv.	Kläranlage Weilerbach/KL	6511/NO	L. SIMON
5 ♀ m. 1, 3, 3, 5, 12 juv.	Klärteiche Kaiserslautern/KL	6512/NW	L. SIMON
1 ♀ m. 5 juv.	Neuhofener Altrhein/RP	6516/48	J. BAYER
1 ♀ m. 12 juv.	Mechtersheimer Tongruben/RP	6716/26	E. SEFRIN

2009:			
1 ♀ m. 3 juv.	Stauweiher Nistersägewerk/WW	5313/12	A. KUNZ
1 Bp. m. 9 juv.	Dorfteich, Urbach/WW	5411/26	J. KUCHINKE
1 ♀ m. 4 juv.	Hofmannsweiher/WW	5412/09	A. KUNZ
4 ♀ m. 6, 7, 4, 4 juv.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	A. KUNZ
2 Bp. m. juv.	Brinkenweiher/WW	5412/20	A. KUNZ
2 ♀ m. 7 u. 8 juv.	Wiesensee/WW	5413/10	A. KUNZ
1 ♀ m. 4 juv.	Eichholzmaar bei Steffeln/DAU	5705/NW	C. HACKENBERG
1 Bp. m. 1 juv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	E. LIPPOK
1 ♀ m. 6 juv.	Kläranlage Weilerbach/KL	6511/NO	P. RAMACHERS

Maximalzahlen (400-1.200):

16.01.08	13 ♂, 11 ♀	Mosel bei Trier-Ehrang/TR	S. TWIETMEYER
19.01.08	700 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
20.01.08	650 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
27.01.08	215 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
04.02.08	150 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
02.03.08	150 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
07.12.08	1.055 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
20.12.08	550 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK
31.12.08	410 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
01.01.09	120 Ex.	Steinsee/NR	M. JÖNCK
04.01.09	133 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.01.09	415 Ex.	Rhein bei Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.01.09	350 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK
01.02.09	53 Ex.	Mosel bei Igel/TR	K.-H. HEYNE
07.02.09	700 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK
27.07.09	80 Ex.	Klärteiche Kaiserslautern/KL	L. SIMON
12.12.09	275 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
31.12.09	ca. 1.000 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK

Ringfund:

Am 31.12.2009 wurde ein Erpel mit der blauen Schnabelmarke „1F“ auf dem Silbersee/RP entdeckt (J. BAYER, C. DIETZEN, V. SCHMIDT). Der Vogel war am 16.01.2006 in etwa 150 km Entfernung bei Gerstheim (Frankreich) markiert worden, ebenfalls an einem Winterrastplatz.

Bergente (*Aythya marila*)

rDZ

Das Auftreten blieb im bekannten Rahmen und die Mehrzahl der Feststellungen stammt wie gewohnt von den Rastplätzen am Oberrhein. Bemerkenswert waren die Rastplatzzahlen am Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP, die sich bereits Ende 2007 anbahnten (DIETZEN & FOLZ 2008b).

01.01.-06.03.08	bis 17 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, C. RANDLER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, M. WINK
06.01.08	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	C. DIETZEN
04.02.08	1 vj. ♂, 1 ♀	Steinsee/NR	M. JÖNCK
07.-24.12.08	max. 4 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
02.01.-14.02.09	bis 6 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	C. DIETZEN, M. WINK
11.-24.01.09	2 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT
20.01.09	1 ♂	Rhein bei Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.11.-28.12.09	bis 5 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, D. BECKER, H. BOTT, C. DIETZEN, M. FEUERSENGER, M. JÖNCK, C. RANDLER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, M. WINK
05.-13.12.09	1 ♀	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN, M. WINK
27.12.09	1 ♂, 1 ♀	Berghäuser Altrhein/RP	C. DIETZEN



Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*, Männchen SK, Wiesensee/WW, 24.03.2008.
Foto: R. BUSCH.



Moorente *Aythya nyroca*, ad. Männchen zusammen mit Reiherente *Aythya fuligula* und
Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*, Wiesensee/WW, 24.03.2008. Foto: R. BUSCH.



Eisente *Clangula hyemalis*, Weibchen, mit Reiherenten *Aythya fuligula*, Mosel bei Igel/TR, 01.02.2009. Foto: D. BECKER.



Samtenten *Melanitta fusca*, vorjährige Männchen, Mosel bei Igel/TR, 10.03.2009. Foto: D. BECKER.




Rothalstaucher *Podiceps grisegena*, ad. PK, Sangweiher/DAU, 19.04.2009. Foto: M. BECKER.



Eistaucher *Gavia immer*, 1. Winter, Meerwasser Eich/AZ, 29.12.2008. Foto: M. SCHÄF.



Eistaucher *Gavia immer*, 2. Winter, Silbersee Roxheim/RP, 28.11.2009. Foto: C. DIETZEN.



Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*, diesjährig, Brinkenweiher/WW, 17.09.09 (links) und 19.09.09 (rechts). Fotos: R. BUSCH.



Löffler *Platalea leucorodia*, ad. PK, Krombachtalsperre/WW, 09.05.2008. Foto: R. BUSCH.



Zwergdommel *Ixobrychus minutus*, ad. Männchen, Kenner Flur/TR, 01.06.2009. Foto: D. BECKER.



Kuhreiher *Ardeola ibis*, zwei aus einem Trupp von bis zu neun Vögeln, Leimersheim/GER, 29.04.2008. Foto: C. DIETZEN.



Purpurereiher *Ardea purpurea*, ad. PK, Mechtersheimer Tongruben/RP, 02.07.2008. Foto: M. SCHÄF.



Raufußbussard *Buteo lagopus*, 1. Winter, Neunkhäuser Plateau/WW, 15.02.2008. Foto: R. BUSCH.



Turmfalke *Falco tinnunculus*, diesjährig, Neustadt-Haardt/NW, 29.06.2009. Foto: C. HEBER.



Wasserralle *Rallus aquaticus*, adult, Kreis Worms/WO, 02.04.2010. Foto: M. SCHÄF.



Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*, diesjährig, Ober-Flörsheim/AZ, 02.08.2008.
Foto: M. SCHÄF.

Eiderente (*Somateria mollissima*)**uDZ**

Mit drei Feststellungen war die Art 2008 etwas zahlreicher als gewohnt, wobei unklar ist wie viele Individuen hier beteiligt waren. Das Jahr 2009 blieb im üblichen Rahmen. Auffällig ist, dass die Eiderente eher in der nördlichen Landeshälfte aufzutauchen scheint.

30.11.08	1 juv.	Steinsee/NR	E. LIPPOK
05.12.-14.12.08	1 ♀	Stein- und Kannsee/NR	M. JÖNCK, W. VOGEDES
07.12.08	1 ♀	Kiesgrube Bengel, Urmitz/MYK	M. JÖNCK
19.10.09	2 ♀	Kiesgrube Jungbluth, Urmitz/MYK	M. JÖNCK

Eisente (*Clangula hyemalis*)**uDZ**

Die Eisente ist ein sehr spärlicher und unregelmäßiger Wintergast. Nach einer Beobachtung 2006 (DIETZEN & FOLZ 2008a), gelang in 2008 eine weitere Feststellung. Umso beachtlicher sind dann gleich drei Feststellungen in 2009, wobei sogar einmal zwei Vögel gleichzeitig anwesend waren.

06.01.-10.02.08	1 ♂	Rheinauen bei Bingen/MZ	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, T. u. K. STREIT, B. VOLLMAR
03.01.-06.02.09	1 ♀	Mosel bei Oberbillig-Igel/TR	D. BECKER, MF. BECKER, K.-H. HEYNE, P. HOLZ, T. RAUTENBERG, F.-J. u. S. STÖLB
03.-06.01.09	1 ♂	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
07.-13.11.09	2 Ex.	Baggersee, Ippesheim/KH	B. VOLLMAR

Trauerente (*Melanitta nigra*)**uDZ**

Die Trauerente bleibt an Regelmäßigkeit des Auftretens und auch in der Häufigkeit hinter der Samtente zurück. Dennoch gelangen 2008 gleich vier Beobachtungen, während 2009 mit nur zwei Feststellungen ein „normales“ Jahr war.

05.-06.03.08	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. RANDLER
06.04.08	1 ♂	Kiesseen Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
23.11.08	2 dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
30.11.-28.12.08	1 ♀	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
22.11.09	1 dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.12.09	1 ♂, 1 ♀	Schottel Osterspai/EMS	M. u. U. BRAUN

Samtente (*Melanitta fusca*)**rDZ**

01.01.-06.04.08	4 Ex.	Engerser Feld/NR	M. u. U. BRAUN, R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID, H. STRUNK
13.01.-04.02.08	1 ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK
23.01.-10.02.08	3 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	H. BOTT, C. DIETZEN, T. DOLICH, V. HARRIES, U. JANZ, V. SCHMIDT
16.02.08	1 Ex.	Heinrich-Talau-See/AZ	V. SCHMIDT
16.03.-06.04.08	1 vj. ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK
23.11.-07.12.08	1 juv.	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
04.01.09	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	C. DIETZEN
11.01.09	1 vj.	Schlicht bei Neuhofen/RP	T. DOLICH
19.01.-17.03.09	2 vj. ♂, 1 wf.	Mosel bei Trier/TR	D. u. MF. BECKER, G. BIVER, K.-H. HEYNE, P. HOLZ, P. LIESER, F.-J. STÖLB, U. UHL
26.11.-31.12.09	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, C. RANDLER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, M. WINK
19.-27.12.09	3 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	C. DIETZEN, M. WINK

Von den vier Vögeln im Engerser Feld 2008 blieb ein vorjähriges Männchen mindestens bis zum 25.06. und mauserte dort (M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID, H. STRUNK). Die Vögel auf der Mosel bei Trier 2009 waren nicht alle durchgehend anwesend.

Schellente (*Bucephala clangula*)

rDZ

Letztbeobachtungen Frühjahr (06.04.-01.05.):

06.04.08	1 ♂, 1 ♀	Wiesensee/WW	R. BUSCH
30.03.09	1 ♂	Haidenweiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Herbst (23.09.-11.11.):

01.11.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
01.11.08	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, M. WINK
17.10.09	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Jahreszeitlich ungewöhnlich sind die Beobachtungen einer weiblichen Schellente am 22.06.08 auf der Krombachtalsperre/WW (R. BUSCH) und ein Exemplar zwischen dem 14.09. und 02.10.2009 auf dem Wiesensee/WW (R. BUSCH).

Maximalzahlen (116-455):

23.01.08	319 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.01.09	163 Ex.	Bingen/Rüdesheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Kappensäger (*Lophodytes cucullatus*)

GF

Der Aufenthalt der kleinen Population im Westerwald scheint langsam zu Ende zu gehen und es liegt nur noch eine Beobachtung eines Einzelvogels vor. 2009 wurde keine Feststellung mehr bekannt.

24.02.08	1 ♀	Hammermühle Maxsain/WW	J. KUCHINKE
----------	-----	------------------------	-------------

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

rDZ

Schwerpunktgebiete der Winterverbreitung sind der Neuhofener Altrhein, Roxheimer Altrhein mit Ochsenlachsee und Silbersee sowie die Mechtersheimer Tongruben (alle RP). Außerhalb der Rheinebene wurde die Art, wie in den Vorjahren, nur vereinzelt beobachtet. 2009 trat der Zwergsäger im nördlichen Rheinland-Pfalz stärker in Erscheinung als 2008.

Letztbeobachtungen Frühjahr (16.03.-18.04.):

27.02.08	1 ♂, 1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	R. STEINHAUSEN
15.03.09	1 ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Herbst (28.10.-01.12.):

16.11.08	1 ♂	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
05.12.09	1 ♀	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK

Maximalzahlen (8-54):

06.01.08	16 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	C. DIETZEN
19.01.08	3 ♂, 14 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
20.01.08	1 ♂, 6 ♀	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
27.01.08	32 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	C. DIETZEN

14.01.09	3♂, 8♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
08.02.09	12 Ex.	Schäferweiher Lingenfeld/RP	E. SEFRIN
28.12.09	7♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Auswahl sonstiger Beobachtungen:

06.01. u. 03.02.08	1♂	Mosel bei Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
19.01.08	1♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK
19.01.08	2♂	Wörther Altrhein/GER	U. JANZ
30.01. u. 19.02.08	1♂	Kannsee/NR	R. SCHEID, H. STRUNK
04.01.09	1♂, 3♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
07.01.09	3♂, 6♀	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
18.01.09	2♂, 2♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK
18.01.09	3♂, 3♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.02.09	4♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Gänsesäger (*Mergus merganser*)**rDZ**Letztbeobachtungen Frühjahr (28.04.-17.05.):

16.04.08	1♀	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.04.09	1♂, 1♀	Saar zw. Kanzem u. Ayl/TR	D. BECKER
13.05.09	1♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Herbst (11.09.-28.10.):

02.11.08	1♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK
06.11.08	2♂, 5♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
26.09.09	1♂, 1♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Eine jahreszeitlich ungewöhnliche Beobachtung am 13.06.08 betraf ein durchziehendes Weibchen am Silbersee Roxheim/RP und wurde von der AKRP anerkannt (J. BAYER).

Maximalzahlen (40-106):

25.-27.01.08	max. 45 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.12.08	11♂, 4♀	Nahe zw. Lonsheim u. Bretzenheim/KH	B. VOLLMAR
26.12.08	18♂, 5♀	Saar bei Saarbürg/TR	S. TWIETMEYER
10.01.09	27♂, 27♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.01.09	14♂, 12♀	Saar bei Serrig/TR	E. SCHALLER
01.03.09	30 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Mittelsäger (*Mergus serrator*)**uDZ**

Wie gewohnt fallen die wenigen Beobachtungen in das Winterhalbjahr, wobei aus 2008 ungewohnt zahlreiche Feststellungen vorliegen.

10.02.-24.03.08	1♂	Stein- u. Kannsee/NR	K. BITTNER, J. BOSSELMANN, E. LIPPOK, R. SCHEID, H. STRUNK
13.05.08	1♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.11.08	1♀	dz. Bingen, Rüdeshheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ
19.11.08	1♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
01.-04.12.08	1♀	Nahe zw. Gensingen u. Ippesheim/KH	B. VOLLMAR
06.-21.12.08	1♀	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
19.-27.12.09	1♀	Berghäuser Altrhein/SP	C. DIETZEN, M. WINK

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

rBV, rDZ

Brutverdacht und Brutzeitbeobachtungen wurden im Berichtszeitraum aus den Kreisen BIT, COC, DAU, EMS, MYK, MZ, NW, RP, TR, WW gemeldet. Ein Brutnachweis durch die Sichtbeobachtung einer Familie mit Jungvögeln gelang in Dammheim/SÜW (U. JANZ).

Erstbeobachtungen (16.04.-10.05.):

28.04.08	1 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
30.04.08	1 Ex.	Lörzweiler Königstuhl/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.08	3 Ex.	Neunberg/TR	K.-H. HEYNE
04.05.08	1 Ex.	Geinsheim/NW	C. HEBER
11.05.08	1 Ex.	Büchelberg/GER	H.-J. SCHYGULLA
26.04.09	1 Ex.	Vendersheim Plateau/AZ	H.-G. FOLZ
29.04.09	2 Ex.	Olk/TR	S. TWIETMEYER
02.05.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (01.09.-25.10.):

13.09.08	1 Ex.	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.09	1 Ex.	Vendersheim Plateau/AZ	H.-G. FOLZ

Zugbeobachtungen:

03.09.08	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.08	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
12.08.09	3 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.09	1 Ex.	dz. Vendersheim Plateau/AZ	H.-G. FOLZ

Fasan (*Phasianus colchicus*)

rBV

Maximalzahlen (19-40):

05.01.08	45 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
06.01.08	19 Ex.	Rüber/MYK	E. LIPPOK
11.04.09	35 Ex.	Otterstadt/RP	T. DOLICH

Beobachtungen in den Hochlagen (> 350 m ü. NN):

22.04.08	1 Ex.	Friedhof Liebenscheid/WW (> 550 m ü. NN)	R. BUSCH
11./12.05.08	2 Ex.	Waldstraße Westernohe/WW (460 m ü. NN)	R. BUSCH

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

rBV

Brutzeitbeobachtungen und Brutnachweise gelangen im Berichtszeitraum in den Landkreisen DAU, DÜW, GER, KH, LD, MYK, MZ, NW, RP, SÜW, TR, WIL und WO.

Maximalzahlen (15-42):

25.01.08	18 Ex.	Bretzenheim/KH	M. SCHELLER
21.06.08	15 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK
21.08.08	28 Ex.	Ober-Hilbersheim See/MZ	H.-G. FOLZ
23.08.08	20 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
11.01.09	10 Ex.	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.09	15 Ex.	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Haselhuhn (*Bonasia bonasia*)

IBV

Über aktuelle Verbreitung und Bestände ist wenig bekannt, umso erfreulicher, dass im Berichtszeitraum zwei Beobachtungen aus dem Bereich des bekannten Verbreitungsgebietes gelangen:

25.01.09	1 Ex.	bei Obernhof/EMS	S. IDELBERGER, R. KLENK
29.06.09	2 Ex.	rufend Plitschbachtal, Konz-Oberemmel/TR	D. BECKER

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

rBv, rDZ

Für das Jahr 2008 wurden 32 Brutpaare gemeldet. Bei 12 Paaren ist der Bruterfolg mit insgesamt 24 Pulli bekannt. Für 2009 wurden lediglich 19 Brutpaare gemeldet. Bei neun Paaren ist der Bruterfolg mit insgesamt 22 Pulli bekannt. Für das Jahr 2009 ist von einem etwas niedrigeren Erfassungsgrad als für 2008 auszugehen. Der tatsächliche Bestand liegt sicherlich etwas höher, da viele Brutzeitbeobachtungen mit rein akustischen Nachweisen vorliegen. Im Berichtszeitraum wurden vier neu besetzte TK25-Quadranten aus der Region Trier gemeldet: 6104/SW (2008), 6104/SO (2008) und 6007/NW, NO (2009).

Maximalzahlen (42-168):

07.04.08	16 Ex.	Steinsee/NR	R. SCHEID
02.08.08	31 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
30.08.09	15 Ex.	Eichholzmaar Steffeln/DAU	C. HACKENBERG
17.09.08	24 Ex.	Rodder Maar/AW	M. u. U. BRAUN
18.09.08	35 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
03.01.09	15 Ex.	Mosel bei Oberbillig/TR	K.-H. HEYNE
14.01.09	19 Ex.	Rhein bei Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
07.02.09	20 Ex.	Berghäuser Altrhein/SP	M. WINK
13.09.09	35 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
18.10.09	24 Ex.	Teiche bei Hof Roth, Giershofen/NR	J. KUCHINKE

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

rBv, rDZ

Für das Jahr 2008 wurden 51 Brutpaare gemeldet. Bei 20 Bruten ist der Bruterfolg mit 43 Pulli bekannt. Für das Jahr 2009 wurden 38 Brutpaare gemeldet. Der Bruterfolg ist bei 21 Paaren mit 39 Pulli bekannt. Nur für 2009 wurde ein neu besetzter TK25-Quadrant gemeldet: 6216/NW.

Maximalzahlen (109-260):

01.01.08	91 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	C. DIETZEN
06.01.08	60 Ex.	Schäferweiher/GER	M. WINK
04.02.08	25 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
15.09.08	138 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
07.11.08	65 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
06.09.09	50 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
14.09.09	109 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.11.09	57 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
10.12.09	25 Ex.	Steinsee/NR	M. u. U. BRAUN

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

IBV, rDZ

Bruten:

2008 hielten zunächst fünf Paare Reviere am Dreifelder Weiher/WW (01.05.2008, A. KUNZ). Am 01.06.2008 waren dann nur noch zwei Paare anwesend (A. KUNZ), nachdem der Wasserspiegel abgesenkt worden war. Über einen Bruterfolg ist nichts bekannt. Vom 30.03.-01.07.2008 wurde auch ein Vogel am Haidenweiher/WW festgestellt (M. u. U. BRAUN, R. BUSCH, A. KUNZ, E. LIPPOK), der auch balzend beobachtet wurde (M. u. U. BRAUN). Am 24.05.08 wurden zwei Vögel festgestellt (A. KUNZ). Zu einer Brut kam es wohl nicht. Vom 12.06. bis 26.07.2008 hielt sich ein weiterer Vogel am Sangweiher/DAU auf (K.-H. HEYNE, S. MANNSCHOTT, H. STRUNK). Zu einer Brut kam es auch hier nicht.

2009 waren am Dreifelder Weiher/WW zunächst drei Reviere besetzt. Am 04.07. und 05.07.2009 konnten dann zwei erfolgreiche Paare mit einem und zwei Pulli beobachtet werden (A. KUNZ, M. SCHÄFER). Vom 07.04.-03.05.2009 wurde ein Vogel am Haidenweiher/WW beobachtet (A. KUNZ). Eine Brut fand nicht statt. Vom 08.04.-26.04.2009 hielt sich wie im Vorjahr wieder ein Vogel am Sangweiher/DAU auf und konnte bei Balz und Nestbau beobachtet werden (M. BECKER, D. BECKER, H. BODES, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, S. MANNSCHOTT, C. HACKENBERG, M. u. U. BRAUN). Der Vogel verteidigte seinen Neststandort aggressiv gegen Haubentaucher, eine Brut fand aber, wie im Vorjahr, leider nicht statt.

Sonstige Beobachtungen außerhalb des Westerwaldes:

01.01.08	1 Ex.	Steinsee/NR	E. LIPPOK
01.01.-08.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, M. WINK
17.-23.05.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN, M. JÖNCK
10.-28.08.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
29.11.-24.12.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, M. WINK
08.10.09	1 Ex.	Schottel Osterspai/EMS	M. u. U. BRAUN
23.11.-31.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT, J. BAYER, C. DIETZEN, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

uBV, rDZ

Bruten:

2008 kam es am Haidenweiher/WW zu einer erfolgreichen Brut. Am 06.08.2008 konnte ein Paar mit zwei Pulli beobachtet werden (A. KUNZ). 2009 waren am Dreifelder Weiher/WW drei Paare mit 1x 1 und 2x 2 Pulli erfolgreich (A. KUNZ). Am 10.08.2009 führten drei Paare Pulli am Haidenweiher/WW (A. KUNZ).

Sonstige Beobachtungen (außerhalb Westerwald):

05.01.-06.04.08	1 Ex.	Steinsee/NR	M. u. U. BRAUN, R. BUSCH, E. LIPPOK, M. JÖNCK, R. SCHEID, H. STRUNK
06.01.-16.02.08	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT, V. SCHRUBA, R. STEINHAUSEN, M. WINK
10.-11.05.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
03.-15.07.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
25.07.-10.08.08	1 dj.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, C. DIETZEN, M. WINK
28.07.08	2 ad.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
23.08.08	1 Ex.	Eichholzmaar Steffeln/DAU	C. HACKENBERG
15.09.08	1 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
08.10.08	1 Ex.	Nahe bei Bad Kreuznach/KH	D. RINNE
05.11.-10.12.08	2 ad.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

18.04.09	5 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
25.04.09	4 Ex.	Rhein bei Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
21.05.09	2 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
26.07.09	1 dj.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK, E. LIPPOK
26.11.-31.12.09	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. RANDLER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)**uDZ**

31.12.09	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, V. SCHMIDT, M. WINK
----------	-------	----------------------------------	--

Sterneltaucher (*Gavia stellata*)**rDZ**

Im Berichtszeitraum erschien die Art in durchschnittlicher Anzahl im Winter, jedoch ist ein sehr später Frühjahrsnachweis eines vorjährigen Vogels, der bei einem Sommergewitter auf dem Sterenbachstausee/WIL entdeckt wurde (M. BECKER), erwähnenswert.

04.11.08	1 dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
06.-19.11.08	1 dj.	Krombachtalsperre/WW (anderes Ind.)	R. BUSCH
19.12.08-01.01.09	1 juv.	Mosel bei Neumagen-Dhron/WIL	D. BECKER, K.-H. u. M. HEYNE
09.-24.01.09	1 ad.	Laacher See/AW	M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK
25.-26.05.09	1 K2	Sterenbachstausee Wittlich/WIL	M. BECKER
04.-29.11.09	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.11.-06.12.09	1 K1	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK
18.12.09	1 K1	Kiefweiher Altrip/RP	J. BAYER
20.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee	M. FEUERSENGER, N. WALTER

Prachtaucher (*Gavia arctica*)**rDZ**

In beiden Jahren eher durchschnittliches Auftreten in den Wintermonaten.

06.01.08	1 K2	Urmitzer Werth/NR	R. BUSCH
15.-21.11.08	1 K1	Kiefweiher Altrip/RP	J. BAYER
15.11.09	1 K1	Laacher See/AW	M. JÖNCK
19.11.09	1 K1	Kannsee/NR	H. STRUNK
28.12.09	1 K1	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Eistaucher (*Gavia immer*)

*-

A

Nachdem die Art 2007 nicht nachgewiesen werden konnte, wurden 2008 und 2009 die Nachweise Nummer 18-20 erbracht.

28.12.08-04.01.09	1 K2	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	C. DIETZEN, E. HENB, V. SCHMIDT
20.11.09-03.01.10	1 K2	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, D. BECKER, H. BOTT, C. DIETZEN, M. FEUERSENGER, R. u. M. JÖNCK, C. RANDLER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN
05.-12.12.09	1 K1	Rüdesheimer Aue/MZ	M. BICKEL, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, J. REUFENHEUSER, B. VOLLMAR

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

rBv, rDZ

Bruten:

Der rheinland-pfälzische Brutbestand lag 2008 bei 205 und 2009 bei 225 Brutpaaren (jeweils ohne die Kolonie auf hessischer Seite) und ist somit im Vergleich zu 2007 (254 Bp. = Rheinland-Pfalz-Bestand) wieder leicht gesunken (s. Abb. 10). Einmal mehr zeigt sich, dass der Brutbestand seit Jahren um ca. 220-230 Brutpaare schwankt und nicht mehr zunimmt. Ein Brutplatz (Brutverdacht Saar bei Taben/TR) wurde 2008 erstmals besetzt, aber bereits 2009 wieder aufgegeben.

Brutplatz	TK25	Anzahl Brutpaare		Beobachter
		2008	2009	
Urmitzer Werth/NR	5511/41	89	77	M. JÖNCK
Reiherschussinsel Lehmen/MYK	5710/18	10	12	H. SCHAUSTEN
Schottel Osterspai/EMS	5711/38	4	3	M. u. U. BRAUN
Bacharacher Werth/MZ	5912/17	7	10	H.-G. FOLZ
Konz-Hamm/TR	6305/NW	9	17	K.-H. HEYNE
Saar bei Taben/TR	6405/NO	2	0	K.-H. HEYNE, E. SCHALLER
Hördter Rheinaue/GER	6816/32	84	106	H. u. L. SIMON
Summe		205	225	




Abb. 10: Brutbestand des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in Rheinland-Pfalz 1991-2009 für die einzelnen Kolonien. Die Gesamthöhe der Säulen entspricht dem rheinland-pfälzischen Brutbestand. Grafik: T. Dolich.

Maximalzahlen (272-1.540):

07.09.08	315 Ex.	Rüdesheimer Aue, Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.08	541 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
07.11.08	600 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
09.11.08	400 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
30.11.08	280 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK

16.09.09	299 Ex.	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
29.-30.09.09	285 Ex.	Rüdesheimer Aue, Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.09	263 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
14.10.09	257 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. BRAUN
28.11.09	350 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN




Abb. 11: Überblick über die Ergebnisse der Kormoranschlafplatz-Synchronzählungen in Rheinland-Pfalz 2007/2008 bis 2008/2009 an 55 Schlafplätzen. N = 26.082. Die Gesamthöhe der Säulen gibt den Gesamtbestand wieder. Grafik: T. DOLICH.

Schlafplatz-Zählungen:

Wie schon in der vorangegangenen Saison 2007/08 war auch in der Saison 2008/09 ein weiterer Rückgang des Wintermittels in Rheinland-Pfalz festzustellen (Abb. 12). Im Mittel waren von September bis April 1.424 Exemplare an den Schlafplätzen anwesend. Das Maximum wurde bereits im November mit 2.006 Exemplaren erreicht. Es ist das niedrigste Maximum seit über 15 Jahren und die Maximalbestände haben sich verglichen mit Mitte der 1990er Jahre weit mehr als halbiert. Vermutlich fanden aufgrund des kalten Januars Abzugbewegungen statt, die die Januarzahlen kleiner ausfallen ließen.

Die Schlafplatzzählungen wurden unter Koordination von T. DOLICH von D. BECKER, M. BECKER, N. BÖHM, M. BRAUN, M. BUCHMANN, P. DIEKER, T. DOLICH, O. ELLE, H.-G. FOLZ, F.-J. FUCHS, K.-H. HEYNE, S. IDELBERGER, M. JÖNCK, P. KRÜCK, J. KUCHINKE A. LAUX, K. LAUX, E. LIPPOK, T. LOOSE, P. LORENZ, H. MAGIN, L. MARTHALER, G. MOHRBACH, F. POLLÄHNE, R. PROESS, K.-H. RAPP, T. RAUTENBERG, F. u. M. ROBECK, E. SCHALLER, H. SCHAUSTEN, S. SCHLEICH, K. SCHORR, G. SCHWAB, E. SEFRIN, H. u. L. SIMON, S. TWIETMEYER, M. WAGNER, J. WAHL, P. WOLF, S. WOLF und T. WOLF durchgeführt. Allen Zählern sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!




Abb. 12: Überblick über die Ergebnisse der Kormoranschlafplatz-Synchronzählungen in Rheinland-Pfalz von der Saison 1994/95 bis 2008/09. Wintermittel (gestrichelte Linie) und Wintermaximum (durchgezogene Linie) sind dargestellt. Grafik: T. DOLICH.

Ringfunde:

Am Silbersee/RP konnten im Winter 2008 und 2009 zwei farbberingte Kormorane abgelesen werden, welche beide mehrere Jahre zuvor als Nestlinge in dänischen Kormorankolonien beringt worden waren (J. BAYER, M. FEUERSENGER). Die Ablesungen geben einen Hinweis darauf, woher die in Rheinland-Pfalz überwinternden Kormorane stammen.

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*)

A

Mehrere Beobachtungen eines länger verweilenden Exemplars dieses Ausnahmegasts, das sich zunächst am Hausweiher (13.09.09, A. KUNZ), dann bis zum 18.10.09 am Brinkenweiher/WW aufhielt und von vielen Beobachtern festgestellt werden konnte (D. BECKER, R. BUSCH, J. HERZER, A. KUNZ, M. JÖNCK, J. KUCHINKE, K. LAUX, E. LIPPOK, M. SCHÄFER). Dies ist gleichzeitig der vierte Nachweis für Rheinland-Pfalz (vgl. JÖNCK 2008).

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*)

GF

Im Jahr 2009 gelang die mindestens fünfte Feststellung in Rheinland-Pfalz seit 1990. Ein Teil der Vögel stammte nachweislich aus Gefangenschaft und auffällig ist die Häufung im Norden des Landes (alle Nachweise bisher in den Kreisen NR, MYK und WW). Die zuvor letzte Beobachtung gelang im Herbst 2002, ebenfalls an der Westerwälder Seenplatte/WW (DIETZEN et al. 2003).

07.-08.10.09

1 Ex. Wiesensee/WW

G. FAHL, A. KUNZ

Löffler (*Platalea leucorodia*)

A

Nachdem bereits im Vorjahr zwei Beobachtungen dokumentiert und ein weiterer Löffler ohne Dokumentation gemeldet wurde, konnte die Art 2008 erneut in Rheinland-Pfalz festgestellt werden, wieder zur typischen Zeit im Frühjahr. Dies ist der mindestens 16. Nachweis für unser Bundesland.

09.-10.05.08 1 Ex. Krombachtalsperre/WW R. BUSCH

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

rDZ

Insgesamt 16 Einzelbeobachtungen im Jahre 2008 stehen gerade einmal drei Nachweise aus 2009 gegenüber, wobei jedoch die Beobachtungen 2008 auch länger verweilende Exemplare betrafen:

13.01.-03.02.08	bis 2 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN, G. OEHMICHEN, E. SEFRIN
06.-28.03.08	bis 2 Ex.	Brinkenweiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL
17.10.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
11.01.09	1 Ex.	Laacher See/AW	E. LIPPOK
24.01.09	1 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
29.10.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COG	T. GRUNWALD

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

IBV

Im Jahre 2008 nur zwei Beobachtungen:

26.07.08	1 ♂	Kiesgruben Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE
27.07.08	1 ♂, 1 ♀	Kiesgruben Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE

Da in diesem Gebiet von Juni bis August regelmäßig nach der Art gesucht wurde, kann davon ausgegangen werden, dass 2008 hier kein Brutvorkommen bestand. 2009 mit zwölf gemeldeten Beobachtungen mehr Feststellungen als im Vorjahr und an zwei Stellen auch wieder brutverdächtig:

01.06.-09.07.09	1 ♂	Kiesgrube Großlittgen/WIL	M. BECKER, K.-H. HEYNE
31.05.-25.06.09	bis 3 Ex.	Kiesgrube Kenner Flur/TR	D. BECKER, K.-H. HEYNE, S. TWIETMEYER

Die Bestandssituation am Oberrhein ist weitgehend nicht bekannt. Am Neuhofener Altrhein/RP konnten im Berichtszeitraum keine Zwergdommeln beobachtet werden (J. BAYER, T. DOLICH, u.a.), das ehemalige Brutvorkommen existiert vermutlich nicht mehr. Aus dem Kreis GER, wo es in früheren Jahren Brutvorkommen gegeben hatte, wurden leider keine Beobachtungen gemeldet.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

uDZ

Nach dem Ausbleiben von Nachweisen in 2007, gab es den beiden Berichtsjahren 2008 und 2009 wieder jeweils zwei Feststellungen:

01. u. 04.05.08	1 ad.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
23.07.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	H. KNÖFFEL, R. SCHEID
28.05.09	1 vj.	Thürer Wiesen/MYK	M. BRAUN, A. KÖNEN
04.09.09	1 Ex.	dz. 20:50 Uhr Hechtsheim/MZ	M. SCHMOLZ

Kuhreiher (*Ardeola ibis*)

A

Ende April 2008 stellte sich auf dem Sportplatz Leimersheim/GER ein Team Kuhreiher ein, das allerdings rasch an Kopfstärke verlor: Zunächst waren es neun Mitspieler (erste Meldung vom 29.4.). Am selben Tag wurden dann später von C. DIETZEN nur noch sechs Exemplare gemeldet und am 01.05.08 hatten sich weitere zwei Kuhreiher verabschiedet, sodass H.-J. SCHYGULLA nur noch vier Vögel anfeuern konnte. Die Mannschaft erreichte den achten Nachweis für Rheinland-Pfalz. Obwohl die Herkunft der Vögel Spekulation bleibt, könnte es sich hier durchaus um Wildvögel gehandelt haben. Alle waren unberingt und das jahreszeitliche Auftreten passt in das typische Muster von Vögeln aus dem Mittelmeerraum, die über ihr Ziel hinausschießen. Zeitgleich wurden im Saarland und Nordfrankreich Kuhreiher beobachtet, die auf einen Einflug hindeuten können.

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

rDZ

Aus beiden Jahren liegen rund tausend Einzelmeldungen (inklusive etlicher Doppelmeldungen) vor allem aus dem Rheintal und der Vorderpfalz, aber auch von Mosel, Saar, Westerwälder Seenplatte und weiteren Gebieten, vor. Meistens waren es Einzelvögel oder kleine Gruppen. Nachfolgend die Ansammlungen von 15 und mehr Exemplaren:

Maximalzahlen (5-33):

29.10.-02.11.08	16 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. u. U. BRAUN, M. SCHÄFER
11.10.08	17 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
31.10. u. 01.11.09	15 Ex.	Brinkenweiher/WW	J. KUCHINKE, M. SCHÄFER
08.11.09	17 Ex.	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
15.11.09	15 Ex.	Hausweiher/WW	A. KUNZ
04.10.09	33 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ



Silberreiher (*Casmerodius albus*). Zeichnung: P. BOSWELL.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

rBV, rDZ

Bruten:

	2008	2009
Anzahl gemeldete Kolonien	10	13
Anzahl Brutpaare	202	136
Anzahl neue Brutplätze (TK25-Quadrant)	1 (5413/31)	2 (5612/48; 5613/51)

Trotz sicherlich recht unvollständiger Erfassung, deutet sich evtl. ein leichter Rückgang an (zum Vergleich 2006 noch 21 Kolonien mit mind. 193 Bp.), da auch von jährlich kontrollierten Kolonien Abnahmen mitgeteilt wurden (Melder: J. BAYER, D. BECKER, M. u. U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, H. GÖPPEL, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, J. KUCHINKE, A. KUNZ, L. LENZ, P. RAMACHERS, R. SCHEID, M. SCHMOLZ, L. SIMON, P. SPIELER, M. WINK).

Maximalzahlen Durchzug (49-106):

27.07.08	23 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
28.07.08	32 Ex.	Sangweiher/DAU	R. SCHEID
02.10.09	43 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.10.09	34 Ex.	Hausweiher/WW	A. KUNZ
08.11.09	28 Ex.	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Bei systematischen Zugvogelzählungen im Raum Engelstadt/MZ wurden zwischen dem 10.07. und 07.12.08 an 11 Tagen insgesamt 26 durchziehende Graureiher und zwischen dem 31.07. und 15.11.09 an 14 Tagen insgesamt 20 durchziehende Graureiher auf dem Wegzug registriert (H.-G. FOLZ).

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

IBv, rDZ

Brutzeitbeobachtungen gelangen in beiden Jahren zwar in mehreren Gebieten, ohne dass jedoch Brutverdacht geäußert oder gar ein Brutnachweis gemeldet worden wäre. Nur in den Mechtersheimer Tongruben/RP konnte die Art brütend angetroffen werden:

2008 wurden vier Brutpaare gemeldet, die erfolgreich zur Brut schritten: 2, 2, 3 und 3 Junge wurden flügge. Beobachtungen wurden hier zwischen dem 18.05. und 19.07.08 gemeldet (Alle Angaben: E. SEFRIN, weitere Beobachter: DENGLER, C. DIETZEN, L. SIMON, M. WINK).

2009 wurden acht Horste gezählt. In fünf Nestern konnten 15 Junge gezählt werden. Anwesend waren die Vögel hier vom 10.05. bis 06.09.09 (Alle Angaben: E. SEFRIN, weiterer Beobachter: M. WINK).

Sonstige Beobachtungen:

15.03.08	1 Ex.	dz. Ober-Hilbertsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.04.08	1 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
05.05.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
14.05.08	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	F. KLÖPFER
25.05.08	1 K2	Kiesgrube Großlittgen/WIL	M. BECKER
19.06.08	1 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
15. u. 28.06.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
24.08.08	1 Ex.	Uhlerbörner Teichgebiet/MZ	W. HEUSER
13.05.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	F. u. M. ROBECK
24.05.09	1 Ex.	Neupotz/GER	H.-J. SCHYGULLA
07. u. 14.06.09	1 Ex.	Neuburg am Rhein/GER	H.-J. SCHYGULLA
19. u. 21.06.09	1 Ex.	Kiesgruben Kenner Flur/TR	D. BECKER, J. ENGLER, A. LUHMER
22.07.09	1 Ex.	Neuburg am Rhein/GER	H.-J. SCHYGULLA
12.09.09	1 Ex.	dz. Neustadt-Ost/NW	C. HEBER

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)u**DZ**

09.06.09	1 Ex.	„Im Bruch“, Mausbach/PS	P. SPIELER
10.06.09	1 Ex.	Saar bei Taben/TR	D. BECKER
04.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Leider wurden zwei weitere Beobachtungen aus 2008 und eine aus 2009 nicht dokumentiert und können daher nicht als Nachweise gelten.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)r**Bv**, r**DZ**

Im Jahr 2008 wurden 29 und im Jahr 2009 insgesamt 24 Brutpaare in 11 Landkreisen gezählt, der derzeitige Brutbestand ist damit deutlich höher als in den Vorjahren (um 15 Bp., s. a. DIETZEN et al. 2005).

Gemeldete Bruten:

Kreis	2008	2009	Beobachter
Landkreis Altenkirchen/AK	k.A.	Brutverdacht f. 2 Bp.	M. u. U. BRAUN, S. SCHMIDT-FASEL
Landkreis Ahrweiler/AW	11 erfolgr. Bp.	6 erfolgr. Bp.	F.-J. FUCHS
Landkreis Birkenfeld/BIR	1 Bp. m. 3 juv.	1 Bp. m. 3 juv.	K.-H. HEYNE, C. OSWEILER, G. GRAF VON PLETTENBERG
Eifelkreis Bitburg-Prüm/BIT	3 Bp. m. 2,2,3 juv.	3 erfolgr. Bp. m. 4, 4 u. ? juv., 1x Brutverlust	K.-H. u. M. HEYNE, W. KUNZ
Landkreis Cochem-Zell/COC	3 erfolgr. Bp.	3 Bp.	L. LENZ, H. SCHAUSTEN
Landkreis Vulkaneifel/DAU	1 Bp. m. 4 juv.	2 Bp. m. 3 u. ? juv.	K.-H. u. M. HEYNE, W. KUNZ
Rhein-Lahn-Kreis/EMS	1 Bp. m. 4 juv.	1 Bp. m. 3 juv.	M. u. U. BRAUN, R. KLENK, G. WAGNER
Landkreis Mayen-Koblenz MYK	1 erfolgr. Bp.	1 erfolgr. Bp.	F.-J. FUCHS
Landkreis Neuwied/NR	3 Bp.	1 Bp. m. 1 juv.	J. KUCHINKE, T. LOOSE
Landkreis Trier-Saarburg/TR	2 Bp. m. 3 u. ? juv.	1 Bp. m. 3 juv.	B. BUSS, K.-H. u. M. HEYNE
Westerwaldkreis/WW	3 Bp. m. 2,2,4 juv.	2 Bp. m. 2, ? juv.	M. u. U. BRAUN, J. KUCHINKE, K. LAUX, P. SCHIEFENHÖVEL, G. FAHL

Erstbeobachtungen (20.02.-26.03.):

08.03.08	1 Ex.	Dohr/COC	L. LENZ
13.03.08	1 Ex.	Habscheid-Hollnich/BIT	J.-R. VOS
13.03.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
01.03.09	1 Ex.	Enz bei Mettendorf/BIT	C. CASPARI
14.03.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
17.03.09	2 Ex.	Herschbach/WW	K. LAUX

Letztbeobachtungen (22.08.-03.10.):

14.09.08	2 Ex.	dz. Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
14.09.08	1 Ex.	dz. Rölerhöcht-Tawern/TR	D. BECKER, F.-J. STÖLB
14.09.09	4 Ex.	Nistermühle, Hachenburg/WW	A. KUNZ
16.09.09	2 Ex.	Nistermühle, Hachenburg/WW	A. KUNZ
17.09.09	1 Ex.	dz. Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahlen (<3-70):

07.08.08	7 Ex.	kr. Neuhäusel Kalterbachtal/WW	M. u. U. BRAUN
18.08.08	7 Ex.	Nistermühle Hachenburg/WW	A. KUNZ
26. u. 27.08.09	8 Ex.	Große Nister, Nister/WW	A. KUNZ
30.08.09	8 Ex.	Nistermühle Hachenburg/WW	A. KUNZ
09.09.09	27 Ex.	dz. im Trupp, Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

rBv, rDZ

Bruten:

DORNER (2009) gibt für 2008 einen Brutbestand von 62 frei fliegenden Brutpaaren an, was eine auffallende Steigerung gegenüber 2007 (49 Paare) darstellt. Insgesamt wurden 139 juv. flügge. Sechs weitere Brutpaare mit 11 flüggen Jungen brüteten in Haltungen.

Für das Jahr 2009 kann erneut eine starke Zunahme der Brutpaare auf 82 Brutpaare festgestellt werden (HECHLER & HILSENDEGEN 2010). 161 flügge Jungvögel wurden gezählt. Hinzukommen sieben weitere Brutpaare in Haltungen, die insgesamt 14 Junge groß zogen.

Angaben zum Bruterfolg (DORNER 2009, HECHLER & HILSENDEGEN 2010):

2008: 10x 0 juv., 7x 1 juv., 17 x 2 juv., 16 x 3 juv., 10x 4 juv. und 2x 5 juv.

2009: 24x 0 juv., 5x 1 juv., 19 x 2 juv., 21 x 3 juv., 10x 4 juv. und 3x 5 juv.

Auf die Landkreise Rheinhessens und der Pfalz verteilen sich die Vorkommen wie folgt (Anzahl Bp. 2007, 2008, 2009): MZ (7, 10, 10), AZ (2, 2, 2), WO (1, 1, 1), KUS (1, 3, 5), KL (2, 3, 3), RP (4, 4, 9), NW (1, 1, 2), LD (1, 1, 1), PS (2, 4, 5), SÜW (13, 16, 23) und GER (14, 16, 20). Neu wurde 2008 der Kreis DÜW besiedelt (0, 1, 1).

Winterbeobachtungen:

11.01.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	R. STEINHAUSEN
18.01.08	1 Ex.	Laubenheimer Ried/MZ	L. STOHL
19.-20.01.08	1 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ	O. STRUB, B. VOLLMAR
01.11.-20.12.08	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, H. BOTT, C. RANDLER, J. SCHRUBA, R. STEINHAUSEN, M. WINK
08.11.08	1 Ex.	Maximiliansau/GER	H.-J. SCHYGULLA
20.01.09	1 Ex.	Budenheim/MZ (evtl. aus Schiersteiner Zuchtst.)	H.-G. FOLZ
20.11.-31.12.09	1-3 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN, R. STEINHAUSEN, M. WINK
25.11. u. 07.12.09	1 Ex.	Maximiliansau/GER	H.-J. SCHYGULLA
05.12.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK

Erstbeobachtungen Heimzug (05.02.-09.03.):

21.01.08	1 Ex.	dz. Mainz Stephansberg/MZ	H.-G. FOLZ
23.01.08	1 Ex.	am Nest Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.02.08	1 Ex.	Kiessee bei Hagenbach/GER	U. JANZ
14.02.09	2 Ex.	am Nest Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.02.09	1 Ex.	Nistertal bei Hachenburg/WW	K. KRÄMER
01.03.09	2 Ex.	Laubenheim/MZ	M. SCHMOLZ

Letztbeobachtungen Wegzug (02.09.-29.11.):

Eine Trennung der Wegzugbeobachtungen von den Winterbeobachtungen ist beim vorliegenden Datenbestand nur sehr schwer möglich, da sie fließend in einander übergehen.

01.09.-07.10.08	1-2 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
20.10.08	1 Ex.	Nahe zw. Gensingen/MZ und Ippesheim/KH	B. VOLLMAR
21. u. 22.09.09	1 Ex.	rastend Wittlich-Wengerohr/WIL	F. WASSER
11.10.09	1 Ex.	rastend Mechtersheimer Tongruben/RP	T. DOLICH

Maximalzahl (10-106):

26.08.08	13 Ex.	rastend Idenheim/BIT	K.-H. HEYNE
08.09.08	17 Ex.	dz. Rheindürkheim/WO	J. BAYER
15.08.09	9 Ex.	rastend Singhofen/EMS	V. SCHÖNFELD
13.10.09	16 Ex.	Budenheim/MZ (evtl. aus Schiersteiner Zuchtst.)	H.-G. FOLZ

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

rDZ

Für den Berichtszeitraum wurden insgesamt 108 Beobachtungen (2008: 70; 2009: 38) aus folgenden Kreisen gemeldet: AW, BIR, BIT, COC, DAU, EMS, KH, KL, LU, MYK, MZ, NR, NW, RP, TR, WIL, WO und WW.

Erstbeobachtungen Heimzug (18.02.-02.04.):

25.03.08	1 Ex.	Limburgerhof/RP	V. SCHMIDT
27.03.08	1 Ex.	Dohr/COC	L. LENZ
15.03.09	1 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER
25.03.09	1 Ex.	Ingelheim Fulderaue /MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug (05.05.-31.05.):

22.05.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
01.06.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	A. KUNZ
13.05.09	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
21.05.09	1 Ex.	Landscheid-Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen Wegzug (03.07.-01.08.):

09.08.08	1 Ex.	Hömberg/EMS	M. u. U BRAUN
18.08.08	1 Ex.	Platten/WIL	B. MÖDDER
17.08.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. RECH
18.08.09	1 Ex.	Hömberg/EMS	M. u. BRAUN

Letztbeobachtungen Wegzug (25.09.-02.11.):

01.10.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.10.08	1 Ex.	Postweiher/WW	A. KUNZ
11.10.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
31.10.09	1 Ex.	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (2-5):

31.08.08	4 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
11.09.09	4 Ex.	Nassau/EMS	M. BRAUN

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

rBv, rDZ

Im Vergleich zu den Vorjahren (2001 bis 2007) wurden 2008 und 2009 neue Brutzeithinweise für insgesamt elf TK25-Quadranten gemeldet (Abb. 13).

Erstbeobachtungen (17.04.-05.05.):

25.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
03.05.08	1 Ex.	Weiß Lay/WW	A. KUNZ
02.05.09	1 Ex.	Mattheiser Wald/TR	F. u. M. ROBECK




Abb. 13: Brutverbreitung des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) in Rheinland-Pfalz 2001-2009 (besetzte TK25-Quadranten).

Letztbeobachtungen (21.09.-08.10.):

21.09.08	1 Ex.	Kirchheimbolanden/KIB	B. VOLMAR
07.10.08	2 Ex.	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.09	1 Ex.	Mülheimer Berg/MYK	M. JÖNCK
27.09.09	1 Ex.	Engelstadt-Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (14-180):

24.08.08	22 Ex.	dz. Fisch/TR	K.-H. HEYNE, E. SCHALLER
31.08.08	31 Ex.	dz. Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
06.09.09	18 Ex.	Engelstadt-Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.09	21 Ex.	Hof Obergutenuau-Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN

Während des Wegzuges vom 02.08.-07.10.08 wurden an 52 Beobachtungstagen insgesamt 180 bzw. vom 01.08.-27.09.09 an 54 Tagen insgesamt 218 durchziehende Wespenbussarde in folgenden Landkreisen registriert: AW, BIT, COC, DAU, DÜW, EMS; KH, KIB, KO, MYK, MZ, NR, RP, SIM, TR, WIL, WO, WW und ZW.

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)

A

Nachdem er schon im Vorjahr das Ober-Hilbersheimer Plateau besucht hatte (DIETZEN & FOLZ 2008b), erschien der Schlangenadler auch im Jahr 2008 wieder auf dem Plateau, wo er von vielen Beobachtern ausgiebig studiert werden konnte (siehe dazu auch FOLZ 2010):

03.-23.08.08 1 K3 Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ H.-G. FOLZ u.v.a.

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

A

Nach dem überdurchschnittlichen Auftreten in Mitteleuropa in den Vorjahren (KRÜGER & KRÜGER 2007), wurde 2008 in RLP nur eine Beobachtung dokumentiert:

25.06.08 3 Ex. Partenheim/AZ M. u. R. FOLZ-GÖBEL

Schelladler (*Aquila clanga*)

A

Im Sommer 2008 wurde ein nestjünger Schelladler in Estland mit einem Sender ausgestattet und seitdem kontinuierlich per Satellit überwacht (<http://www.loduskalender.ee/en/node/5141>). Die Peilungen haben gezeigt, dass der Schelladler „Tönn“ auf dem Wegzug im Oktober 2008, erneut auf dem Heimzug 2009 und wieder auf dem Wegzug 2009 Rheinland-Pfalz passiert und dort auch gerastet bzw. übernachtet hat, z. B. am 24.10.08 bei Grünstadt/DÜW und vom *20.-22.09.09 bei Dudenhofen/RP. Eine optische Bestätigung im Feld gelang bisher, trotz intensiver Bemühungen einiger Beobachter, leider nicht. Es handelt sich hierbei um die ersten (nicht durch Sichtnachweise) belegten „Nachweise“ für Rheinland-Pfalz, die auch von der DSK anerkannt wurden (DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION 2009)!

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

A

Im Berichtszeitraum gelang der dritte dokumentierte Nachweis in Rheinland-Pfalz:

28.09.08 1 K5 Söllscheid/NR J. JANSMANN

Die zuvor letzten Feststellungen stammen aus 1991 (FOLZ 1995) und 2003 (ISSELBÄCHER et al. in DIETZEN et al. 2004), hinzu kommen aber noch einige wenige, bisher nicht dokumentierte, Beobachtungen, sowie ca. drei historische Nachweise.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

uBV, rDZ

Aus den Jahren 2008 und 2009 wurden keine Brutzeitbeobachtungen gemeldet. Die vorliegenden 200 Beobachtungen durchziehender Kornweihen verteilen sich auf folgende Landkreise: AW (1), AZ (1), BIT (18), COC (2), DAU (12), DÜW (2), EMS (7); GER (1), KH (2), KO (1), MYK (17), MZ (42), NR (2), NW (6), PS (2), RP (4), TR (46), WIL (13) und WW (21).

Letztbeobachtungen Frühjahr (24.04.-23.05.):

17.05.08 1 Ex. Kenner Flur/TR H. LEMKE

01.05.09 1 Ex. Ober-Hilbersheim/MZ H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Herbst (22.07.-22.08.):

02.08.08	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.09	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (4-12):

09./10.02.08	10 Ex.	Mürmes/DAU	M. JÖNCK, E. LIPPOK
28.01.09	5 Ex.	VSG Orsfeld/BIT	M. BRAUN, G. KURZ

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)**uBV, rDZ**

Die vorliegenden 96 Wiesenweihen-Beobachtungen aus den Jahren 2008 und 2009 verteilen sich auf folgende Landkreise: BIR (1), DAU (2), EMS (2), KH (1), KL (1), KO (1), MYK (8), MZ (66), RP (1), TR (12), und WIL (1)

Brutvorkommen:

1 Bp. m. 3 juv. (2008)	Ober-Hilbersheim/MZ	6114/NW	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 4 juv. (2009)	Aspishheim-Schild/MZ	6013/SO	H.-G. FOLZ

Ein weiteres Nest wurde 2009 nahe des o. a. Brutplatzes angelegt, aber nach der Ablage des ersten Eis aufgegeben (vgl. FOLZ 2009). Es ist wahrscheinlich, dass es sich um einen Fall von Bigynie (zweites ♀ desselben ♂) handelte.

Erstbeobachtungen (10.04.-09.05.):

19.04.08	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
05.04.09	1 ♂	Laubenheimer Ried/MZ	M. SCHMOLZ

Letztbeobachtungen (13.08.-24.09.):

31.08.08	1 ad. ♂	Sangweiher/DAU	F. J. STÖLB
31.08.08	1 ad. ♂, 1 dj.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
29.08.09	1 Ex.	Ralingen-Olk/TR	S. TWIETMEYER
30.08.09	1 juv.	Rinzenberg/BIR	GRAF V. PLETTENBERG

Maximalzahl (3-21):

29.07.09	6 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	---------------------	------------

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)**rBV, Rdz**Brutvorkommen:

Die Erfassung ist sicherlich unvollständig und spiegelt nicht den tatsächlichen Bestand, sondern eher die Aktivität einzelner Beobachter, wider. Für 2008 wurden insgesamt 9-15 mögliche Brutvorkommen gemeldet (10 Brutnachweise) und für 2009 waren es 19-21 (19 Brutnachweise).

2008:

6 Bp.	Landkreis MZ	6014/SO	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Bodenheim/MZ	6015/SO	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Sprendlingen/MZ	6113/20	H.-G. FOLZ
1 Bp., 1 Bv.	St. Johann, Ober-Hilbersheim/MZ	6114/NW	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Partenheim-Gienau/MZ	6114/NO	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Hahnheim/MZ	6115/NW	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/SW	H. BOTT
1 Bp.	Neuhofener Altrhein/RP	6516/SO	J. BAYER
1 Bv.	Mechtersheim/RP	6716/NO	E. SEFRIN

2009:			
1 Bp.	Aspishheim/MZ	6013/60	H.-G. FOLZ
2 Bv.	St. Johann, Ober-Hilbersheim/MZ	6114/NW	H.-G. FOLZ
8 Bp.	Landkreis MZ	6014/SO	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Sprendlingen/MZ	6113/20	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Partenheim/MZ	6114/08	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	L. SIMON
1 Bp. m. 3 juv.	Rheindürkheim/WO	6216/SW	J. BAYER
1 Bv.	Neuhofener Altrhein/RP	6516/SO	J. BAYER
1 Bp.	Aumühle Geinsheim/NW	6615/SO	C. HEBER
1 Bv.	NW Hanhofen/RP	6615/60	T. DOLICH

Die für 2008 und 2009 ca. 284 gemeldeten Beobachtungen durchziehender Rohrweihen beziehen sich auf folgende Landkreise: AZ (3), BIT (3), COC (3), DAU (11), DÜW (13), EMS (7), GER (2), KH (4), KO (1), LU (4), MYK (80), MZ (45), NR (1), NW (4), RP (25), SÜW (1), SIM (2), TR (28), WIL (7), WW (39) und ZW (1).

Erstbeobachtung (23.02.-30.03.):

02.03.08	1 Ex.	Duppach/BIT	T. WEBER
08.03.09	1 Ex.	Rüber-Küttig/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen (05.10.-01.11.):

01.11.08	1 dj.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
11.10.09	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahl (10-41):

13.09.08	13 Ex.	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.08.09	13 Ex.	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Habicht (*Accipiter gentilis*)

rBV, rDZ

Für 2008 und 2009 wurden ca. 224 Habichtbeobachtungen aus folgenden Landkreisen gemeldet: AZ (1), AK (2), AW (1), BIT (8), DAU (3), DÜW (8), EMS (23), GER (1), KH (10), KIB (5), KL (3), KO (1), LU (3), MYK (12), MZ (47), NR (7), NW (7), RP (34), SÜW (2), SIM (2), TR (27), WIL (11), und WW (7).

Brutnachweise 2008 und 2009:

1 Bp.	Burbach/BIT	5805/SW	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Kaiserslautern/KL	6512/NW	P. RAMACHERS
1 Bp. m. ? juv.	Ingendorf/BIT	6004/SO	S. WIEGAND
1 Bp. m. 3 juv.	Kaiserslautern/KL	6512/NW	P. RAMACHERS

Weitere Brutzeitvorkommen wurden von den folgenden TK25-Quadranten gemeldet: 2008 5412/NO, 6014/SO, 5711/NO, 5314/NW, 5214/SW, 6206/SW und 2009 6816/NW, 5911/NO, 5612/NO, 5613/SO, 6616/SW, 5613/SO, 5113/SW (M. u. U. BRAUN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, C. HEBER, J. KUCHINKE, F. u. M. ROBECK).

Sperber (*Accipiter nisus*)

rBV, rDZ

2008 und 2009 wurden insgesamt ca. 346 Beobachtungen aus nahezu allen Landesteilen gemeldet. Rückschlüsse auf die tatsächliche Häufigkeit des Sperbers können aus diesen gemeldeten Zufallsbeobachtungen nicht gezogen werden.

Maximalzahlen (6-36):

18.10.08	17 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
01.11.08	12 Ex.	dz. Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
12.09.09	12 Ex.	dz. Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.09	11 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Rotmilan (*Milvus milvus*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

02.01.08	1 Ex.	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
11.01.08	2 Ex.	Dohr/COC	L. LENZ
12.01.08	1 Ex.	Westermohe/WW	R. BUSCH
01.-03.01.09	1 Ex.	Engenser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
06.01.09	1 Ex.	Montabaur/WW	K. KRÄMER
18.01.09	1 Ex.	Moselstaustufe Trier/TR	F.-J. STÖLB

Erstbeobachtungen Heimzug (23.01.-09.02.):

03.02.08	3 Ex.	dz. Sembach/KL	M. KNÖDLER
03.02.08	1 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
15.02.09	1 Ex.	Enkirch/WIL	M. BECKER
15.02.09	1 Ex.	Gonsenheim/MZ	D. RINNE

Letztbeobachtungen Wegzug (21.11.-19.12.):

14.12.08	1 Ex.	Rheinhafen-Brohl/AW	M. JÖNCK
31.12.08	1 Ex.	Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
23.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
27.12.09	1 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER

Maximalzahlen (26-213):

31.08.08	52 Ex.	dz. Kollig-Naunheim/MYK	C. DIETZEN
07.10.08	52 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
08.10.08	86 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
09.10.09	211 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD
09.10.09	216 Ex.	dz. Simmern/SIM	V. HARTMANN

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)**rBV, rDZ**

Für die Jahre 2008 und 2009 wurden aus den Gebieten KL (erstmalig), MZ, RP, WIL und WW insgesamt 30 Brutnachweise bzw. Brutpaare gemeldet (J. BAYER, D. BECKER, M. u. U. BRAUN, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, J. KUCHINKE, P. RAMACHERS, L. SIMON, G. VIETZEN)

Erstbeobachtungen (28.02.-15.03.):

28.02.08	1 Ex.	Mechtesheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
03.03.08	1 Ex.	Bodenheim/MZ	L. SIMON
15.03.09	13 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
15.03.09	2 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA

Letztbeobachtungen (08.09.-03.10.):

13.09.08	2 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.09.08	1 Ex.	Mosel bei Temmels/TR	D. BECKER
13.09.09	1 Ex.	Vendersheim Plateau/AZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (71-300):

15.07.08	48 Ex.	Mainz-Finthen/MZ	H.-G. FOLZ
24.07.08	162 Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
30.06.09	40 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Seeadler (*Haliaetus albicilla*)

A

Im gewohnt spärlichen Rahmen gelang im Berichtszeitraum nur eine dokumentierte Beobachtung im Winter am Inselrhein:

06.01.08	1 K2	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLMAR
----------	------	-------------------------------	-----------------------

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

uDZ

Von insgesamt sieben Feststellungen im Berichtszeitraum wurden bisher lediglich drei ausreichend dokumentiert. Die Art ist vermutlich ein regelmäßiger Durchzügler und Wintergast in Rheinland-Pfalz, aber besonders bei jahreszeitlich ungewöhnlichen Beobachtungen können Fehlbestimmungen nicht ausgeschlossen werden und rechtfertigen vorerst die sorgfältige Prüfung aller Beobachtungen durch die AKRP.

27.01.-02.03.08	1 Ex.	Neunkhausen/WW	R.BUSCH, M. HÖFER, J. KUCHINKE, A. KUNZ, R. SCHEID
17.03.08	1 K2	Engelstadt/Dotterberg/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.08	1 Ex.	Westernohe/WW	R. BUSCH
16.11.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
01.12.08	1 Ex.	Hüblingen/WW	R. BUSCH
11.11.09	1 Ex.	Engelstadt Stephansgewann/MZ	H.-G. FOLZ

Eine ungewöhnliche frühe Beobachtung aus dem September 2009 im Westerwald wurde bisher nicht dokumentiert.

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (26-102):

07.10.08	49 Ex.	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.08	78 Ex.	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
28.01.09	40 Ex.	Orsfeld/BIT	M. u. U. BRAUN
19.10.09	42 Ex.	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Merlin (*Falco columbarius*)

rDZ

Aus den Jahren 2008 und 2009 liegen 79 Beobachtungen durchziehender Merline vor: AK (1), BIT (3), DAU (2), DÜW (2), EMS (6), MYK (18), MZ (21), NR (1), NW (4), RP (1), SÜW (2), TR (13), WO (3) und WW (2).

Letztbeobachtungen Heimzug (01.05.-06.05):

30.04.08	1 Ex.	Lörzweiler Königsstuhl/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.08	1 Ex.	Saargau/TR	K.-H. HEYNE
18.04.09	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
26.04.09	1 Ex.	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug (04.09.-24.09.):

31.08.08	1 Ex.	Bonerath/TR	F. u. M. ROBECK
07.09.08	1 Ex.	Engelstadt-Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.08.09	1 Ex.	Einig/MYK	E. LIPPOK
30.08.09	1 dj.	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)**uDZ**

Der Einflug des Rotfußfalcken nach Mitteleuropa im Mai 2008 führte auch in Rheinland-Pfalz zu einer ungewohnt hohen Anzahl von Nachweisen. Es waren insgesamt bis zu acht verschiedene Individuen beteiligt.

02.05.08	1 Ex.	Wawerner Bruch/TR	M. u. F. ROBECK
12.-16.05.08	1 vj. ♂	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
13.05.08	1 vj. ♂	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
14.05.08	1 ♂	Lykershausen/EMS	M. u. U. BRAUN
14.05.08	1 ♀	Bacharach-Steeg/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.08	1 ♂	Erpolzheimer Bruch/DÜW	J. WEIB
24.05.08	1 ♂	Flughafen Mendig/MYK	S. FRÄNZEL
25.05.08	1 ♂	Otterstadt/RP	A. STÖHR
29.08.09	1 ♂	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Baumfalke (*Falco subbuteo*)**rBV, rDZ**

Konkrete Brutnachweise gelangen in den TK25-Quadranten 5412/NO, 5612/SO, 6105/NO (nur 2009), 6113/SO (nur 2008), 6615/NW (nur 2009) (M. u. U. BRAUN, C. HEBER, K.-H. HEYNE, J. KUCHINKE, B. VOLLMAR). Weitere Brutzeitbeobachtungen kommen aus den Landkreisen AK (8), AW (1), AZ (8), BIT (10), COC (6), DAU (10), DÜW (10), EMS (30), GER (4), KH (16), KL (2), LD (2), LU (1), MYK (20), MZ (27), NW (5), RP (17), SIM (2), TR (16), WIL (14), WO (4) und WW (20).

Erstbeobachtungen (09.04.-18.04.):

17.04.08	1 Ex.	Haßloch/DÜW	C. HEBER
19.04.08	1 Ex.	Kaltenengers/MYK	M. JONCK
14.04.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
21.05.09	1 Ex.	Dümpelfeld/DAU	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen (22.09.-24.10.):

18.10.08	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN
19.10.08	1 Ex.	Schwabenheim – Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	1 Ex.	Bingen-Rochusberg/MZ	M. BICKEL

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

rBV

Der ARBEITSKREIS WANDERFALKENSCHUTZ (www.wanderfalkenschutz-rlp.de) ermittelte für 2008 insgesamt 34 und 2009 gar 39 Brutpaare für Rheinland-Pfalz:

	2008		2009	
	Nord	Südpfalz	Nord	Südpfalz
Fels	1	14	1	17
Steinbruch	7	0	8	0
Gebäude	12	0	13	0
Anzahl Bp./Region	20	14	22	17
Erfolgreiche Bp./Region	13	9	19	15
Flüge juv. Region	34	22	44	39
Anzahl Bp. gesamt	34		39	
Erfolgreiche Bp. gesamt	22		34	
Flüge juv. gesamt	55		83	

Es liegen zudem für 2008 und 2009 ca. 250 Beobachtungen von durch- bzw. umherziehenden Wanderfalken aus dem gesamten Landesgebiet vor.

Letztbeobachtungen Wegzug:

16.11.08	1 Ex.	Engelstadt-Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.11.09	1 Ex.	Ludwigshafen-Süd/LU	J. BAYER

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

rBV

Maximalzahlen (23-50):

15.07.08	17 Ex.	Mainz-Finthen/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.08	15 Ex.	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
12.09.09	20 Ex.	zw. Offstein u. Dirmstein/DÜW	M. WINK

Kranich (*Grus grus*)

rDZ

Heimzug 2008:

Der Heimzug 2008 (mindestens 40.810 gemeldete Ex.) erstreckte sich vom 03.02.-25.03.08 (Abb. 14, oben). Zuvor gab es ungewöhnlich viele Beobachtungen im Januar (insges. 24 Meldungen mit 727 Ex.), die hauptsächlich vom 01.01.-06.01.08 in südwestliche Richtung ziehende Vögel betrafen. Sie dürften somit als Nachhut des Wegzugs 2007 betrachtet werden. Ungewöhnlich war jedoch die Beobachtung von einem Trupp von 84 Ex., der am 06.01.08 am Steinerberg (Kesseling/AW) gen Nordosten zog (F.-J. FUCHS). Besonders spät waren hingegen ca. 100 Kraniche unterwegs, die noch am 31.01.08 bei Traben-Trarbach/WIL nach Südwesten zogen (H. HAUENSTEIN).

Drei Tage später setzte dann bereits der gerichtete Heimzug ein. Dieser brachte an 33 Tagen ziehende Kraniche. Die Verteilung war dieses Mal recht symmetrisch. Der Hauptzugtag (24.2. mit 15.775 Ex. = 39%) wurde von einigen schwächeren Zugtagen flankiert, so dass alleine an fünf Tagen (22.-26.2.08) mit 25.862 Ex. ca. 63% der Kraniche durchzogen. Bereits am 8.3.08 hatten 98% der Kraniche Rheinland-Pfalz passiert.

Erstbeobachtungen Heimzug 2008:

03.02.08	26 Ex.	dz. Bollendorf/BIT	K.-H. HEYNE
03.02.08	29 Ex.	dz. Ferschweiler/BIT	K.-H. HEYNE
07.02.08	? Ex.	dz. (Rufe) Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen Heimzug 2008:

25.03.08	67 Ex.	dz. Dohr/COC	L. LENZ
05. u. 11.04.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN
13.04.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher u. Hofmannsweiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
19.04.08	1 Ex.	Haidenweiher/WW	L. MUNSCH

Sommerbeobachtungen 2008:

28.04.-16.06.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
08.06.08	1 Ex.	Feuchgebiet Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK

Heimzug 2009:

Der Heimzug 2009 (mindestens 68.169 gemeldete Ex. – davon 58.726 ziehende Ex., jedoch ohne Umkehrzug) erstreckte sich vom 05.02.-15.04.09 (Abb. 14, unten) und somit über mehr als zwei Monate. Nachzügler wurden noch bis 17.05.09 beobachtet (s.u.), die aber rastende und teils flugunfähige Ex. betrafen. Die neun Beobachtungen mit insgesamt 469 Ex. in der ersten Januar-Dekade (01.-10.01.09) betrafen rastende oder in südwestliche Richtung ziehende Vögel und sind somit dem Wegzug von 2008 zuzurechnen.

An 30 Tagen wurden Heimzugbewegungen festgestellt (an zwei Tagen mit unbekannter Zahl, da nur Rufe gehört wurden). Nachdem vom 05.-15.02. nur vergleichsweise geringe Tagessummen gemeldet wurden, gab es am 15.02. den ersten kleinen Vorstoß mit 2.300 Ex. Im Wesentlichen spielte sich dann aber das Zuggeschehen vom 21.02. bis zum 01.03.09 ab. In diesen acht Tagen passierten 51.014 Ex. (87%) Rheinland-Pfalz, wobei es zwei Spitzentage mit 16.400 Ex. (21.02.) und 14.826 Ex. (27.02.) gab. Danach blieben die Zahlen vergleichsweise gering mit Tagessummen durchweg unter 1.500 Ex. (max. 1.455 Ex. am 11.03.). Die letzte größere Zugbewegung fand am 28.03.09 mit insgesamt 250 Ex. statt.

Am 27.02.09 fand aufgrund dichten Nebels im Westerwald starker Umkehrzug statt. Die ganze Nacht waren tausende Kraniche zu hören (A. KUNZ). Allen Orten kam es zu Notlandungen und leider auch zu Anflügen an Stromleitungen (13 am 28.02.09 bei Herschbach/WW, J. KUCHINKE). Am folgenden Morgen rasteten mindestens 4.390 Kraniche vor allem in der Region Hachenburg-Herschbach/WW (J. KUCHINKE, A. KUNZ, K. LAUX, M. SCHÄFER), darunter rund 2.500 Ex. im Quarzitgebiet/Herschbach/WW (J. KUCHINKE).

Erstbeobachtungen Heimzug 2009:

05.02.09	5 Ex.	dz. Hattert/WW	K. KRÄMER
05.02.09	32 Ex.	dz. Staustufe Trier/TR	D. BECKER, M. BECKER
05.02.09	34 Ex.	dz. Trierweiler/TR	K.-H. HEYNE, E. ROSLEFF-SØRENSEN
06.02.09	40 Ex.	dz. Niederheckenbach/AW	F.-J. FUCHS

Letztbeobachtungen Heimzug 2009:

15.04.09	1 Ex.	Burgen/MYK	M. u. U. BRAUN
17.05.09	1 Ex.	Kiesgrube Platten/W4L	M. BECKER

Rastende Kraniche Heimzug 2009:

01.03.-27.04.09	1 Ex.	flugunf., Herschbach/WW	K. LAUX
-----------------	-------	-------------------------	---------




Abb. 14: Zeitlicher Verlauf des Heimzuges des Kranichs (*Grus grus*) in Rheinland-Pfalz 2008 (grau, oben) und 2009 (grau, unten) jeweils im Vergleich zu den Vorjahren (schwarz). Prozentanteil täglich beobachteter Individuen an der Gesamtheit aller Individuen im Frühjahr (2008 n = 40.810 Ex. und 2009 n = 58.976 Ex.).

Wegzug 2008:

Vom Wegzug wurden insgesamt 24.028 Ex. gemeldet, womit er zahlenmäßig deutlich schwächer ausgeprägt war als der Heimzug 2008. Wie schon 2007 gab es eine ungewöhnlich frühe Beobachtung bereits am 09.09.08 (12 Ex. dz. Fisch/TR, E. SCHALLER). Ansonsten vollzog sich der Hauptdurchzug vom 03.10.-28.11. (Abb. 15, oben) und umfasste 30 Zugtage. Bis zum ersten größeren Zugtag am 31.10.08 mit 3.480 Ex. verlief der Zug nur schwach ausgeprägt mit

zwar 13 Zugtagen, aber nur 4.705 Ind. (20%). Auch danach blieb der Durchzug bis Mitte November auf niedrigem Niveau, so dass bis einschließlich des 16.11. gerade einmal 9.576 (40%) Kraniche durchgezogen waren. Am 17.11. gab es dann den stärksten Durchzugstag des Wegzugs 2008 mit 7.980 Ex. (33%). Eine letzte Welle des Hauptdurchzugs wurde vom 24.11.-28.11. beobachtet, bei der 5.247 Ex. (22%) durchgezogen, so dass damit 98,4% der Kraniche Rheinland-Pfalz passiert hatten. Nach einer über dreiwöchigen Pause gab es nochmals eine Phase leichten Durchzugs vom 21.-31.12. mit insgesamt 377 Ex. (1,6%-inklusive einiger Trupps, die nur gehört wurden) an sieben Tagen, was als Winterflucht gedeutet werden kann

Erstbeobachtungen Wegzug 2008:

03.10.08	170 Ex.	dz. Neustadt/NW	R. STEINHAUSEN
08.10.08	200 Ex.	dz. Neustadt-Haardt /NW	C. HEBER

Letztbeobachtungen Wegzug 2008:

27.12.08	136 Ex.	dz. Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN
27.12.08	80 Ex.	dz. Obernhof/Lahn/EMS	G. u. W. MAY, H. SCHLIERICKE
29.12.08	? Ex.	dz. (Rufe) Mülheim-Kärlich/MYK	H. JÖNCK
30.12.08	? Ex.	dz. (Rufe) Lissendorf/DAU	W. PODSZUN
31.12.08	7 Ex.	dz. Gusterath/TR	F. u. M. ROBECK
31.12.08	? Ex.	dz. (Rufe) Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK

Wegzug 2009:

Der Wegzug 2009 setzte am 09.10. mit 270 Ex. ein, wobei fünf der sieben Meldungen Beobachtungen betrafen, bei denen die Trupps nur gehört wurden, also insgesamt mit noch wesentlich mehr Ind. zu rechnen war. Leider wurden während der gesamten Zugperiode sehr viele Trupps nachts verhört, von denen meistens keine Zahlenangaben vorlagen und die somit auch nicht in die Statistik eingehen konnten. Insgesamt wurden dennoch 53.386 Ex. gemeldet, wobei nur 84 Ex. rastende Vögel betrafen. So wurden also 2009 weit mehr als doppelt so viele Kraniche wie 2008 gezählt – und das trotz der vielen zahlenmäßig nicht erfassten nachts ziehenden Trupps!

Der Durchzug erstreckte sich vom 09.10.-21.12. und umfasste 31 Zugtage (Abb. 15, unten). Gleich zu Beginn der Zugperiode setzte sehr starker Durchzug ein, der vom 12.-16.10. mindestens 31.373 (59%) ziehende Kraniche bescherte. Der Hauptzugtag war der 14.10., an dem überwältigende 21.657 Ex. (41%!) in Rheinland-Pfalz gezählt wurden.

In den folgenden zwei Wochen fanden dann nur geringe Zugbewegungen statt. Erst vom 30.10.-03.11. gab es nochmals stärkeren Zug mit insgesamt 9.907 Ex. an vier Zugtagen (19%). Abgesehen vom 08.11. (997 Ex.) und 30.11. (zwei nächtliche Trupps) wurden im November keine Kraniche mehr gemeldet. Dafür gab es im Dezember noch einmal vergleichsweise viele Beobachtungen, immerhin wurden an 15 Tagen Kraniche gemeldet: Eine kleinere Welle zu Monatsbeginn brachte 3.120 Ex. (01. u. 02.12.) sowie rufende Ex. am 03.12., und bei einer zweiten, längeren Welle, wurden vom 11.-21.12. nochmals 6.828 Ex. (13%) beobachtet.

Erstbeobachtungen Wegzug 2009:

09.10.09	120 Ex.	dz. Monzel/WIL	F. WASSER
09.10.09	150 Ex.	dz. Hundsangen/WW	M. WEIDENFELLER

Sowie am 09.10.09 nächtlich durchziehende ohne Angabe von Zahlen in Idesheim/BIT (K.-H. HEYNE), Konz-Köhen/TR (H. BECKER), Korlingen/TR (D. BECKER), Pluwig/TR (G. u. J. MICHELS) und Zerf/WIL (N. BECKER).

Letztbeobachtungen Wegzug 2009:

20.12.09	45 Ex.	dz. Bechthelm/AZ	P. ERLEMANN
20.12.09	105 Ex.	dz. Trier/TR	K.-H. HEYNE
21.12.09	49 Ex.	dz. Trier/TR	F. WASSER

Rastende Kraniche beim Wegzug 2009:

10.10.09	14 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
02.11.09	70 Ex.	Holzheim/EMS	R. FISCHER




Abb. 15: Zeitlicher Verlauf des Wegzuges des Kranichs (*Grus grus*) in Rheinland-Pfalz 2008 (grau, oben) und 2009 (grau, unten) jeweils im Vergleich zu den Vorjahren (schwarz). Prozentanteil täglich beobachteter Individuen an der Gesamtheit aller Individuen im Frühjahr (2008 n = 24.028 Ex. und 2009 n = 53.386 Ex.).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

rBV

Gemeldete Brutvorkommen 2008:

1 Bv.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	5412/24	J. KUCHINKE
1 Rev.	Dreifelder Weiher/WW	5412/30	A. KUNZ, M. SCHÄFER
2-4 Rev.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK
2-3 Rev.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	D. BECKER, C. DIETZEN, P. ERLEMANN, E. LIPPOK
2-4 Rev.	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	5710/01,03,11,13	E. LIPPOK
1-2 Bv.	Sangweiher/DAU	5807/23,33	M. u. U. BRAUN, D. BECKER, M. BECKER
3 Rev.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	5906/57	M. BECKER, K.-H. HEYNE
2-4 Rev.	Maringer Wies/WIL	6007/09	M. BECKER, K.-H. HEYNE
3 Rev.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	6007/35	D. u. M. BECKER, K.-H. HEYNE, C. KÖNIG
2 Bv.	Schwabenheimer Schilf/MZ	6014/46	H.-G. FOLZ
2-3 Bv.	Im Mayen, Elsheim/MZ	6014/56	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Wallertheim, Wiesbachtal/AZ	6114/14	H.-G. FOLZ
2 Bv.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/24	F. KLÖPFER
4-5 Rev.	Im Bruch, Mausbach/PS	6810/05	P. SPIELER

Gemeldete Brutvorkommen 2009:

1 Bv.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	A. KUNZ
2-3 Rev.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. JÖNCK, E. LIPPOK
2-4 Rev.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	H. BODES, C. DIETZEN, P. ERLEMANN, E. LIPPOK
2-4 Rev.	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	5710/01,03,11,13	M. u. U. BRAUN, E. LIPPOK
1 Bv.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	5906/57	K.-H. HEYNE
2-3 Rev.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	6007/35	D. u. M. BECKER, K.-H. HEYNE, S. TWIETMEYER
3 Bv.	Im Mayen, Elsheim/MZ	6014/56	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Kenner Flur/TR	6106/53, 54	D. BECKER, K.-H. HEYNE
1 Bv.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	D. u. M. RINNE
1 Bv.	Rheindürkheim/WO	6216/52	J. BAYER
1 Bv.	Aumühle W Hanhofen/NW	6615/59	C. HEBER, M. POST

Winterbeobachtungen:

01.-20.01.08	bis 3 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
06.01.08	2 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
10.01.08	1 Ex.	Schwarzbachtal östl. Dellfeld/PS	G. RINDCHEN
07.-20.12.08	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, M. WINK
21.12.08	1 Ex.	Geinsheim-Nord/SP	C. HEBER
23.12.08	1 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.12.08	2 Ex.	Meerfelder Maar/WIL	K.-H. HEYNE
25.12.08-08.02.09	1-2 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	K.-H. HEYNE
04.-31.12.09	bis 3 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, C. DIETZEN
07. u. 13.12.09	2-3 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
11. u. 26.12.09	1 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK
19.12.09	1 Ex.	Klärteiche Mehren/DAU	M. BECKER
19.12.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
24.12.09	2 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
28.12.09	1 Ex.	Feuchtgebiet zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Heimzug (02.03.-15.03.)¹:

16.02.08	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
24.02.08	3 Ex.	Im Bruch, Mausbach/PS	P. SPIELER

¹ Vergleichsdaten aus 2004–2007.

24.02.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	K.-H. HEYNE
24.02.08	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
28.02.09	1 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	K.-H. HEYNE
08.03.09	2 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.03.09	2 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtungen Wegzug (07.11.-28.11.)¹:

18.11.08	2 Ex.	Im Bruch, Mauschbach/PS	P. SPIELER
30.11.08	1 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
15.11.09	3 Ex.	Kiesgrube Großlittgen-Heeg/WIL	K.-H. HEYNE
30.11.09	2 Ex.	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK

Wachtelkönig (*Crex crex*)

IBV

Für das Berichtsjahr 2008 wurden besetzte Rufplätze in den Landkreisen WW (sechs Rufer, R. BUSCH), KL (bis zu zwei Rufer, P. RAMACHERS), NW (ein Rufer, A. STÖHR) sowie in den Queichwiesen/SÜW gemeldet (P. KELLER). Die Beobachtungen stammen aus dem Zeitraum 15.05.-09.07.08.

Im Jahre 2009 wurden nur sechs Rufer einzig aus dem Westerwald (Landkreis WW) gemeldet (A. KUNZ). Alle Beobachtungen stammen vom 29.06.2009. Man kann nur hoffen, dass nicht alle Wachtelkönige gemeldet wurden.

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

rDZ

Während für 2008 gar keine Tüpfelsumpfhühner aus Rheinland-Pfalz gemeldet wurden, gelangen 2009 immerhin 12 Einzelbeobachtungen, die sich auf drei Gebiete mit z. T. länger verweilenden Individuen aufteilen. Alle betreffen Exemplare auf dem Wegzug.

09.08.09	1 ad.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
09.-25.08.09	1-3 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER, H. BODES, K.-H. u. M. HEYNE
26.-31.08.09	1 dj.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
12.09.09	2 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

rBV

Insgesamt wurden für 2008 nur 104 Einzelbeobachtungen und für 2009 gar nur noch 77 Beobachtungen gemeldet. Größere Ansammlungen wurden besonders 2009 nicht gemeldet.

Maximalzahlen (19-76):

10.01.08	17 Ex.	Lahn zwischen Dausenau u. Lahnstein/EMS	M. u. U. BRAUN
16.12.08	18 Ex.	Lahn zwischen Dausenau u. Lahnstein/EMS	M. u. U. BRAUN
15.12.09	8 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK

Blässhuhn (*Fulica atra*)

rBV

Maximalzahlen (1.050-1.808):

01.01.08	1.508 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
16.11.08	421 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
14.12.08	472 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
28.12.08	832 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK

14.01.09	550 Ex.	Rhein Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.01.09	993 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
31.10.09	1.100 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
20.11.09	832 Ex.	Kannsee/NR	M. u. U. BRAUN

Triel (*Burhinus oedicnemus*)**A**

Ein weiterer gut dokumentierter Erstnachweis für die Region Trier ist gleichzeitig die 15. Feststellung in Rheinland-Pfalz. Die zuvor letzte Beobachtung gelang im Juli 2005 im Westerwald (DIETZEN et al. 2006).

13.04.08	1 Ex.	Beinhausen/DAU	R. HANSEN
----------	-------	----------------	-----------

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)**uDZ**

Es liegen zwar über 40 Feststellungen aus 2008 vor, diese betreffen allerdings nur 1-2 Individuen, die sich über einen längeren Zeitraum im Mittelrheinischen Becken aufhielten. Im Folgejahr war die Aufenthaltsdauer deutlich geringer, dafür gelang aber ein weiterer Nachweis vom Wegzug.

02.03.-17.04.08	2 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. u. U. BRAUN, P. ERLEMANN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID, H. STRUNK
06.-15.03.09	2 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
09.08.09	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)**uDZ**

Es gelangen in beiden Berichtsjahren gewohnt spärliche Beobachtungen vom Heimzug:

12.04.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	W. VOGEDES
14.04.08	2 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	P. ERLEMANN, W. VOGEDES
14.03.09	2 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)**rDZ**

Während aus dem Jahr 2008 überhaupt keine Beobachtung vorliegt, trat der Kiebitzregenpfeifer 2009 wieder etwas stärker in Erscheinung:

30.05.09	1 vj.	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
02.10.09	1 juv.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. KNÖDLER
02.-13.10.09	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH, J. KUCHINKE, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK
11.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)**rDZ**

Nachzutragen ist eine weitere Dezemberbeobachtung von einem Exemplar am 28.12.2007 bei Mörz/MYK (H. u. I. STRUNK).

Aus dem aktuellen Berichtszeitraum liegen Feststellungen ($n = 66$) von 384 (2008) bzw. 177 Exemplaren (2009) vor, die sich auf die Landkreise BIT (5), DAU (1), DÜW (1), EMS (1), MYK (27), MZ (25), NR (2), TR (4), WO (1) und WW (1) verteilen. Zum jahreszeitlichen Auftreten s. Abb. 16.




Abb. 16: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadensummen) des Goldregenpfeifers (*Pluvialis apricaria*) in Rheinland-Pfalz 2008 (grau, $n = 384$ Ex.) und 2009 (schwarz, $n = 177$ Ex.).

Erstbeobachtungen Heimzug (05.02.-28.02.):

22.02.08	27 Ex.	westl. Einig/MYK	W. VOGEDES
22.02.08	2 Ex.	nördl. Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
22.02.08	19 Ex.	südl. Badem/BIT	K.-H. HEYNE
24.02.08	1 Ex.	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE
28.02.09	3 u. 2 Ex.	rastend bei Dudeldorf u. Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
01.03.09	7 Ex.	Kaisereiche Dierdorf/NR	J. KUCHINKE
01.03.09	1 Ex.	rastend Rölerhöcht Tawern/TR	D. BECKER
02.03.09	28 Ex.	nordwestl. Lonnig/MYK	W. VOGEDES

Letztbeobachtungen Heimzug (11.03.-14.04.):

06.04.08	1 Ex.	dz. Steinsee Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
25.04.09	1 Ex.	Stephansgewann Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug (12.08.-07.09.):

22.07.08	1 Ex.	dz. Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.08	1 Ex.	dz. Sammetzkopf SO Kollig/MYK	M. JÖNCK
02.09.08	2 ad.	rastend bei Fisch/TR	E. SCHALLER
06.08.09	4 Ex.	dz. westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
06.09.09	4 Ex.	Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Wegzug (26.11.-31.12.):

16.11.08	5 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
23.11.08	18 Ex.	Laubenheimer Ried/MZ	M. SCHMOLZ
02.12.09	16 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ, P. WOLF
13.12.09	3 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahlen (46-690):

14.03.08	78 Ex.	westl. Einig/MYK	W. VOGEDES
27.03.08	49 Ex.	Lörzweiler Königsstuhl/MZ	H.-G. FOLZ
02.03.09	28 Ex.	nordwestl. Lonnig/MYK	W. VOGEDES
02.10.09	26 Ex.	dz. Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER

Steppenkiebitz (*Vanellus gregarius*)

A

Nach fast 25-jähriger Wartezeit gelang 2009 der dritte Nachweis für Rheinland-Pfalz bzw. der Erste für die Region Trier:

*19.09.09	1 dj.	bei Ralingen-Kersch/TR	D. BECKER, M. BECKER, J. ENGLER, K.-H. HEYNE
-----------	-------	------------------------	---

Zwei ältere Nachweise stammen vom 27.03.1959 bei Speyer (HENNING 1961) und vom 11.10.1986 am Urmitzer Werth (S. JAMRWOSKI, M. JÖNCK).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

rBV, rDZ

Bruten:

Die Anzahl gemeldeter Brutvorkommen ist weiterhin rückläufig, was allerdings nicht nur an der sicherlich wenig erfreulichen Bestandsentwicklung der Art liegt, sondern auch durch die ebenfalls rückläufige Meldeaktivität bedingt wird. Insgesamt wurden für 2008 und 2009 nur noch 17 bzw. 12 nachweisliche Bruten mitgeteilt, ergänzt durch jeweils noch einmal so viele Brutverdachte und -hinweise (D. BECKER, H. BOTT, H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, H. GÖPPEL, V. HÄSELBARTH, C. HEBER, K.-H. HEYNE, J. KUCHINKE, M. MÜNCH, P. RAMACHERS, M. SCHMOLZ, E. SEFRIN, L. SIMON, P. SPIELER, R. STEINHAUSEN, B. VOLLMAR). Die Vorkommen befanden sich in den bekannten Gebieten (s. DIETZEN & FOLZ 2008a) und neu besetzte TK25-Quadranten waren 6015/SO (Brutverdacht), 6511/SW und 6810/NW (erfolglose Brut).

Gleichermaßen gehen auch die Rastbestände dramatisch zurück und Ansammlungen von 500 Exemplaren oder mehr scheinen weitgehend Geschichte zu sein.

Winterbeobachtungen (Jan.):

16.01.08	2 Ex.	Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER
20. u. 26.01.08	1-12 Ex.	„Im Mayen“, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.01.08	11 Ex.	Sangweiher/DAU	S. MANNSCHOTT
27.01.08	1 Ex.	südl. Weitfeld/AK	A. KUNZ
24.01.09	1 Ex.	Welschbillig-Ittel/TR**	K.-H. HEYNE

Maximalzahl Heimzug (> 200 Ex.) (800-3.100):

01.03.08	212 Ex.	Gappenach/MYK	H. STRUNK
27.02.09	280 Ex.	Dudeldorf/BIT	K.-H. HEYNE
28.02.09	420 Ex.	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen Wegzug (> 250 Ex.) (388-3.500):

19.10.08	208 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
19.11.08	1.835 Ex.	Plateaus um Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	222 Ex.	dz. östl. Gering/MYK	M. JÖNCK
31.10.09	203 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

rBV, rDZ

Bruten:

Für 2008 wurden insgesamt 27 Brutpaare gemeldet, von denen sich sieben auf bisher nicht besetzten TK25-Quadranten aufhielten (Abb. 17). Von insgesamt 13 für 2009 gemeldeten Vorkommen befanden sich zwei auf neuen TK25-Quadranten. Die meisten mitgeteilten Vorkommen stammen aus Sekundärbiotopen (Kiesgruben, Tongruben u.ä.) in Westerwald, Region Trier und Rheintal (ARBEITSKREIS WESTERWALD, J. BAYER, M. BECKER, D. BECKER, R. BUSCH, P. ERLEMANN, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. KNÖDLER, J. KUCHINKE, P. RAMACHERS, H.-J. SCHYGULLA, S. u. F.-J. STÖLB, S. TWIETMEYER, W. VOGEDES).




Abb. 17: Brutverbreitung des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Rheinland-Pfalz 2001-2009 (besetzte TK25-Quadranten).

Erstbeobachtungen (09.03.-23.03.):

13.03.08	1 Ex.	Flugplatz Bitburg/BIT
14.03.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK
19.03.08	3 Ex.	Polder Ingelheim/MZ

K.-H. HEYNE
W. VOGEDES
H.-G. FOLZ

15.03.09	3 Ex.	Hagenbach/GER	H.-J. SCHYGULLA
19.03.09	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	V. HÄSELBARTH
21.03.09	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
22.03.09	je 2 Ex.	Kiesgruben Arenrath u. Hetzerath/WIL	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (13.09.-26.09.):

02.09.08	2 Ex.	Kiesgruben Esch/WIL	F.-J. u. S. STÖLB
14.09.08	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	V. PLATZ
12.09.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Eine weitere Meldung, aus der zweiten Oktober-Dekade 2008, wurde bisher leider nicht dokumentiert und kann folglich nicht als Nachweis gelten!

Maximalzahlen (12-50):

08.04.08	14 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.07.08	16 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
17.08.08	20 Ex.	Ramstein/KL	P. RAMACHERS
05.07.09	10 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

rDZ

Insgesamt wurden für den Berichtszeitraum 70 Meldungen übermittelt, davon 23 aus 2008 und 47 aus 2009. In Anbetracht der generell niedrigeren Meldeaktivität in 2009, muss in diesem Jahr von einem proportional stärkeren Vorkommen ausgegangen werden. Räumlich verteilen sich die Feststellungen auf die Landkreise COC (4), DAU (4), DÜW (12), KH (3), MYK (4), MZ (15), NR (5), NW (1), RP (9), WIL (1), WO (1) und WW (11). Erwähnenswert sind außerdem die sehr frühen Beobachtungen diesjähriger Sandregenpfeifer, die sonst erst deutlich später bei uns im tiefen Binnenland auftauchen.

Erstbeobachtung Heimzug (04.03.-29.04.):

19.03.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	---------------------	------------

Letztbeobachtungen Heimzug (01.05.-24.06.):

24.05.08	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
13.06.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
10.05.09	2 Ex.	Kiesgruben Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
17.05.09	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Erstbeobachtungen Wegzug (07.07.-06.09.):

04.07.08	2 dj. (!)	Klärteiche Offstein/DÜW - -	V. SCHMIDT
06.07.08	1 dj. (!)	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
06.08.09	1 Ex.	dz. westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
15.08.09	1 ad.	Sangweiher/DAU	M. BECKER

Letztbeobachtungen Wegzug (05.10.-29.10.):

08.10.08	1 Ex.	dz. Rheindürkheim/WO	J. BAYER
03.10.09	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	D. RINNE, O. STRUB u.a.
06.10.09	7 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. KNÖDLER
12.10.09	3 Ex.	Wiesensee/WW	R. SCHEID

Maximalzahlen (6-28):

22.05.08	8 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
----------	-------	-------------------------	---------

25.08.09	7 Ex.	Rhein Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
02.10.09	10 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. KNÖDLER
08.10.09	8 Ex.	Wiesensee/WW	A. KUNZ

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

rDZ

Der Durchzug verlief gewohnt konzentriert innerhalb eines engen Zeitfensters im Spätsommer ab und die Beobachtungen stammen aus den bekannten Gebieten in Maifeld/MYK, Saargau/TR, Wattweiler Höhe/ZW und Rheinhessen/MZ.

Aus 2008 wurden gut 30 Beobachtungen mit insgesamt mindestens 147 Exemplaren zwischen dem 17.08. und 17.09. gemeldet (D. BECKER, M. u. U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-J. ESPER, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, E. LIPPOK, E. SCHALLER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, H. STRUNK, A. TORKLER).

Im Jahr 2009 erstreckte sich der Wegzug vom 06.08. bis zum 20.09. und erbrachte gut 45 Beobachtungen mit insgesamt mind. 231 Exemplaren (M. u. U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, P. ERLEMANN, H.-G. FOLZ, H. GÖPPEL, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, G. KURZ, E. LIPPOK, G. NICKLAUS, E. SCHALLER, P. SPIELER, S. u. F.-J. STÖLB, G. SÜBDORF, S. TWIETMEYER, W. VOGEDES, E. C. WALTER).

Zum jahreszeitlichen Auftreten s. Abb. 18 und zum generellen Vorkommen in Rheinland-Pfalz s. DIETZEN et al. (2008).




Abb. 18: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadensummen) des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (dunkelgrau, n = 1.558 Ex.), 2008 (schwarz, n = 164 Ex.) und 2009 (hellgrau, n = 268 Ex.).

Beobachtungen abseits bekannter Rastplätze:

01.09.09	1 Ex.	Schallodenbach/KL	U. u. F. SCHMOLTZI
04.09.09	6 Ex.	Wattweiler Höhe/ZW	C. BRAUNBERGER

Maximalzahlen (7-56):

17.08.08	4 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ, A. TORKLER
24.08.08	67 Ex.	Tagessumme Maifeld/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, H. STRUNK E. SCHALLER
02.09.08	2 ad., 8 dj.	Saargau Fisch/TR	E. SCHALLER
06.09.09	45 Ex.	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
22.08.09	5 ad., 10 dj.	Saargau Fisch/TR	K.-H. HEYNE

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)**rDZ**

Das Auftreten blieb im bekannten Rahmen, mit der Mehrzahl der Feststellungen während des Heimzuges.

15.04.-03.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, V. HÄSELBARTH, M. MÜNCH
19.04.08	3 Ex.	Binger Wiese, Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.08	1 Ex.	Kleeburgerhof, Küttig/MYK	E. LIPPOK
16.05.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
24.08.08	1 Ex.	dz. bei Fisch/TR	K.-H. HEYNE, E. SCHALLER
11.04.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	C. HACKENBERG
16.08.09	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)**rDZ**Winterbeobachtungen:

23.11.08	1 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
03.01.09	1 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, M. WINK

Heimzug:

09.03.08	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/BIT	K.-H. HEYNE
04.04.08	1 Ex.	zw. Fehlritzhausen u. Hof/WW	R. BUSCH
06.04.08	2 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
14.03.09	1 Ex.	Westheim/RP	C. DIETZEN
29.03.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK

Wegzug:

Zwischen dem 19.08. und 16.09.2008 gelangen elf Feststellungen mit insgesamt 34 Exemplaren (J. BAYER, M. u. U. BRAUN, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, H. LEMKE, B. VOLLMAR). Maximal wurden am 24.08.08 am Dreifelder Weiher/WW 12 Exemplare gezählt (A. KUNZ).

Zwischen dem 03.08. und 13.09.2009 gelangen zehn Feststellungen mit nur 14 Exemplaren (N. BÖHM, M. u. U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, C. HACKENBERG, S. TWIETMEYER, M. WINK). Maximal wurden je drei Exemplare am 29.08.09 bei Engelstadt/MZ (H.-G. FOLZ) und am 30.08.09 bei Bubenheim/MZ (H.-G. FOLZ) registriert.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)**rDZ**

Das Auftreten verlief im üblichen Rahmen und für 2008 und 2009 liegen jeweils zwei bzw. drei Beobachtungen ausschließlich vom Heimzug vor:

14.-21.03.08	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT, F. ZIERZ u.a.
21.-22.03.08	1 Ex.	bei Scharfbillig/BIT	K.-H. HEYNE
17.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
15.03.09	2 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
28.03.09	1 Ex.	nachts dz. Trier/TR	J. ENGLER

Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*)

rDZ

Nach zweijähriger Pause gab es im Berichtszeitraum wieder einzelne Beobachtungen von Heim- und Wegzug. Leider wurde eine jahreszeitlich ungewöhnliche weitere Feststellung aus dem März 2008 bisher nicht dokumentiert.

28.04.08	1 Ex.	bei Landau/LD	U. JANZ
29.04.08	2 Ex.	dz. Petrisberg/TR	H. LEMKE
04.09.09	1 SK	Rhein Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
30.09.-06.10.09	1 dj.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. BICKEL, H.-G. FOLZ, M. KNÖDLER
13.10.09	1 dj.	Rhein Petersau/RP	E. LEESE

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

rBV, rDZ

Insgesamt gelangen im Berichtszeitraum 15 Bruthinweise aus den Landkreisen BIT, DÜW, EMS, LU, RP, TR und WW (TK25-Quadranten: 5313/SW, 5412/NW, NO, 5612/SO, 6104/NW, 6305/SW, 6614/SW, 6516/NW, 6615/NW, SW, 6616/SW, 6713/NO, 6714/NW).

Winterbeobachtungen:

11.-22.01.08	2 Ex.	Gemeindewald Herschbach/WW	J. KUCHINKE
28.12.08	1 Ex.	Wald ‚Katzhausen‘ Liebenscheid/WW	A. KUNZ
24.01.09	1 Ex.	Gemeindewald Mündersbach/WW	J. KUCHINKE
04.12.09	1 Ex.	Neidenbacher Wald/BIT	A. DER
15.12.09	1 Ex.	Keppeshausen/BIT	J. RICHARZ
16.12.09	1 Ex.	Grünewald Wittlich/WIL	M. BECKER

Heimzug:

28.02.08	1 Ex.	südlich Nister/WW	A. KUNZ
18.03.08	1 Ex.	Our bei Sevenig/BIT	A. DER
23.-29.03.08	max. 3 Ex.	Schmidtenhöhe/KO	H. STRUNK
30.03.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
30.03.08	1 Ex.	Westernohe/WW	R. BUSCH
31.03.08	1 Ex.	Bingerwald/MZ	B. VOLLMAR
03.03.09	1 Ex.	Wolsfeld/BIT	B. PICKAN
15.03.09	1 Ex.	Ziegenberg Hinterwald/EMS	M. u. U. BRAUN
22.03.09	1 Ex.	zw. Zerf u. Mandern/TR	N. BECKER

Wegzug:

31.08.08	1 Ex.	Geinsheim/NW	C. HEBER
20.10.08	1 Ex.	Talau Nassau-Scheuern/EMS	M. u. U. BRAUN
10.11.08	1 Ex.	Schweighausen/EMS	M. u. U. BRAUN
13.11.08	3 Ex.	Sülm/BIT	B. PICKAN
21.11.08	1 Ex.	Gemeindewald Mündersbach/WW	J. KUCHINKE
30.11.08	1 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	M. WINK
15.09.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
26.09.09	1 Ex.	Kell Wadrill/TR	F. u. M. ROBECK

18.10.09	1 Ex.	Koblenz/KO	H. STRUNK
12.11.09	1 Ex.	Geinsheim/NW	C. HEBER
14.11.09	1 Ex.	Steinborner Wald/BIT	K.-H. HEYNE

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

rDZ

Im Berichtszeitraum gelangen insgesamt 34 Beobachtungen (2008: 14, 2009: 20), die sich auf nur wenige Landkreise verteilen: DAU (1), MZ (1), NW (1), RP (1), TR (3), WIL (21), WO (1) und WW (5).

Winterbeobachtungen:

27.01.08	1 Ex.	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
29.11.08-18.01.09	1-4 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER, K.-H. HEYNE
02.01.09	1 Ex.	Rothenbach SW Hachenburg/WW	A. KUNZ
14.11.-20.12.09	2 Ex.	Viehweiden SW Hachenburg/WW	A. KUNZ
20.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. FEUERSENGER, N. WALTER
24.12.09	2 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER

Heimzug:

29.02.08	1 Ex.	Neustadt/NW	C. BROWNSEA
09.03.08	2 Ex.	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
14.03.-08.04.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	H. BIRK, F. ZIERZ
16.-23.03.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	D. BECKER, M. BECKER, K.-H. HEYNE
19.03.08	3 Ex.	Nasswiesen Nister/WW	A. KUNZ
23.03.08	1 Ex.	„Im Mayen“, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
24.-30.03.08	1 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
01.02.-08.03.09	5 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	D. BECKER, M. BECKER, H. BODES, K.-H. HEYNE
05.04.09	1 Ex.	Kiesgrube Grosslittgen/WIL	K.-H. HEYNE
05.04.09	1 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE

Wegzug:

27.09.08	1 Ex.	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
23.11.08	2 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	K.-H. HEYNE
14.10.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	W. VOGEDES
25.10.09	1 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	K.-H. HEYNE

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

rBV, rDZ

Es gab zwar vereinzelte Beobachtungen balzender Bekassinen, es fehlen jedoch Feststellungen zwischen Mitte Mai und Anfang Juli, so dass nun bereits drei Jahre in Folge (2007-2009) keine sicheren Bruthinweise aus RLP mehr bekannt wurden!

Es liegen Winterbeobachtungen zwischen dem 11.-27.01.08 (fünf Beob. m. 40 Ex.), 30.11.-31.12.08 (11 Beob. m. 34 Ex.), 01.-24.01.09 (acht Beob. m. 11 Ex.) und 29.11.-31.12.09 (13 Beob. m. 40 Ex.) vor (M. BECKER, P. ERLEMANN, C. HACKENBERG, C. HEBER, K.-H. HEYNE, J. KUCHINKE, A. KUNZ, K. LAUX). Die meisten Beobachtungen stammen aus Westerwald und Eifel, nur vereinzelte Feststellungen in den südlichen Landesteilen (MZ, RP). Bemerkenswert sind Ansammlungen von bis zu 32 Exemplaren bei Hachenburg/WW am 26.01.08 (A. KUNZ).

Erstbeobachtungen Heimzug (03.02.-04.03.):

13.02.08	2 Ex.	Giershofen/NR	K. LAUX
16.02.08	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
16.02.08	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
24.02.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
08.02.09	3 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
24.02.09	2 Ex.	Viehweiden Hachenburg/WW	A. KUNZ
04.03.09	5 Ex.	Neupotz/GER	H.-J. SCHYGULLA

Letztbeobachtungen Heimzug (03.05.-15.05.):

01.05.08	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
04.05.08	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
07.05.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
12.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
16.05.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Wegzug (02.07.-24.07.):

05.07.08	2 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
19.07.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
26.07.08	4 Ex.	Sangweiher/DAU	H. STRUNK
28.07.08	1 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	D. BECKER
02.08.09	8 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
09.08.09	3 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtungen Wegzug (23.11.-09.12.):

22.11.08	4 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	K. LAUX
23.11.08	2 Ex.	Steinsee, Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
13.11.09	1 Ex.	Postweiher/WW	A. KUNZ
13.11.09	1 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA
14.11.09	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.11.09	1 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	D. BECKER

Maximalzahlen (35-66):

24.02.08	23 Ex.	Mauschbacher Bruch/PS	H. GÖPPEL, P. SPIELER
05.04.08	32 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
10.04.08	30 Ex.	Schäfersmühle Rüber/MYK	W. VOGEDES
28.09.08	41 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	K. LAUX
08./09.11.08	28 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER, F.-J. STÖLB
11.10.09	26 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
31.10.09	22 Ex.	Postweiher/WW	M. SCHÄFER

Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)u**DZ**

Interessanterweise gelang der mittlerweile fünfte Nachweis für Rheinland-Pfalz fast auf den Tag genau im selben Gebiet wie die letzte Feststellung (29.04.06 C. DIETZEN, E. u. V. SCHMIDT, E. SEFRIN in DIETZEN & FOLZ 2008a)!

*26.-27.04.09	1 SK/PK	Mecktersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN, E. SEFRIN
---------------	---------	-----------------------------	-----------------------

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)**rdZ**

Insgesamt über 300 Meldungen (2008: ca.210, 2009: ca. 110) verteilen sich nahezu landesweit auf die Landkreise BIT, COC, DAU, DÜW, EMS, GER, KH, KL, LU, MYK, MZ, NR, NW, PS, RP, SP, TR, WIL und WW.

Winterbeobachtungen:

10.-13.01.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, W. VOGEDES
10.02.08	1 Ex.	Andernacher Hafen/MYK	E. LIPPOK
15.02.08	1 Ex.	Weißenthurner Werth/NR	M. u. U. BRAUN
04.01.-14.02.09	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	C. DIETZEN, M. WINK
19.12.09	1 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK
24.12.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Erstbeobachtungen Heimzug (27.03.-21.04.):

15.03.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, R. SCHEID
20.03.08	1 Ex.	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
30.03.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
14.04.08	1 Ex.	Scharbillig/BIT	K.-H. HEYNE
29.03.09	1 Ex.	Harspelter Mühle/BIT	J.-R. VOS
25.04.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. SCHMOLZ, M. WINK

Letztbeobachtungen Heimzug (20.05.-16.06.):

23.05.08	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK
25.05.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
28.05.08	1 Ex.	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
20.05.09	1 Ex.	Moselstaustufe Trier/TR	K.-H. HEYNE
26.05.09	1 Ex.	Nahe zw. Langenlohnheim u. Bretzenheim/KH	B. VOLLMAR
27.05.09	je 1 Ex.	Dreifelder Weiher u. Haidenweiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Wegzug (18.06.-07.07.):

22.06.08	2 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
30.06.08	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
06.07.08	1 Ex.	Kiesgruben Esch/WIL	K.-H. HEYNE
06.07.08	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
05.07.09	1 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
05.07.09	1 Ex.	Schleuse Hollerich/EMS	M. u. U. BRAUN
11.07.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
11.07.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Letztbeobachtungen Wegzug (15.10.-26.11.):

22.09.08	1 Ex.	Nahe zw. Gensingen u. Ippenheim/MZ	B. VOLLMAR
05.10.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
13.11.08	3 Ex.	Mauschbacher Bruch/PS	H. GÖPPEL, P. SPIELER
28.09.09	1 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. BICKEL
03.10.09	1 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA
11.10.09	1 Ex.	Kiessee Busdepot Neuwied/NR	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (19-35):

08.05.08	9 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
11. u. 25.07.08	10 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, C. DIETZEN
10.08.08	10 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, C. DIETZEN
10.08.08	9 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
24.08.08	9 Ex.	Baggerweiher Mußbach/NW	C. HEBER

13.08.09	21 Ex.	Schleuse Hollerich/EMS	M. u. U. BRAUN
21.08.09	15 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

rDZ

Insgesamt wurden 21 Meldungen (2008: 11, 2009: 10) mitgeteilt, die sich auf die Landkreise BIT (1), DAU (4), DÜW (7), MYK (1), MZ (5), NR (1), und WW (2) verteilen.

Erstbeobachtungen Heimzug (23.03.-16.04.):

15.04.08	4 Ex.	Harselter Mühle/BIT	J.-R. VOS
15.04.08	2 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH
20.04.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Aus 2009 liegt insgesamt nur eine einzige Meldung vom Heimzug vor (01.05.09 ein Exemplar Klärteiche Offstein/DÜW, M. WINK), die als Erstbeobachtung nicht in Frage kommt.

Letztbeobachtung Heimzug (25.04.-17.05.):

18.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
----------	-------	---------------------	------------

Erstbeobachtungen Wegzug (18.06.-08.08.):

06.08.08	1 ad.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
16.08.08	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
09.08.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
14.08.09	1 Ex.	Haidenweiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen Wegzug (03.10.-25.11.):

24.09.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
12.10.09	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	W. VOGEDES

Maximalzahlen (2-54):

29.04.08	7 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
12.09.09	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BIRK, A. HANTGE u.a.

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

rDZ

Insgesamt nur 40 Meldungen verteilen sich auf die Jahre 2008 (33) und 2009 (7) sowie die Landkreise BIT (6), DAU (2), DÜW (5), GER (2), MYK (4), MZ (12), NW (1), RP (2), TR (1) und WW (5).

Erstbeobachtungen Heimzug (06.03.-24.03.):

13.03.08	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	R. SCHEID
13.03.08	1 Ex.	Scharbillig/BIT	K.-H. HEYNE
19.03.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.03.09	1 Ex.	Lochbusch-Königswiesen/NW	M. POST
15.03.09	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPPOK

Letztbeobachtungen Heimzug (21.05.-24.06.):

20.05.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
25.05.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Erstbeobachtung Wegzug (26.06.-11.08.):

04.07.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
----------	-------	----------------------------------	------------

Letztbeobachtungen Wegzug (09.09.-14.10.):

25.08.08	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
25.08.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER

Maximalzahlen (5-32):

05.04.08	7 Ex.	Sangweiher/DAU	W. VOGEDES
24.04.08	9 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

rDZ

Insgesamt liegen fast 110 Meldungen vor (2008: 55 u. 2009: 54), die sich auf die Landkreise AW (1), BIT (3), COC (3), DAU (11), DÜW (14), KH (2), LU (1), MZ (20), NR (6), RP (4), TR (4), WIL (4), WO (6) und WW (30) verteilen.

Erstbeobachtungen Heimzug (31.03.-18.04.):

15.04.08	4 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH
17.04.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
19.04.08	je 1 Ex.	Weinsheim u. Harspelt/BIT	K.-H. HEYNE
19.04.09	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
22.04.09	4 Ex.	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Heimzug (20.05.-11.06.):

18.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
25.05.08	1 Ex.	Kiesgruben Esch/WIL	M. BECKER
27.05.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
13.05.09	1 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
01.06.09	1 Ex.	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen Wegzug (16.06.-10.07.):

11.07.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
09.08.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
05.07.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
26.07.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Letztbeobachtungen Wegzug (29.09.-07.11.):

12.09.08	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. u. U. BRAUN
03.10.08	je 2 Ex.	Wiesensee u. Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
26.09.09	1 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER
06.10.09	2 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. KNÖDLER
08.10.09	2 Ex.	Wiesensee/WW	A. KUNZ
11.10.09	2 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (12-45):

20.04.08	15 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
21./22.08.09	12 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, H. BOTT

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

rDZ

Insgesamt wurden über 280 Meldungen mitgeteilt (2008: 177, 2009: 107), die fast alle Landkreise von Rheinland-Pfalz betreffen: AW (2), BIT (9), COC (10), DAU (17), DÜW (20), EMS (1), GER (4), KH (11), MYK (11), MZ (33), NR (17), NW (4), PS (1), RP (51), TR (6), WIL (38), WO (6) und WW (43).

Winterbeobachtungen:

09.01.-03.03.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN, C. HEBER, E. SEFRIN
13.01.-24.02.08	2 Ex.	Teichanlage Hof Roth/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX
05.11.-29.12.08	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, L. SIMON, R. STEINHAUSEN
16.11.-21.12.08	1 Ex.	Teichanlage Hof Roth/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX
16.11.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
17.11.-31.12.08	1 Ex.	Nahe Gensingen-Bretzenheim-Ippenheim/MZ, KH	B. VOLLMAR
30.11.-26.12.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
30.11.08	1 Ex.	Steinsee Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
03.01.09	1 Ex.	Gonsbachtal Mainz-Gonsenheim/MZ	E. FRAGSTEIN
10.01.09	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
14.01.09	1 Ex.	Selzmündung Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.11.-09.12.09	1 Ex.	Hausweiher/WW	A. KUNZ
07.11.-31.12.09	4 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. HEBER, E. SEFRIN, M. WINK
06.12.09	5 Ex.	Harspelter Mühle/BIT	J.-R. VOS
06.12.09	1 Ex.	Rüdesheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ
13.12.09	2 Ex.	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Heimzug (21.02.-24.03.):

15.03.08	5 Ex.	Sangweiher/DAU	S. MANNSCHOTT
15.03.08	1 Ex.	Mauschbacher Bruch/PS	C. BRAUNBERGER
16.03.08	1 Ex.	Teichanlage Hof Roth/NR	J. KUCHINKE, K. LAUX
18.03.08	3 Ex.	Altrhein Maximiliansau/GER	H.-J. SCHYGULLA
21.03.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
24.03.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	K.-H. HEYNE
01.03.09	1 Ex.	Aumühle Hanhofen/RP	M. POST
02.03.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
10.03.09	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.03.09	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.03.09	1 Ex.	Rodder Maar/AW	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen Heimzug (07.05.-15.05.):

12.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
24.05.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
26.04.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
01.05.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Wegzug (23.05.-03.06.):

13.06.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
16.06.08	1 Ex.	Rodder Maar/AW	S. MANNSCHOTT
16.06.08	1 Ex.	Gewerbegebiet Langenlohnheim/KH	M. SCHELLER
26.05.09	1 Ex.	Nahe Langenlohnheim/MZ	B. VOLLMAR
14.06.09	1 Ex.	Rückhaltebecken/Altrich/WIL	D. BECKER
16.06.09	1 Ex.	Herschbach/WW	K. LAUX

Letztbeobachtungen Wegzug (24.09.-29.11.):

16.10.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.10.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
22.10.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
29.10.-01.11.09	2 Ex.	Postweiher/WW	A. KUNZ, K. LAUX, M. SCHÄFER

Maximalzahlen (9-30):

15.04.08	8 Ex.	Harspelter Mühle/BIT	J.-R. VOS
16.04.08	26 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.07.08	15 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.03.09	10 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.03.09	8 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
30.08.09	8 Ex.	Eichholzmaar Steffeln/DAU	C. HACKENBERG

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)**rDZ**

Insgesamt liegen knapp 100 Meldungen vor (2008: 70, 2009: 29), die sich auf die Landkreise COC (18), DAU (22), DÜW (20), GER (2), MYK (1), MZ (13), RP (1), SÜW (1), WIL (7), WO (5) und WW (9) verteilen.

Erstbeobachtungen Heimzug (11.04.-27.04.):

16.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.04.08	2 Ex.	Maximiliansau/GER	H.-J. SCHYGULLA
25.04.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.04.08	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
28.04.08	2 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER, K.-H. HEYNE

Zwei weitere Meldungen aus der ersten April-Dekade 2008 wurden bisher leider nicht dokumentiert und können folglich nicht als Nachweise gelten! Aus 2009 liegen insgesamt nur zwei (!) Meldungen vom Heimzug vor, die als Erstbeobachtung nicht in Frage kommen.

Letztbeobachtungen Heimzug (14.05.-04.06.):

14.05.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.05.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
16.05.09	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Erstbeobachtungen Wegzug (11.06.-24.06.):

17.06.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.07.08	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
10.07.08	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	D. BECKER
28.06.09	7 Ex.	Höhe zw. Kretz u. Ändernach/MYK	E. LIPPOK
06.07.09	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
26.07.09	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Letztbeobachtungen Wegzug (01.09.-11.10.):

27.08.08	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. u. U. BRAUN
16.09.08	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
31.08.09	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
18.09.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
28.09.09	1 Ex.	Rhein Bingen/MZ	M. BICKEL

Maximalzahlen (24-110):

03.05.08	16 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
06./07.05.08	17 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER

13.05.08	23 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
27./28.07.08	6 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN, E. LIPPOK
02.08.09	7 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
17.08.09	6 Ex.	Sangweiher/DAU	H. BODES
22.08.09	10 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

rDZ

Für beide Jahre liegen zusammen nur knapp 70 Meldungen vor (2008: 50, 2009: 20), die aus den Landkreisen BIT (3), COC (15), DAU (7), DÜW (12), MYK (3), MZ (13), NR (1), RP (2), TR (1), WO (11) und WW (3) stammen.

Erstbeobachtungen Heimzug (23.02.-25.03.):

18.03.08	6 Ex.	,Im Mayen', Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.03.08	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
29.03.09	1 Ex.	Harspelter Mühle/BIT	J.-R. VOS
07.04.09	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	R. STEINHAUSEN

Letztbeobachtungen Heimzug (13.05.-05.06.):

12.05.08	1 Ex.	Rhein Kaltengens/MYK	M. JÖNCK
13.05.08	2 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
13.05.08	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
15.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug (19.06.-08.07.):

24.07.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
----------	-------	---------------------------	-------------

Letztbeobachtungen Wegzug (29.09.-24.10.):

20.09.08	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
24.09.08	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
28.09.08	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
22.09.09	4 dj.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER
11.10.09	1 Ex.	dz. östl. Gering/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahl (4-98):

29.04.08	14 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.08	10 Ex.	Schwabenheim, Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.09	6 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Knutt (*Calidris canutus*)

uDZ

Lediglich vom 08.-10.05.2009 hielten sich drei Exemplare bei Hagenbach/GER auf, von denen ein Vogel bis zum 13.05. blieb (H.-J. SCHYGULLA).

Sanderling (*Calidris alba*)

uDZ

Im Berichtszeitraum gelangen nur 2008 Feststellungen in drei Gebieten, wobei die Anzahl beteiligter Individuen nicht eindeutig zu ermitteln ist.

03.-04.05.08	1 PK	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
14.-21.09.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
16.-18.09.08	1 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
16. u. 28.09.08	je 1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)**rDZ**

Die insgesamt 33 Beobachtungsmeldungen sind mit 26 Feststellungen aus 2008 und nur sieben aus 2009 sehr ungleichmäßig verteilt. Die Meldungen kommen aus den Landkreisen COC (1), DAU (1), DÜW (5), NW (4), RP (6) und WW (16).

Heimzug:

04.-13.05.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
09.-13.05.08	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
20.05.08	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	A. STÖHR

Erstbeobachtung Wegzug (06.07.-26.08.):

25.07.08	1 ad.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER
----------	-------	-------------------------	----------

Letztbeobachtungen Wegzug (02.10.-21.10.):

07.10.08	2 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
14.10.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
18.09.09	1 Ex.	Wiesensee/WW	E. LIPPOK

Maximalzahl (3-20):

02.-03.10.08	4 dj.	Wiesensee/WW	R. BUSCH, E. LIPPOK
--------------	-------	--------------	---------------------

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)**rDZ**

Mit insgesamt 15 Beobachtungen war das Jahr 2008 überdurchschnittlich gut für diese gerne übersehene Art, während 2009 mit lediglich drei Feststellungen sehr schwach ausfiel. Der Heimzug erstreckte sich 2008 vom 04.05. bis zum 22.05. (je 1 Ex. Klärteiche Offstein/DÜW, V. SCHMIDT u. M. WINK). Maximal wurden vier Exemplare am 06.05.08 bei Rheindürkheim/WO gezählt (J. BAYER). Der Wegzug begann bereits recht früh am 10.07.08 (ein Ex. Ulmener Jungferweiher/COC, D. BECKER) und zog sich bis zum 07.09.08 (ein Ex. Nickelsee Kirrweiler/SÜW, M. POST). Die wenigen Beobachtungen aus 2009 sind nachfolgend aufgelistet:

10.05.09	1 Ex.	Kiesgruben Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
15.07.09	1 Ex.	Kiesgruben Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
25.08.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)**rDZ**

Insgesamt liegen aus beiden Jahren nur magere drei Beobachtungen vom Wegzug vor:

03.08.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
14.09.08	1 dj.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.09	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)**rDZ**

Insgesamt liegen aus beiden Jahren knapp 120 Beobachtungen vor, wobei 2008 nur gut halb so viele Feststellungen gelangen wie 2009. Die Feststellungen verteilen sich auf die Landkreise BIT (2), COC (11), DAU (7), DÜW (11), MYK (3), MZ (18), NR (5), NW (4), RP (17), WIL (3), WO (10), WW (27).

Erstbeobachtungen Heimzug (07.03.-09.04.):

25.03.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
29.03.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	V. HÄSELBARTH
29.03.08	1 Ex.	Rhein Kaltengens/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK
30.03.08	1 Ex.	überschwemmte Wiesen Scharbillig/BIT	K.-H. HEYNE
14.03.09	1 Ex.	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen Heimzug (28.04.-27.05.):

15.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.05.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Wegzug (17.07.-09.08.):

29.07.08	1 ad.	Kiesgruben Esch/WIL	D. BECKER
07.08.09	1 ad.	Kiesgruben Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Wegzug (29.10.-26.11.):

01.11.08	4 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER, M. WINK
02.11.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
02.11.08	3 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
18.10.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
02.11.09	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN

Maximalzahlen (14-26):

03.10.08	10 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
07.10.08	18 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.09	10 Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
19.09.09	12 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BIRK, E. HANTGE u.a.
10.10.09	38 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
12.10.09	19 Ex.	Wiesensee/WW	R. SCHEID

Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)**A**

Die Anzahl der Nachweise in Rheinland-Pfalz erhöht sich auf nunmehr elf:

11.07.08	1 ad.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER, C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT u.a.
----------	-------	-------------------------	---

Die zuvor letzte Feststellung stammt vom 31.08.2007 am Sangweiher/DAU (BECKER in DIETZEN & FOLZ 2008b).

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)**A**

Die einzige Beobachtung aus dem Berichtszeitraum wurde bisher leider nicht dokumentiert und kann daher auch nicht als Nachweis gelten.



Steppenkiebitz *Vanellus gregaria*, diesjährig mit Kiebitz *Vanellus vanellus*, Ralingen-Kersch/TR, 19.09.2009. Foto: D. BECKER. Erstnachweis für die Region Trier und dritter Nachweis in Rheinland-Pfalz.



Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*, diesjährig, Rhein bei Petersau/RP, 13.10.2009. Foto: E. LEESE.



Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*, 1. Winter,
Berghausener Altrhein/RP, 04.01.2009.
Foto: C. DIETZEN.



Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*, adult,
Klärteiche Offstein/DÜW, 11.07.2008. Foto:
C. DIETZEN. Elfter Nachweis für Rheinland-
Pfalz.



Knutt *Calidris canutus*, ad. PK mit Rotschenkel *Tringa totanus*, Krombachtalsperre/WW,
06.05.09. Foto: R. BUSCH.



Sanderling *Calidris alba*, diesjährig, Krombachtalsperre/WW, 14.09.2009. Foto: R. BUSCH.



Steinkauz *Athene noctua*, Bad Bodendorf/AW, 18.07.2010. Foto: E. LIPPOK.



Zwergohreule *Otus scops*, Männchen, aus potenzieller Bruthöhle rufend, Geinsheim/NW, 04.05.2009. Fotos: C. DIETZEN.




Waldohreule *Asio otus*, adult, Diedesfeld/NW, 04.06.2008. Fotos: C. HEBER.



Uhu *Bubo bubo*, adult, Trier/TR, 01.06.2009. Foto: D. BECKER.



Waldkauz *Strix aluco*, adult im Tageseinstand, Rehe/WW, 22.03.2009. Foto: R. BUSCH.



Buntspecht *Dendrocopos major*, adultes Weibchen an Spechtschmiede, Neustadt-Haardt/NW, 28.05.2009. Foto: C. HEBER.



Mittelspecht *Dendrocopos medius*, Männchen an derselben Spechtschmiede, Neustadt-Haardt/NW, 25.08.2009. Foto: C. HEBER.



Raubwürger *Lanius excubitor*, Wintergast im Kreis Worms, 18.10.2008. Foto: M. SCHÄF.



Rauchschwalbe *Hirundo rustica*, Altvogel füttert flügge Junge, Haßloch/DÜW, 13.06.2009.
Foto: C. HEBER.



Bartmeise *Panurus biarmicus*, adultes Männchen (links) und Weibchen (rechts), Seegraben Rheindürkheim/WO, 24.02.2008. Fotos: C. DIETZEN.



Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*, ein Vertreter der in Rheinland-Pfalz verbreitet brütenden streifenköpfigen Unterart *europaeus*, Neustadt-Haardt/NW, 06.03.2008. Foto: C. HEBER. Siehe auch DIETZEN & SCHMIDT (2011), in diesem Heft.

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)

A

Rheinland-Pfalz erhielt einen kleinen Anteil eines sturmbedingten größeren Einflugs der Art nach Südwestdeutschland im Januar 2009 mit immerhin drei Feststellungen, von denen die dritte einem Wanderfalken zu verdanken ist. Eine zusätzliche Beobachtung im Dezember macht mit insgesamt vier Nachweisen das Jahr 2009 zu einem überdurchschnittlichen Jahr für die Art.

22.01.09	1 ad.	Moselstaustufe Trier/TR	S. TWIETMEYER
24.01.09	1 K3	Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ
28.02.09	1 ad.	Totfund bei Aspisheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.12.09	1 K1	Mundenheimer Altrheinhafen/LU	J. BAYER

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)

rDZ

In beiden Berichtsjahren wiederum nur sehr spärlich vertreten. Insgesamt wurden 2008 und 2009 jeweils nur sieben Individuen gemeldet. Aufgrund der Seltenheit sind alle Daten aufgeführt:

16.04.08	1 ad.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
28.04.08	1 ad.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
15.09.08	2 ad.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
23.11.08	1 ad.	Kiesgrube Riol/TR	D. BECKER, K.-H. HEYNE
23.11.08	1 K1	Laacher See/AW	M. JÖNCK
23.-26.11.08	1 K1	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
05.01.09	1 ad.	Altrip Kiefweiher/RP	J. BAYER
25.03.09	1 ad.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
18.04.09	1 K2	Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ
25.04.09	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
26.-31.12.09	1 ad.	Moselstauungen Trier-Wellen/TR	D. BECKER, S. TWIETMEYER

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

IBV, rDZ

Es liegen nur von zwei Orten Meldungen von Brutvorkommen vor. Auffallend sind weiterhin geringe winterliche Maximalzahlen, die wohl der veränderten Art der Hausmülldeponierung zuzuschreiben sind. Rastvögel und Durchzügler verteilen sich mit deutlicher Konzentration an den großen Gewässern über weite Teile des Bundeslandes.

5 Bp.	Meckersheim Tongruben/RP	6716/26	L. SIMON
>27 Bp.	Meckersheim Tongruben/RP	6716/26	M. SCHMOLZ, E. SEFRIN, L. SIMON
1 Bp.	Neuburg Kiese Wolf/GER	6915/57	H.-J. SCHYGULLA

Maximalzahlen (11.000-24.000):

19.01.08	3.200 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
19.01.08	2.750 Ex.	Bingen Kraus-Aue/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
21.01.09	4.000 Ex.	Rhein bei Mainz/MZ	M. SCHMOLZ
23.01.09	1.700 Ex.	Mosel bei Konz/TR	K.-H. HEYNE
24.01.09	3.200 Ex.	Bingen Kraus-Aue/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
24.12.09	750 Ex.	Mosel Trier-Wellen/TR	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen abseits von Rhein, Mosel und Laacher See:

28.04.08	28 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
02.07.08	42 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
12.07.09	20 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)**rDZ**

Spärliches Auftreten wird aus beiden Berichtsjahren gemeldet: 2008 wurden 14 und 2009 12 Individuen festgestellt. Die Gesamtanzahlen wie auch die Maximalzahlen blieben deutlich hinter den Werten aus 2007 zurück.

Aus 2008 liegen Beobachtungen von drei Ind. im März, fünf Ind. im April, zwei Ind. im Mai, ein Ind. im Juni, ein Ind. im Juli, ein Ind. im August und ein Ind. im November vor.

2009 verweilte ein Ind. (K2) vom 24.01.-21.02. am Laacher See (M. JÖNCK). Des Weiteren liegen Beobachtungen von zwei Ind. im April, je drei Ind. in Mai und Juli, ein Ind. im August und zwei Ind. im Dezember vor.

Beobachtungsgebiete waren Laacher See/AW (M. JÖNCK), Staustufe Trier/TR (D. BECKER, K.-H. HEYNE, S. TWIETMEYER), Sangweiher /DAU (M. BECKER), Rhein bei Kaltenengers/MYK (M. JÖNCK, E. LIPPOK), Urmitzer Werth/NR (M. JÖNCK), Feuchtgebiet Küttig/MYK (W. VOGEDES), Rhein bei Budenheim/MZ (H.-G. FOLZ), Klärteiche Offstein/DÜW (V. SCHMIDT, M. WINK), Ludwigshafen Parkinsel/LU (J. BAYER), Roxheimer Altrhein/RP (J. BAYER, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN).

Maximalzahl (2007: 15):

28.07.09	3 K1	Rhein bei Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	------------------------	------------

Sturmmöwe (*Larus canus*)**uBV, rDZ**

Die Art tritt in Rheinland-Pfalz weiterhin in direktem Zusammenhang mit niedrigen Temperaturen auf. So waren die Maximalzahlen zum Ausgang des milden Winters 2007/2008 deutlich geringer als die in den strengeren Wintern 2008/2009 und 2009/2010 (in letzterem am ausgeprägtesten). Der Laacher See/AW entwickelte sich weiter zum herausragenden Schlafgewässer der Art, während die Bestände am Inselrhein eher gering waren. Beobachtungen abseits der großen Gewässer gelangen bei Wittlich/WIL (M. BECKER), auf dem Mainzer Plateau bei Essenheim/MZ (H.-G. FOLZ) und bei Eisenberg/KIB (M. WINK).

Maximalzahlen (550-2.000):

12.01.08	300 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
07.01.09	100 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
09.01.09	800 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.01.09	110 Ex.	Bingen Schlafplatz/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
30.12.09	1.800 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Sommerbeobachtungen:

13.-21.06.08	1-4 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
→ 09.07.09	je 1 Ex.	Staustufen Palzem und Wellen/TR	D. BECKER, P. LORGÉ

Mantelmöwe (*Larus marinus*)**uDZ**

Mit insgesamt fünf Individuen und insbesondere einem wiederholten Überwinterer zeigte sich die Art in Relation zu früheren Jahren überdurchschnittlich gut vertreten.

06.01.-20.02.08	1 ad.	Laacher See/AW u. Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, R. BUSCH u. a.
16.09.08	1 K1	Rhein bei Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
23.11.08.-21.02.09	1 ad.	Laacher See/AW u. Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, M. BRAUN u. a.
10.-21.01.09	1 ad.	Rhein bei Bingen/MZ	H.-G. FOLZ, M. SCHMOLZ
04.12.09	1 K3	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	B. FISCHER, W. JAKOB

Der Vogel, der im Winter 2008/2009 häufig im Bereich Laacher See/AW und Urmitzer Werth/NR gesehen wurde, dürfte mit einem am 08.01.09 an der Staustufe Müden/COC von W. VOGEDS gesehehen adulten Vogel identisch sein.

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

rDZ

Auch bei dieser Art fallen, ähnlich wie bei Lach- und Sturmmöwe, die niedriger gewordenen Anzahlen am Inselrhein auf. Anders dagegen sieht es am Laacher See aus, der sich mit neuen Maximalzahlen vor allem im Winter 2008/2009 noch mehr als bisher zu einem stark frequentierten Schlafplatz entwickelt, dessen Bedeutung weit über die Region hinausreicht. Neben Rhein und Laacher See rastet die Art noch am ehesten regelmäßig an der Mosel.

Im Jahr 2008 erstrecken sich die Winterdaten bis zum 17.04., nach wenigen Sommerbeobachtungen um Ende Juli/Anfang August setzen die Herbstdaten ab dem 31.08. ein.

Im Jahr 2009 sieht es ähnlich aus: Winterdaten liegen bis zum 14.04. vor, nach wiederum wenigen Sommerbeobachtungen Anfang/Mitte Juni und Anfang August setzen die Herbstdaten ab dem 30.08. ein.

Phänotypisch erschienen sowohl *L. a. argentatus* als auch *L. a. argenteus*.

Maximalzahlen (192-831):

06.12.08	1.185 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
30.12.08	219 Ex.	Steinsee, Engenser Feld/NR	M. JÖNCK
07.-09.01.09	550 Ex.	Urmitzer Wert/NR	M. JÖNCK
16.01.09	191 Ex.	Weißenthurmer Werth/NR	M. u. U. BRAUN
23.01.09	858 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.01.09	48 Ex.	Heidenfahrt Mariannaue/MZ	W. HEUSER

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

rBV, rDZ

Die Art ist weiterhin spärlicher Brutvogel. Brutnachweise wurden 2008 bei Bingen/MZ (zwei Bp. mit Erfolg, H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR), Ludwigshafen (ein Bp. mit Erfolg, J. BAYER), Mechttersheim/RP (ein Bp. ohne Erfolg, E. SEFRIN, L. SIMON), Hördter Rheinaue/RP (ein Bp. mit unklarem Erfolg, L. SIMON) und bei Neuburg/SÜW (ein Bp. mit unklarem Erfolg, L. SIMON) gemeldet.

2009 beschränkten sich die Brutnachweise auf den Rhein bei Bingen/MZ (zwei Bp. mit Erfolg, H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR), die Ludwigshafener Große Blies (ein Bp. mit Erfolg, L. SIMON) und die Hördter Rheinaue (ein Bp. mit unklarem Erfolg, L. SIMON).

Maximalzahlen zeigten sich ähnlich wie bei anderen Großmöwen mit hohen Werten am Laacher See/AW bzw. im Maifeld/MYK und eher gering bleibenden Werten am Inselrhein/MZ.

Außer an Laacher See/AW, im Maifeld/MYK (wo sich die Rasttradition weiter stabilisiert hat) und am Rhein liegen einzelne Beobachtungen von Mosel und Nahe vor.

Maximalzahlen (60-337):

06.12.08	184 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
20.09.09	130 Ex.	zw. Polch und Einig/MYK	M. JÖNCK
03.10.09	34 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Zugbeobachtungen abseits von Gewässern:

04.10.08	2 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.10.08	11 Ex.	Rochusberg Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.08	3 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

25.07.09	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.09	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

rDZ

Mit knapp 200 Meldungen bleibt die Art weit hinter der Mittelmeermöwe (über 400 Meldungen) zurück. Die Maximalzahlen haben sich allerdings gegenüber 2007 gesteigert. Insbesondere 2009 war am Laacher See auch diese Art unter den zahlreichen Großmöwen am Schlafplatz in recht hoher Anzahl zu finden. Im Inselrheinbereich ist dagegen wie bei allen anderen Großmöwenarten ein Rückgang auffallend (aufgrund veränderter Hausmüll-deponierung).

Allmählich lässt sich ein Trend der Art vermuten, zunehmend als (nicht brütender) Jahresvogel an unseren größeren Gewässern zu verweilen: Während 2008 Beobachtungen erstmalig aus allen Monaten des Jahres vorliegen, fehlen allerdings 2009 Daten aus den Monaten April, Mai und Juni.

Maximalzahlen (78-720):

31.12.08	100 Ex.	Steinsee, Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
07.01.09	110 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
23.01.09	266 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.02.09	54 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Heringsmöwe (*Larus fuscus graellsii/intermedius*)

rDZ

Mit jeweils ca. 50 Beobachtungen je Berichtsjahr und jährlich etwa 140 Exemplaren blieben die Feststellungen zahlenmäßig im selben Rahmen der letzten Jahre.

Phänotypisch erschienen sowohl *L. f. graellsii* als auch *L. f. intermedius*.

Maximalzahlen (6-22):

06.04.08	8 Ex.	Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
19.10.08	7 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.12.08	19 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
06.12.09	16 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Zugbeobachtungen abseits von Gewässern:

03.08.08	1 Ex.	Welschbillig/TR	K.-H. HEYNE
19.10.08	7 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

A

Die einzige Beobachtung gelang mit einem Exemplar im Prachtkleid am 24.05.08 am Hinteren Roxheimer Altrhein/RP (J. BAYER, V. SCHMIDT).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

rDZ

Mit nur knapp 100 vorliegenden Durchzugsdaten wird ein recht spärliches Auftreten aus beiden Berichtsjahren gemeldet. Insbesondere 2009 war ein sehr schwaches Jahr für die Art in unserem Bundesland. 75% aller Daten stammen aus dem Landkreis WW; einzelne weitere Beobachtungen gelangen in den Kreisen TR, COC, DAU, NR, LU, DÜW, RP und NW. Am rheinhessischen Inselrhein blieb die Art – vielleicht wasserstandsbedingt – in beiden Jahren völlig aus.

Erstbeobachtungen Heimzug (16.04.-26.04.):

25.04.08	2 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
09.05.09	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Letztbeobachtungen Heimzug (25.06.-29.06.):

02.07.08	2 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.07.09	2 Ex.	Dreifelder Weiher /WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Wegzug (09.07.-01.08.):

26.07.08	3 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	T. RAUTENBERG
10.08.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher /WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen Wegzug (24.09.-17.10.):

10.09.08	1 Ex.	Krombachtalsperre /WW	R. BUSCH
15.09.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher /WW	A. KUNZ

Maximalzahlen (12-38):

08.05.08	30 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
10.05.08	28 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. BRAUNBERGER
12.05.08	23 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
20.08.09	5 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Zwergseeschwalbe (*Sternula albifrons*)

uDZ

Die einzige Beobachtung des Berichtszeitraums stammt vom 17.05.09, als H.-J. SCHYGULLA ein Ind. der Art auf einer künstlichen Insel in einem Kiessee bei Hagenbach/GER sah.

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*)

uDZ

Mit nur einer Beobachtungen vom Heimzug 2008 und Fehlanzeige in 2009 blieb die Art spärlich wie auch in den Vorjahren.

29.05.08	1 Ex.	Kannsee, Engerser Feld/NR	D. SAUERBORN
----------	-------	---------------------------	--------------

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)

uDZ

Leider wurde eine Feststellung im Mai 2008 bisher nicht dokumentiert.

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)

IBV, rDZ

Brutnachweise wurden im Jahr 2008 aus den bekannten pfälzischen Brutgebieten bei Mechtersheim/RP (ein Bp., C. DIETZEN, E. SEFRIN, L. SIMON) und Neuburg/GER (neun Bp., H.-J. SCHYGULLA) gemeldet. Für 2009 gibt E. SEFRIN ausdrücklich an, dass im Bereich Mechtersheim keine Brut stattgefunden hat. H.-J. SCHYGULLA meldet, dass 2009 bei Neuburg sieben begonnene Bruten aufgegeben wurden, evtl. wegen Störungen durch Mittelmeermöwen.

Die Heimzug- und Wegzugdaten der Berichtsjahre lassen sich nicht scharf voneinander trennen, da auch abseits der Brutgebiete einzelne Flusseeeschwalben während des ganzen Sommers beobachtet wurden. 2008 liegen die Meldungen zwischen dem 24.04. und dem 24.09.; 2009 zwischen dem 14.04. und dem 08.08.

Beobachtungsgebiete waren – neben den Brutplätzen – die folgenden: Krombachtalsperre/WW, Dreifelder Weiher/WW, Kiesgruben Kenner Flur/TR, Ralingen-Olk/TR, Ulmener Jungferweiher/COC, Rhein bei Kaltenengers/NR, Rhein bei Ludwigshafen/LU, Roxheimer Altrhein/RP und Berghäuser Altrhein/RP.

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)

uDZ

Mit vier Beobachtungen – eine aus 2008 und drei aus 2009 – blieb das Auftreten im gewohnt spärlichen Rahmen. Alle Daten stammen vom Heimzug.

21.06.08	1 PK	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER, V. SCHMIDT
02.05.09	1 PK	Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
07.06.09	1 PK	Rhein bei Bingen-Kempton/MZ	B. VOLLMAR
15.06.09	1 PK	Rhein bei Bingen/MZ	M. BICKEL

Eine weitere von den Mechtersheimer Tongruben/RP gemeldete Küstenseeschwalbe erwies sich bei der Sichtung des Belegfotos als eindeutige Flusseeeschwalbe.

Hohltaube (*Columba oenas*)

rBV, rDZ

Brutzeitdaten und Brutnachweise liegen aus folgenden Landkreisen vor: AW, WW, TR, WIL, DAU, COC, MYK, EMS, SIM, MZ, WO, DÜW.

Erstbeobachtungen (21.01.-25.02.):

02.01.08	4 Ex.	dz. Engelstadt/MZ (noch Wegzug)	H.-G. FOLZ
26.01.08	1 Ex.	dz. Elsheim/MZ (Heimzug)	H.-G. FOLZ
27.01.08	3 Ex.	Neunkhausen Plateau/WW	R. BUSCH
08.02.09	2 Ex.	zw. Rüber und Küttig/MYK	E. LIPPOK
11.02.09	2 Ex.	dz. Essenheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.02.09	24 Ex.	dz. Fisch/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (11.11.-28.12.):

25.10.08	13 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
18.11.08	1 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
19.11.08	1 Ex.	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
31.10.09	1 Ex.	Deidesheim/DÜW	D. BECKER
14.11.09	4 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
05.12.09	1 Ex.	Laacher See/AW	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (63-250):

26.03.08	210 Ex.	Ober-Flörsheimer Plateau/AZ	H. BIRK
08.10.08	199 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.08	80 Ex.	Banner Wiesen/MYK	E. LIPPOK
04.09.09	117 Ex.	Essenheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.09	75 Ex.	Aspishem Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.09	43 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

rBV, rDZ

Insbesondere im Jahr 2009 war der Wegzug durch überdurchschnittlich hohe Anzahlen während der planmäßigen Vogelzugerfassungen geprägt.

Maximalzahlen (1.500-10.239):

14.10.08	2.293 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
19.10.08	4.561 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
10.12.08	950 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	R. STEINHAUSEN
27.12.08	1.500 Ex.	Lingenfeld/RP	M. WINK
14.10.09	12.706 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
19.10.09	10.006 Ex.	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
21.10.09	9.342 Ex.	dz. Pfalzfeld/SIM	T. GRUNWALD

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

rBV

Maximalzahlen (30-150):

31.12.08	32 Ex.	Ippesheim/KH	B. VOLLMAR
31.01.09	30 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (17.04.-24.04.):

13.04.08	1 Ex.	Nothbachtal/MYK	H. STRUNK
16.04.08	1 Ex.	Mussbacher Baggerweiher/NW	A. STÖHR
25.04.09	2 Ex.	dz. Wolfsheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.04.09	1 Ex.	rufend Rivenich/WIL	K.-H. HEYNE
26.04.09	1 Ex.	Tongrube Oberreis/NR	J. KUCHINKE

Letztbeobachtungen (18.09.-05.10.):

06.09.08	1 Ex.	dz. Kettig/MYK	M. JÖNCK
07.09.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

19.09.09	2 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
26.09.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (19-27):

10.08.08	46 Ex.	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.08.09	16 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Halsbandsittich (*Psittacula krameri*)

rBV

Die vorliegenden Daten ergeben keine wesentlichen Kenntniserweiterungen. Insgesamt wurden in den beiden Berichtsjahren 60 Beobachtungen aus den bekannten Brutgebieten im pfälzischen und rheinhessischen Rheintal gemeldet.

Aus dem bekannten Rahmen fällt jedoch eine Beobachtung aus dem äußersten Norden des Bundeslandes: drei Exemplare an der Landskrone Bad-Neuenahr/AW am 15.05.08 (D. GLITZ).

Maximalzahlen:

01.11.08	46 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
04.12.09	56 Ex.	Römerwall Mainz/MZ	M. SCHMOLZ

Rosellasittich (*Platycercus eximius*)

GF

Eine Beobachtung mit einem Exemplar gelang vom 09.-14.05.08 am Roxheimer Altrhein/RP (J. BAYER, V. SCHMIDT).

Nymphensittich (*Nymphicus hollandicus*)

GF

Eine Beobachtung: 1 Ex. am 25.09.09 am Urmitzer Werth/NR (H. STRUNK).

Wellensittich (*Melopsittacus undulatus*)

GF

Ein Exemplar zeigte sich am 18.03.08 in Ludwigshafen-Maudach/LU (J. BAYER).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtung (30.03.-10.04.):

10.04.08	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
05.04.09	1 Ex.	Wittlich/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtung (07.08.-14.09.):

30.08.08	1 Ex.	Kerben/MYK	E. LIPPOK
18.09.09	1 Ex.	Landscheid-Niederkaill/WIL	K.-H. HEYNE

Schleiereule (*Tyto alba*)

rBV

Die aus den beiden Berichtsjahren vorliegenden Meldungen fügen sich im Wesentlichen in das bisherige Verbreitungsbild ein. Daten wurden aus folgenden Landkreisen gemeldet: WW, TR, BIT, WIL, COC, MYK, KH, MZ, DÜW, NW, LD, SÜW.

Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

rBV

Die Beobachtungsmeldungen aus dem Jahr 2008 beschränken sich auf Mitteilungen über erfolgreiche Bruten aus der Ahr- und Hocheifel (22 Bp. m. 49 juv.), Schneifel (5 Bp. m. 19 juv.), Hunsrück (4 Bp. m. 10 juv.) und Westerwald (6 Bp. m. 14 juv.) (T. LOOSE, J.-R. VOS). 2009 wurde eine erfolgreiche Brut aus dem Westerwald bei Alpenrod/WW gemeldet (T. LOOSE).

Steinkauz (*Athene noctua*)

rBV

Die insgesamt 69 Beobachtungsmeldungen in beiden Berichtsjahren stammen aus den Landkreisen AW, WW, TR, BIT, WIL, EMS, KH, MZ, AZ, DÜW, NW und SÜW; sie ergeben keinen wesentlich neuen Kenntnisstand über die Verbreitung.

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

IBV

Abseits des bekannten Brutgebietes Pfälzerwald mit flächendeckender Erfassung durch die OAG Westpfalz, liegen ausschließlich unbelegte Meldungen aus 2008 vor, darunter einige Brutzeitbeobachtungen aus dem Ahrgebirge/AW.

Zwergohreule (*Otus scops*)

A

Am 18.09.08 wurde in der Pflegestation Wiltingen/TR eine wohl im Bereich Trier-Zewen/TR von einem unbekanntem Finder verletzt aufgegriffene Eule abgeliefert, die kurz darauf verstarb und später als Zwergohreule bestimmt werden konnte (M. BECKER, J. MEYER).

Bei Amphibienkartierungen entdeckte T. SCHULTE ein rufendes, aber unverpaartes, adultes ♂ bei Geinsheim/NW, das vom 01.05.-18.06.09 festgestellt wurde (J. BAYER, C. DIETZEN, T. DOLICH, M. FEUERSENGER, C. HEBER, T. SCHULTE, R. STEINHAUSEN). Eine Brut fand hier, trotz besetzter potenzieller Nisthöhle, wohl nicht statt.

Waldohreule (*Asio otus*)

rBV

Die insgesamt 89 Meldungen der beiden Berichtsjahre aus den Landkreisen WW, TR, WIL, COC, EMS, KH, MZ, AZ, KIB, KL, DÜW, NW, LD, GER, SÜW ergeben keine wesentliche Veränderung des bisher bekannten Verbreitungsbildes. Jedoch motivieren gemeldete Winterbeobachtungen im Raum Trier (J. ENGLER, S. TWIETMEYER, J.-R. VOS) zu Nachsuchen in dieser Region zur Brutzeit, die ergänzende besetzte Raster ergeben könnten.

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)**uDZ**

Fünf Beobachtung in 2008 und sechs Beobachtungen in 2009 zeigen, dass die Art bei regelmäßiger Nachsuche in den Feldfluren wohl alljährlich festgestellt werden kann.

Winter:

03.01.08	1 Ex.	Ober-Flörsheim Plateau/AZ	H. BIRK
----------	-------	---------------------------	---------

Heimzug:

02.05.08	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. BRAUN
----------	-------	-------------	----------

Wegzug:

05.10.08	1 Ex.	rast. Laurenzberg/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.08	1 Ex.	Schwabenheim Schilf/MZ (Herbstalzw)	H.-G. FOLZ
06.12.08	1 Ex.	Trier Petrisberg/TR	J. ENGLER, S. TWIETMEYER
12.09.09	1 Ex.	Dirmstein/DÜW	M. WINK
19.09.09	1 Ex.	Feldflur westl. Limburg/EMS	J. HERZER
08.10.09	1 Ex.	Ingelheim Mainzer Berg/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	1 Ex.	Bingen Rochusberg/MZ	M. BICKEL
25.10.09	1 Ex.	Laubenheimer Ried/MZ	B. FRIEDRICH
13.11.09	1 Ex.	Feldflur Mainz-Hechtsheim/MZ	M. SCHELLER

Zusätzlich meldet A. PORN einen Rupfungsfund bei Trier aus 2008 (ohne Datum); als Prädator wird ein Uhu vermutet.

Uhu (*Bubo bubo*)**rBV**

Die insgesamt 173 Meldungen der beiden Berichtsjahre, davon insbesondere die umfangreichen Nachsuchen von M. KNÖDLER, der allein für den Bereich Pfalz, Rheinhessen und Nahetal über 50 auf Bruten bezogene Beobachtungsmeldungen beisteuerte, zeigen die Stabilisierung des Brutbestandes der letzten Jahre und ein annähernd landesweites Vorkommen der Art. Die Meldungen stammen aus den folgenden Landkreisen: AW, WW, TR, BIT, WIL, DAU, MYK, EMS, KH, MZ, AZ, WO, KIB, DÜW, RP, SÜW.

Für 32 Bruten wurde die Anzahl der festgestellten Jungvögel mitgeteilt. Daraus ergeben sich sieben Bp. mit einem juv., 15 Bp. mit zwei juv., acht Bp. mit drei juv. und zwei Bp. mit vier juv.

Waldkauz (*Strix aluco*)**rBV**

Die insgesamt 79 Meldungen der beiden Berichtsjahre aus den Landkreisen AW, WW, AK, TR, BIT, WIL, COC, DAU, NR, KO, EMS, MZ, KIB, DÜW, LU, NW und, SÜW ergeben keine wesentliche Veränderung des bisherigen Verbreitungsbildes.

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)**rBV, rDZ**

Alle Meldungen der beiden Berichtsjahre stammen aus den bekannten pfälzischen Brutgebieten in folgenden Landkreisen: KL (2008 zehn Reviere und 2009 sieben Reviere in der Mehlinger Heide, P. RAMACHERS); DÜW (allein 17 Reviere vermutet D. HOFFMANN 2009 im Haßlocher Wald); RP (zehn Reviere im Bereich der Speyerer Dünen, C. DIETZEN, T. DOLICH, wohl in beiden Berichtsjahren) und NW (2008 fünf Reviere und 2009 mindestens drei Reviere um Haßloch und Geinsheim, C. DIETZEN, R. STEINHAUSEN). Damit wird die bisher bekannte Verbreitung im Wesentlichen bestätigt.

Mauersegler (*Apus apus*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (11.04.-19.04.):

12.04.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
13.04.08	1 Ex.	Altrich/WIL	M. BECKER
15.04.08	1 Ex.	Bretzenheim an der Nahe/KH	M. SCHELLER
16.04.09	1 Ex.	dz. Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.04.09	2 Ex.	Trier/TR	K.-H. HEYNE
18.04.09	12 Ex.	Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (09.09.-18.10.):

13.09.08	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
14.09.08	1 Ex.	Welschbillig/TR	K.-H. HEYNE
14.10.08	1 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
31.08.09	5 Ex.	Kettig/MYK	M. JÖNCK
01.09.09	3 Ex.	Koblenz-Bubenheim/KO	M. u. U. BRAUN
06.09.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (863-3.500):

28.04.08	ca. 2.000 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
05.05.09	1.300 Ex.	Zugstau Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ
19.07.09	1.320 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Eisvogel (*Alcedo atthis*)**rBV**

Die zwei strengen Winter des Berichtszeitraums schlagen sich nicht auffällig in einem Meldungsrückgang nieder. Aus 2008 wurden 318 Daten, aus 2009 256 Daten gemeldet. Brutnachweise, Bruthinweise bzw. Brutzeitbeobachtungen stammen aus den Landkreisen AW, WW, TR, BIT, WIL, MYK, NR, COC, DAU, EMS, KH, MZ, AZ, KL, PS, LU, DÜW, RP, NW, GER.

Bienenfresser (*Merops apiaster*)**rBV**

Die gemeldeten Beobachtungen liegen 2008 zwischen dem 04.05. (zwei Exemplare bei Kerzenheim/KIB, H. BOTT) und dem 31.08. (30 Ex. bei Vinningen/PS, U. GROH), 2009 zwischen dem 10.05. (30 Ex. bei Eisenberg/KIB, M. WINK; vier Exemplare bei Gerolsheim/DÜW, J. WEIß) und dem 06.09. (20 Ex. bei Maxdorf/DÜW, J. WEIß).

Die Tendenz zur Gründung neuer Kolonien, z. B. in AW, MYK und KL (vgl. RAMACHERS 2010), setzt sich fort; möglicherweise geht damit ein gewisser Rückgang in den bisherigen größeren Kolonien einher, der aber auch durch Störungen bedingt sein kann.

Einzelbruten bzw. Brutkolonien wurden aus den Landkreisen AW, MYK, MZ, KIB, KL, WO, DÜW und RP gemeldet. Über die Brutpaaranzahl in den Berichtsjahren 2008 und 2009 in Rheinland-Pfalz informiert die nachfolgende Tabelle (nach zusammengefassten Angaben von J. WEIß unter www.bienenfresser-rlp.de):

	AW	MYK	MZ	KIB	KL	WO	DÜW	RP	Gesamt
Anzahl Brutpaare 2008	1	1	17	23	0	4	1	15	62
Anzahl Brutpaare 2009	0	3	23	15	2	3	2	10	58

Beobachtungen abseits der Brutkolonien nehmen in der Folge der Weiterverbreitung ebenfalls zu. Nicht nur nach dem Ausfliegen der Jungvögel lassen sich zunehmend individuenreiche Trupps feststellen.

Maximalzahlen abseits bekannter Kolonien:

23.05.08	15 Ex.	Mainz-Finthen/MZ	J. WIEGAND
31.08.09	30 Ex.	Vinningen/PS	U. GROH

Zugbeobachtung (Heimzug):

01.06.09	4 Ex.	dz. Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	--------------------------	------------

Wiedehopf (*Upupa epops*)

rBV

2008 lagen die 19 gemeldeten Daten zwischen dem 15.04. (ein Exemplar Jugenheim/MZ, P. DÖRHÖFER) und dem 19.08. (zwei Exemplare Essenheim/MZ, H.-G. FOLZ), 2009 gelangen 21 Beobachtungsmeldungen zwischen dem 11.04. (ein Exemplar Freinsheim/DÜW, M. WINK) und dem 23.08. (ein Exemplar Ober-Hilbersheim/MZ, H.-G. FOLZ). Beobachtungen liegen aus den Kreisen MYK, MZ, DÜW, NW und RP vor. Einzelne Heim- und Wegzugbeobachtungen stammen von planmäßigen Vogelzugerfassungen auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ (H.-G. FOLZ).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

rBV

Brutzeitbeobachtungen beider Berichtsjahre wurden aus den Landkreisen BIT, DÜW, GER, KH, KIB, MYK, SÜW, RP, TR und WIL gemeldet. Brutnachweise erfolgten nur im Jahr 2008 in den Kreisen NW und WIL (D. BECKER, M. BECKER, H. BODES, C. DIETZEN, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, M. KNÖDLER, V. PLATZ, M. POST, E. ROSELFF SÖRENSEN, H.-J. SCHYGULLA, S. TWIETMEYER, B. VOLLMAR, H. WEITZ).

Erstbeobachtungen (01.04.-18.04):

06.04.08	1 Ex.	Mehring/TR	K.-H. HEYNE
09.04.08	1 Ex.	Boppard Buchenau/SIM	W. VOGEDES
12.04.08	3 Ex.	Geinsheim Nord/NW	C. HEBER
26.04.08	1 Ex.	Maudacher Bruch/LU	J. BAYER
03.04.09	1 Ex.	Trier/TR	U. UHL
05.04.09	1 Ex.	Neustadt/NW	M. POST
11.04.09	1 Ex.	Boppard Buchenau/SIM	W. VOGEDES
13.04.09	1 Ex.	Haßloch/DÜW	C. HEBER
15.04.09	1 Ex.	Hanhofen/RP	T. DOLICH

Letztbeobachtungen (06.08.-24.09.):

28.08.08	1 Ex.	Herschbach/WW	K. LAUX
09.09.08	2 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
12.09.08	1 Ex.	Rotenberg/KH	B. VOLLMAR
02.09.09	1 Ex.	Holzheim/EMS	R. FISCHER
15.09.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER
20.09.09	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER

Grauspecht (*Picus canus*)

rBV

Aus beiden Berichtsjahren liegen insgesamt nur 78 Beobachtungen von etwa 100 Individuen aus den Landkreisen BIT, COC, DAU, DÜW, EMS, GER, KH, KIB, KO, LU, MYK, MZ, NW, PS, RP, TR, WIL und WW vor.

Ob der Rückgang der Meldungen sich in dem seit einigen Jahren rückläufigen Bestand, oder in der insgesamt niedrigen Beobachter- und Meldeaktivität des Jahres 2009 begründet, lässt sich nicht eindeutig belegen.

Alle Beobachter werden freundlich aufgerufen, alle Beobachtungen dieser Art zu notieren, damit ein eventueller Bestandsrückgang des Grauspechtes rechtzeitig erkannt und evtl. gegensteuert werden kann!

Grünspecht (*Picus viridis*)

rBV

In beiden Berichtsjahren gingen 306 Beobachtungsmeldungen von zahlreichen Beobachtern ein, die eine landesweite Verbreitung andeuten. Grünspechte wurden in den Landkreisen AK, AW, AZ, BIR, COC, DÜW, EMS, GER, KH, KIB, KO, MYK, MZ, NR, NW, RP, SIM, SÜW, TR, WIL WO und WW beobachtet.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

rBV

Die 228 Meldungen der beiden Berichtsjahre deuten auch beim Schwarzspecht eine landesweite Verbreitung in Gebieten mit typischen Habitaten an. Die Beobachtungen stammen aus den Kreisen AK, AW, AZ, BIR, BIT, COC, DAU, DÜW, EMS, GER, KH, KIB, KO, MYK, MZ, NR, NW, RP, SÜW, TR, WIL und WW.

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

rBV

Bei systematischen Erfassungen des Vogelzuges konnten in Rheinhessen/MZ während des Wegzuges vom 10.07.–30.11.08 an 20 Tagen 31 durchziehende Exemplare beobachtet werden. Im Folgejahr wurden vom 15.08.–07.11.09 an 13 Tagen insgesamt 19 ziehende Buntspechte erfasst (H.-G. FOLZ).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

rBV

Es liegen 169 Meldungen zahlreicher Beobachter aus den Landkreisen AW, BIT, COC, DAU, DÜW, EMS, GER, KIB, KO, MYK, MZ, NR, NW, RP, SÜW, TR, WIL und WW vor, die das bekannte Verbreitungsbild bestätigen.

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

rBV

Es gingen 172 Beobachtungen aus den Landkreisen AW, AZ, BIT, COC, DÜW, EMS, GER, KIB, KO, LU, MYK, MZ, NR, NW, PS, RP, SÜW, TR, WIL und WW ein.

Während der systematischen Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ konnte am 02.12.08 und am 16.08.09 jeweils ein durchziehender Kleinspecht beobachtet werden (H.-G. FOLZ).

Pirol (*Oriolus oriolus*)**rBV, rDZ**

Brutzeitbeobachtungen und Brutnachweise aus beiden Berichtsjahren wurden aus folgende Landkreisen gemeldet: BIT, DAU, DÜW, GER, EMS, KIB, KH, KO, LU, MYK, MZ, NW, RP SÜW, TR, WIL. Wie bereits in den Vorjahren konzentriert sich die Mehrzahl der Bruthinweise auf die Pfalz und Rheinhessen.

Erstbeobachtungen (22.04.-01.05.):

23.04.08	1 Ex.	Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.08	1 Ex.	Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
27.04.08	1 Ex.	Reitclub Neustadt/NW	C. HEBER
28.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
01.05.09	1 Ex.	Rothenseegraben Hanhofen/RP	T. DOLICH
01.05.09	1 Ex.	Siebenborn/WIL	M. BECKER
01.05.09	1 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
02.05.09	1 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Zwei relativ späte Beobachtungen im September beider Berichtsjahre deuten an, dass die Art im Herbst länger bei uns verweilt, als dies bisher beobachtet wurde:

Letztbeobachtungen (23.08.-02.09.):

21.08.08	1 Ex.	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
17.09.08	1 Ex.	Maudacher Bruch/LU	J. BAYER
09.08.09	2 Ex.	dz. Sammetzkopf Kollig/MYK	M. JÖNCK
08.09.09	1 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Bei systematischen Erfassungen des Vogelzuges konnten in Rheinhessen/MZ während des Heimzuges zwei ziehende Exemplare (16.05.09) und während des Wegzuges vom 08.-30.08.09 an drei Tagen drei durchziehende Pirole beobachtet werden (H.-G. FOLZ).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)**A**

Nach der beobachteten Mischbrut eines Rotkopfwürgers und eines Neuntöters im Jahr 2007 (FOLZ et al. 2007), konnte in beiden Berichtsjahren jeweils ein Exemplar nachgewiesen werden:

13.05.08	1 ♀	Pferdsfeld/KH	T. GRUNWALD
16.06.09	1 ♂	Oberarnbach/KL	P. SCHMIDT

Neuntöter (*Lanius collurio*)**rBV, rDZ**

Die gemeldeten Brutzeitvorkommen weisen auf eine landesweite Verbreitung hin, mit Schwerpunkten in den westlichen und südlichen Landesteilen.

Erstbeobachtungen (23.04.-07.05.):

24.04.08	1 Ex.	Rivenich/WIL	K.-H. HEYNE, M. HEYNE
24.04.08	1 Ex.	Dorsheim/KH	B. VOLLMAR
27.04.08	1 Ex.	Wawener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
01.05.08	1 Ex.	Mecktersheim/RP	E. SEFRIN
26.04.09	1 Ex.	Metternich/KO	E. LIPPOK
01.05.09	1 Ex.	Mecktersheim/RP	E. SEFRIN
01.05.09	1 Ex.	Wawener Bruch/TR	H. LEMKE
02.05.09	1 Ex.	dz. Aspishheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (11.08.-01.11.):

31.08.08	2 Ex.	Bonerath/TR	F. ROBECK
11.09.08	1 Ex.	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
27.09.08	2 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
27.09.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
09.09.09	1 Ex.	Layenhof/MZ	M. SCHMOLZ
10.09.09	1 Ex.	Konz-Oberemmel/TR	J. PAUWELS
12.09.09	1 Ex.	Laumersheim/DÜW	M. WINK
13.09.09	1 Ex.	Mecktersheim/RP	E. SEFRIN

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

rBV

Im Jahr 2008 wurden aus den bekannten Brutgebieten im Raum Trier und der Eifel insgesamt acht Brutpaare gemeldet. Diese stammen aus dem Kreis TR (2), AW (5) und DAU (1) (D. BECKER, M. BECKER, F.-J. FUCHS). Im Folgejahr wurden keine Brutnachweise gemeldet. Brutzeitbeobachtungen von Einzelvögeln liegen für 2009 aus den Landkreisen DAU, TR und WW vor (D. BECKER, M. BECKER, H. BODES, K.-H. HEYNE, K. LAUX).

Winterreviere und rastende Vögel wurden in den Berichtsjahren in den Kreisen AW, BIT, DAU, KO, MYK, NW, TR, WIL und WW festgestellt (D. BECKER, M. BECKER, M. U. U. BRAUN, R. BUSCH, C. U. W. DIETZEN, C. HACKENBERG, C. HEBER, K.-H. HEYNE, J. KUCHINKE, A. KUNZ, G. KURZ, M. POST, M. U. F. ROBECK, E. SCHALLER, R. SCHEID, F.-J. STÖLB, T. WEBER, J.-R. VOS)

Während des Wegzuges konnte bei systematischen Zugvogelerfassungen bei Engelstadt/MZ am 01.11.08 ein ziehendes Exemplar beobachtet werden. Im Jahr 2009 zog dort jeweils ein Individuum am 11.10. und am 07.11. durch (H.-G. FOLZ).

Elster (*Pica pica*)

rBV

Maximalzahlen (20-50):

05.01.08	58 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
18.07.08	20 Ex.	Freinsheim/DÜW	M. WINK
24.11.08	45 Ex.	Schlafplatz, Mussbach Ost/NW	C. HEBER
01.02.09	15 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
14.03.09	45 Ex.	Rüber/MYK	E. LIPPOK

Während des Wegzuges wurden in Rheinhessen/MZ an drei Tagen im Oktober und November fünf ziehende Exemplare beobachtet. Im Jahr 2009 gelangen dort im selben Zeitraum Beobachtungen von drei ziehenden Individuen (H.-G. FOLZ).

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

rBV

Während des Wegzuges konnten im Herbst 2008 insgesamt 236 ziehende Exemplare beobachtet werden (J. BAYER, D. BECKER, M. U. U. BRAUN, H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR), davon entfallen 138 Exemplare auf die systematischen Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ (30.08.–26.11.08, 17 Beobachtungstage, H.-G. FOLZ).

Im Jahr 2009 wurden keine nennenswerten Zugbewegungen notiert.

Maximalzahlen (12-106):

14.09.08	63 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
29.09.08	42 Ex.	dz. Tawern-Fellerich/TR	D. BECKER
17.10.08	61 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.09	20 Ex.	dz. Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

IBV

Es liegen 26 Feststellungen aus dem bekannten Vorkommensgebiet in den Landkreisen WW und BIT vor (R. BUSCH, C. HACKENBERG, J. KUCHINKE, A. KUNZ, E. LIPPOK). Eine rheinhessische Beobachtung stellt die erste Feststellung während der seit 1986 unternommenen planmäßigen Zugvogelerfassungen dar und dürfte im Zusammenhang mit einem auch andernorts bemerkten Einflug der ssp. *macrorhynchos* stehen. Beobachtungen abseits des Westerwaldes erfolgten nur in den Herbst- und Wintermonaten:

26.01.08	1 Ex.	Hunsrück/TR	K.-H. HEYNE
13.11.08	1 Ex.	ssp. <i>macrorhynchos</i> , dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.12.08	1 Ex.	Neustadt-Oberhambach/NW	V. PLATZ
14.10.09	1 Ex.	Kell, Reinsfeld/TR	F. u. M. ROBECK
30.10.09	2 Ex.	Reinsfeld/TR	F. ROBECK

Dohle (*Coloeus monedula*)

rBV, rDZ

Bruten wurden im Jahr 2008 aus den Kreisen AZ (55 Bp.), EMS (10 Bp.), MZ (27 Bp.), RP (10 Bp.) und im Jahr 2009 aus AW (8 Bp.), AK (20 Bp.), AZ (4 Bp.), COC (6 Bp.), MZ (3 Bp.), RP (10 Bp.) und ZW (1 Bp.) mitgeteilt. Nur die Brutpaare aus dem Kreis COC besetzten Baumhöhlen, alle übrigen waren Gebäudebrüter. Die abnehmende Brutpaarzahl dürfte in der insgesamt niedrigen Beobachter- und Meldeaktivität des Jahres 2009 begründet sein.

Maximalzahlen (280-1.800):

13.01.08	300 Ex.	dz. Ixheim/ZW	C. BRAUNBERGER
24.08.08	240 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
26.12.08	850 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.01.09	720 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.12.09	200 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	M. WINK

Vom 30.08.–18.11.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 16 Beobachtungstagen insgesamt 651 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Jahr 2009 wurden vom 26.09.–02.12.09 an 21 Tagen 278 Individuen gezählt (H.-G. FOLZ).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

rBV, rDZ

Die Anzahl der in den Berichtsjahren gemeldeten Kolonien und Nester liegt deutlich niedriger als in den Vorjahren und spiegelt sicher nicht den wahren Brutbestand der Art in Rheinland-Pfalz wider. Zur Dokumentation der Bestandsentwicklung sollten auch weiterhin alle Brutvorkommen gemeldet werden!

Maximalzahlen Zug und Überwinterung (800-4.200):

23.01.08	3.200 Ex.	Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.12.08	7.500 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.12.08	900 Ex.	Schlafplatz Zweibrücken/ZW	P. SPIELER
03.01.09	4.500 Ex.	Gau-Algesheim/MZ	H.-G. FOLZ
16.11.09	7.200 Ex.	Mainz Stephansberg/MZ	H.-G. FOLZ
28.12.09	2.500 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	M. WINK

Rabenkrähe (*Corvus corone*)**rBV**Maximalzahlen (120-1.200):

10.01.08	350 Ex.	Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
20.01.08	800 Ex.	Auw/BIT	K.-H. HEYNE
02.08.08	180 Ex.	Worms-Mörstadt/WO	M. WINK
21.09.08	264 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
16.09.09	141 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
25.12.09	300 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN

Am 19.10.09 konnten über dem Laurenziberg Plateau/MZ vier durchziehende Exemplare beobachtet werden (H.-G. FOLZ).

Nebelkrähe (*Corvus cornix*)**A**

Im Jahr 2009 gelangen Beobachtungen von mindestens drei phänotypischen Nebelkrähen:

25.07.-24.08.09	1 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.09	1 Ex.	Haßloch/DÜW	C. HEBER
19.09.09	1 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Bei einer weiteren Nebelkrähe in Ober-Hilbersheim am 04.11.09 handelte es sich möglicherweise um dasselbe Exemplar, welches schon im August dort beobachtet worden war (H.-G. FOLZ).

Beobachtungen von Individuen mit Hybridmerkmalen von Raben- und Nebelkrähe:

10.02.-13.04.08	1 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	T. DOLICH
05.04.08	1 Ex.	Ludwigshafen-Oggersheim/LU	J. BAYER
16.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.08.08	1 Ex.	Gau-Bickelheim, Wiesbachtal/MZ	H.-G. FOLZ
01.09.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
08.08.09	1 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
26.08.-31.12.09 1 ad., 1 juv.		Rheindürkheim/WO	J. BAYER
13.09.-18.10.09	1 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	T. DOLICH
16.09.09	1 Ex.	Wackernheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Bei den Individuen in Rheindürkheim/WO 2009 handelte es sich um einen Altvogel und seinen Nachwuchs, dessen zweiter Elternteil eine Rabenkrähe war.

Kolkrahe (*Corvus corax*)**rBV**

Im Jahr 2008 wurden Brutnachweise aus den Landkreisen AW, EMS, KO, MYK und TR gemeldet (M. u. U. BRAUN, S. BRÜCHER, F. J. FUCHS, B. JAKOBS). Im Folgejahr konnte nur eine Brut bei Bettenfeld/WIL nachgewiesen werden (M. u. K.-H. HEYNE), weitere Bruthinweise gab es im gleichen Landkreis und in den Kreisen BIT, COC, DAU, EMS und WW (D. BECKER, M. u. U. BRAUN, H. P. FELTEN, M. SCHMOLZ, J.-R. VOS).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

rBV, rDZ

Im Jahr 2008 wurden von der Kiesgrube Kenner Flur/TR, vom Roxheimer Altrhein/RP, aus den Thürer Wiesen/MYK und aus dem NSG Meerheck/NR Brutzeitbeobachtungen gemeldet, ein Brutnachweis erfolgte nicht (J. BAYER, G. HAHN, E. HUBER, M. JÖNCK, F. KLÖPFER, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, M. WINK).

Im Folgejahr wurde am 13.06.09 am Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ ein Brutpaar mit Nest gefunden (diverse Beobachter, GEO-Tag der Artenvielfalt).

Obwohl Mitteleuropa den Westrand des Verbreitungsgebietes darstellt und die Art in ganz Deutschland in den letzten Jahren offenbar rückläufig ist, sollte sie von den Beobachtern nicht vernachlässigt werden. Weitläufige Teiche, Seen und Altarme von Flüssen mit Rohrkolbenbeständen und hochgewachsenen Weiden am Ufer sind geeignete Plätze, an welchen weitere Brutvorkommen der Beutelmeise in Rheinland-Pfalz gefunden werden könnten.

Zugzeitbeobachtungen im Jahr 2008 betreffen zehn Gebiete aus neun Landkreisen mit erfreulichen 30 Meldungen und datieren überwiegend aus dem Zeitraum 28.03.-25.05.08. Nur sieben Beobachtungen entfallen auf den Wegzug.

Im Jahr 2009 gelangen insgesamt 14 Beobachtungen, diese umfassen, im Gegensatz zu 2008, hauptsächlich die Monate September und Oktober.

Erstbeobachtung (12.03.-02.04.):

28.03.08	1 Ex.	NSG Meerheck/NR	H. STRUNK
01.04.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
03.04.08	2 Ex.	Kiesgrube Rivenich/WIL	M. BECKER
03.04.08	3 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK
10.04.09	1 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
13.04.09	1 Ex.	Maringer-Wies/WIL	M. BECKER
26.04.09	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtung (03.10.-24.10.):

08.10.08	2 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
19.10.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
01.11.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
28.09.09	7 Ex.	Ulmener Jungfernweiher/COO	E. LIPPOK
03.10.09	7 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	A. HANTGE, H. BIRK, H. PLÄN, u.a.
11.10.09	8 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahlen (4-38):

08.04.08	6 Ex.	NSG Meerheck/NR	H. STRUNK
21.09.09	15 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

rBV

Im Jahr 2008 wurde intensives Zugeschehen während des Wegzuges dokumentiert. In den Landkreisen MZ, NW, RP und WO konnten ziehende Einzelvögel und Trupps beobachtet werden (J. BAYER, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, C. HEBER). Von insgesamt 895 durchziehenden Blaumeisen entfallen 758 Exemplare auf die systematischen Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ (17.09.-16.11.08, 16 Beobachtungstage, H.-G. FOLZ).

Im Jahr 2009 dagegen blieb der Herbstzug unterdurchschnittlich, während des Wegzuges wurden in Rheinhessen/MZ vom 06.09.-02.12.09 an 17 Beobachtungstagen nur 79 durchziehende Exemplare beobachtet (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen (16-362):

19.10.08	243 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.08	30 Ex.	dz. Worms-Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
21.10.08	98 Ex.	dz. Neustadt/NW	C. HEBER
03.10.09	19 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE

Kohlmeise (*Parus major*)**rBV**Maximalzahlen (9-200):

04.10.08	106 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.09	24 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE

Vom 07.09.–07.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 15 Beobachtungen insgesamt 368 durchziehende Exemplare beobachtet werden. Im Folgejahr war der Herbstzug nur schwach ausgeprägt, es wurden vom 20.09.–15.11.09 an acht Beobachtungstagen 34 ziehende Kohlmeisen erfasst (H.-G. FOLZ).

Haubenmeise (*Parus cristatus*)**rBV**

Insgesamt nur 14 Meldungen aus beiden Berichtsjahren spiegeln kaum die tatsächliche Verbreitung wieder.

Maximalzahl:

22.05.08	10 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE
----------	--------	---------------------	----------

Tannenmeise (*Parus ater*)**rBV**Maximalzahlen:

14.09.08	21 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
07.10.08	13 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 05.10.–05.11.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an sechs Beobachtungstagen insgesamt 26 durchziehende Exemplare beobachtet werden. Im Folgejahr erfolgte dort eine Heimzugbeobachtung am 01.04.09 (8 Ex.) und eine Wegzugbeobachtung am 19.10.09 (1 Ex.) (H.-G. FOLZ).

Sumpfmehse (*Parus palustris*)**rBV**

Die 53 eingegangenen Beobachtungen der beiden Berichtsjahre stammen aus den Landkreisen COC, EMS, LU, MZ, NR, NW, RP, SÜW und WIL und spiegeln sicher kaum die Verbreitung der Art in Rheinland-Pfalz wieder.

Weidenmeise (*Parus montanus*)**rBV**

Im Berichtszeitraum gingen 46 Beobachtungen der Art ein, die sich auf die Landkreise AW, AZ, COC, EMS, KO, MYK, MZ, NR, NW, RP, TR und WW verteilen.

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

rBV

Diese Art wird in Rheinland-Pfalz von Jahr zu Jahr spärlicher beobachtet. Im Jahr 2008 wurden nur 12 Beobachtungen aus den Landkreisen DÜW, GER, KH, NW, RP und WO gemeldet (C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, C. HEBER, F. KLÖPFER, V. PLATZ, M. SCHELLER, H.-J. SCHYGULLA). Brutverdacht mit jeweils 1-2 Revieren bestand in der Pfalz bei Haßloch/DÜW und Grünstadt/DÜW (C. HEBER, V. PLATZ), konkrete Brutnachweise gab es nicht.

Die Meldungen des Jahres 2009 stammen nur noch aus den Landkreisen DÜW, MZ, NW und WO. Brutnachweise gelangen von einem Paar mit einem Jungvogel in Haßloch/DÜW (C. HEBER) und von zwei Paaren mit insgesamt drei Jungvögeln bei Rheindürkheim/WO (J. BAYER). Vom langjährigen Brutplatz in Grünstadt/DÜW wurde leider nur eine einzelne Brutzeitbeobachtung gemeldet (D. BECKER, J. ENGLER).

Winterbeobachtungen über die Jahreswende 2008/09 erfolgten bei Haßloch/DÜW und Neustadt/NW und betrafen mindestens neun Individuen (C. HEBER, M. POST).

Der subjektive Eindruck einer leichten Zunahme 2010, sollte alle Beobachter anspornen, verstärkt auf diese Art zu achten und alle Beobachtungen zu protokollieren, um Veränderungen zu dokumentieren.

Heidelerche (*Lullula arborea*)

rBV, rDZ

Brutzeitrelevante Beobachtungen wurden für das Jahr 2008 aus den Landkreisen AW, DÜW, MYK und NW gemeldet, mindestens 17 Reviere konnten erfasst werden (M. u. U. BRAUN, F. J. FUCHS, M. JÖNCK, V. PLATZ). Aus dem Folgejahr wurden 12 Brutzeitvorkommen mitgeteilt, in den Kreisen KL, MZ und SÜW (H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, U. JANZ, M. MÜNCH, P. RAMACHERS).

Erstbeobachtungen (03.02.-20.02.):

06.02.08	7 Ex.	Neustadt Ost/NW	C. HEBER
23.02.08	22 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
25.02.08	1 Ex.	Kalenborn/AW	R. SCHEID
28.02.09	1 Ex.	dz. Landscheid-Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE
28.02.09	4 Ex.	dz. Schankweiler/BIT	J.-R. VOS
28.02.09	4 Ex.	Trier und Zerf/TR	J. ENGLER, M. SCHORR, S. TWIETMEYER

Letztbeobachtungen (22.10.-20.11.):

01.11.08	1 Ex.	Tongrube Mülheim/MYK	M. JÖNCK
13.11.08	10 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.11.08	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
07.12.08	1 Ex.	dz. Ordenswald Nord/NW	C. HEBER
26.10.09	1 Ex.	dz. Haardt/NW	C. HEBER
08.11.09	9 Ex.	Eichholzmaar und Hölzchen/DAU	C. HACKENBERG, J.-R. VOS
13.11.09	1 Ex.	dz. Klärteiche Offstein/DÜW	J. BAYER
14.11.09	9 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Winterbeobachtungen:

07.01.09	3 Ex.	Nettetal/MYK	M. JÖNCK
23.12.09	1 Ex.	Deidesheim/NW	A. STÖHR

Maximalzahlen (48-195):

08.10.08	83 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
09.10.08	60 Ex.	dz. Mülheimer Berg/MYK	M. JÖNCK
14.10.08	70 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN

03.10.09	70 Ex.	Horchheimer Höhe/KO	V. HARTMANN
11.10.09	175 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
13.10.09	91 Ex.	dz. Hunsrück/TR	T. GRUNWALD

Vom 08.10.–05.11.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 14 Beobachtungen insgesamt 321 durchziehende Exemplare beobachtet werden. Im Jahr 2009 wurden vom 20.09.–14.11.09 an 15 Tagen 576 Heidelerchen gezählt (H.-G. FOLZ).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

02.01.08	54 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
11.01.08	1 Ex.	,Im Mayen', Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.01.09	12 Ex.	Ordenswald Nord/NW	C. HEBER
11.01.09	16 Ex.	Engelstadt/Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
11.01.09	1 Ex.	Haßloch/DÜW	M. POST

Maximalzahlen (1.402-5.138):

08.10.08	4.720 Ex.	dz. Engelstadt/Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
12.10.08	1.200 Ex.	Kaan/MYK	M. JÖNCK
18.10.08	1.929 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
13.10.09	1.782 Ex.	dz. Hunsrück/TR	T. GRUNWALD
19.10.09	5.032 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.10.09	2.992 Ex.	Pfalzfeld/SIM	T. GRUNWALD

Vom 07.09.–27.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 23 Beobachtungstagen insgesamt 17.809 durchziehende Exemplare festgestellt werden. Im Jahr 2009 wurden vom 15.08.–05.12.09 an 35 Tagen 10.851 Individuen gezählt (H.-G. FOLZ).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

rBV, rDZ

In beiden Jahren wurden Bestandsangaben von acht (2008) bzw. neun Kolonien (2009) aus den Kreisen GER, KH, KIB, MZ, RP, TR und WIL gemeldet, mit 347 (2008) und 182 (2009) besetzten Röhren.

Erstbeobachtungen (17.03.-09.04.):

16.03.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER, K.-H. HEYNE
21.03.08	1 Ex.	Steinsee Engerser Feld/NR	E. LIPPOK, M. JÖNCK
04.04.08	2 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
29.03.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK
09.04.09	1 Ex.	Kiesgruben Kanzem/TR	D. BECKER

Letztbeobachtungen (23.09.-12.10.):

15.09.08	16 Ex.	Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
17.09.08	3 Ex.	dz. Maudach/LU	J. BAYER
18.09.08	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
17.09.09	15 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
20.09.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (170-700):

14.06.08	200 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK
25.07.09	160 Ex.	Worms-Abenheim/WO	M. WINK

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**rBV, rDZ**

Die erste Beobachtung einer Rauchschwalbe ist für die meisten Beobachter ein besonderes Ereignis im Frühjahr, dem in jedem März aufs Neue entgegengefiebert wird. Im Jahr 2008 gelangten die ersten Beobachtungen zeitgleich in drei verschiedenen Landkreisen, im Folgejahr belegte der Kreis Trier Platz eins im „Wettstreit“ um die erste Rauchschwalbe des Jahres.

Erstbeobachtungen (09.03.-20.03.):

17.03.08	1 Ex.	Herschbach/WW	K. LAUX
17.03.08	14 Ex.	Engerser Feld/NR	H. STRUNK
17.03.08	3 Ex.	Wittlich/WIL	M. BECKER
17.03.09	1 Ex.	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
19.03.09	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.03.09	1 Ex.	Dienheim/MZ	L. SIMON
22.03.09	21 Ex.	Engerser Feld/NR	J. KUCHINKE
22.03.09	12 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Letztbeobachtungen (06.10.-30.10.):

11.10.08	1 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	M. JÖNCK
14.10.08	2 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
17.10.08	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
19.10.08	2 Ex.	dz. Rotenberg/KH	B. VOLLMAR
14.10.09	5 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
19.10.09	1 Ex.	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.10.09	1 Ex.	Pfalzfeld/SIM	T. GRUNWALD

Maximalzahlen (523-5.000):

17.04.09	265 Ex.	Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
19.04.08	800 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK
05.05.09	1.400 Ex.	Nahemündung Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.09	1.000 Ex.	Nassau/EMS	M. BRAUN

Vom 10.07.–09.10.08 konnten in Rheinhessen bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 26 Beobachtungstagen 719 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden dort vom 27.07.–19.10.09 an 32 Beobachtungstagen insgesamt 1.763 ziehende Rauchschwalben erfasst (H.-G. FOLZ).

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)**rBV, rDZ****Erstbeobachtungen (10.03.-10.04.):**

17.03.08	2 Ex.	Kannsee/NR	H. STRUNK
28.03.08	1 Ex.	Kenner Flur/TR	H. LEMKE
28.03.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
30.03.08	3 Ex.	Polder Ingelheim und Wolfsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
31.03.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. ERLEMANN
28.03.09	1 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
28.03.09	2 Ex.	Sterenbach-Stausee/WIL	H. BODES
01.04.09	2 Ex.	Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.04.09	1 Ex.	Freinsheim/DÜW	R. STEINHAUSEN

Letztbeobachtungen (30.09.-18.10.):

04.10.08	1 Ex.	dz. Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
05.10.08	1 Ex.	Brinkenweiher/WW	J. KUCHINKE
12.10.08	1 Ex.	Freilingen/WW	K. LAUX
07.10.09	3 Ex.	Molsberg/WW	P. SCHIEFENHÖVEL
08.10.09	4 Ex.	dz. Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
11.10.09	1 Ex.	dz. Gering/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahlen (1.000-5.000):

03.09.08	1.500 Ex.	dz. Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
05.05.09	800 Ex.	dz. Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 27.07.–16.09.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs bei 13 Beobachtungen nur 890 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr war der Herbstzug etwas stärker ausgeprägt, vom 12.08.–03.10.09. wurden dort an 19 Tagen insgesamt 1.474 ziehende Mehlschwalben erfasst (H.-G. FOLZ).

Bartmeise (*Panurus biarmicus*)u**DZ**

Es gelangen nur drei Beobachtungen in den Landkreisen WIL und WO, die insgesamt mindestens neun Exemplare betreffen.

Bei Worms-Rheindürkheim/WO konnten am 24.02.08 drei Individuen (C. DIETZEN, V.SCHMIDT) und am 14.3.08 fünf Individuen (H. BIRK, F. ZIERZ) festgestellt werden. Vermutlich handelte es sich um insgesamt fünf Individuen, die in diesem Gebiet überwintert haben.

Über die Jahreswende 2008/09 überwinterten vier Bartmeisen vom 09.11.08-22.02.09 in einem Regenrückhaltebecken bei Altrich/WIL. Einer der Vögel verblieb bis zum 15.03.09 (K.-H. HEYNE, D. BECKER, M. BECKER.).

Während des Wegzuges wurden am 14.11.09 in einer Kiesgrube in Großlittgen-Heeg/WIL drei Exemplare beobachtet (M. u. K.-H. HEYNE).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)r**BV**

Es gingen 124 Beobachtungen aus 18 Landkreisen ein, die auf eine landesweite Verbreitung mit Schwerpunkt in der Oberrheinebene hindeuten. Das Fehlen der Art im Saar-Nahe-Bergland ist vermutlich auf zu geringe Beobachteraktivitäten in diesem Bereich zurückzuführen.

Maximalzahlen (18-50):

16.01.08	35 Ex.	Edenkoben Haardtrand/SÜW	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
27.01.08	20 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	C. DIETZEN
04.10.08	30 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
29.11.09	20 Ex.	Laubenheimer Höhe/MZ	D. RINNE
29.11.09	15 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Zugbeobachtungen bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen:

05.11.08	10 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
24.12.08	8 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
15.02.09	11 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
20.09.09	10 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
02.12.09	5 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (13.04.-23.04.):

Im Jahr 2008 gelangen die ersten Beobachtungen zeitgleich am 20.04.08 in den Landkreisen GER, LU, RP und WIL (J. BAYER, M. BECKER, K.-H. u. M. HEYNE, W. KUNZ, H.-J. SCHYGULLA).

22.04.08	1 Ex.	singend Mehring/TR	K.-H. HEYNE
23.04.08	1 Ex.	Herscbach/WW	J. KUCHINKE
13.04.09	1 Ex.	Büdesheim/BIT	K.-H. HEYNE
19.04.09	2 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
20.04.09	1 Ex.	Hartenfels/WW	J. KUCHINKE

Letztbeobachtungen (13.08.-06.09.):

22.08.08	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
28.08.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
30.08.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.09.09	1 Ex.	dz. Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (16.03.-01.04.):

30.03.08	4 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER, H. LEMKE
30.03.08	1 Ex.	Kleeburger Hof/MYK	R. SCHEID
30.03.08	1 Ex.	Piesport-Ferres/WIL	D. BECKER
01.04.08	1 Ex.	Mainz/MZ	D. RINNE
03.04.08	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
30.03.09	1 Ex.	Wittlich-Bombogen/WIL	M. BECKER
02.04.09	1 Ex.	Herscbach/WW	J. KUCHINKE
04.04.09	2 Ex.	Lachen/NW	M. POST
04.04.09	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	V. HÄSELBARTH
04.04.09	5 Ex.	Speyerer Dünen/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen (24.09.-18.10.):

03.09.08	2 Ex.	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.08	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
27.09.09	2 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
07.10.09	1 Ex.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Ein Mischsänger mit Gesangselementen von Fitis und Zilpzalp hielt vom 30.04.-11.06.08 ein Revier am Kistnerweiher/RP besetzt, eine Brut konnte nicht nachgewiesen werden (J. BAYER).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)**rBV, rDZ**

Die Daten des Wegzuges und der Winterbeobachtungen lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen, es erfolgten 12 Beobachtungen in den Monaten Dezember und Januar.

Winterbeobachtungen:

01.01.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	C. DIETZEN
01.01.08	1 Ex.	Kiesgruben Kenner Flur/RP	D. BECKER
13.01.08	1 Ex.	Neuwied/NR	G. HAHN
07.12.08	2 Ex.	Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
15.12.08	1 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
30.12.08	1 Ex.	Mayschoß/AW	L. SCHMID
03.01.09	1 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.01.09	1 Ex.	Trier-Ehrang/TR	M. u. U. BRAUN
12.12.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
13.12.09	5 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
23.12.09	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
27.12.09	1 Ex.	Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen (20.02.-13.03.):

27.02.08	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
02.03.08	1 Ex.	Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE
02.03.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
03.03.08	1 Ex.	Trier/TR	F.-J. STÖLB
05.03.08	3 Ex.	Bretzenheim/KH	B. VOLLMAR
13.02.09	1 Ex.	Engerser Feld/NR	M. u. U. BRAUN
14.03.09	1 Ex.	Konz-Hamm/TR	D. BECKER
14.03.09	2 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
15.03.09	1 Ex.	Ordenswald/NW	M. POST
15.03.09	9 Ex.	Urmitz und Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK, M. JÖNCK

Feldschwirl (*Locustella naevia*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (06.04.-21.4.):

14.04.08	1 Ex.	Konz-Konzerbrück/TR	K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB
19.04.08	1 Ex.	Nackenheim/MZ	M. KNÖDLER
20.04.08	6 Ex.	Rüber/MYK	E. LIPPOK
20.04.08	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
10.04.09	2 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
10.04.09	1 Ex.	Kleeburgerhof/MYK	E. LIPPOK

Eine weitere Beobachtung vom 10.04.09 wurde bisher leider nicht dokumentiert.

Letztbeobachtungen (15.07.-19.08.):

13.07.08	1 Ex.	Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
20.07.08	1 Ex.	Mesenberg/WIL	B. VOLLMAR
25.07.08	2 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	D. BECKER, T. RAUTENBERG
09.08.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
09.08.09	1 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.09	1 Ex.	(beringt) Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)**IBV, uDZ**

Beobachtungen gelangen nur im Jahr 2008, aus dem Folgejahr gingen keine Meldungen ein:

30.04.08	1 Ex.	singend Hahnheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.05.08	1 Ex.	singend Schwabenheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
14.05.08	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	F. KLÖPFER
06.07.08	1 dj.	Dreifelder Weiher/WW (beringt)	A. KUNZ

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)**IBV, rDZ**

Im Jahr 2008 wurden 14 Individuen beobachtet, in den Landkreisen AZ, COC, DÜW, MZ, WIL, WO und WW (A. STÖHR, J. BAYER, M. BECKER, H. BOTT, C. DIETZEN, F. KLÖPFER, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT). Diese verteilen sich auf zehn Beobachtungen während des Heim- und nur drei während des Wegzuges. Damit gibt es seit dem Jahr 2005 keinerlei Hinweise mehr auf Bruten in Rheinland-Pfalz und das letzte bekannte Brutvorkommen am Eich-Gimbsheimer Altrhein scheint erloschen zu sein.

Im Jahr 2009 gelangen nur drei Beobachtungen:

03.04.09	1 Ex.	Ehranger Flur/TR	S. TWIETMEYER
14.08.09	1 dj.	(beringt) Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
15.08.09	1 dj.	Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (29.04.-05.05.):

03.05.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
04.05.08	1 Ex.	Golfclub Geinsheim/NW	C. HEBER
11.05.08	1 Ex.	Rückhaltebecken Altrich/WIL	M. BECKER
11.05.08	2 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
09.05.09	1 Ex.	Sandgrube bei Mendig/MYK	M. JÖNCK
13.05.09	1 Ex.	Im Bruch, Hahnheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.09	2 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
17.05.09	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	H. BODES

In beiden Jahren waren Daten des Heimzuges und Beginn der Brutsaison nicht eindeutig voneinander abzugrenzen. Echte Wegzugbeobachtungen konnten nicht verzeichnet werden. Die letzten Hinweise auf Brutgeschehen, und damit zugleich die Letztbeobachtungen, stammen aus der zweiten und dritten Augustdekade beider Berichtsjahre:

17.08.08	1 Ex.	futtertragend, Mussbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
19.08.09	1 Ex.	Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER
26.08.09	3 juv.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)**rBV, rDZ**

Im Jahr 2008 wurden die ersten Beobachtungen leider erst während des Brutgeschäftes notiert. Auch die recht späten Erstankunftsdaten des Folgejahres lassen vermuten, dass die Ankunft der Art im Berichtszeitraum nur wenig Aufmerksamkeit durch die Beobachter erfahren hat.

Erstbeobachtungen (02.04.-26.04.):

24.04.08	je 1 Ex.	Schwabenheimer Schilf u. Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
25.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	J. BAYER
27.04.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
25.04.09	5 Ex.	Kläerteiche Offstein/DÜW	M. SCHMOLZ, M. WINK
02.05.09	2 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Eine ungewöhnlich frühe Beobachtung Anfang April 2008 wurde bisher nicht bei der AKRP dokumentiert.

Letztbeobachtungen (23.09.-27.11.):

04.10.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
19.10.08	3 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
07.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
08.10.09	2 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
11.10.09	1 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

IBV, uDZ

Aus dem Berichtszeitraum liegen nur drei Einzelbeobachtungen vor. Bruthinweise konnten nicht erbracht werden.

14.05.08	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	F. KLÖPFER
01.05.09	1 Ex.	singend Landschaftsweiher Hanhofen/RP	T. DOLICH
17.05.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Eine sehr frühe Beobachtung im März 2008 wurde leider nicht dokumentiert.

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

rBV, rDZ

In den beiden Berichtsjahren wurden nur aus den Kreisen COC, GER, MYK, MZ und RP Brutzeitbeobachtungen gemeldet, die vermutlich nicht die Brutzeitverbreitung dieser Art in Rheinland-Pfalz widerspiegeln.

Erstbeobachtungen (22.04.-13.05.):

07.05.08	2 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
11.05.08	1 Ex.	Kiessee bei Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA
13.05.08	2 Ex.	Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.05.08	2 Ex.	Ludwigshafen/LU	T. DOLICH
15.05.08	2 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
08.05.09	1 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA
09.05.09	1 Ex.	Wörth/GER	L. SIMON
11.05.09	1 Ex.	Nehren/COC	M. SCHMOLZ

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

IBV, uDZ

Aus beiden Berichtsjahren liegen insgesamt 122 Meldungen von zahlreichen Beobachtern vor, die damit die Anzahl der Gelbspöttermeldungen (52) weit übertreffen! Brutzeitbeobachtungen, Reviere singender Männchen und Brutnachweise gelangen (2008/2009) in den Kreisen BIR (2/0) DÜW (0/2), KL (0/1), MYK (12/6), MZ (12/5), NW (2/1), SÜW (1/0) TR (mind. 17/30), WIL (24/3), ZW (1/0).

Erstbeobachtungen (20.04.-08.06.):

27.04.08	1 Ex.	Kiesgrube Kanzern/TR	K.-H. HEYNE
27.04.08	2 Ex.	bei Igel/TR	H. LEMKE, S. TWIETMEYER
05.05.08	1 Ex.	Morkaute/MZ	M. BICKEL

26.04.09	5 Ex.	bei Igel/TR	S. TWIETMEYER
02.05.09	2 Ex.	Kiesgrube Kanzem/TR	K.-H. HEYNE
07.05.09	1 Ex.	Sandgrube bei Kruft/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen (22.07.-06.08.)

Der Herbstzug lässt sich nicht eindeutig von den Brutzeitdaten abgrenzen, da die Letztbeobachtungen beider Berichtsjahre noch Hinweise auf Brutverhalten beinhalten:

29.07.08	3 Ex.	westl. Miesenheim/MYK	E. LIPPOK
30.07.08	1 Ex.	warnend, bei Igel/TR	S. TWIETMEYER
04.08.09	2 ad., 1 juv.	fütternd, Schrollbach/KL	P. RAMACHERS
09.08.09	2 Ex.	warnend, RHB Altrich/WIL	M. BECKER

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

rBV, rDZ

Die sehr frühe Erstbeobachtung eines Exemplares im Jahr 2008 in NW könnte auch einen überwinternden Vogel betreffen.

Winterbeobachtungen:

11.12.08	1 ♀	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
24.01.09	1 ♀	Neuhofen/RP	T. DOLICH

Erstbeobachtungen (23.02.-28.03.):

06.02.08	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
08.03.08	1 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE
08.03.08	1 Ex.	Wittlich/WIL	M. BECKER, K.-H. HEYNE
17.03.08	1 Ex.	Korlingen/TR	D. BECKER
18.03.08	1 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN
07.03.09	1 Ex.	Hambacher Höhe/NW	M. POST
29.03.09	1 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN
30.03.09	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER

Letztbeobachtungen (03.11.-29.11.):

04.10.08	2 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN
04.10.08	2 Ex.	Konz-Könen/TR	D. BECKER, Mf. BECKER
10.10.08	2 Ex.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.09	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

rBV, rDZ

Die Beobachtungen fügen sich in die bekannte Phänologie dieser Art ein, die frühe Letztbeobachtung im Jahr 2008 ist möglicherweise auf eine geringe Beobachteraktivität zurückzuführen.

Erstbeobachtungen (16.04.-26.04.):

15.04.08	1 Ex.	sing. Bingen/MZ	B. VOLLMAR
20.04.08	1 Ex.	Zweibrücken/ZW	P. SPIELER
24.04.08	1 Ex.	Pottum/WW	M. u. U. BRAUN
25.04.08	1 Ex.	Trier/TR	H. LEMKE

25.04.09	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
26.04.09	3 Ex.	sing. Dreis/WIL	M. BECKER
26.04.09	1 Ex.	Arzbach/EMS	M. u. U. BRAUN
02.05.09	1 Ex.	Neustadt/NW	M. POST

Letztbeobachtungen (05.09.-03.10.):

31.08.08	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.09.08	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
09.09.09	2 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (02.04.-21.04.):

13.04.08	1 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
16.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.04.08	1 Ex.	Edenkoben/SÜW	U. JANZ
17.04.08	1 Ex.	Bad Dürkheim/DÜW	V. KLEIN
18.04.08	1 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK
05.04.09	1 Ex.	Wasserliesch/TR	D. BECKER
07.04.09	1 Ex.	Koblenz-Wallersheim/KO	E. LIPPOK
10.04.09	1 Ex.	Virneburg/MYK	E. LIPPOK
10.04.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
11.04.09	1 Ex.	Selters/WW	J. KUCHINKE

Letztbeobachtungen (03.09.-22.9.):

06.09.08	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
09.09.08	1 Ex.	Maudacher Bruch/LU	J. BAYER
14.09.08	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
30.08.09	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
12.09.09	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
13.09.09	1 Ex.	Rölerhöchst/TR	D. BECKER

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (12.04.-21.04.):

12.04.08	1 Ex.	Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
13.04.08	1 Ex.	Kanzem/TR	D. BECKER
13.04.08	1 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
10.04.09	1 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
10.04.09	2 Ex.	Partenheim, Wolfsheim/AZ	H.-G. FOLZ
11.04.09	1 Ex.	Prill-Wiesen/NW	M. POST
11.04.09	1 Ex.	Freinsheim/DÜW	M. WINK
12.04.09	1 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen (14.09.- 01.10.):

23.09.08	1 Ex.	Ordenswald/NW	C. HEBER
28.09.08	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
08.09.09	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	H. BODES
09.09.09	1 Ex.	Mannebach/TR	J. PAUWELS
20.09.09	2 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER

Samtkopfgrasmücke (*Sylvia melanocephala*)

A

Am 26.4.08 wurde in Bad Dürkheim/DÜW ein Exemplar aufgrund seiner Rufaktivität entdeckt (C. DIETZEN). Die Beobachtung ist von der DSK anerkannt und stellt, nach einer Beobachtung am 02.11.2001 bei Meudt-Ehringhausen/WW (G. FAHL), den zweiten Nachweis für Rheinland-Pfalz dar.

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen:

06.02.08	40 Ex.	Neustadt Ost, Hasslocher Wald, Ordenswald/NW	C. HEBER
03.11.08	20 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER

Im Jahr 2009 wurden keine größeren Anzahlen gemeldet.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*)

rBV, rDZ

Brutzeitbeobachtungen wurden in beiden Jahren nur aus den Kreisen DÜW, MZ und RP gemeldet (T. DOLICH, D. RINNE, M. WINK).

Winterbeobachtungen:

06.01.08	1 Ex.	Koblenz/KO	W. VOGEDES
16.01.08	5 Ex.	Haardtrand Edenkoben/SÜW	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
29.01.08	1 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER
05.12.08	1 Ex.	Trier/TR	S. TWIETMEYER
28.11.08	1 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER
30.12.08	1 Ex.	Ahr/AW	E. LIPPOK
31.12.08	1 Ex.	Koblenz/KO	W. VOGEDES

Im Jahr 2009 wurden keine Winterbeobachtungen mitgeteilt.

Erstbeobachtungen (02.03.-14.03.):

24.02.08	5 Ex.	Tierwasen/KIB	M. KNÖDLER
08.03.08	1 Ex.	Trier/TR	K.-H. HEYNE
11.03.08	4 Ex.	Oppenheim/MZ	D. RINNE
14.02.09	1 Ex.	Koblenz/KO	E. LIPPOK
27.03.09	1 Ex.	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (23.10.-26.11.):

23.11.08	1 Ex.	Urmitz/MYK	M. JÖNCK
25.11.08	1 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER
30.11.09	1 Ex.	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahl (13):

04.04.08	6 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE
----------	-------	---------------------	----------

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

uDZ

Alle Seidenschwanzbeobachtungen der beiden Berichtsjahre datieren aus dem Zeitraum 29.12.08–08.04.09. Es liegen 52 Beobachtungen von zahlreichen Beobachtern vor, welche insgesamt mindestens 1.366 Individuen umfassen und damit einen deutlich stärkeren Einflug belegen, als in den Vorjahren. Die Beobachtungen verteilen sich auf die Landkreise BIT (5 Ex.), DAU (24 Ex.), DÜW (814 Ex.), EMS (214 Ex.), LD (3 Ex.), MYK (48 Ex.), NR (6 Ex.), NW (66 Ex.), RP (6 Ex.), TR (7 Ex.), WIL (25 Ex.) und WW (148 Ex.).

Maximalzahlen:

03.01.09	83 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
18.01.09	550 Ex.	Grünstadt/DÜW	R. STEINHAUSEN
21.02.09	84 Ex.	Montabaur/WW	K. KRÄMER
06.04.09	130 Ex.	Herthasee Holzappel/EMS	R. BUCHARD

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

A

Vom 22.10. bis mindestens 26.10.09 hielt sich ein Mauerläufer bei Neustadt-Haardt/NW auf, der dort mehrere Steinbrüche besuchte (J. BAYER, D. EGGERT, C. HEBER u.a.). Ein weiteres (?) Exemplar wurde am 20.12.09 bei Albersweiler/SÜW beobachtet (O. NIEHUIS, U. BERIT). Beide Beobachtungen wurden von der AKRP anerkannt (s. a. NIEHUIS 2010).

Kleiber (*Sitta europaea*)

rBV

Beobachtungen des aktiven Zuges dieser Art werden selten notiert, obwohl der Kleiber als Strichvogel durchaus evasionsartige Wanderungen, auch in Zusammenhang mit Invasionen von Meisen, durchführt (GLUTZ & BAUER 1993). Vermutlich werden die ziehenden Einzelvögel von den Beobachtern nicht als durchziehend wahrgenommen, oder die Kleiber werden in den Meisentrupps, in denen sie mitfliegen, nicht entdeckt.

Im Jahr 2008 gelangen drei und im Jahr 2009 eine Zugbeobachtung während des Herbstzuges:

31.08.08	1 Ex.	dz. Kollig/MYK	C. DIETZEN
01.11.08	1 Ex.	dz. Tongrube Mülheim/MYK	M. JÖNCK
08.11.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.08.09	1 Ex.	dz. Sammetzkopf/MYK	M. JÖNCK

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)

rBV

Aus dem Berichtszeitraum gingen 20 Meldungen aus den Landkreisen COC, DÜW, EMS, MYK, MZ, NR, RP, WW und ZW ein, die sicher nicht die Verbreitung der Art in Rheinland-Pfalz widerspiegeln.

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*)

rBV

Erstgesang:

07.02.08	1 Ex.	Altenkirchen/AK	A. KUNZ
28.02.09	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Star (*Sturnus vulgaris*)

rBV, rDZ

Schlafplatzansammlungen (1.500-1.500.000):

08.10.08	2.500 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
01.11.08	25.000 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	D. RECH, K.-H. HEYNE
30.12.08	75.000 Ex.	Schwabenheimer Schilf/MZ	H.-G. FOLZ
05.01.09	125.000 Ex.	Schwabenheimer Schilf/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.09	12.000 Ex.	Schwabenheimer Schilf/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	3.000 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
14.11.09	10.000 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE

Sonstige Maximalzahlen (24.978-1.500.000):

06.01.08	6.000 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.10.08	8.000 Ex.	Rotenberg/KH	B. VOLLMAR
02.12.08	5.200 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
17.12.08	20.000 Ex.	dz. Mußbach Ost/NW	C. HEBER
10.08.09	4.500 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
25.10.09	100.000 Ex.	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.10.09	12.000 Ex.	Mainzer Rheinufer/MZ	M. SCHMOLZ

Vom 10.07.-28.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 35 Tagen insgesamt 67.566 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr konnten dort vom 19.07.-02.12.09 an 44 Beobachtungstagen 35.714 ziehende Stare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

rBV

Insgesamt 69 Meldungen aus beiden Jahren verteilen sich über alle Monate und stammen aus den Landkreisen AW, BIT, COC, DÜW, EMS, KH, MYK, MZ, SIM, SÜW, TR, WIL und WW. Singende Vögel und Brutnachweise wurden aus den Kreisen BIT, COC, EMS, MYK, TR und WW gemeldet.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (38-98):

14.09.08	62 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
08.10.08	101 Ex.	dz. Engelstadt/Kalmerick	H.-G. FOLZ
19.02.09	30 Ex.	Ordenswald Nord/NW	C. HEBER
14.10.09	71 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN



Waldohreule *Asio otus*, adult, Diedesfeld/NW, 04.06.2008. Foto: C. HEBER.



Eichelhäher *Garrulus glandarius*, Neustadt-Hardt/NW, 28.04.2008. Foto: C. HEBER.



Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*, adult (Weibchen?), Boden/WW, 14.02.2009.
Foto: R. BUSCH.



Mauerläufer *Tichodroma muraria*, Schlichtkleid, Steinbruch Neustadt-Haardt/NW, 25.10.2009.
Fotos: C. HEBER.



Ringdrossel *Turdus torquatus*, adultes Männchen der nordeuropäischen Nominatform, Landkreis Bad Dürkheim, 12.04.2008. Foto: M. SCHÄF.




Brachpieper *Anthus campestris*, diesjährig, Maifeld/MYK, 22.08.2010. Foto: E. LIPPOK.



Singschwan *Cygnus cygnus*, adult, darunter ein mit Halsring markierter Vogel aus Polen, Rhein bei Bingen-Gaulsheim/MZ, 01.03.2009. Foto: H.-G. FOLZ.



Silberreiher *Casmerodius albus*, adult mit Merkmalen der östlichen Unterart *modesta*, Roxheimer Altrhein/RP, 12.12.2009. Foto: J. BAYER.



Graureiher *Ardea cinerea*, ad. PK, Landau/LD, 04.05.2008. Foto: C. HEBER.



Kuckuck *Cuculus canorus*, Kreis Bad Dürkheim, 30.05.2007. Foto: M. SCHÄF.



Bergente *Aythya marila*, ad. Weibchen mit Reiherente *Aythya fuligula*, ad, Männchen, Silbersee Roxheim/RP, 04.03.2010. Foto: J. BAYER.



Stieglitz *Carduelis carduelis*, adult, Neustadt-Haardt/NW, 03.04.2009. Foto: C. HEBER.



Erlenzeisig *Carduelis spinus*, ad. Männchen, Neustadt-Haardt/NW, 24.01.2008. Foto: C. HEBER.



Zausammer *Emberiza cirrus*, ad. Männchen, Kreis Bad Dürkheim, 31.03.2010. Foto: M. SCHÄF.



Zausammer *Emberiza cirrus*, ad. Weibchen, Neustadt-Haardt/NW, 10.03.2008. Foto: C. HEBER.

Vom 08.10.-21.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 25 Tagen insgesamt 165 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden dort vom 31.07.-02.12.09 an 31 Beobachtungstagen 153 ziehende Misteldrosseln erfasst (H.-G. FOLZ).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

rDZ

Es gingen insgesamt 67 Beobachtungsmeldungen ein, davon entfallen 55 auf das Jahr 2008. Während des Heimzuges 2008 wurden insgesamt 111 Exemplare beobachtet, der größte Teil der Ringdrosseln wurde während intensiver Zählungen im Westerwald von R. BUSCH erfasst. Weitere Beobachtungen gelangen in den Landkreisen AZ, DAU, DÜW, EMS, MZ, NR, TR und WIL.

Der Heimzug 2009 ist mit insgesamt nur 21 beobachteten Exemplaren der am schwächsten ausgeprägte Frühjahreszug seit der ersten Zusammenstellung von Beobachtungen in Rheinland-Pfalz 2001. Dies ist jedoch ausschließlich auf eine geringere Beobachtungsintensität als in den Vorjahren zurückzuführen, da R. BUSCH in diesem Jahr keine Zugzeitählungen im Westerwald durchführen konnte. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, wie stark die Aktivität eines einzelnen Beobachters die auswertbare Datenmenge einer Vogelart und damit die Interpretation dieser Daten beeinflussen kann!

Wünschenswert wäre es daher, wenn viele weitere Beobachter sich an der Erfassung der Art beteiligen und ihre Beobachtungen mitteilen würden. In den Höhenlagen sind zum Beispiel Wiesen und Weiden geeignete Rasthabitate, die während der Zugzeiten gezielt von den Beobachtern besucht werden könnten.

Erstbeobachtungen Heimzug (17.03.-01.04.):

30.03.08	1 Ex.	dz. Gusterath/TR	F. ROBECK
01.04.08	1 Ex.	Westernohe/WW	R. BUSCH
02.04.08	1 Ex.	Lörzweiler Königsstuhl/MZ	H.-G. FOLZ
30.03.09	1 Ex.	Neidhof/WIL	H. BODES
04.04.09	1 Ex.	Wackernheim/MZ	E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
05.04.09	3 Ex.	Arft/MYK	E. LIPPOK
10.04.09	8 Ex.	Mehringer Berg/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Heimzug (29.04.-16.05.):

26.04.08	2 Ex.	Stangenrod/WW	A. KUNZ
29.04.08	2 Ex.	Neuwied/NR	W. VOGEDES
04.05.08	1 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
13.04.09	1 Ex.	dz. Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.04.09	1 Ex.	Kleeburger Hof/MYK	W. VOGEDES
18.04.09	1 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen Heimzug (3-46):

21.04.08	12 Ex.	Hof/WW	R. BUSCH
10.04.09	8 Ex.	Mehringer Berg/TR	K.-H. HEYNE

Erst- und Letztbeobachtungen des Wegzugs (19.09.-17.11.):

04.10.08	3 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN
01.11.08	2 Ex.	Krombachtalsperre und Herschbach/WW	R. BUSCH
07.10.09	1 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
28.10.09	1 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Amsel (*Turdus merula*)

rBV

Erstgesang wurde am 05.01.08 und 09.02.09 bemerkt (C. HEBER, A. KUNZ).

Bei systematischen Erfassungen des Herbstzuges wurden vom 4.10.-27.11.08 in Rheinhessen/MZ an 11 Tagen 61 Individuen beobachtet und vom 02.09.-21.11.09 an 20 Tagen 119 Individuen (H.-G. FOLZ).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

rBV, rDZ

In beiden Berichtsjahren ganzjährig anwesend. Es wurden nur aus den Kreisen COC, LU, MZ und SÜW Brutzeitbeobachtungen und Brutnachweise gemeldet, obwohl die Wacholderdrossel sicherlich eine weit größere Brutzeitverbreitung in Rheinland-Pfalz hat.

Maximalzahlen (618-3.215):

16.01.08	650 Ex.	Edenkoben Haardtrand/SÜW	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
01.11.08	1.857 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.08	944 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.11.09	349 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 05.10.-25.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 25 Tagen 5.439 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden dort vom 08.08.-05.12.09 an 19 Beobachtungstagen insgesamt 1.197 ziehende Wacholderdrosseln gezählt (H.-G. FOLZ).

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

Aus beiden Berichtsjahren stammen 15 Januar- und neun Dezemberbeobachtungen in den Kreisen MYK, MZ, NR, NW, PS, RP, TR, WIL (J. BAYER, D. BECKER, M. BECKER, H. BODES, C. HEBER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, E. LIPPOK, G. RINDCHEN).

Erstbeobachtungen (02.02.-17.02.):

06.02.08	2 Ex.	Haßlocher Wald/NW	C. HEBER
13.02.08	1 Ex.	Hillscheid/WW	M. u. U. BRAUN
13.02.08	1 Ex.	Bingen-Büdesheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.02.08	1 Ex.	Freinsheim/DÜW	J. WEIB
01.02.09	1 Ex.	Trier-Ehrang/TR	K.-H. HEYNE
14.02.09	1 Ex.	Nette/MYK	E. LIPPOK
15.02.09	3 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen (11.11.-06.12.):

08.11.08	2 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	M. WINK
29.11.08	1 Ex.	Wittlich/WIL	M. BECKER
17.11.09	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Maximalzahlen (130-247):

15.10.08	210 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
13.10.09	142 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
13.10.09	94 Ex.	Hunsrück/TR	T. GRUNWALD

Vom 17.09.-04.11.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 12 Tagen insgesamt 80 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr konnten dort vom 06.09.-19.10.09 an 16 Beobachtungstagen 121 Individuen gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

rDZ

Die Rotdrossel zeigt eine Tendenz zur Verschiebung ihrer phänologischen Eckdaten, die Letztbeobachtungen des Heimzuges liegen 2009 sehr früh, die Erstbeobachtungen des Wegzuges recht spät in der Zugperiode. Aus dem Berichtszeitraum gingen insgesamt 224 Beobachtungsmeldungen zahlreicher Beobachter ein-ob die veränderten Daten mit der Beobachteraktivität oder natürlichen Gegebenheiten zusammenhängen, ist nicht eindeutig belegbar. Es wäre daher wünschenswert, wenn die Beobachter auch weiterhin alle Rotdrosselbeobachtungen notieren und melden.

Letztbeobachtungen Heimzug (10.04.-24.04.):

19.04.08	30 Ex.	Niesenberg/WIL	K.-H. HEYNE
19.04.08	80 Ex.	Roth/BIT	K.-H. HEYNE
20.04.08	1 Ex.	Karmelenberg Bassenheim/MYK	E. LIPPOK
22.04.08	1 Ex.	Stein-Neukirch/WW	R. BUSCH
03.05.08	1 Ex.	dz. Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.04.09	2 Ex.	dz. Wasserliesch/TR	D. BECKER
05.04.09	1 Ex.	Arft/MYK	E. LIPPOK
06.04.09	1 Ex.	Klein-Winternheim/MZ	M. SCHMOLZ
06.04.09	20 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug (25.09.-10.10.):

10.10.08	2 Ex.	Korlingen/TR	D. BECKER
12.10.08	2 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
12.10.08	6 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
05.10.09	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.09	1 Ex.	Bingen-Rochusberg/MZ	M. BICKEL
13.10.09	25 Ex.	dz. Hunsrück/TR	T. GRUNWALD
14.10.09	2 Ex.	Hömberg/EMS	M. BRAUN

Winterbeobachtungen:

Aus dem Berichtszeitraum liegen 17 Januar- und 26 Dezemberbeobachtungen von rastenden Exemplaren vor, es wurden insgesamt 135 Exemplare im Januar und 101 Ex. im Dezember beobachtet. Auf den kalten und schneereichen Winter 2008/09 entfallen 27 Beobachtungen mit insgesamt 179 Individuen.

Maximalzahlen (150-1.096):

18.10.08	360 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
04.11.08	416 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.03.09	300 Ex.	dz. Bengel/WIL	H. BODES
13.11.09	350 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Vom 12.10.-07.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 21 Tagen insgesamt 2.442 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden dort vom 05.10.-02.12.09 an 13 Beobachtungstagen nur 242 Individuen erfasst (H.-G. FOLZ).

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (22.04.-08.06.):

24.04.08	1 Ex.	Langenlonsheim/KH	B. VOLLMAR
28.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
03.05.08	1 Ex.	Mattheiser Wald/TR	J. ENGLER
03.05.08	2 Ex.	Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
25.04.09	1 Ex.	Ordenswald/NW	M. POST
29.04.09	1 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
16.05.09	1 Ex.	dz. Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (09.09.-03.10.):

07.09.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
10.09.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.09.08	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
16.09.09	1 Ex.	Konz-Kommlingen/TR	J. PAUWELS
20.09.09	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (01.04.-15.04.):

Insgesamt belegen die Daten die bekannte Phänologie der Art, doch erfolgten zwei sehr frühe Beobachtungen in der ersten Aprildekade beider Berichtsjahre:

04.04.08	1 ♂	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
13.04.08	1 Ex.	Marienstatt/WW	A. KUNZ
13.04.08	1 Ex.	Rheinkribben/MZ	B. VOLLMAR
20.04.08	5 Ex.	Weisenheim am Berg/DÜW	J. WEIB
06.04.09	1 Ex.	Allmendwald Hanhofen/RP	T. DOLICH
10.04.09	1 ♂	Neustadt/NW	M. POST
19.04.09	1 Ex.	Nassau/EMS	M. u. U. BRAUN
19.04.09	1 Ex.	Zerf-Nierendorf/TR	M. SCHORR

Letztbeobachtungen (26.08.-03.10.):

02.09.08	1 Ex.	Engelstadt Plateau7MZ	H.-G. FOLZ
02.09.08	3 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	J. BAYER
07.09.08	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
09.09.08	3 Ex.	Maudacher Bruch/LU	J. BAYER
19.08.09	1 Ex.	Trier/TR	J. ENGLER
06.09.09	1 ♂, 1 ♀	Geinsheim/NW	C. BUSSEN
19.09.09	1 Ex.	Haardt/DÜW	C. HEBER

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)**rBV, rDZ**

Es wurden lediglich zwei nachweisliche Brutvorkommen aus 2008 sowie ein Brutverdacht aus 2009 mitgeteilt. Angaben zu weiteren Vorkommen sind dringend erwünscht!

2 Bp.	Kirchweiler Rohr/DAU	6209/NW	T. WEBER
1 Bp.	Wirftal/DAU	5605/SW	T. WEBER
1 Bv.	Herschbach/WW	5412/NW	K. LAUX

Weitere Brutzeitbeobachtungen gelangen bei Eisenberg/KIB, Freinsheim/DÜW, Willingen/WW, Schüwel/EMS, Hof/EMS, Wirft/DAU, Booser Weiher/AW, Kalenborner Höhe/AW, Meuspath/AW, Döttingen/MYK, Weibern/MYK (H. BOTT, M. u.U. BRAUN, F. J. FUCHS, V. HARRIES, T. WEBER).

Erstbeobachtungen (15.04.-20.04.):

18.03.08	2 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	R. ALBERT
06.04.08	1 Ex.	Hungen/WW	M. WEIDENFELLER
09.04.09	1 Ex.	Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER u. a.
19.04.09	1 Ex.	Platten/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtungen (21.09.-18.10.):

21.09.08	1 Ex.	Hellenhahn-Schellenberg/WW	R. BUSCH
27.09.08	1 Ex.	Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
19.09.09	1 Ex.	Hömberg/EMS	M. BRAUN
26.09.09	3 Ex.	Mechtersheim/RP	E. SEFRIN

Maximalzahlen Zug (18-57)²:

03.09.08	28 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.08	15 Ex.	Bonerath/TR	F. u. M. ROBECK
02.09.09	15 Ex.	Ralingen/TR	S. TWIETMEYER

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

rBV, rDZ

Für 2008 und 2009 liegen nahezu flächendeckend rund 500 Meldungen mit Bruthinweisen aus insgesamt 24 Landkreisen vor.

Erstbeobachtungen (27.02.-13.03.):

20.02.08	1 Ex.	Lambsheim/RP	J. WEIB
27.02.08	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
01.03.09	1 Ex.	Rölerhöcht, Tawern/TR	D. BECKER
04.03.09	1 Ex.	Bengel/WIL	H. BODES

Letztbeobachtungen (14.10.-28.10.):

02.11.08	1 Ex.	Rüber-Küttig/MYK	E. LIPPOK
02.11.08	1 Ex.	Wienau/NR	J. KUCHINKE
03.11.09	1 Ex.	Kinderbeuern/WIL	H. BODES

Winterbeobachtungen:

21.12.08-03.01.09	1 ♂	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
09.01.08	1 Ex.	Hütschenhausen/KL	A. KLEIN

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (01.04.-14.04.):

03.04.08	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK
15.04.08	1 Ex.	Konz-Könen/TR	K.-H. HEYNE
15.04.08	1 Ex.	Yachthafen-Neuwied/NR	R. SCHEID
19.04.08	1 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA

² Vergleichszeitraum 2005-2007

04.04.09	1 Ex.	Benzenloch/NW	M. POST
08.04.09	1 Ex.	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
09.04.09	1 Ex.	Kanzem/TR	D. BECKER
13.04.09	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
14.04.09	1 Ex.	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA

Letztbeobachtungen (08.07.-27.09.):

09.08.08	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.09	2 Ex.	Steingrube Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*)

rBV, rDZ

Brutzeitvorkommen:

2008:

2♂ singend	Schwabenheim/MZ	6014/36, 46	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Engelstadt/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Elsheim/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1♂ singend	Partenheim-Gienau/MZ	6114/08	H.-G. FOLZ
5♂ singend	Hahnheim-Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
3♂	Rheindürkheim/WO	6216/SW	R. STEINHAUSEN
5-8♂ singend	Offstein/DÜW	6315/54	H. BOTT, M. WINK

2009:

bis 4♂ singend	Engelstadt/Elsheim/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
bis 4♂ singend	Elsheim/Engelstadt/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
5♂ singend	Partenheim/MZ	6114/08	H.-G. FOLZ
1 Bz.	Hahnheim/MZ	6115/01	M. u. D. RINNE
2♂ singend	Hahnheim-Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
bis 2♂ singend	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	H. BOTT, M. SCHMOLZ, M. WINK
3♂ singend	Rheindürkheim/WO	6216/SW	J. BAYER
bis 3♂ singend	Limburgerhof/RP	6516/45	T. DOHLICH

Erstbeobachtungen (13.03.-28.03.):

22.03.08	1♂	Meerheck/NR	W. VOGEDES
25.03.08	3 Ex.	Im Spieß, Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
15.03.09	2♂	„Im Mayen“, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.03.09	1♂	Roxheimer Altrhein/RP	M. WINK

Letztbeobachtungen (11.08.-29.09.):

10.08.08	2 wf/dj	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
09.08.09	1 Ex.	Engelstadt NSG Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ
26.08.09	mind. 1♂	Seebach Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahlen:

30.03.08	19 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
12.04.08	12 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

rBV, rDZ

Für die Jahre 2008 und 2009 liegen erneut Winterdaten vor: 15 Januar- und 10 Dezemberbeobachtungen aus den Landkreisen KH, KO, LU, MYK, MZ, NW, PS, RP, SÜW, TR, WIL, WW.

Maximalzahl Winter:

29.01.08	10 Ex.	Hatzenport/MYK	R. SCHEID
----------	--------	----------------	-----------

Darüber hinaus werden auch zunehmend Beobachtungen aus allen anderen Wintermonaten (Nov. bis Febr.) gemeldet, sodass z.B. die Unterscheidung im Frühjahr von aus Überwinterungsquartieren zurückgekehrten bzw. überwinternden Hausrotschwänzen schwieriger wird.

Erstbeobachtungen (21.02.-08.03.):

03.03.08	1 Ex.	Mussbach/NW	C. WEBER
03.03.08	1 ♂	Bingen-Gaulsheim/KO	B. VOLLMAR
12.03.09	1 Ex.	singend Scheuern/EMS	M. u. U. BRAUN
13.03.09	1 Ex.	Hundsangen/WW	M. WEIDENFELLER

Letztbeobachtungen Zug (26.10.-29.11.):

16.11.08	1 Ex.	singend Ludwigshafen-BASF/LU	T. DOLICH
23.11.08	1 Ex.	Hachenburg/WW	A. KUNZ
21.11.09	1 Ex.	singend Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
25.11.09	1 Ex.	Wallersheim/KO	E. LIPPOK

Ein Hybrid aus Haus- und Gartenrotschwanz hielt sich vom 29.5.-02.06.08 am Pleiner Waldschlößchen/WIL auf (M. BECKER, S. TWIETMEYER).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (20.03.-07.04.):

30.03.08	1 Ex.	Kerschenbach/DAU	C. HACKENBERG
06.04.08	1 ♂	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
04.04.09	1 ♂	Speyerer Dünen/RP	C. DIETZEN
10.04.09	1 ♂	Kästal/Pfälzer Wald/RP	M. POST

Letztbeobachtungen (15.09.-24.10.):

25.09.08	1 Ex.	Kamp-Bornhofen/EMS	M. SCHMOLZ
28.09.08	1 Ex.	Neustadt Haardt/NW	C. HEBER
20.09.09	1 Ex.	Einig/MYK	M. JÖNCK
01.11.09	1 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtung (05.03.-02.04.):

01.04.08	1 ♂	Wachenheim/DÜW	J. WEIB
06.04.08	1 Ex.	Welschbillig/TR	K.-H. HEYNE
29.03.09	1 Ex.	Diedesfeld/NW	M. POST
04.04.09	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen (27.09.-02.11.):

28.09.08	2 Ex.	Welschbillig/TR	K.-H. HEYNE
04.10.08	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN

28.09.09	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN
26.09.09	1 Ex.	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
11.10.09	1 Ex.	Koblenz/KO	V. HARTMANN

Maximalzahlen Zug (12-42)³:

29.04.08	15 Ex.	Wittlich-Bombogen/WIL	C. KÖNIG
03.05.08	18 Ex.	Ingelheim-Mainzer Berg/MZ	H.-G. FOLZ, E. FRAGSTEIN, M. MÜNCH
12.09.09	15 Ex.	Offstein-Dirmstein/DÜW	M. WINK

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

Im Jahr 2008 entfielen 12 Beobachtungen und im Jahr 2009 insgesamt 20 Beobachtungen auf die Monate Januar und Dezember. Allerdings ist hierbei von nicht unerheblichen Meldedefiziten auszugehen.

Maximalzahlen (43-121):

26.19.08	36 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.09	162 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 17.09.-07.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 13 Tagen 101 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden vom 19.09.-02.12.09 an 21 Tagen insgesamt 430 ziehende Individuen gezählt (H.-G. FOLZ).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)**A**

Am 02.01.08 wurde eine Alpenbraunelle am Trifels/SÜW beobachtet (H. KETTERING, T. KETTERING). Es handelt sich hierbei mindestens um den dritten Nachweis in Rheinland-Pfalz, allerdings wurde eine weitere Beobachtung vom selben Ort (2005) bisher nicht dokumentiert. Der letzte belegte Nachweis stammt somit aus dem Jahr 1979 (SISCHKA 1983).

Haussperling (*Passer domesticus*)**rBV**

Am 19.04.08 wurde am Roxheimer Altrhein/RP ein albinotisches Exemplar beobachtet (M. WINK).

Feldsperling (*Passer montanus*)**rBV**Maximalzahlen (150-500):

01.11.08	250 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
19.09.09	250 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HANTGE, H. BIRK u.a.

³ Vergleichszeitraum 2004-2007

Brachpieper (*Anthus campestris*)**rDZ**

Wie in den Jahren zuvor liegt der Schwerpunkt der Beobachtungen auf dem Wegzug. Im Jahr 2008 entfielen von insgesamt 43 Beobachtungen fünf auf den Heimzug, im Jahr 2009 wurden drei Heimzug- und 48 Wegzugbeobachtungen notiert. Im Jahr 2008 wurden 120 und im Jahr 2009 insgesamt 244 Exemplare beobachtet.

Speziell der Brachpieper ist eine dankbare Art, die zum Beispiel im Zuge von Mornellbeobachtungen erfasst werden kann, da beide Arten fast zeitgleich durchziehen und ähnliche Rasthabitate bevorzugen. Wer in der offenen Feldflur nicht nur nach Mornellrufen sucht, sondern auch auf das haussperlingsähnliche Tschilpen des ruffreudigen Brachpiepers achtet, wird hier sicherlich nicht enttäuscht werden und Beobachtungen notieren können.

Erstbeobachtungen Heimzug:

21.04.08	3 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
25.04.08	2 Ex.	Freinsheim/DÜW	M. WINK
05.05.08	1 Ex.	Hinter der Mortkaute/MZ	M. BICKEL
19.04.09	1 Ex.	dz. Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.09	1 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.05.09	1 Ex.	Sürzerhof/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Wegzug (24. 07.-15.08.):

03.08.08	1 Ex.	dz. Gering/MYK	M. JÖNCK
10.08.08	1 Ex.	Ober-Hilbersheim See/MZ	H.-G. FOLZ
14.08.08	1 Ex.	dz. Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
06.08.09	2 Ex.	Minkelfeld/MYK	M. JÖNCK
08.08.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
15.08.09	1 Ex.	Hömburg/EMS	M. u. U. BRAUN

Letztbeobachtungen (15.09.-02.10.):

09.09.08	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
10.09.08	1 Ex.	Rüber/MYK	W. VOGEDES
10.09.08	5 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
17.09.09	1 Ex.	Kenner Flur/TR	S. TWIETMEYER
19.09.09	1 Ex.	Ralingen-Kersch/TR	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen Zug (8-24):

26.08.08	11 Ex.	Fisch/TR	H. LEMKE, E. SCHALLER
31.08.08	11 Ex.	Kollig/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK
01.09.08	9 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
23.08.09	9 Ex.	Sammetzkopf, Kollig/MYK	M. JÖNCK
24.08.09	22 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.08.09	78 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerich/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 20.08.-10.09.08 konnten in Rheinhessen/MZ und im Landkreis MYK bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 11 Tagen insgesamt 25 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ, M. JÖNCK). Im Jahr 2009 wurden in Rheinhessen/MZ vom 08.08.-13.09.09 an 13 Tagen 132 ziehende Individuen erfasst. Dabei stellte der 29.08.09 mit 78 durchziehenden Individuen den bisher stärksten Zugtag des Brachpiepers seit Beginn der Zugvogelerfassungen in Rheinhessen im Jahr 1986 dar (H.-G. FOLZ).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (23.03.-02.04.):

31.03.08	1 Ex.	Quarzitgrube Baumbach/WW	C. BRAUNBERGER
20.04.08	1 Ex.	Dörscheid/EMS	J. SCHRUBA
21.04.08	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
04.04.09	2 Ex.	Rivenich/WIL	D. BECKER, A. BECKER-KOB, u.a.
04.04.09	2 Ex.	Lochbusch-Königswiesen/NW	M. POST
04.04.09	1 Ex.	Speyerer Dünen/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen (04.10.-26.10.):

04.10.08	2 Ex.	dz. Konz-Könen/TR	D. BECKER
09.10.08	3 Ex.	dz. Mülheimer Berg/MYK	M. JÖNCK
09.10.08	1 Ex.	dz. Bingen Rochusberg/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.09	1 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD
08.10.09	2 Ex.	dz. Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
11.10.09	5 Ex.	Bingen Rochusberg/MZ	M. BICKEL

Maximalzahlen Zug (99-647):

30.08.08	222 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
14.09.08	162 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
06.09.09	829 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.09	239 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 14.08.-09.10.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 15 Tagen insgesamt 242 durchziehende Exemplare gezählt werden und vom 25.07.09-07.10.09 an 22 Tagen 1.916 Ind. (H.-G. FOLZ).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

rBV, rDZ

Brutzeitbeobachtungen und besetzte Reviere wurden im Berichtszeitraum nur aus den Kreisen AW (3 Reviere), DAU (2), EMS (mind. 2), KIB (1) und WW (1) mitgeteilt (M. u. U. BRAUN, M. JÖNCK, M. KNÖDLER, T. WEBER).

Winternachweise:

Es liegen aus beiden Berichtsjahren neun Januar- und zehn Dezemberbeobachtungen aus den Landkreisen COC, NR, NW, MZ, RP, TR, WIL und WW vor (J. BAYER, M. BECKER, R. BUSCH, P. ERLEMANN, M. FEUERSENGER, H.-G. FOLZ, C. HEBER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. PLATZ, M. ROBECK, N. WALTER).

Maximalzahlen Zug (177-561):

08.10.08	345 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
10.10.09	520 Ex.	dz. Ober-Hilbersheim Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.09	404 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 14.09.-17.12.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 20 Tagen 1.171 durchziehende Exemplare gezählt werden, im Folgejahr wurden dort an 30 Beobachtungstagen vom 20.09.-29.11.09 insgesamt 2.669 Individuen gezählt (H.-G. FOLZ).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)

rDZ

In den beiden Berichtsjahren konnten insgesamt 14 Rotkehlpieper beobachtet werden, davon entstammt nur eine Meldung im Jahr 2008 vom Heimzug. Alle Beobachtungen fügen sich in die bekannte Phänologie der Art ein:

20.04.08	1 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.09.08	1 Ex.	abz. Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER, V. SCHMIDT
27.09.08	1 Ex.	dz. Mörsbach-Niedermörsbach/WW	A. KUNZ
07.10.08	1 Ex.	abz. Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
08.10.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.09	1 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD
07.10.09	1 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Spornpieper (*Anthus richardi*)

A

In beiden Berichtsjahren gelang jeweils eine Beobachtung während des Wegzuges. Diese stellen, bei Anerkennung durch die DSK, den fünften und sechsten Nachweis für Rheinland-Pfalz dar. Der letzte Spornpieper war im September 2006 in MZ durchgezogen (DIETZEN & FOLZ 2008a).

19.10.08	1 Ex.	dz. Galgenberg bei Durchroth/KH	T. GRUNWALD
*11.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

rDZ

Letztbeobachtungen Heimzug (20.04.-11.06.):

20.04.08	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	B. VOLLMAR
20.04.08	2 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
20.04.08	4 Ex.	Küttig u. Rüber/MYK	E. LIPPCK
21.04.08	16 Ex.	Meerheck/NR	M. JÖNCK
21.04.08	2 Ex.	Rodder Maar/KO	M. JÖNCK
17.05.08	1 Ex.	Wittlich-Wengerohr/WIL	M. BECKER
11.04.09	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER, C. HACKENBERG
19.04.09	4 Ex.	Harspelter Mühle/BIT	J.-R. VOS
10.05.09	1 Ex.	Geinsheim/NW	M. WINK

Erstbeobachtungen Wegzug (25.09.-08.10.):

03.10.08	1 Ex.	dz. Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
07.10.08	1 Ex.	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.09	2 Ex.	Waigandshainer Weiher/WW	R. BUSCH
03.10.09	4 Ex.	Rochusberg/MZ	M. BICKEL
08.10.09	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	J. BAYER
12.10.09	5 Ex.	Wiesensee/WW	R. SCHEID

Maximalzahlen (18-160):

16.02.08	35 Ex.	Heinrichs Talau See, Gimsheim/AZ	V. SCHMIDT
26.10.08	44 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
13.12.09	28 Ex.	Postweiher/WW	A. KUNZ
23.12.09	40 Ex.	Marienstatt/WW	A. KUNZ

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

rBV

Winternachweise wurden aus den Flussniederungen von Rhein, Lahn und Mosel sowie aus dem Westerwald gemeldet: insgesamt 34 Januar- (2008: 15, 2009: 19) und 33 Dezemberbeobachtungen (2008: 11, 2009: 12).

Erstbeobachtungen Wegzug (05.08.-15.08.):

11.08.08	3 Ex.	Rheinkribben Bingerbrück/MZ	B. VOLLMAR
15.08.08	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.09.08	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	J. BAYER
09.08.09	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
12.08.09	1 Ex.	Grolsheim Katharinenmühle/MZ	H.-G. FOLZ
13.08.09	1 Ex.	Alf/COC	H. BODES
16.08.09	1 Ex.	Speyerbach/NW	M. POST

Vom 07.09.-18.10.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an vier Tagen neun durchziehende Exemplare gezählt werden, im Jahr 2009 wurden dort an acht Beobachtungstagen vom 20.09.-11.10.09 insgesamt 16 Individuen gezählt (H.-G. FOLZ).

Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (16.03.-05.04.):

28.03.08	1 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
31.03.08	3 Ex.	Kestert/EMS	H. STRUNK
31.03.08	1 Ex.	Quarzitgrube Baumbach/WW	V. HÄSELBARTH
31.03.09	1 Ex.	Heidenfahrt Nonnenaue/MZ	H.-G. FOLZ
03.04.09	1 Ex.	RHB Altrich/WIL	M. BECKER
04.04.09	2 Ex.	Speyerer Dünen/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen (07.10.-27.10.):

05.10.08	1 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER
07.10.08	1 Ex.	dz. Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
08.10.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
13.10.09	1 Ex.	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
19.10.09	1 Ex.	Laurenzibergplateau/MZ	H.-G. FOLZ
26.10.09	1 ♂	Neuburg/GER	H.-J. SCHYGULLA

Maximalzahlen (100-1.500):

30.08.08	60 Ex.	Kollig/MYK	E. LIPPOK
29.08.09	102 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.09	173 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 06.07.-08.10.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 21 Tagen insgesamt nur 197 durchziehende Exemplare gezählt werden, im Folgejahr wurden dort vom 25.07.-19.10.09 an 28 Beobachtungstagen 579 ziehende Schafstelzen beobachtet (H.-G. FOLZ).

Thunbergshafstelze (*Motacilla thunbergi*)**rDZ**

Während des Heimzuges wurden vom 28.04.-16.05.08 insgesamt 84 Exemplare beobachtet, in den Landkreisen BIR, KH, MYK, MZ, TR und WIL (M. BECKER, C. BRAUNBERGER, H.-G. FOLZ, T. GRUNWALD, K.-H. HEYNE, H. LEMKE, E. LIPPOK, S. TWIETMEYER). Im Berichtszeitraum erfolgten nur zwei Wegzugbeobachtungen im September 2008.

Nur ein einziges gemeldetes Exemplar im Jahr 2009 soll als Aufruf an die Beobachter dienen, vermehrt auf diese Art zu achten. Größere Trupps Schafstelzen auf Wiesen und Äckern laden im Frühjahr, wenn die adulten Männchen ausgefärbt sind, dazu ein, nach dunkelköpfigen Thunberg-, aber auch anderen Schafstelzenarten, Ausschau zu halten.

Erstbeobachtungen (12.04.-01.05.):

28.04.08	2 Ex.	Landscheid/WIL	K.-H. HEYNE
10.05.09	1 Ex.	dz. Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Frühjahr und Herbst (27.05.-06.09):

15.05.08	1 Ex.	Küttig/MYK	E. LIPPOK
16.05.08	11 Ex.	Galgenberg/KH	T. GRUNWALD
03.09.08	2 Ex.	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.09.08	1 ad. ♂	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahlen (8-60):

10.05.08	12 Ex.	Wittlich-Bombogen/WIL	M. BECKER
16.05.08	11 Ex.	Galgenberg/KH	T. GRUNWALD

Bachstelze (*Motacilla alba*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (120-379):

21.03.08	70 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
05.10.08	85 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER
03.03.09	114 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD
05.10.09	235 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.09	306 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD

Zahlreiche Beobachtungen aus den Monaten Dezember und Januar (in beiden Jahren jeweils 42) belegen die zunehmende Überwinterungstendenz der Art.

Vom 07.09.-01.11.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzuges an 12 Tagen insgesamt 147 durchziehende Exemplare gezählt werden. Während des Heimzuges konnten dort an acht Tagen vom 02.02.-20.04.08 20 ziehende Individuen beobachtet werden. Im Folgejahr wurden dort vom 15.08.-31.10.09 an 25 Tagen insgesamt 602 durchziehende Exemplare gezählt und während des Heimzuges vom 21.03.-11.04. an sechs Beobachtungstagen insgesamt 48 ziehende Individuen (H.-G. FOLZ). Der 05.10.09 erwies sich mit 235 ziehenden Individuen als der stärkste Zugtag der Bachstelze seit Beginn der systematischen Zählungen in Rheinhessen 1986.

Trauerbachstelze (*Motacilla yarrellii*)

uDZ

Nachdem im Jahr 2007 zwei Trauerbachstelzen im Polder Ingelheim/MZ beobachtet worden waren (DIETZEN & FOLZ 2008b), hielten sich dort auch im Jahr 2008 wieder zwei Vögel auf, eine weitere konnte an den Klärteichen bei Weinsheim/BIT beobachtet werden:

19.03.08	1 ♂	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.04.08	1 ♂	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
19.04.08	1 Ex.	Klärteiche bei Weinsheim/BIT	K.-H. HEYNE

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (8.080-23.569):

08.10.08	12.414 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerich/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.08	6.058 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
07.10.09	10.007 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.10.09	7.662 Ex.	dz. Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD

Vom 10.02.-20.04.08 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Heimzuges an 15 Tagen 3.924 und vom 03.08.-25.12.07 während des Wegzuges an 35 Tagen insgesamt 25.935 durchziehende Exemplare gezählt werden.

Im Jahr 2009 konnten während des Heimzuges vom 28.01.-19.04.09 an 19 Beobachtungstagen 4.380 Individuen und bei den Erfassungen des Wegzuges wurden vom 22.08.-05.12.09 an 38 Tagen 22.849 Exemplare im Zuge der Zählungen erfasst (H.-G. FOLZ).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

rDZ

Letzbeobachtungen Frühjahr (15.04.-01.06.):

20.04.08	1 Ex.	Dachsenhausen/EMS	M. u. U. BRAUN
22.04.08	2 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK
22.04.08	3 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.05.08	1 Ex.	Rüber/MYK	E. LIPPOK, A. KÖNEN
10.04.09	2 Ex.	Dahlem/BIT	K.-H. HEYNE
14.04.09	1 Ex.	dz. Mülheimer Berg/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Herbst (20.09.-28.09.):

25.09.08	1 Ex.	Hünenfeld/MYK	M. u. U. BRAUN
27.09.08	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
28.09.09	1 Ex.	Standortübungsplatz Schmidtenhöhe/KO	M. u. U. BRAUN
03.10.09	27 Ex.	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.09	9 Ex.	Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (1.000-13.409):

19.10.08	548 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
03.01.09	300 Ex.	Ordenswald/NW	C. HEBER
23.12.09	3000 Ex.	Koblenz/KO	H. STRUNK

Vom 04.10.-13.11.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 16 Tagen während des Wegzuges insgesamt 2.055 durchziehende Exemplare gezählt werden und vom 03.10.-15.11.09 an 12 Tagen 371 Ind. (H.-G. FOLZ).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)**rBV**Maximalzahlen (25-138):

05.10.08	45 Ex.	dz. Laurenzibergplateau/MZ	H.-G. FOLZ
19.12.08	70 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
13.10.09	53 Ex.	dz. Hunsrück/TR	T. GRUNWALD
20.10.09	75 Ex.	Rheinböllen/SIM	T. GRUNWALD

Vom 05.10.-27.11.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 12 Tagen während des Wegzugs insgesamt 104 durchziehende Exemplare festgestellt werden. Im Folgejahr wurden vom 06.09.-15.11.09 an acht Beobachtungstagen nur 37 ziehende Kernbeißer beobachtet (H.-G. FOLZ).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)**rBV, rDZ**

Während der systematischen Erfassungen des Wegzuges in Rheinhessen/MZ konnten im Jahr 2008 insgesamt fünf und im Jahr 2009 nur zwei ziehende Individuen festgestellt werden (H.-G. FOLZ).

Wie bereits in den Vorjahren, so wurden auch in den beiden Berichtsjahren nordöstliche Vögel der Nominatform *Pyrrhula p. pyrrhula* gemeldet, die von den Beobachtern lautmalerisch treffend als „Trompetergimpel“ bezeichnet werden. Der Großteil der eingegangenen Meldungen stammt aus dem Jahr 2008:

13.01.08	2 Ex.	Schalkenmehren/DAU	K.-H. HEYNE
01.02.08	1 Ex.	Hausweiher/WW	A. KUNZ
03.02.08	1 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
26.02.08	1 Ex.	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
06.03.08	1 Ex.	Wittlich/WIL	K.-H. HEYNE
23.11.08	1 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
25.11.08	1 Ex.	Neustadt/NW	C. HEBER
30.11.08	2 Ex.	Berghäuser Altrhein/RP	M. WINK
07.12.08	1 Ex.	Ordenswald Nord/NW	C. HEBER
10.01.09	2 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
24.01.09	3 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Girlitz (*Serinus serinus*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

Die Winterbeobachtungen stammen alle aus der klimatisch begünstigten Oberrheinebene:

16.01.08	4 Ex.	Edenkoben/SÜW	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
10.02.08	1 Ex.	Industriehafen Mainz/MZ	D. RINNE
31.12.08	15 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
05.01.09	22 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
17.01.09	15 Ex.	Otterstadt/LU	T. DOLICH

Erstbeobachtungen (06.02.-10.03.):

08.03.08	1 Ex.	Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK
08.03.08	1 Ex.	Wolfheim Dürkheimer Klauer/MZ	H.-G. FOLZ
09.03.08	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER

25.02.09	1 Ex.	Heichtsheim/MZ	M. SCHMOLZ
10.03.09	1 Ex.	Bad Ems/EMS	M. u. U. BRAUN
13.03.09	1 Ex.	Gusterath/TR	F. U. M. ROBECK

Letztbeobachtungen (01.11.-19.11.):

13.11.08	3 Ex.	Engelstadt/Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.11.08	3 Ex.	Otterstadt/RP	T. DOLICH
28.11.08	1 Ex.	dz. Kiefweiher/RP	J. BAYER
16.11.09	1 Ex.	Bergnassau/EMS	M. u. U. BRAUN
18.11.09	8 Ex.	Haardt/DÜW	C. HEBER
21.11.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 03.08.-13.11.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 15 Tagen während des Wegzugs 56 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr waren dort vom 15.08.-21.11.09 an 20 Tagen insgesamt 161 Individuen durch (H.-G. FOLZ).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)**rBV, uDZ**

Im Jahr 2008 wurden keine Bruthinweise gemeldet. Im Folgejahr bestand ein Revier am Hermeskopf/SÜW (U. JANZ), weitere Brutzeitbeobachtungen liegen aus den Landkreisen BIT, DÜW und WW vor (C. HEBER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, J.-R. VOS).

Maximalzahlen (36-500):

09.01.08	150 Ex.	Endertal, Cochem/COC	L. LENZ
08.07.08	30 Ex.	Wald bei Trimport/BIT	K.-H. HEYNE
01.11.09	68 Ex.	Mehringer Berg/TR	K.-H. HEYNE
01.11.09	27 Ex.	Gietzebeul/WW	A. KUNZ

Grünfink (*Carduelis chloris*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (277-1.100):

17.08.08	140 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	C. HEBER
19.10.08	210 Ex.	Schwabenheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.09	120 Ex.	Rodder Maar/AW	S. MANNSCHOTT
24.10.09	65 Ex.	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 04.10.-28.12.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 22 Tagen während des Wegzugs 703 durchziehende Exemplare gezählt werden. Die Zählungen im Folgejahr ergaben vom 05.09.-02.12.09 an 23 Tagen insgesamt 473 ziehende Individuen (H.-G. FOLZ).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (615-137):

03.09.08	120 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
25.10.08	103 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
18.01.09	100 Ex.	Rheinauen Bingen-Gaulsheim/MZ	M. u. D. RINNE
12.09.09	150 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Vom 09.08.-18.11.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 22 Tagen während des Wegzugs insgesamt 283 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr konnten dort vom 25.07.-02.12.09 an 27 Beobachtungstagen 390 ziehende Stieglitze gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

uBV, rDZ

Es wurden nur im Jahr 2008 zwei einzelne Brutzeitbeobachtungen aus den Kreisen AK und RP mitgeteilt (M. u. U. BRAUN, T. DOLICH), Bruten konnten aber nicht nachgewiesen werden.

Letztbeobachtungen Frühjahr (10.03.-05.06.):

20.04.08	8 Ex.	Rüber/MYK	E. LIPPOK
20.04.08	96 Ex.	dz. Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.08	1 Ex.	Hanhofen/RP	T. DOLICH
15.07.08	1 Ex.	Daaden/AK	M. u. U. BRAUN
01.04.09	6 Ex.	Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.04.09	1 Ex.	Ordenswald/NW	M. POST
12.04.09	12 Ex.	dz. NSG Mesenberg/WIL	M. BECKER

Erstbeobachtungen Herbst (21.08.-30.09.):

20.09.08	2 Ex.	Roxheimer Althrein/RP	J. BAYER
25.09.08	15 Ex.	dz. Hünenfeld/MYK	M. u. U. BRAUN
25.09.08	1 Ex.	Kamp-Bornhofen/EMS	M. SCHMOLZ
12.09.09	3 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerich/MZ	H.-G. FOLZ
19.09.09	2 Ex.	Hömberg/EMS	M. BRAUN
27.09.09	1 Ex.	Schmidtenhöhe/KO	H. STRUNK

Maximalzahlen (100-500):

08.10.08	104 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerich/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.08	800 Ex.	rastend Ordenswald Nord/NW	C. HEBER
08.10.09	200 Ex.	dz. Roxheimer Althrein/RP	J. BAYER
23.12.09	200 Ex.	Koblenz/KO	H. STRUNK

Vom 08.10.-08.11.08 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 14 Tagen während des Wegzugs insgesamt 370 durchziehende Exemplare gezählt werden. Im Folgejahr wurden vom 12.09.-15.11.09 an 18 Tagen 624 Individuen erfasst (H.-G. FOLZ).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

01.01.08	60 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
02.01.08	13 Ex.	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
05.01.08	22 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
01.01.09	30 Ex.	Neumagen-Dhron/WIL	K.-H. HEYNE
11.01.09	320 Ex.	Engelstadt Kalmerich/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (100-3.500):

05.02.08	400 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
09.09.09	420 Ex.	Essenheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

In beiden Jahren war der Winterbestand vom Heim- und Wegzug nicht eindeutig abzugrenzen.

Bei systematischen Erfassungen des Wegzugs in Rheinhessen/MZ wurden vom 02.08.-07.12.08 an 25 Tagen insgesamt 863 durchziehende Exemplare gezählt. Heimzugbeobachtungen datieren vom 07.03.-13.04.08 und an sieben Tagen wurden 165 Durchzügler gezählt. Im Jahr 2009 konnten während des Heimzuges vom 28.02.-19.04.09 an 10 Beobachtungstagen insgesamt 185 Individuen und während des Wegzuges vom 25.07.-04.10.09 an 39 Tagen 1.767 ziehende Bluthänflinge gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Birkenzeisig (*Carduelis flamma*)

rBV, rDZ

Brutverdacht bestand im Jahr 2008 an drei Stellen in den Landkreisen AK und WW (M. u. U. BRAUN, A. KUNZ), im Jahr 2009 gab es sechs Meldungen mit Brutverdacht aus den Kreisen KH und KO (H. BODES, M. u. U. BRAUN, C. HACKENBERG).

In beiden Berichtsjahren wurde kein Taigabirkenzeisig *C. f. flamma* gemeldet.

Maximalzahlen (40-135):

06.01.08	160 Ex.	Vielbach/WW	K. LAUX
23.11.08	200 Ex.	Engeser Feld/NR	E. LIPPOK
28.02.09	40 Ex.	Ordenswald/NW	C. HEBER
10.03.09	60 Ex.	Dahlem/BIT	K.-H. HEYNE

Bei den systematischen Erfassungen des Wegzuges in Rheinhessen/MZ konnten lediglich im Jahr 2008 zwei ziehende Individuen beobachtet werden:

25.11.08	1 Ex.	dz. Mainz Bruchweg/MZ	H.-G. FOLZ
27.11.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Spornammer (*Calcarius lapponicus*)

uDZ

08.10.08	2 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
17.10.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ

Es handelt sich hierbei um den 23. bis 25. Nachweis für Rheinland-Pfalz, wobei eine weitere Zugbeobachtung aus Rheinhessen nicht dokumentiert wurde. Die Art erscheint mittlerweile alljährlich in geringer Anzahl im Herbst.

Schneeammer (*Calcarius nivalis*)

A

Eine klassische Beobachtung vom Herbstzug:

25.10.08	3 Ex.	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------------	------------

Graumammer (*Emberiza calandra*)

rBV

Auf der TK25 6314 wurden während der Brutzeit im Jahr 2008 116 Reviere und auf der TK25 6313 weitere 11 Reviere erfasst (M. KNÖDLER).

Die Brutzeitbeobachtungen konzentrieren sich insgesamt weitgehend auf Rheinhessen und die Pfalz sowie vereinzelte Nachweise aus dem mittelhessischen Becken. Hervorzuheben ist eine Brutzeitbeobachtung eines singenden Männchens vom 07.-08.06.2009 aus einem früheren Brutgebiet in der Region Trier (Siewerich bei Wincheringen-Söst/TR, D. BECKER, MF. BECKER, K.-H. HEYNE.). Eine Brut kann aber ausgeschlossen werden. Die Art ist in der Region Trier ausgestorben.

Erstbeobachtungen (14.02.-19.03.):

02.03.08	3 Ex.	Layenhof, Mainz/MZ	O. KIFFEL
09.03.08	1 Ex.	Lambsheim/RP	J. WEIB
07.03.09	1 Ex.	Sprendlingen/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (01.11.-01.12.):

08.11.08	12 Ex.	dz. Plateau Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
13.12.09	2 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Maximalzahlen (14-120):

07.10.08	45 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER
19.09.09	56 Ex.	Worms-Rheindürkheim/WO	J. BAYER

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

rBV, rDZ

Erstgesang:

20.02.08	1 Ex.	Konz-Köhen/TR	M. u. U. BRAUN
19.02.09	1 Ex.	Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (22-300):

08.11.08	50 Ex.	Hochebene bei Dienheim/MZ	D. RINNE
28.11.08	50 Ex.	Kistnerweiher, Neuhofen/RP	J. BAYER
11.10.09	220 Ex.	NSG Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.09	250-300 Ex.	Stoppelacker S Steinen/WW	A. KUNZ

Bei planmäßigen Erfassungen des Wegzugs wurden vom 14.08.-30.11.08 in Rheinhessen/MZ an 19 Tagen insgesamt 130 ziehende Exemplare registriert (H.-G. FOLZ). Im Jahr 2009 konnten vom 12.09.-02.12. an 24 Tagen insgesamt 186 ziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Zaunammer (*Emberiza cirrus*)

IBV

Die intensive Bestandserfassung wurde von JANZ et al. (2008) am Haardtrand fortgeführt und erbrachte 2008 insgesamt 207 Reviere und geschätzte 190 Brutpaare und für das Jahr 2009 insgesamt 272 Reviere, wobei die Anzahl der Brutpaare auf 250 geschätzt wird (s. JANZ 2011 in diesem Heft).

Später Brutnachweis:

01.09.09	1 Bp. m. 3 juv.	Fütterung, Neustadt-Haard/NW	C. HEBER
----------	-----------------	------------------------------	----------

Winterbeobachtungen:

11.01.08	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
16.01.08	1 Ex.	Edenkoben/SÜW	H.-G. FOLZ, S. MOSTER
06. u. 13.02.08	1 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

16.01.09	12 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
16.12.09	10 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
23.12.09	16 Ex.	Deidesheim/DÜW	A. STÖHR

Zippammer (*Emberiza cia*)

IBV

Brutvorkommen bzw. Brutzeitdaten wurden bei sehr unvollständiger Erfassung wiederum aus den traditionellen Brutgebieten an Mosel, Ahr, Nahe und Mittelrhein in den Landkreisen WIL (8/3 Reviere, 2008/2009), MYK (0/0), COC (0/4), AW (3/0), EMS (2/0), KH (3/0) und MZ (5/0) gemeldet. Die Bestandsentwicklung der Art sollte, angesichts der nationalen Bedeutung, genauer erfasst werden.

Beobachtungen abseits der regelmäßig besetzten Verbreitungsgebiete:

05.-06.06.09	1 ♂	Weyher/NW	U. JANZ (s. a. JANZ 2010).
--------------	-----	-----------	----------------------------

Winterbeobachtungen:

29.01.08	9 Ex.	Hatzenport/MYK	R. SCHEID
17.02.08	12 Ex.	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
15.02.09	2 Ex.	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
12.12.09	4 Ex.	Oberhausen/KH	M. STEVERDING

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

rDZ

Heimzug:

21.04.08	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
27.-29.04.08	bis 2 ♂, 2 ♀	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE, C. KÖNIG, H. LEMKE, T. RAUTENBERG
25.-26.04.09	1 ♂	Kenner Flur/TR	D. BECKER, K.H. HEYNE
26.04.09	1 Ex.	Wolfsheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.09	1 Ex.	Engelstadt NSG Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ

Wegzug:

17.08.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
23.08.08	1 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
31.08.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.08	1 Ex.	dz. Sammetzkopf SO Kollig/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK
02.09.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.09.08	3 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.09.08	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.08.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
29.08.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
30.08.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
30.08.09	1 Ex.	dz. Sammetzkopf SO Kollig/MYK	M. JÖNCK
04.09.09	1 Ex.	dz. Essenheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.09	2 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.09	4 Ex.	dz. Engelstadt Zollstock/MZ	H.-G. FOLZ
12.09.09	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (65-193):

24.02.08	40 Ex.	Seegraben Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
12.03.08	40 Ex.	Elsheim NSG Im Mayen/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.08	86 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
03.01.09	80 Ex.	Ordenswald Neustadt/NW	C. HEBER
01.03.09	50 Ex.	Laubenheimer Ried/MZ	M. SCHMOLZ
07.03.09	50 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER
11.10.09	200 Ex.	dz. Rheindürkheim/WO	J. BAYER
19.10.09	138 Ex.	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Bei planmäßigen Erfassungen wurden in Rheinhessen/MZ während des Wegzuges vom 05.10.-19.11.08 an 16 Tagen insgesamt 403 ziehende Exemplare und vom 06.09.-02.12.09 an 25 Tagen insgesamt 417 Exemplare registriert (H.-G. FOLZ).

Hybriden

Folgende Wasservogel-Hybridpaarungen konnten im Berichtszeitraum anhand phänotypischer Merkmale bestimmt werden:

Grau- x Kanadagans (*Anser anser* x *Branta canadensis*):

2008	7 Ex.	AK, MYK, MZ	M. JÖNCK, A. KUNZ, H. STRUNK
2009	9 Ex.	MYK, MZ, RP, WIL, WO	J. BAYER, H. BODES, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK

Schwanen- x Kanadagans (*Anser cygnoides* x *Branta canadensis*):

2008	2 Ex.	Lufwigshafen/LU, Silbersee/RP	J. BAYER
------	-------	-------------------------------	----------

Schwanen- x Graugans (*Anser cygnoides* x *A. Anser*):

2008	1 Ex.	Ludwigshafen/LU	J. BAYER
------	-------	-----------------	----------

Schwanen- x Streifengans (*Anser cygnoides* x *A. indicus*):

2008 und 2009	2 Ex.	Silbersee/RP	J. BAYER
---------------	-------	--------------	----------

Grau- x Streifengans (*Anser anser* x *A. indicus*):

2009	1 Ex.	Rhein bei Sankt Sebastian/MYK	M. JÖNCK
------	-------	-------------------------------	----------

Weißwangens- x Kanadagans (*Branta leucopsis* x *B. canadensis*):

2009	1 Ex.	Silbersee/RP	M. WINK
------	-------	--------------	---------

Rost- x Nilgans (*Tadorna ferruginea* x *Alopochen aegyptiacus*):

2009	3 Ex.	Bingen-Gaulsheim und Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
------	-------	-----------------------------------	------------

Spieß- x Stockente (*Anas acuta* x *A. platyrhynchos*):

2009	1 Ex.	Mechttersheimer Tongruben/RP	C. HEBER
------	-------	------------------------------	----------

Pfeif- x Bahamaente (*Anas penelope* x *A. bahamensis*):

2008	1 Ex.	Saarmündung/TR	S. TWIETMEYER
------	-------	----------------	---------------

Kolben- x Stockente (*Netta rufina* x *A. platyrhynchos*):

2008	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK
------	-------	-------------------	----------

Tafel- x Moorente (*Aythya ferina* x *A. nyroca*):

2008	2 Ex.	Auw an der Kyll/BIT, Silbersee/RP	J. BAYER, K.-H. HEYNE
2009	1 Ex.	Silbersee/RP	M. FEUERSENGER

Tafel- x Reiherente (*Aythya ferina* x *A. fuligula*):

2009 2 Ex. Dreifelder Weiher/WW

A. KUNZ

Moor- x Reiherente (*Aythya nyroca* x *A. fuligula*):

2009 1 Ex. Kistnerweiher/RP

V. HARRIES

7 Literaturverzeichnis

- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Liste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* **19**: 89-111. Einbeck.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland 2006-2008. – *Limicola* **23**: 257-334. Einbeck.
- DIETZEN, C. & H.-G. FOLZ (2008a): Ornithologischer Sammelbericht 2006 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **38**: 5-213. Landau.
- DIETZEN, C. & H.-G. FOLZ (2008b): Ornithologischer Sammelbericht 2007 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 5-102. Landau.
- DIETZEN, C. & V. M. SCHMIDT (2002): Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 7-196. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENB (2004): Ornithologischer Sammelbericht 2003 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **32**: 5-222. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENB (2005): Ornithologischer Sammelbericht 2004 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **33**: 5-200. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENB (2006): Ornithologischer Sammelbericht 2005 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **34**: 5-234. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G., HENB, E., EISLÖFFEL, F., JÖNCK, M. & C. HOF (2003): Ornithologischer Sammelbericht 2002 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 5-193. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G., JÖNCK, M. & E. LIPPOK (2008): Der Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 245-266. Landau.
- DIETZEN, C., SCHMIDT, V., FOLZ, H.-G., HEYNE, K.-H. & E. LIPPOK (2008): Die Vögel in Rheinland-Pfalz – Eine aktuelle Artenliste (Stand 01.04.2008). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 111-130. Landau.
- DORNER, I. (2009): Weißstorch *Ciconia ciconia* 2008 in Rheinland-Pfalz – eine Übersicht. – POLLICHA-Kurier **25/1**: 30-35. Bad Dürkheim.
- FOLZ, H.-G. (1995): Ein Steinadler (*Aquila chrysaetus*) bei Bingen/Rhein. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **7**, 4: 1095-1097. Landau.
- FOLZ, H.-G. (2009): Vorkommen und Schutz der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz **11**: 723-742. Landau.
- FOLZ, H.-G. (2010): Der Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau im Kontext neuerer rheinland-pfälzischer und deutscher Nachweise. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz **11**: 1151-1162. Landau.
- FOLZ, H.-G., VOLLMAR, B., SCHMIDT, V. M., SCHÄF, M. & C. DIETZEN (2007): Eine Mischbrut zwischen Neuntöter *Lanius collurio* und Rotkopfwürger *L. senator* in Rheinland-Pfalz. – *Limicola* **21**, 3: 218-232. Einbeck.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Passeriformes (4. Teil). Bd. **13/II**. Sittidae – Laniidae. – Aula Verlag Wiesbaden: 825-872. Wiesbaden.

- HECHLER, K. & P. HILSENDEGEN (2010): Weißstorch 2009 in Rheinland-Pfalz. – POLLICHA-Kurier **26/1**: 29-32. Bad Dürkheim.
- HENNINGS, H. (1961): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) in der Pfalz. – Ornithologische Mitteilungen **13**: 77.
- JANZ, U. (2010): Beobachtungen der Zippammer (*Emberiza cirlus*) in der Südpfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **11**, 4: 1199-1207. Landau.
- JANZ, U. (2011): Ergebnisse der Arbeitsgruppe Zaunammer-Monitoring: Bestand und Verbreitung der Zaunammer *Emberiza cirlus* in Rheinland-Pfalz 2009. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **42**: 151-157. Landau.
- JÖNCK, M. (2008): Erste Nachweise der Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **38**: 231-232. Landau.
- KRÄTZEL, K. & J. O. KRIEGS (2011): Vom Goldhähnchen-Laubsänger zur Schieferdrossel: Deutsche Seltenheitenkommission wird Deutsche Avifaunistische Kommission. – Falke **58**, 2: 67. Wiesbaden.
- KRÜGER, T. & J. A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. – Limicola **21**: 185-217. Einbeck.
- LIPPOK, E. & C. DIETZEN (2003): Anforderungen an eine Seltenheitenmeldung. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 207-214. Landau.
- LIPPOK, E. & C. DIETZEN (2011): Seltenheitenbericht 2008-2010. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **42**: 139-149. Landau.
- NIEHUIS, M. (2010): Zum Vorkommen des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **11**, 4: 1255-1280. Landau.
- RAMACHERS, P. (2010): Erfolgreiche Erstbrut des Bienenfressers (*Merops apiaster*) im Landkreis Kaiserslautern. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **11**, 4: 1311-1318. Landau.
- SISCHKA, N. (1983): Alpenbraunelle – *Prunella collaris*. In: Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (9). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **2**, 4: 792. Landau.

Manuskript fertiggestellt am 06. Februar 2011.

Anschriften der Verfasser:

Christian DIETZEN, Goethestr. 40, 68775 Ketsch, e-Mail: chrisdie21@aol.com
Julia BAYER, Bayernstr. 63, 67061 Ludwigshafen, e-Mail: juliab_ms@yahoo.de
Dominik BECKER, Zum Steinbruch 13, 54317 Korlingen, e-Mail: BeckerDominik@web.de
Hans-Georg FOLZ, Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt, e-Mail: folz-engelstadt@gmx.de
Peter RAMACHERS, Turnerstr. 7, 67732 Hirschhorn, e-Mail: PRamachers@aol.com
Michael SCHMOLZ, Am Hechenberg 48, 55129 Mainz, e-Mail: michael.schmolz@gnor.de

8 Artenregister

Alpenbraunelle (<i>Prunella collaris</i>)	120	Große Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	43
Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	80	Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	69
Amsel (<i>Turdus merula</i>)	114	Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)	128
Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)	63	Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	75
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	125	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	93
Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)	103	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	52
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	55	Halsbandsittich (<i>Psittacula krameri</i>)	88
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	122	Haselhuhn (<i>Bonasia bonasia</i>)	37
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	71	Haubenlerche (<i>Galerida cristata</i>)	100
Bergente (<i>Aythya marila</i>)	32	Haubenmeise (<i>Parus cristatus</i>)	99
Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	126	Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	37
Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	123	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	118
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	98	Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	120
Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>)	91	Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	100
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)	130	Heiliger Ibis (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	42
Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)	21	Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)	84
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	62	Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	18
Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	118	Hohлтаube (<i>Columba oenas</i>)	86
Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	98	Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	78
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	129	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	19
Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	121	Kappensäger (<i>Lophodytes cucullatus</i>)	34
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	84	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	127
Brandseeschwalbe (<i>Sterna sandvicensis</i>)	26	Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	65
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	116	Kiebitzregenpfeifer (<i>Pluvialis squatarola</i>)	63
Brautente (<i>Aix sponsa</i>)	25	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	109
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	77	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	111
Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	126	Kleinspecht (<i>Dryobates minor</i>)	93
Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	93	Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	29
Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)	96	Knutt (<i>Calidris canutus</i>)	78
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	109	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	99
Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	81	Kolbenente (<i>Netta rufina</i>)	30
Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	107	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	97
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	74	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	40
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	95	Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	50
Eiderente (<i>Somateria mollissima</i>)	33	Kranich (<i>Grus grus</i>)	56
Eisente (<i>Clangula hyemalis</i>)	33	Krickente (<i>Anas crecca</i>)	27
Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	39	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	88
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	91	Kuhreiher (<i>Ardeola ibis</i>)	44
Elster (<i>Pica pica</i>)	95	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	86
Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	129	Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	81
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	36	Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	29
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	101	Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	43
Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	105	Mandarinente (<i>Aix galericulata</i>)	25
Feldsperling (<i>Passer domesticus</i>)	120	Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	82
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	120	Mauerläufer (<i>Tichodroma muraria</i>)	111
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	128	Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	91
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	48	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	54
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	104	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	102
Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	66	Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	54
Flussseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	86	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	112
Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	73	Mittelmeermöwe (<i>Larus michahellis</i>)	83
Gänsegeier (<i>Gyps fulvus</i>)	50	Mittelsäger (<i>Mergus serrator</i>)	35
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	35	Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	93
Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachyactyla</i>)	112	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	108
Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	108	Moorente (<i>Aythya nyroca</i>)	30
Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	119	Mormellregenpfeifer (<i>Charadrius morinellus</i>)	68
Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	124	Moschusente (<i>Cairina moschata</i>)	25
Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	107	Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	117
Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	127	Nachtreiher (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	43
Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	127	Nebelkrähe (<i>Corvus cornix</i>)	97
Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	131	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	94
Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	63	Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	23
Graugammer (<i>Emberiza calandra</i>)	130	Nymphensittich (<i>Nymphicus hollandicus</i>)	88
Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	80	Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i>)	39
Graugans (<i>Anser anser</i>)	22	Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)	107
Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	45	Ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)	132
Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	116	Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	27
Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	93	Pfuhlschnepfe (<i>Limosa lapponica</i>)	70

Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	94	Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	119
Prachtaucher (<i>Gavia arctica</i>)	39	Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>)	65
Purpurreiher (<i>Ardea purpurea</i>)	45	Steppenhöve (<i>Larus cachinnans</i>)	84
Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	97	Sterntaucher (<i>Gavia stellata</i>)	39
Raubseeschwalbe (<i>Hydroprogne caspia</i>)	85	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	128
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	95	Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	27
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	102	Streifengans (<i>Anser indicus</i>)	23
Raufußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	54	Sturmmöve (<i>Larus canus</i>)	82
Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>)	89	Sumpfmöwe (<i>Parus palustris</i>)	99
Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	36	Sumpfohreule (<i>Asio flammeus</i>)	89
Regenbrachvogel (<i>Numenius phaeopus</i>)	69	Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	106
Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	31	Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	31
Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)	113	Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	96
Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>)	21	Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	99
Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	87	Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	62
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	133	Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	106
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	105	Temminckstrandläufer (<i>Calidris temminckii</i>)	79
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	51	Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	72
Rosellasittich (<i>Platyercus eximius</i>)	88	Thunbergshafstelze (<i>Motacilla thunbergi</i>)	125
Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	25	Trauerbachstelze (<i>Motacilla yarrellii</i>)	126
Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)	115	Trauerente (<i>Melanitta nigra</i>)	33
Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	55	Trauerschöpfchen (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	116
Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	38	Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	85
Rotkehlpieper (<i>Anthus cervinus</i>)	123	Triel (<i>Burhinus oedicedemus</i>)	63
Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	94	Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	62
Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	53	Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	87
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	74	Turnfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	56
Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)	21	Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	87
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	96	Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	69
Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	63	Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	101
Samtente (<i>Melanitta fusca</i>)	33	Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	90
Samtkopffragmücke (<i>Sylvia melanocephala</i>)	110	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	114
Sanderling (<i>Calidris alba</i>)	78	Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	36
Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	67	Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	62
Schelladler (<i>Aquila clanga</i>)	50	Waldhohleule (<i>Certhia familiaris</i>)	111
Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	34	Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	90
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	106	Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	104
Schlangenadler (<i>Circus gallicus</i>)	50	Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	89
Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	89	Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	70
Schmarotzerraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	80	Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	76
Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	26	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	56
Schneeammer (<i>Calcarius nivalis</i>)	130	Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	112
Schwanengans (<i>Anser cygnoides</i>)	23	Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	61
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	103	Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	99
Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	38	Weißbart-Seeschwalbe (<i>Chlidonias hybrida</i>)	84
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola rubicola</i>)	117	Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	47
Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>)	82	Weißwangengans (<i>Branta leucopsis</i>)	19
Schwarzkopf-Ruderente (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	18	Wellensittich (<i>Melospittacus undulatus</i>)	88
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	53	Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	92
Schwarzschan (<i>Cygnus atratus</i>)	18	Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	48
Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	93	Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	92
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	46	Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	122
Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	54	Wiesenschafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	124
Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)	46	Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	51
Seidenschwanz (<i>Bombycilla garrulus</i>)	111	Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	110
Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	79	Zaunammer (<i>Emberiza cirius</i>)	131
Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)	83	Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	90
Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	44	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	104
Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	114	Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	132
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	19	Zwergdommel (<i>Ixobrychus minutus</i>)	43
Sommeregoldhähnchen (<i>Regulus ignicapilla</i>)	110	Zwergmöwe (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	81
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	52	Zwergohreule (<i>Otus scops</i>)	89
Sperlingskauz (<i>Glaucidium passerinum</i>)	89	Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>)	34
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	28	Zwergscharbe (<i>Phalacrocorax pygmeus</i>)	42
Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)	130	Zwergschnepfe (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	71
Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>)	123	Zwergseeschwalbe (<i>Sterna albifrons</i>)	85
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	112	Zwergstrandläufer (<i>Calidris minuta</i>)	79
Steinadler (<i>Aquila chrysaetos</i>)	50	Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	37
Steinkauz (<i>Athene noctua</i>)	89		