

Ergänzungen/Berichtigungen

- 1.) NIEHUIS, M. & L. SIMON (1991): Zur Kenntnis der Verbreitung der Röhrenspinne *Eresus niger* (PETAGNA) in Rheinland-Pfalz (Araneae: Eresidae). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 6 (2): 287-297. Landau.
- NIEHUIS, M. (1991, 1996, 2005): Ergänzungen/Berichtigungen. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 6 (3, 1991: 877-878), 8 (2, 1996: 569-570), 10 (3, 2005: 1145-1147). Landau.
- NIEHUIS, M. (1995): Weitere Nachweise von Röhrenspinne (*Eresus niger*) Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) und Blutaderzikade (*Tibicina haematodes*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8 (1): 33-41. Landau.

Zusätzliche Zitate:

BERTKAU, P. (1878): [Über die Lebensweise des *Pompilus coccineus* FABR.]. – Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn 1878: 177-179. Bonn.

[*Pompilus coccineus* als Verfolger von *Eresus cinnaberinus* auf dem bereits berücksichtigten Rochusberg/Bingen (13. Juli 1878) und Hinweis auf eine Beobachtung von LEYDIG (August 1878) bei Cochem/Mosel]

DÖDERLEIN, L. (1913): Beobachtungen über elsässische Tiere. – Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft in Elsaß-Lothringen, Bd. V: 163-174. Straßburg.

[Der Autor verweist auf Belege und Funde im Elsaß (Molsheim, Rufach, Münster).]

REICHENSPERGER, A. (1931/32): Zoologische Inseln in der Rheinlandschaft, ihre Tierformen und die Bedeutung ihres Schutzes. – Nachrichten-Blatt für rheinische Heimatpflege (3. Naturschutzheft <Der Mittelrhein>) 3 (9/10): 320-325. Düsseldorf.

[Der Autor verweist auf den bereits berücksichtigten Fundort Rochusberg b. Bingen.]

- 2.) NIEHUIS, M. & L. SIMON (1994): Zum Vorkommen von Blutaderzikade – *Tibicina haematodes* (SCOP.) – und Bergzikade – *Cicadetta montana* (SCOP.) – in Rheinland-Pfalz (Homoptera: Cicadidae). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (2): 253-264. Landau.

NIEHUIS, M. (1994, 1996, 2005): Ergänzungen/Berichtigungen. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (3, 1994: 788-791), 8 (2, 1996: 569-570), 10 (3, 2005: 1145-1147).

NIEHUIS, M. & M. WEITZEL (1996): Die Bergzikade (*Cicadetta montana*) in Rheinland-Pfalz (Insecta: Homoptera: Cicadina). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8 (2): 439-447. Landau.

Zusätzliche Zitate:

DÖDERLEIN, L. (1913): Beobachtungen über elsässische Tiere. – Mitteilungen der Philomatischen Gesellschaft in Elsaß-Lothringen V: 163-174. Straßburg.

[Der Autor verweist auf Belege und Funde von *Tibicina haematodes* (Deutschland: Regensburg, Würzburg, Tübingen, Waldshut, Brandeck; Elsaß: Westhalten; Lothringen: Sierck/Mosel), *Cicadetta montana* (Elsaß: Türkheim) und *Cicada plebeja* (Elsaß: Rufach, wohl eingeschleppt).]

ENSLIN, E. (1921): Ein Ausflug in das Maintal. – Entomologisches Jahrbuch 30: Kalender für alle Insekten-Sammler für das Jahr 1921: 75-84. Frankfurt a. M.

[Nachweise von *Tibicina haematodes* und *Cicadetta montana* bei Karlstadt/Main; verweist auf Würzburg.]

3.) NIEHUIS, M. (2003): Fund der Nordischen Moosjungfer – *Leucorrhinia rubicunda* (L.) – in der Südpfalz (Insecta: Odonata) – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (1): 279-284. Landau.

NIEHUIS, M. (2004): Ergänzungen/Berichtigungen. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (2): 753-757. Landau.

Zusätzliches Zitat:

FELDWIESER, G. (2002): Zu einer Beobachtung von *Leucorrhinia rubicunda* (Nordische Moosjungfer) im Raum Reutlingen. – Mercuriale – Libellen in Baden-Württemberg, H. 2: 6-7. Ihringen.

[Der Beitrag stellt eine wichtige Ergänzung zur Literatur des mitgeteilten pfälzischen Erstnachweises dar.]

4.) NIEHUIS, M. & D. HEILIG (2004): Später Nachweis der Gemeinen Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus*) in der Pfalz (Insecta: Odonata). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (2): 703-704. Landau.

Zusätzliche Zitate:

SCHIEL, F.-J. (2004): Spätfund kleiner *Gomphus pulchellus*-Exuvien. – Mercuriale – Libellen in Baden-Württemberg, H. 4: 35. Ihringen.

[Der Autor hält gleichfalls „Frühstart in Folge des warmen Vorjahres-Sommers für möglich.]

WESTERMANN, K. (2002): Schlupf einer *Gomphus vulgatissimus* (Gemeine Keiljungfer) im August. – Mercuriale – Libellen in Baden-Württemberg, H. 2: 20-21. Ihringen.

[Es wird ebenfalls ein Zusammenhang mit einer außergewöhnlich langen Periode warmen Wetters hergestellt.]

5.) OTT, J. (2005): Die Große Moosjungfer – *Leucorrhinia pectoralis* (CHARPENTIER, 1825) – erneuter Nachweis für Rheinland-Pfalz (Odonata: Libellulidae). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (3): 921-926. Landau.

Zusätzliches Zitat:

KLEIN, J.-P. (2002): *Leucorrhinia pectoralis* (Große Moosjungfer) im Elsass. – Mercuriale – Libellen in Baden-Württemberg, H. 2: 13-16. Ihringen.

[Der Beitrag ergänzt die Hypothesen zur Herkunft der in der Pfalz erneut beobachteten Art.]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2003-2006

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ergänzungen/Berichtigungen 1409-1411](#)