

Nachweise von Reiherarten (*Ardeidae*) am Neuhofener Altrhein und Umgebung (Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen)

von **Rolf Schneider**

Nachfolgend sollen Beobachtungen der in den letzten Jahren am Neuhofener Altrhein und Umgebung beobachteten Reiherarten mitgeteilt werden.

Silberreiher (*Egretta alba*)

Die erste Beobachtung eines Silberreiherers am Neuhofener Altrhein erfolgte im Jahre 1996. Vom 10. -27. März hielt sich ein Exemplar am Altrhein auf. An folgenden Tagen konnte seine Anwesenheit festgestellt werden: 10., 13., 15., 17., 20., 22., 23., 24. und 27. Am 29. März wurde der Vogel nicht mehr beobachtet. Am 22. März wurde ein zweiter Vogel an den Klärteichen Offstein notiert. Im Herbst 1996 wurde wiederum ein Exemplar am Altrhein gesehen.

Ein längerer Aufenthalt eines Exemplares wurde 1997 festgehalten: Ich beobachtete den Vogel am 8., 9., 11., 12. und 14. März. Ein Aufbaumen des Reiherers auf einer Silberweide (*Salix alba*) bzw. auf einer Hybridpappel (*Populus x canadensis*) am Ufer direkt unterhalb der ruhenden Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) wurde am 24. März 1996 und am 11. und 12. März 1997 in der Abenddämmerung beobachtet. Am 23. März 1996 wurde der Vogel bemerkt, als er aus dem Fluge ins Wasser stieß und dabei einen kleinen Fisch erbeutete.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Am 4. November 1995 wurde ein Exemplar beobachtet, welches, vom Neuhofener Altrhein kommend, über die Weiher der „Blauen Adria“ nach Norden abflog (Mitbeobachter: Andreas BITZ, Mainz).

Der Seidenreiher wurde bereits in den 1950er Jahren am Altrhein nachgewiesen (SCHEITHE 1956).

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

Folgende Zufallsbeobachtungen vom Purpureiher gelangen mir am Neuhofener Altrhein: Am 26. August 1983 ein immatures Exemplar, am 2. und 29. Juli 1988 sowie am 20. August 1995 jeweils ein Ex., am 5. August 1996 ein adultes und ein juveniles

Ex. Ein weilers juv. Ex. wurde am 14. September 1994 am Weiher südlich des GIU-LINI-Geländes bei Rheingönheim festgestellt.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Am Altrhein ganzjährig in Anzahlen bis etwa zehn Ex. zu beobachten, größere Ansammlungen wie am 18. September 1990, als sich 32 Ex. am Südende aufhielten, sind selten.

Nachdem bereits im Jahre 1985 nördlich Neuhofen im Wildgehege Rheingönheim Horstbau festgestellt worden war, kam es im Jahre 1992 zur Gründung einer Brutkolonie. Folgende Horst- bzw. Brutpaaranzahlen wurden vermerkt: 1992 8 BP; 1993 16 Horste, davon mindestens 13 besetzt; 1994 keine Überprüfung; 1995 40 Horste, die aber wohl nicht alle besetzt waren; 1996 33 Horste (wohl nicht vollständig erfaßt); 1997 42 Horste, davon mindestens 29 besetzt. Die Horste befinden sich fast alle auf Schwarzerlen (*Alnus glutinosa*), fünf, davon 1997 einer besetzt sowie zwei von der Stockente (*Anas platyrhynchos*) und einer vom Weißstorch (*Ciconia ciconia*) benutzt, auf einer Silberweide sowie ein weiterer auf einer Schwarzkiefer (*Pinus nigra*).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Die Nachweise aus den Jahren 1988 und 1990 siehe SCHNEIDER (1991).

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Die Art hält sich vor allem im Winterhalbjahr gelegentlich am Altrhein auf. Folgende Beobachtungen wurden mir übermittelt: im Dezember 1988 und am 19. Dezember 1992 am Südende ein Ex. (C.M. BAUMANN) sowie am 10.10. 1996 nachmittags ein Ex. im Nordteil (A. VOGELGESANG).

Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

Bis Ende der 1980er Jahre in einiger Anzahl Brutvogel, danach im Bestand ein deutlicher Rückgang festzustellen. Konnte man in den 80er Jahren in den Sommermonaten praktisch bei jedem Besuch Zwergrohrdommeln feststellen, z.B. am 18. August 1988 sogar sieben Ex., sah ich im Jahre 1996 kein einziges Exemplar.

Literatur

- AMMERSBACH, R. (1941): Die Vogelwelt des Neuhofener Altrheins. – Mitteilungen des Vereins für Naturkunde und Naturschutz in der Westpfalz Pollichia (N.F.) **9**: 57-82. Kaiserslautern.
- SCHEITHE, K. (1956): Purpureiher, Seidenreiher und Weißbarteeschwalbe am Neuhofener Altrhein. – Ornithologische Mitteilungen **8**: 51. Wiesbaden.



Abb. 1: Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*). Foto: M. NIEHUIS



Abb. 2: Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*). Foto: O. NIEHUIS

SCHNEIDER, R. (1991): Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) am Neuhofener Altrhein. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **6** (3): 854-857. Landau.

Manuskript eingereicht am 2. Juli 1997.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Rolf Schneider, Freinsheimer Straße 32, 67067 Ludwigshafen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 1995-1998

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Rolf

Artikel/Article: [Nachweise von Reiherarten \(Ardeidae\) am Neuhofener Altrhein und Umgebung \(Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen\) 889-892](#)