


Keft 55-60 mlt je 24 Koppem
mlt je 9 Textblatt

coll. ylt: Bk 21/vm.50



www.Ginnpress.com

Tab. 1. Tiphia Morio Fabric.

- 2. Hylaeus cylindricus Fabric.
- 3. Hylaeus annulatus Fabric.
- 4. Hylaeus interruptus Panzer.
- 5. Andrena funebris Panzer.
- 6. Apis hispanica Fabric.
- 7. Apis lagopoda Fabric.
- 8. Apis pilipes Fabric.
- 9. Apis vestita Fabric.
- 10. Apis manicata Mas. Fabric.
- 11. Apis manicata Fem. Fabric.
- 12. Apis centuncularis Fabric.
- 13. Apis quadridentata Fabric.
- 14. Apis farfarisqua Scop.
- 15. Apis cornigera Roffi.
- 16. Apis pacifica Panzer.
- 17. Apis bimaculata Panzer.
- 18. Nomada ruficornis Fabric.
- 19. Nomada fucata Panzer.
- 20. Nomada varia Panzer.
- 21. Nomada succincta Panzer.
- 22. Nomada vaga Panzer.
- 23. Nomada furva Panzer.
- 24. Mutilla coronata Fabric.



Tiphia Morio Fabr.

J. 11-12

TIPHIA Morio.

Die Mohren-Raubwespe.


Tiphia Morio: nigra alis fuscis, femoribus posticis cinereo barbatis. *Fabric. Mant.*
Inf. T. I. n. 15. p. 280. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 227.

Habitat in Austria.

Statura et habitus *Tiph. femorat Fabr.* (Faun. germ. LIII. 3.) ast paulo maior. Totum corpus atrum nitidum hirtum. Anus in hoc specimine non fuscus, sed aequè ater ac reliquum abdomen. Tibiae anticae laeves, spinaque affixa lateri interiori armatae: mediae et posticae extus argute ferratae. Alae abdomine breviores fuscae. Abdominis segmenta postice praesertim subtus, setis argenteo-nitidulis albicantia. Abdomen nitidum atro-aeneum, apice vero magis hirtum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Fünf und funfzigstes Heft.





Hylaeus cylindricus Fabr.

HYLAEVS cylindricus.

Die walzenförmige Blumenbiene.

Hylaeus cylindricus: niger abdomine cylindrico: segmentis margine albicantibus, labio apice pedumque geniculis albis. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 302.*

Habitat frequens in pratis, hortis, flores frequentans.

Magnitudine variat. Abdomen saepius totum nigrum, pilis segmentorum detritis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Hylaeus annulatus Fabr.



Calliphora vicina L.

HYLAEVS annulatus.

Die geringelte Blumenbiene.

Hylaeus annulatus: niger fronte annulisque pedum albis. *Fabric. Ent. syst. T. III.*
n. 12. p. 305.

Apis annulata. *Fabric. Syst. Ent. n. 56. p. 387. Spec. Inf. T. I. n. 77. p. 486. Mant.*
Inf. T. I. n. 90. p. 305.

Apis annulata. *Linn. Syst. Nat. n. 33. p. 958. ed. XIII. n. 33. p. 2779. Faun.*
Suec. n. 1706.

Habitat haud infrequens primo vere in hortis, pratis, flores compositos et
tubulosos ibi melle plenos frequentans. Odorem ambrosiacum spargit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Hylaeus interruptus Mili.

HYLAEVS interruptus.

Die unterbrochene Blumenbiene.

Hylaeus interruptus: niger abdomine cylindrico basi rufo, segmentis margine interrupte albis, labio annulisque pedum flavis.

Habitat in Austria.

Magnitudo et statura *Hyl. floriformis*. Fabric. (Faun. Germ. XLVI. 13). Caput nigrum punctatum leviter pubescens, fronte villoso-nivea, labio flavo. Antennae supra nigrae subtus rufae. Oculi tufci. Thorax ater nitidus antice lineola tenui interrupta alba. Alae hyalinae nervo antico crassiori nigro, et in hoc puncto nigro. Abdomen cylindricum, atrum, nitidum, basi foveolatum lateque rufum, marginibus segmentorum e pilis albis interrupte ciliatis. Anus integer. Pedes nigri, tibiis anticis flavis immaculatis, medlis et posticis flavo annulatis. Tarsi omnes flavi.
a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Andrena funebris Mihi.

ANDRENA funebris.

Die Trauer - Waldbiene.

Andrena funebris: atra thorace albo - villoso fascia atra , fronte segmentisque abdominis utrinque macula alba.

Habitat in confinibus Austriae et Pannoniae.

Habitus *Apis punctat. Fabric.* (Faun. germ. XXXV. 22.) et *Ap. albopunct.* et *luctuos. Ross.* sed maior et distincta. Caput nigrum. Frons niveo - villosa. Labium atrum. Antennae nigrae. Oculi fusci. Thorax ater nitidus antice posticeque albido - villosus. Alae anticae obscuro - fuscae margine antico crassiori nigro, posticae albo hyalinae. Abdomen compressum atrum nitidum, segmentorum marginibus utrinque maculis quatuor villoso - niveis. Pedes omnes hirsuti atrii amaculati. Corpus subtus nigro - cinereoque villosum.



Apis hispanica Fabr.



Staph. curvispinosus Latr.

APIS hispanica.

Die spanische Biene.

Apis hispanica: hirsuta flavescens, abdomine apice nigro, pedibus intermediis fasciculato pilosis. *Fabric.* Syst. Ent. n. 10. p. 380. Spec. Inf. T. I. n. 11. p. 476. Mant. Inf. T. I. n. 12. p. 300. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 318.

Habitat in floribus hortorum.

Haec nostra neque staturam neque magnitudinem *Apis virginian.* *Fabric.* habet, sed aliam faciem minoremque potius staturam refert. Hinc cum *Ape virginian.* F. aequiparare nollem, quamvis haud dubitem, me veram *Ap. hispanic.* F. hic depinxisse.

Descriptioni *illustr.* *Fabric.* addo: Labium quidem flavum, verum frons aequè flavo-maculata: maculis utplurimum tribus, quarum media reliquis maior, punctis-

que supra duobus nigris, reliquae duae laterales angustiores minores apiceque bifidae.
Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Reliquum haud abludit.

a Magnitudo naturalis. b Caput antice visum auctum. c Pes intermedius
auctus.



Apis lagopoda Fabr.

J. St. f.

APIS lagopoda.

Die Haasenfuss - Biene.

Apis lagopoda: grisea pedibus anticis dilatato-ciliatis, tibiis posticis clavatis, ano emarginato. *Fabric.* Syst. Ent. n. 27. p. 383. Spec. Inf. T. I. n. 33. p. 480. Maut. Inf. T. I. n. 37. p. 301. Ent. syst. T. III. n. 48. p. 325.

Apis lagopoda. *Linn.* Syst. Nat. n. 27. p. 957. ed. XIII. n. 27. p. 2776. Fn. Suec. n. 1702.

Habitat in floribus, in hortis et pratis.

Neque *Sulzeri* fig. 17. tab. 27, neque *Christ.* fig. 3, tab. 9. utramque malam, huc referre volui, quippe neutra Apem nostram sistit.

a Magnitudo naturalis. b Pes anticus auctus. c Portio ani emarginata, aucta.



Apis pilipes Fabr.

APIS pilipes.

Die Federfüßige Biene. Der Federfuß. Der Harfuß.

Apis pilipes: grisea, pedibus intermediis fasciculato-pilosis. *Fabric. Syst.*
Ent. n. 28. p. 383. *Spec. Ins. T.I. n. 34. p. 480. Mant. Ins. T. I.*
n. 39. p. 302.

Apis plumipes. Schrank austr. n. 804.

Fuesly N. Magaz. 1 Th. p. 298.

Apis plumipes. Pallas spicil. zool. IX. p. 31. tab. 1. fig. 14. Deutsche Ausg.
Christ. Bien. p. 131.

Nicht sehr gemein in Oestereich, auch in unsern Gegenden,
setzt sich in Gärten auf blühende Gewächse.

Ob diese Biene genau diejenige seye, welche *Pallas*, und *Christ*
a. a. O. beschrieben haben, getraue ich mir nicht mit Zuverlässigkeit zu

bestimmen. Wahr ist es aber, dafs sie die *A. plumipes* des Hrn. Söhranks ist, — denn ich habe selbst ein Exemplar von ihr seiner gütigen Mittheilung zu verdanken. Dafs ich sie mit der Pallasischen hier in Verbindung bringe, geschieht lediglich auf dessen eigene Veranlassung; man findet sie im Füesl. Magaz. a. a. O.

a. Natürliche Grösse; ein vergrösserter Mittelfufs.



Apis vestita Fabr.

APIS vestita.

Die fuchssrothe Biene. L' Abeille maconne à poils roux. Geoffr.

Apis vestita: atra thoracis abdominisque dorso ferrugineo hirtis. *Fabric. Syst.*
Ent. T. III. n. 65. p. 329.

Apis nigra thoracis abdominisque basi superne lana rufa. *Geoffr. Inf. T. II. n. 4.*
p. 409.

Habitat in hortis in floribus.

1874

1874

1874

1874

1874

1874

1874



Apis manicata Mas Fabr.

Jac. Sturm fec.

APIS manicata Mas.

Die Esausbiene. Das Männchen. L' Abeille à cinq crochets. Geoffr.

Apis manicata: cinerea abdomine nigro: maculis lateralibus flavis, ano quinque-
dentato. *Fabric.* Syst. Ent. n. 36. p. 384. Spec. Inf. T. I. n. 45. p. 482. Mant.
Inf. T. I. n. 50. p. 302. Ent. syst. T. III. n. 73. p. 330.

Apis manicata. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 958. ed. XIII. n. 28. p. 2777. Fn. Suec.,
n. 1701.

Apis abdomine fasciis flavis interruptis, apice spina quintuplici recurva armato.
Geoffr. Inf. T. II. n. 3. p. 408.

Apis manicata. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 914. p. 103.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 32. fig. 11. 12.

Christ. Bien. p. 133. tab. 9. fig. 5.

Habitat primo aere in floribus Pomonae.

Facile *Apis manicata* Mas a femina dignoscitur. Abdomen enim in illo angustum lineare minus hirsutum et maculatum, et anus s. ultimum abdominis segmentum tricuspidatum est, subtusque duo cornua lemilunaria exferit, ad arctiorem forsitan copulam idonea. Nulla desuper nigredo in pedibus observatur.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Ultimum abdominis segmentum auctum.



Apis manicata Fem. Fabr.

J. St. fec.



APIS manicata. Femina.

Die Esausbiene. Das Weibchen. L' Abeille à cinq crochets. Geoffr.

Apis manicata. Fabric. l. l. c. c.

Apis manicata. Linn. l. l. c. c.

Habitat cum mare.

Non dubium est, diagnosin huius Apis a *femina* duntaxat petitam fuisse, siquidem iuxta hanc; anus s. ultimum abdominis segmentum, denticulis quinque terminatum est. Ad rem vero probe si attenditur, nunquam anus in quinque denticulos definit sed constans et semper, quemadmodum videtis in mare, tribus cuspidibus tantum terminatur. Superiores enim illi duo dentes, qui perperam cum ani tribus in quinque dentes conflantur, nullo modo *ad ultimum* segmentum pettinent, sed *ad penultimum*, ut clare id icone nostra demonstratur.

a. Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum. d Penultimum abdominis segmentum bidentatum, et ultimum tridentatum auctum.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Apis centuncularis Fabr.

J. St. fec.

APIS centuncularis.

Die Lappenbiene. L' Abeille charpentiere à ventre velu, et roux en dessous. Geoffr.

Apis centuncularis: nigra ventre lana fulva. *Fabric.* Syst. Ent. n. 4. p. 953. Spec. Inf. T. I. n. 59. p. 484. Mant. Inf. T. I. n. 70. p. 304. Ent. syst. T. III. n. 98. p. 337.

Apis centuncularis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 953. ed. XIII. n. 4. p. 2771. Fn. Suec. n. 1687. *Apis* nigra abdomine supra lineis albis, subtus lana fulva.

Geoffr. Inf. T. II. n. 5. p. 405.

Rai Inf. p. 242. n. 6.

Reaum. Inf. T. VI. tab. 10. fig. 3. 4.

Scop. carn. n. 795. ic. 795.

Scop. Ann. hist. nat. IV. p. 15. n. 15.

Scrank austr. n. 815.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 927. p. 108.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 262. fig. 6. 7.

Christ. Bien. p. 165. tab. 13. fig. 5.

Habitat haud infrequens in ditione nostra intra terram, ibidemque plures nidos cylindricos, tanquam centurculos ex foliis Rosae formans. Videtis plura apud Cl. *Christ.*, qui historiam naturalem huius *Ap.* egregie exposuit.

Monendum diagnosin huius *Apis*, quae vulgo a ventre lana fulva obducto defumitur, non bonam esse posse, quoniam illi soli haud competit. Novi enim plures alias *Apum* species, quarum venter aequè lana fulva obducitur, quae vero multum ab illa distant.

Alter sexus mandibulis validis exsertis dilatatis forcipatis quadridentatisque gaudet.

a Magnitudo naturalis. b Mandibula alterius sexus aucta.



Apis quadridentata Fabr.

APIS quadridentata.

Die vierzähnlige Biene.

Apis quadridentata: fusca abdominis cingulis quinque albis, ano quadridentato: dentibus intermediis bifidis. *Fabric.* Syft. Ent. n. 49. p. 38F. *Spec. Inf.* T. I. n. 68. p. 485. *Mant. Inf.* T. I. n. 79. p. 305. *Ent. syst.* T. III. n. 112. p. 340.

Apis quadridentata. *Linn.* Syft. Nat. n. 29. p. 958. ed. XIII. n. 29. p. 2778. *Fn. Suec.* n. 1703.

Habitat in Aüßria,

Abdomen triangulare nigrum vix lucidum, marginibus segmentorum utrinque maculis e pilis ciliatis albis, quae in dorso in tot fascias medio angustatas confluent. Vltimum abdominis segmentum denticulis sex terminatum est, qui vero pro quatuor

tantum numerantur, quoniam intermedii singulari dichotomia dividuntur. Segmentum penultimum utrinque denticulo armatum. Caput magnum, eiusque pars prona undique tomento flavo tectum est.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Abdominis segmentum penultimum et ultimum.



Apis farfari sequa Scop.

APIS farfarisequa.

Die Huflattig Biene.

Apis farfarisequa: nigro rufo-tomentosa, abdomine ovato. Scop. carn. n. 800.
ic. 800.

Eucera farfarisequa. Scop. Ann. hist. nat. IV. n. 2. p. 9.

Christ. Bien. p. 175.

Habitat in Farfaræ floribus.

Totum corpus rufo villosum. Abdomen ovatum nigrum cingulis quinque vil-
loso-rufis. Antennæ tenues. Alæ albae nervis vix conspicuis. Femora obscura.



Apis cornigera Rossi.

APIS cornigera.

Die Hörnrüsslichte Biene.

Apis cornigera: hirsuta, capite thoraceque cinereo, abdomine subrufo, fronte bicorni. *Ross.* Faun. etrusc. T. II. n. 925. p. 108.

Habitat rarior apud nos. Dn. *Iac. Sturm.*

Statura diversa ab *A. bicorni*, qua minor est, et colore pilorum omnino distincta. Caput minus quam in *A. bicorni*, fronte non nigra, sed pilis fuscis rarioribus hirta. Thorax tum superne, quam inferne griseo-cinereus. Abdomen pallide-rufum, non fulvum, uti in *A. bicorni*. Reliqua similia. *Rossi* l. c.

Eandem esse cum Rossiana Apem, quam in nostris terris primum vidit Dn. *Sturm*, specimine ipso confirmatur, quod Cl. *Rossi* mecum benevole ipse communicavit.

a Magnitudo naturalis. b Caput antice pictum ut corniculorum memorabile par in conspectum prodire possit, et lente auctum.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888



Apis pacifica Mihi.

J. St. f.

APIS pacifica.

Die Friedebringende Biene.

Apis pacifica: atra griseo pubescens, abdomine obtuso cingulis quatuor villosis albis, ano denticulato, subtus lana alba.

Habitat Norimbergae. Dn. Iac. Sturm.

Habitus *Ap. centunculi*. F. sed triplo minor. Antennae nigrae thorace breviores. Frons flava villosa. Caput orbitaque oculorum griseo-pubescentia. Lingua exserta praelonga rufa. Oculi laete virides, qui color vero cum vita perit, tunc fuscescentes. Thorax niger griseo-pubescentia, postice corona densius pubescente cinctus. Abdomen atrum punctatum lucidum cingulis quatuor villosis albis: apice obtuso emarginato atque denticulato. Alae cinereae hyalinae. Pedes nigri, subnudis tarsis omnibus subfuscis. Corpus subtus albo-lanatum.

a Magnitudo naturalis. b Ultimū abdominis segmentum auctum.

[Faint, illegible title text]

[The main body of the document contains several paragraphs of extremely faint, illegible text. The text appears to be a formal report or a scientific paper, given the header and the structured layout. The ink is very light, making the words impossible to decipher.]



Apis bimaculata Mihi.



APIS bimaculata.

Die zweyfleckigte Biene.

Apis bimaculata: atra griseo pubescens, fronte flava maculis duabus atris, abdomine apice bifido, fasciis apiceque griseis.

Habitat Norimbergae. Dn. Iac. Sturm.

Habitus *Apis mellificae* aff duplo minor. Caput magnum nigrum vertice griseo villoso, fronte pubescente flava maculis duabus oppositis rotundatis atris, labio mandibulisque flavis. Antennae breves, supra nigrae subtus rufae. Oculi in viva Ape laete virides, qui vero color cum vita perit et in lacre fuscum transmutatur. Thorax ater punctatus griseo pubescens. Alae albae hyalinae apice aveniae. Abdomen ovatum nigrum, segmentorum trium marginibus albido villosis, reliquum prorsus albedine

villosa tectum. Anus mucrone bifido terminatur. Femora intermedia posticaque nigra, antica villosa - albida. Tibiae omnes flavo - villosae, posticae hirsutiores. Corpus subtus lucidum subvillosum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.



Nomada ruficornis Fabr.



NOMADA ruficornis.

Die rothhörnichte Trauerbiene.

Nomada ruficornis: antennis pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine ferrugineo luteo variegato. *Fabric.* Spec. Inf. T. I. n. 4 p. 488. *Mant.* Inf. T. I. n. 6 p. 307. *Ent. syst.* T. III. n. 7. p. 347.

Apis ruficornis. *Linn.* Syst. Nat. n. 34. p. 958. ed. XIII. u. 34. p. 2795. *Fa. Suec.* n. 1707.

Habitat in Austria.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Phragmites australis (Cav.) Rostk Schmidt

Al



Nomada fucata Mihi.



NOMADA fucata.

Die geschminkte Trauerbiene.

Nomada fucata: antennis, pedibus abdominisque basi ferrugineis, abdomine flavo fasciis quatuor nigris.

Habitat in Austria.

Habitus et statura *Nom. zonat* Faun. germ. LIII. 20. cui similis. Antennae ferrugineae nudae, articulis extimis paullo crassioribus. Caput nigrum punctatum nudum opacum. Labium orbitaque oculorum ferruginea. Oculi grisei. Thorax ater elevatus leviter pubescens, antice punctis duobus, solitario loco scutelli, duobusque ante alas callosis flavis. Alae fuscae margine antico obscuriori nigro. Abdomen ovatum glabrum nitidum, segmento primo ferrugineo, aliquis flavis, omnibus nigro fasciatis. Pedes omnes ferruginei. Pectus nigrum immaculatum. Abdomen subtus nitidum nigrum obscure flavo-fasciatum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Nomada varia Miki

1857, Feb.

NOMADA varia.

Die bunte Trauerbiene.

Nomada varia: antennis pedibusque ferrugineis, abdomine flavo antice rufo, fasciis tribus nigris.

Habitat in Austria.

Similis *Nomad. Lireol.* Faun. germ. LIII. 23 ast minor et diversa. Caput atrum pubescens. Labium, macula supralabiali, orbitaque oculorum flavis. Lingua exserta fusca. Oculi fusci obscure maculati. Antennae ferrugineae medio nigricantes, articulo primo nigro subtus ferrugineo. Thorax ater opacus punctatus subpubescens, lineola antica tenui interrupta, puncto sub alis, et alio calloso ante alas solitario loco scutelli elevato flavis. Alae hyalinae venis flavicantibus. Abdomen

glabrum nitidum, segmento primo atro macula transversa rufa, reliquis flavis margine postico nigro fasciatis. Arus acuminatus flavus pubescens. Pedes omnes ferruginei, femoribus intermediis et posticis ad insertionem nigris. Pectus atrum pubescens basi utrinque lineola flavo. Abdomen subtus nigrum marginibus segmentorum flavis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Nomada succincta Mihi.

NOMADA succincta.

Die gebänderte Trauerbiene.

Nomada succincta: antennis ferrugineis, scutelli punctis duobus flavis, abdomine flavo fasciis quatuor nigris.

Habitat in Austria.

Antennae ferrugineae, articulo primo supra nigro, subtus flavo. Labium nigrum puncto medio flavo. Frons nigra macula utrinque triangulari nigra. Caput atrum leviter pubescens. Oculi fusci nigro maculati. Thorax elevatus ater subpubescens punctis exasperatus, antice lineola, puncto sub alis et alio calloso ante alas, duobus loco scutelli totidemque infra scutellum flavis. Alae magnae hyalinae apice fuscae nervis et venis obscurioribus. Abdomen ovatum nitidum glabrum, basi nigrum,

segmentis omnibus flavis postice nigro-fasciatis: anus & ultimum segmentum immaculatam nigrum. Tibiae anticae et intermediae flavae immaculae, posticae flavae macula media nigra. Femora nigra geniculis flavis. Pectus atrum immaculatum. Abdomen subius flavum angustius quam supra nigro fasciatum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Nomada vaga Miki.

J. St. fcc.

NOMADA vaga.

Die herumschweifende Trauerbiene.

Nomada vaga: atra scutello punctis duobus, abdomine maculis utrinque tribus marginalibus, ano pedibusque flavis.

Habitat in Austria.

Antennae suprae nigrae subtus ferrugineae. Caput magnum atrum opacum punctatum leviter pubescens. Oculi cinerei. Labium, macula supralabiali orbitaque oculorum dimidiata flavis. Thorax elevatus ater punctatus pubescens, puncto ante alas, et alio calloso sub alis, duobusque minutis loco scutelli flavis. Alae hyalinae apice fuscescentes. Abdomen atrum glabrum nitidum, margine laterali utrinque maculis triangularibus gradatim minoribus, anoque flavis. Pedes omnes flavi, tibiis femoribusque macula media fusca. Pectus atrum argenteo pubescens nitidulum. Abdomen subtus nigrum flavo fasciatum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885



Nomada furva Mihi.



NOMADA furva.

Die düstere Trauerbiene.

Nomada furva: thorace immaculato, abdomine ovato nigro obscure flavo fasciato, pedibus nigris flavo - maculatis.

Habitat in Austria.

Minuta. Antennae supra nigrae, subtus ferrugineae, articulo primo penitus nigro. Labium flavum. Frons supra labium argenteo - villosa. Caput nigrum pubescens. Oculi fusci. Thorax ater immaculatus: excepto puncto ante alas et sub alis in pectore calloso flavis. Alae aquae hyalinae apice subfuscae. Scutellum immaculatum. Abdomen ovatum glabrum nitidum atrum, obscure et indistincte fasciatum. Anus pubescens. Pedes omnes nigri flavo maculati. Pectus nigrum immaculatum. Abdomen subtus nitidum flavum segmentorum marginibus nigris.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Mutilla coronata Fabr.

J. St. joo.

MUTILLA coronata.

Die gekrönte Mutille.

Mutilla coronata: nigra fronte cinerea, thorace rufo, abdomine puncto strigisque duabus argenteo albis. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 369.*

Habitat in Austriae et Pannoniae confinibus.

Affinitas summa *Mutill. maur. Fabr.* (Faun. germ. XLVI. 18) at omnino distincta.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

-
- Tab. 1. *Andrena lucida* Panzer.
— 2. *Andrena nitida* Panzer.
— 3. *Andrena aenea* Fabric.
— 4. *Apis subaurata* Rossi.
— 5. *Apis adunca* Panzer.
— 6. *Apis vulpina* Panzer.
— 7. *Apis quadrimaculata* Panzer.
— 8. *Apis fuscata* Panzer.
— 9. *Apis rotundata* Fabric.
— 10. *Apis rufa* Fabric.
— 11. *Apis fusca* Christ.
— 12. *Apis varians* Rossi.
— 13. *Apis dumetorum* Panzer.
— 14. *Apis atra* Scopol.
— 15. *Apis aterrima* Panzer.
— 16. *Apis fuliginosa* Panzer.
— 17. *Apis flavipes* Panzer.
— 18. *Apis fulviventris* Panzer.
— 19. *Apis albiventris* Panzer.
— 20. *Apis ventralis* Panzer.
— 21. *Apis byssina* Panzer.
— 22. *Apis globosa* Scopol.
— 23. *Aps albilabris* Panzer.
— 24. *Apis sphegoides* Panzzer.



Andrena lucida Mihi.

J. St. f. enl.



ANDRENA lucida.

Die glänzende Waldbiene.

Andrena lucida: thorace villoso ferrugineo, abdomine atro nitido margine laterali antice, pedibusque villoso ferrugineis.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum villositate nigra barbatum. Oculi nigri. Antennae filiformes torulosae nigrae. Thorax villoso ferrugineus imprimis margine laterali et postico. Alae hyalinae margine antico crassiori nigredine saturata ad apicem nedum excurrente. Abdomen ovatum, apice acuminatum, supra intraque nitidum, antice margine laterali ferrugineo villosum, postice utrinque nigro villosum. Pedes ferrugineo villosi, femoribus atris minus villosis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Sechs und funfzigstes Heft.



Andrena nitida Mihi.



[Faint, illegible text, possibly a title or description.]

ANDRENA nitida.

Die glatte Waldbiene.

Andrena nitida: thorace nigro cinereo villoso, abdomine atro nitido fasciis tribus interruptis albis.

Habitat Norimbergae.

Similis *Andren. lucid.* ast distincta. Caput nigrum. Frons villositate cinerea barbata. Antennae nigrae thorace breviores. Thorax ater immixta flavedine cinereo villosus. Alae albae nervo antico crassiori nigro. Abdomen ovatum compressum atrum nitidum, segmentis tribus 2. 3. 4. c pilis niveis interrupte albo fasciatis. Pedes secundi et tertii paris supra pallido hirsutissimi, supus nigri nudiusculi nitidi. Femora antica nigra nuda tibiis tarsisque pallido hirsutissimis. Corpus subtus nigrum segmentorum marginibus postice griseo villosis. Variat statura minori et villositate pedum flava, cinerea et pallida. Corpus subtus magis vel minus villosum flavumque.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Andrena aenea Fabr.



Apis mellifera

ANDRENA aenea.

Die metallfärbige Waldbiene. L'Abeille verdâtre et cuivreuse. Geoffr.

Andrena aenea: aenea griseo-pubescent. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 3. p. 309.
Syst. Ent. n. 2. p. 376. Spec. Inf. T. I. n. 3. p. 473. Mant. Inf. T. I. n. 4.
p. 298.

Apis aenea. *Linn.* Syst. Nat. n. 20. p. 955. ed. XIII. n. 20. p. 2793. Fn. Suec.
n. 1695.

Apis tota viridi cuprea. *Geoffr.* Inf. T. II. n. 15. p. 415.

Rossi Fn. Etrusc. T. II. n. 894. p. 96.

Stöck. carn. n. 809. ic. 809.

Habitat Norimbergae.

Antennae filiformes tenues. Abdomen rotundatum globosum. Villositas in nostro specimine flava est. Frons flava pubescit. Alae obscurae apice fuscae. Pedes viridi aenei, tarsis omnibus flavo hirsutis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Apis subaurata Rossi.

J. St. fce.



APIS subaurata.

Die ziemlich goldene Biene.

Apis subaurata: subaurata pubescens, tibiis tarsisque ferrugineo-flavis. *Rossi Faun. Etrusc. Mant. n. 321. p. 144.*

Habitat in Austria.

Tibiae in nostro specimine minus ferrugineo hirsutae tarsi, qui penitus flavo hirsuti.

Andren. aeneae. Fabric. varietas esse nequit, propter staturam habitumque prorsus alienum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879



Apis adunca Mihich.



Apis mellifera L.

APIS adunca.

Die am After hackenförmige Biene.

Apis adunca: nigra thorace flavo villoso, abdominis segmentorum marginibus postice flavis, segmento penultimo utrinque spina incurva, ultimo ferrulato.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum punctatum vertice calvo, occipite flavo villoso. Frons flava villosa. Labium pallide barbatum. Thorax ater flavo-villosus. Abdomen oblongum thorace angustius atrum nitidum punctatum segmentorum marginibus postice c pilis flavis, segmento penultimo margine laterali utrinque spina adunca, ultimoque argute ferrulato. Pedes omnes nigri: tarsis flavo hirsutis. Corpus subtus atrum minus villosum. Alae subobscurae apice fuscae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Penultimum et ultimum abdominis segmentum auctum.

1878

1878

1878

1878

1878



Apis vulpina Mihi.



APIS vulpina.

Die Fuchs - Biene.

Apis vulpina: ferrugineo villosa, antennarum articulo primo fronte labioque flavis, abdomine nigro, segmentis postice ferrugineo villoso fasciatis.

Habitat Norimbergae.

Magnitudo et habitus *Ap. mellific. F.* Caput nigrum villosum. Frons flava albido pubescens punctis duobus minutis nigris. Labium flavum supra punctis duobus nigris. Mandibulae flavae apice fuscae. Oculi magni fusci. Vertex calvus stemmatibus tribus lucidis. Antennae thorace breviores nigrae, articulo primo flavo. Thorax ater ferrugineo villosus. Alae hyalinae nervo antico crassiori venisque nigris. Abdomen ovatum nigrum sublucidum, segmento primo toto, reliquis margine postico villoso ferrugineo fasciatis. Thorax subtus et abdomen albido villosa. Pedes supra nigri subtus flavo villosi, femoribus clavatis minus villosis.

a. Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.



Apis quadrimaculata Mihi.

J. Sturm fec.



APIS quadrimaculata.

Die vierfleckigte Biene.

Apis quadrimaculata: atra cinereo pubescens, fronte flava punctis quatuor strigaeque transversa nigris, abdomine nigro segmentis postice e pilis cinereis fasciatis, tarsis posticis ferrugineo villosis.

Habitat Norimbergae.

Habitus et statura *Ap. bimacul.* (Faun. germ. LV. 17) ast maior et distincta. Caput nigrum vertice calvo stemmatibus tribus lucidis. Frons flava albido pubescens, maculis antice et postice duabus subrotundis, strigaeque intermedia transversa nigris. Labium flavum. Mandibulae flavae apice fasciae. Oculi magni fusci. Antennae nigrae thorace breviores articulo primo flavo. Thorax ater cinereo pubescens. Alae hyalinae nervo antico crassiori venisque nigris: apice aveniae. Abdomen ovato globosum atrum, marginibus segmentorum postice pilis cinereis fasciatis. Corpus subrus albido pubescens. Pedes supra nigri subtus albido pubescentes tarsis fuscis, posticis ferrugineo villosis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.





Apis furcata Mihi.



APIS furcata.

Die gablichte Biene.

Apis furcata: cinereo pubescens atra, antennarum articulo primo fronte labioque flavis, abdomine apice furcato, tarsis ferrugineis.

Habitat Norimbergae.

Magnitudo statura et habitus *Ap. mellific. Fabric.* Caput nigrum vertice nigro pubescente, occipite rufo villosa. Frons flava lineolis angustis brevibusque duobus antice nigris. Labium flavum albido pubescens. Mandibulae fuscae. Antennae nigrae articulo primo subius flavo. Thorax niger antice posticeque cinereo pubescens. Alae fuscescentes nervo antico crassiori venisque fuscis. Abdomen ovatum nigrum cinereo pubescens inprimis ad margines segmentorum. Anus s. ultimum abdominis segmentum mucrone bifido patulo insigne. Pedes supra nigri subtus albido villosi tarsis omnibus ferrugineo villosis. Corpus subius flavo pubescens.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum. d Anus s. ultimum abdominis segmentum auctum.





Apis rotundata Fabr.



APIS rotundata.

Die rundbauchigte Biene.

Apis rotundata: nigra cinereo hirta, abdomine subgloboso: segmentorum marginibus albis. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 80. p. 332. *Mant. Inf.* T. I. n. 57. p. 303.

Habitat Norimbergae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.



Apis rufa Fabr.



APIS rufa.

Die rothbauchigte Biene.

Apis rufa: fusca abdomine rufescente, fronte alba. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 88. p. 334. *Syst.* Ent. n. 39. p. 385. *Spec. Inf.* T. I. n. 53. p. 483. *Mant.* Inf. T. I. n. 64. p. 304.

Apis rufa. *Linn.* *Syst. Nat.* n. 9. p. 954. ed. XIII. n. 9. p. 2772. *Faun. Suec.* n. 1690.

Rossi *Fn. Etrusc.* T. II. n. 913. p. 103.

Habitat Norimbergae.

Antennae tenues nigrae thoracis longitudine. Caput et thorax atro caerulea. Totum corpus rufo-pubescent, imprimis margines segmentorum, qui densiori lanugine tecti. Apex abdominis hirsutus atro caeruleus. Pedes atro caerulei, femoribus clavatis, tibiis posticis dilatatis incurvis, tarsis rufis. Corpus subtus nigrum fere nudum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis fusca Chrif.



Apis mellifera

APIS fusca.

Die rothbraune Biene.

Apis fusca: atra pubescens abdomine subtus, marginibus segmentorum, tarsisque fulvo villosis.

Christ Naturg. d. Bien. p. 182. tab. 14. fig. 10.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum nigroque pubescens. Antennae nigrae. Alae obscurae nervo crassiori antico nigro. Thorax ater nigro villosus. Abdomen ovatum nigrum marginibus segmentorum fulvo fasciatis. Pedes nigri subnudi tarsis ferrugineo villosis. Pectus nigro pubescens: venter ut in *Ap. Centuncul.* F. lana fulva tecus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis varians Rossi.

J. St. f. c.



APIS varians.

Die veränderliche Biene. L'Abeille maconne à poils roux. Geoffr.

Apis varians: nigra thorace abdominisque basi superne hirsuto fulvis. *Rossi* Faun.

Etrusc. Mant. n. 317. p. 142.

Geoffr. Inf. T. II. n. 4. p. 409.

Habitat Norimbergae.

Haec pictura *marem* Ap. variant. *Ross.* demonstrat, et ut equidem ego arbitror penitus cum l. c. descripta Ape convenit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis dumetorum Mihi.



Calliphora vicina L.

APIS dumetorum.

Die Hecken - Biene.

Apis dumetorum: nigra flavo pubescens, abdominis segmentis margine albido pubescentibus, ano fulvo.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum nigro pubescens. Oculi fusci. Antennae nigrae. Labium flavo pubescens. Thorax ater flavo tomentosus. Alae fuscentes nervo marginali antico crassiori nigro. Abdomen atrum lucidum segmentis margine albido pubescentibus. Anus fulvo tomentosus. Corpus subtus cinereo pubescens, ventre subnudo nitido. Pedes supra nigri, subtus flavo villosi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis atra Scopol.

S. St. Jee



APIS atra.

Die schwarze Biene.

Apis atra: nigerrima tota, fronte et thorace antice ac postice albo tomentosis,
abdomine subrotundo alis semifuscis. *Scopol. carn. n. 797. ic. 797.*

Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 917. p. 105. '

Schrank. austr. n. 814.

Christ. Bien. p. 174. tab. 14. fig. 1.

Habitat Norimbergae.

Pedes nigri tarsis fuscis. Thorax albido tomentosus fascia nigra.



Apis aterrima Mihi.

J. St. f. sc



APIS aterrima.

Die ganz schwarze Biene.

Apis aterrima: subnuda atra abdomine atro glabro nitido punctato, segmentis margine lucidis, alis atro fuscis, tarsis flavis.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum nudum punctatum. Frons atra punctata, margine laterali utrinque flavo pubescens. Oculi fusci. Thorax ater punctatus subnudus seu leviter pubescens. Alae atro fuscae macula apicis marginali atra opaca. Abdomen cylindricum atrum nudum glabrum punctatum, segmentis margine testaceo-lucidis, lateribus parum flavo villosis. Pedes nigri subnudi tarsis flavo tomentosis. Corpus subtus subnudum glabrum nitidum, abdominis segmentis margine subtus lucido testaceo.

a Magnitudo naturalis b Eadem aucta.



Apis fuliginosa Mihi.



Apis mellifera L.

APIS fuliginosa.

D i e R u s s - B i e n e .

Apis fuliginosa: pubescens atra, abdomine atro subnudo segmentis margine laterali utrinque villoso albidis, alis fuliginosis, tarsis fuscis.

Habitat Norimbergae.

Caput parvum atrum, vertice calvo, occipite cinereo pubescenti, fronte leviter cinereo pilosa, labio cinereo barbato. Oculi fusci. Antennae nigrae breves. Thorax ater dorso subnudus, antice posticeque magis cinereo pubescens. Alae atro fuscae s. fuliginosae, nervo antico marginali crassiori nigro. Abdomen cylindricum atrum subnudum glabriusculum, segmentis margine laterali utrinque villoso albidis. Pedes nigri nudiusculi nigro subtus subhirsuti, tarsis flavo villosis. Corpus subtus atrum subnudum, ventre lana fulva.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis flavipes Mihi.



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date.]

APIS flavipes.

Die gelbfüßichte Biene.

Apis flavipes: pubescens atra thorace tibiis tarsisque flavo villosis, abdomine subcompresso segmentis margine albido pubescentibus.

Habitat Norimbergae.

Habitus et statura *Andren. succin. Fabric.* Caput nigrum flavo pubescens. Oculi fusci. Antennae nigrae. Thorax ater flavo pubescens. Alae obscuro subflavae, nervo antico venisque subflavicantibus. Abdomen subcompressum atrum nitidum segmentis margine postice e pilis albis fasciatis. Annus s. ultimum abdominis segmentum rimosum fulvum. Pedes nigri, tibiis tarsisque flavo hirsutis. Corpus subtus nigrum flavo pubescens, abdominis segmentis margine flavo pubescentibus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877



Apis fulviventris Mihi.



[Faint, illegible text, possibly a title or description, located below the insect illustration.]

APIS fulviventris.

Die rothbauchigte Biene.

Apis fulviventris: cinereo pubescens nigra abdomine cylindrico nitido segmentorum marginibus albido pubescentibus, ventre lana fulva.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum occipite griseo pubescente, fronte rufo villosa, labio albido barbato. Oculi fusci. Antennae nigrae thorace breviores. Thorax griseo pubescens dorso atro lucido. Alae anticae fuscae apice dilutiores. Abdomen superiolatum cylindricum atrum lucidum segmentorum marginibus albido pubescentibus: ventre lana fulva. Pedes subnudi nigri tarsis fuscis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis albiventris Mihi.

J. St. fce.

APIS albiventris.

Die weissbauchigte Biene.

Apis albiventris: atra albido pubescens abdomine ovato segmentorum marginibus albido pubescentibus, ventre lana nivea.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum occipite cinereo pubescente, labio albido barbato, mandibulis exsertis fuscis. Antennae nigrae breves. Oculi globosi fuscii. Thorax ater albido pubescens. Alae albae nervo antico marginali venisque atris. Abdomen subovatum nigrum lucidum punctatum segmentorum marginibus albido pubescentibus: ventre lana densa nivea. Pedes omnes nigri supra nudi subtus albido pubescentes.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis ventralis Mihi.



APIS ventralis.

Die bauchigte Biene.

Apis ventralis: atra subnuda, abdomine nitido punctato segmentorum marginibus exalbidis, ventre lana rufa.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum punctum subnudum s. leviter pubescens, labio antice reflexo, mandibulis atris. Antennae nigrae. Oculi fusci. Thorax ater punctatus dorso subnudo lateribus parum pubescentibus. Alae flavescens nervo antico crassiori marginali vix ad apicem excurrente nigro. Abdomen ovatum nigrum punctatum segmentorum marginibus excoloribus, ventre lana rufa. Pedes nigri subnudi tarsis subfuscis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis byssina Mihi.



APIS byssina.

Die Seiden - Biene.

Apis byssina: nigra flava pubescens, abdomine subovato lucido punctato, segmentorum marginibus obsolete albidis, ventre lana fulva.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum punctatum flavo pubescens, labio flavo barbato. Antennae nigrae. Thorax ater flavo pubescens praesertim postice, dorso subnudo. Alae subfuscae nervo antico crassiori nigro. Abdomen subovatum atrum punctatum nitidum segmentorum marginibus obsolete albedo pubescentibus, ventre lana fulva. Pedes supra nigri subtus flavo hirsuti.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis globosa Scopoli.



[Faint, illegible text, possibly a signature or title]

APIS globosa.

Die kuglichte Biene.

Apis globosa: nigra rufo pubescens, abdomine subrotundo, segmentorum margine antico longioribus pilis ciliato. *Scopol.* carn. n. 798. ic. 798.

Habitat Norimbergae.

Corpus subnudum aut leviter griseo pubescens. Abdomen globosum atrum nitidum, segmentorum marginibus in hoc specimine pube omni orbatis. Venter lana fulva. Alae obscuro flavicantes nervo antico crassiori nigro.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Apis albilabris Mihi.



APIS albilabris.

Die weifslippigte Biene.

Apis albilabris: atra pubescens labio niveo albido barbato, punctis duobus nigris, abdomine ovato segmentis secundo et tertio rufis.

Habitat Norimbergae.

Caput atrum cinereo pubescens Oculi nigri. Labium nivenum albido barbato, punctisque duobus nigris. Antennae nigrae. Thorax ater cinereo pubescens immaculatus. Alae hyalinae nervo antico venisque nigris. Abdomen ovatum subnudum lucidum, segmento secundo et tertio rufis, reliquis nigris, ultimis pubescentibus. Femora subclavata nigra subnuda, tibiis cinereo-tarsisque flavo pubescentibus. Corpus subtus cinereo hirtum, abdominis segmentis secundo et tertio pariter subtus rufis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Caput antice visum auctum.



Apis sphegoides Mihi.



Handwritten text, likely a species name or description, is visible below the illustration.

APIS sphegoides.

Die Raupentöderartige Biene.

Apis sphegoides: atra cinereo pubescens, abdomine ovato segmentis secundo et tertio rufis pedibus flavis.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum cinereo hirtum, fronte albido barbata, labio nigro immaculato. Oculi nigri. Antennae nigrae. Thorax ater subnudus lateribus cinereo hirtis. Abdomen ovatum nigrum, segmento secundo et tertio rufis, apice albido pubescentis. Pedes flavo hirsuti femoribus supra nigris subtus cinereo pubescentibus. Corpus subtus cinereo hirtum, abdominis segmentis secundo et tertio aequae rufis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

THE JOURNAL OF

THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA

Volume 1, No. 1, January 1910

Published by the Entomological Society of America

Washington, D. C.

Subscription price, \$2.00 per annum in advance

Single copies, 50 cents

Entered as Second-Class Matter, June 26, 1909, Post Office at Washington, D. C., under No. 100,000

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918

Postage paid at Washington, D. C.

Volume 1, No. 1, January 1910

des sieben und funfzigsten Hefts.

- Tab. 1. *Helops chrysomeloides* Panzer.
 — 2. *Helops dermestoides* Panzer.
 — 3. *Cantharis livida* Fabric.
 — 4. *Cantharis testacea* Fabric.
 — 5. *Cantharis nivea* Panzer.
 — 6. *Malachius analis* Panzer.
 — 7. *Dermestes bimaculatus* Panzer
 — 8. *Cistela antennata* Panzer.
 — 9. *Anthribus breviostris* Panzer.
 — 10. *Attelabus globosus* Fabric.
 — 11. *Curculio derafus* Panzer.
 — 12. *Curculio quadrinotatus* Panzer.
 — 13. *Curculio dentatus* Panzer.
 — 14. *Curculio enucleator* Panzer.
 — 15. *Curculio affinis* Panzer.
 — 16. *Curculio porcatus* Panzer.
 — 17. *Curculio ophthalmicus* Rossi
 — 18. *Curculio gracilipes* Panzer.
 — 19. *Curculio pabulinus* Panzer
 — 20. *Mycetophagus signatus* Panzer.
 — 21. *Mycetophagus brunneus* Panzer.
 — 22. *Haltomenus purpureus* Panzer.
 — 23. *Haltomenus testaceus* Panzer.
 — 24. *Staphylinus carinatus* Panzer.



Helops chrysomeloides Mihi.

J. St. f. ec.

HELOPS chrysomeloides.

Der Goldhähnchenartige Schattenkäfer.

Helops chrysomeloides: ater opacus, elytris punctatis margine laterali deflexo, antennis pedibusque fuscis.

Habitat in Austria.

Caput atrum opacum. Antennae obscuro fuscae articulis ultimis crassioribus. Thorax ater opacus transversus punctatus margine rotundatus. Scutellum minutum. Elytra atra opaca pubescentia punctata margine laterali deflexo. Pedes fusci.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Sieben und funfzigstes Heft.



Helops dermestoides Mhi.



HELOPS dermestoides.

Der Speckkäferartige Schattenkäfer.

Helops dermestoides: ater opacus thorace antice rotundato, elytris punctatis apice angustatis, antennis pedibusque fuscis.

Habitat in Austria.

Caput sub thorace reconditum atrum. Antennae fuscae articulis pilosis extimis crassioribus. Thorax ater opacus transversus punctatus antice rotundatus. Elytra atra opaca punctata apice angustata. Pedes fusci.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1872, 1873

1874, 1875

1876, 1877

1878, 1879

1880, 1881

1882, 1883

1884, 1885



Cantharis livida Fabr.

J. St. f. v.



CANTHARIS livida.

Die bleyfärbige Afterfliege. La Cicindele à corcelet rouge. Geoffr.

Cantharis livida: thorace marginato tota testacea. *Fabric.* Ent. syst. T. I. n. 2. p. 213. Syst. Ent. n. 2. p. 205. Spec. Inf. T. I. n. 2. p. 258. Mant. Inf. T. I. n. 2. p. 167.

Cantharis livida. *Linn.* Syst. Nat. n. 3. p. 647. ed. XIII. n. 3. p. 1892. Faun. Suec. n. 701.

Geoffr. Inf. T. I. n. 2. p. 171.

Degeer Inf. T. IV. n. 2. p. 41.

Mull. Zool. dan. prodr. p. 566.

Scop. Carn. n. 122. ic. 122.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 16. fig. 14?

Harrer Besch. der Schöff. Inf. 1 Th. n. 127. p. 80.

Rossi Faun. etrusc. ed. *Hellw.* T. I. n. 414. et 415. p. 190. et 191.

Panzer Ent. germ. T. I. n. 2. p. 89.

Voet. Coleopt. T. II. n. 1. p. 125. tab. 46. fig. 1.

Habitat in floribus, dumetis, sepibus.

a Magnitudo naturalis. **b** Eadem aucta.



Cantharis testacea Fabr.

J. St. fce.



CANTHARIS testacea:

Die gelbe Afterfliege mit dem schwarzgefleckten Bruststück. La Cincindele noir à etuis jaunes. Geoffr.

Cantharis testacea: thorace marginato flavo macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis. *Fabric.* Ent. syst. T.I n. 33. p. 220. Syst. Ent. n. 11. p. 207. *Spec. Inf.* T. I. n. 19. p. 261. *Mart. Inf.* T. I. n. 23. p. 168.

Cantharis testacea. *Linn.* Syst. Nat. n. 15. p. 649. ed XIII. n. 15. p. 1893. Faun. Suec. n. 714.

Geoffr. Inf. T.I. n. 6. b. p. 174.

Degeer Inf. T. IV. n. 4. p. 71.

Scop. Carn. n. 123. ic. 123.

Panzer Ent. germ. T. I. n. 20. p. 93.

Habitat in floribus, in hortis, pratis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Cantharis nivea Mihi.

J. St. fcc.

CANTHARIS nivea.

Die weisse Afterfliege.

Cantharis nivea: thorace marginato testaceo macula nigra, elytris albis, corpore pedibus antennarumque basi testaceis.

Habitat in Austria.

Habitus et statura *Canth. testaceae* Fabr. est duplo minor. Corpus totum atrum marginibus segmentorum abdominis anoque testaceis. Caput nigrum. Oculi nigri. Antennae testaceae apice fuscae. Thorax marginatus testaceus margine albus medio macula nigra. Elytra pubescentia alba punctata margine laterali testaceo. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Malachius aralis Miki.



MALACHIVS analis.

Der rothasterichte Warzenkäfer.

Malachius analis: ater thorace rufo stigma media atra, antennis apice elytris postice pedibusque rufis.

Habitat in Austria.

Similis *M. pulicar.* F. est distinctus. Caput atrum nitidum ore rufo. Antennae basi rufae apice nigrae. Thorax rufus umbra in dorso longitudinali nigra. Elytra atra nitida apice rufa. Pedes rufi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Dermestes bimaculatus Miki.

DERMESTES bimaculatus.

Der zweyfleckigte Speckkäfer.

Dermestes bimaculatus: oblongus ferrugineus thorace ferrulato coleoptris dorso macula nigra.

Habitat in Austria.

Similis *D. cellar. Fabr.* Caput ferrugineum nitidum. Oculi nigri. Antennae ferrugineae pubescentes. Thorax ferrugineus immaculatus quadratus margine laterali utrinque ferrato. Coleoptera ferruginea lucida pubescentia macula ovata dorsali lata. Pedes tenues ferruginei.

a Magnitudo naturalis b Eadem aucta.



Cistela antennata Mihi.

J. St. fec.



CISTELA antennata.

Der einfärbige Fadenkäfer.

Cistela antennata: pubescens ferruginea, antennarum articulo tertio clavato maximo.

Habitat in Austria.

Corpus totum ferrugineum pubescens lucidum, excepto abdomine obscurius ferrugineo. Elytra pubescentia minime striata. Antennae filiformes thorace longiores articulo tertio clavato reliquis maiori. Pedes corpori concolores.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Antenna lente aucta.



Anthribus brevirostris Mihi.

J. St. f.



ANTHRIBVS brevirostris.

Der kurzrüsslichte Bürstenkäfer.

Anthribus brevirostris : fuscus rostro brevissimo, fronte, elytris postice anoque albis.

Habitat in Austria.

Similis *Anthrib. albirostr.* *Fabric.* (Faun. germ. XV. 13.) ast triplo minor et omnino distinctus. Rostrum brevissimum subnullum fuscum. Frons inter antenas villosa alba. Antennae filiformes thorace breviores, testaceae, clava fusca. Oculi nigri. Thorax rotundatus nigro cinereoque varius, punctisque plurimis elevatis adpersus. Scutellum minutum album. Elytra fusca punctis albis nigrisque elevatis holosericeis alternis striata, apiceque alba. Abdomen subtus nigrum. Anas albus. Pedes fusci, femoribus muticis, tibiis albo annulatis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901



Attelabus globosus Fabr.



ATTELABVS globosus.

Der kuglichte Afterrüsselkäfer.

Attelabus globosus: gibbus supra ater subtus cinereus. *Fabric. Ent. syst. T. II.*
n. 31. p. 391.

Curculio Cracca. *Fabric. Syst. Ent. n. 29. p. 132. Eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 42.*
p. 168. *Mant. Inf. T. I. n. 56, p. 101.*

Curculio Cracca. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 506. ed. XIII. n. 6. p. 1743.*

Curculio Hypoleucos. *Paykull. Monogr. Curc. n. 72. p. 75.*

Panzer Ent. germ. I. n. 17. p. 297.

Habitat in Austria.

Elytra in nostris speciminibus atro caerulea sunt.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Curculio derafus Mihi.

J. St. fec.



CVRCVLIO derafus.

Der abgestäubte Rüsselkäfer.

Curculio derafus: longirostris femoribus muticis obscurus, thorace linea dorsali margine laterali maculisque duabus, coleoptris baseos maculis totidem punctisque plurimis obsoletis albis.

Habitat in Austria.

Statura et habitus *C. Colon. Fabric.* (Faun. germ. XXXXII. 2.) aſt alius et omnino diſtinctus. Roſtrum atrum ſcabrum carinatum craſſiuſculum obtuſum. Antennae ſuſcae clava acuminata cinerea. Thorax obſcurus ater punctis plurimis elevatis hinc inde confluentibus exaſperatus, linea dorsali abbreviata, margine laterali utrinque maculisque duabus apicem verſus albis. Coleoptera obſcura atra obſoleta ſtriata, punctisque plurimis obſoletis inprimis ad marginem lateralem, maculisque baseos diſtinctis albis. Pedes nigri cinereo-villoſuli, femoribus clavatis muticis. Corpus ſubtus atrum nitidulum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1875

1875

1875

1875

1875

1875



Curculio quadrinotatus Mihi.

J. S. fre.

CVRCVLIO quadrinotatus.

Der viermal weifs gezeichnete Rüsselkäfer.

Curculio quadrinotatus: longirostris femoribus muticis oblongus ater, elytris crenato fulcatis maculis duabus didymis scutelloque albis.

Habitat in Austria.

Caput atrum rostro incurvo atro. Antennae nigrae articulo primo rufo. Thorax ater carinatus maculis sparsis albis, margine antico rufo. Elytra atra opaca fulcata et inter fulcos crenata, apice gibba, maculis duabus albis, quarum utraque e binis conflata videtur. Scutellum album. Pedes nigri, femoribus muticis. Corpus subtus atrum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876



Curculio dentatus Mihi.

St. fec



CVRCVLIO dentatus.

Der gezähnte Rüsselkäfer.

Curculio dentatus: longirostris femoribus muticis subglobosus cinereo-villosus, elytris margine postico utrinque dentatis, sutura basi alba.

Habitat in Austria.

Habitus et statura *C. pericarp.* F. Caput obscurum rostro deflexo. Thorax antice elevatus bituberculatus. Elytra cinereo villosa striata, maculisque raris hinc inde albis adspersa, margineque postico utrinque dentata. Suturae basis alba. Pedes cinereo villosi, tarsis fuscis, femoribusque muticis. Corpus subtus atrum cinereo villosum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Curculio enucleator Mili.

J. S. f. sc.

CVRCVLIO enucleator.

Der Kernnagende Rüsselkäfer.

Curculio enucleator: longirostris femoribus muticis ovatus subvillosus rufus elytris
substriato punctatis.

Habitat in Austria.

Corpus totum rufum villositate pallidiore praesertim in antico elytrorum
tinctum. Caput punctatum. Antennae rufae clava villosa pallida. Oculi nigri.
Thorax punctatus. Elytra substriato-punctata subvillosa. Pedes rufi femoribus mu-
ticis. Pectus et abdomen nigra, ano rufo.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Curculio affinis Mithi.



CVRCVLIO affinis.

Der verwandte Rüsselkäfer.

Curculio affinis: longirostris femoribus muticis subvillosus ater opacus, elytris striatis.

Habitat in Austria.

Statura et habitus *Curc. assimilis Fabr.* (Faun. germ. XXXXII. 6.) aet duplo minor. Corpus totum atrum opacum subvillosum. Thorax minus tuberculatus. Elytra striata abdomine breviora. Femora mutica.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Curculio porcatus Mihi.

J. St. fec.



CVRCVLIO porcatus.

Der gefurchte Rüsselkäfer.

Curculio porcatus: longirostris femoribus dentatis, oblongus cinereus elytris porcato crenatis.

Habitat in Austria.

Corpus totum atrum villositate cinerea rectum. Caput atrum punctatum opacum. Rostrum crassiusculum rectum thorace brevius, tricarinatum obtusum mandibulis exsertis. Oculi parvi nigri. Antennae rufescentes clava cinereo-villosa. Thorax depressus carinatus punctisque plurimis elevatis glabriusculis adpersus. Elytra depressa sup plana profunde fulcata, et inter sulcos crenata, punctis plurimis laevigatis elevatisque adpersa. Scutellum minutum. Pedes cinereo villosuli, femoribus clavatis dentatis. Corpus subtus obscurum cinereo-villosum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884



Curculio ophthalmicus Rossi.

CVRCVLIO ophthalmicus.

Der Rüsselkäfer mit Augenflecken.

Circulio ophthalmicus: brevirostris oblongus cinereo-nigroque varius, elytris punctato-striatis: dorso macula utrinque distincta cinerea ocellata. *Rossi Faun. Etrusc. T. I. n. 326. p. 128. ed. Hellwig. p. 136.*

Habitat in Austria.

100



Curculio gracilipes Mihi.

J. St. fec.



CVRCVLIO gracilipes.

Der schlangfüßsichte Rüsselkäfer.

Curculio gracilipes: brevirostris femoribus muticis ferrugineus, elytris gibbis punctato striatis, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Austria.

Similis *Curcul. pabulin.* a. triplo minor. Rostrum brevissimum truncatum. Antennae glabrae testaceae. Oculi globosi nigri. Thorax brevis ferrugineus punctisque plurimis minutis impressis. Elytra ferruginea nitida gibba punctato striata, interstitiis laevibus. Pedes breves graciles femoribus subclavatis inermibus. Corpus subtus ferrugineum nitidum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

Handwritten text, likely a title or header.

Handwritten text, likely a title or header.

Handwritten text, likely a title or header.

Handwritten text, likely a title or header.

Handwritten text, likely a title or header.

Handwritten text, likely a title or header.



Curculio pabulinus Mihi.



CVRCVLIO pabulinus.

Der gefräßige Rüsselkäfer.

Curculio pabulinus: brevirostris femoribus dentatis ferrugineus, elytris subglobosis punctato-striatis, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Austria.

Caput obscure ferrugineum punctatum rostro obtuso mandibulis exsertis forcipatis. Oculi subglobosi nigri. Antennae testaceae villosae. Thorax globosus ferrugineus villosus punctis plurimis elevatis hinc inde confluentibus nitidis adpersus. Elytra subglobosa gibba apice acuminata ferruginea villosa nitida, punctato-striata. Pedes testacei femoribus clavatis dentatis. Corpus subtus ferrugineum nitidum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Mycetophagus signatus Miki.

J. St. fec.

MYCETOPHAGVS signatus.

Der gezeichnete Pflferkäfer.

Mycetophagus signatus. ater thoracis margine laterali coleoptris baseos maculis sex, fascia punctoque postico ferrugineis.

Habitat in Austria.

Caput nigrum opacum. Antennae rufae. Thorax ater punctatus margine laterali imprimis postice ferrugineus. Elytra atra punctata minime striata punctis baseos tribus, fascia punctoque postico ferrugineis. Pedes rufi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Mycetophagus brunneus Mihi.

J. St. f.



MYCETOPHAGVS brunneus.

Der braune Pflifferkäfer.

Mycetophagus brunneus: rufus, elytris punctato striatis fasciis tribus testaceis media interrupta.

Habitat in Austria.

Caput rufum. Oculi nigri. Antennae rufae. Thorax rufus punctatus antice rotundatus postice punctis duobus impressis. Elytra rufa punctato striata fascia bascos lata, media interrupta apicisque maculari testaceis. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Hallomenus purpureus. Miki.

J. St. fec.



HALLOMENVS purpureus.

Der purpurrothe Hupfkäfer.

Hallomenus purpureus: purpureus elytris acuminatis punctatis antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Austria.

Caput et thorax obscura nitida punctata. Antennae testaceae. Thorax transversus margine rotundatus. Elytra atro purpurea nitida punctata acuminata. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Hallomenus testaceus Miki.

J. St. fec.

HALLOMENVS testaceus.

Der dunkelgelbe Hüpfkäfer.

Hallomenus testaceus: laevis obscure testaceus elytris punctatis, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Austria.

Minutus. Caput sub thorace retractum obscurum. Thorax transversus margine oblique rotundatus obscure testaceus punctatus. Antennae testaceae pilosae. Elytra testacea laevia punctata. Pedes testacei. Corpus subtus obscurum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871



Stapylinus carinatus Mihi.

STAPHYLINVS carinatus.

Der gekielte Raubkäfer.

Staphylinus carinatus: ater nitidus thorace depresso lineis elevatis quatuor pedibusque testaceis.

Habitat in Austria.

Similis *Staph. piceo* Fabric. (*Faun. Gem. XXVII. 14*) est alius et vere distinctus. Caput transversum nigrum nitidum antice subfoveolatum, palpis mandibulisque porrectis. Antennae nigrae. Thorax ater depressus nitidus dorso lineis elevatis quatuor margine laterali utrinque foveolato. Elytra nitida atra pubescentia. Abdomen atrum nitidum segmentorum margine postico elevato. Anus pilosus. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

- Tab. 1. *Scarabaeus centrolineatus* Panzer.
 — 2. *Scarabaeus equestris* Panzer.
 — 3. *Scarabaeus nubilus* Panzer.
 — 4. *Scarabaeus sticticus* Panzer.
 — 5. *Scarabaeus sphacelatus* Panzer.
 — 6. *Scarabaeus limicola* Panzer.
 — 7. *Scarabaeus coenosus* Panzer.
 — 8. *Scarabaeus pusillus* Herbst.
 — 9. *Scarabaeus foriorum* Panzer.
 — 10. *Scarabaeus semicornis* Panzer.
 — 11. *Lucanus Dorcas* Panzer.
 — 12. *Lucanus Capra* Panzer.
 — 13. *Lucanus caraboides* Fabric.
 — 14. *Lucanus rufipes* Herbst.
 — 15. *Leucospis dorsigera* Mas. Fabric.
 — 16. *Nemotelus villosus* Fabric.
 — 17. *Stratiomys errans* Fabric.
 — 18. *Stratiomys viridula* Fabric.
 — 19. *Stratiomys angulata* Panzer.
 — 20. *Stratiomys tigrina* Fabric.
 — 21. *Stratiomys leonina* Panzer.
 — 22. *Stratiomys felina* Panzer.
 — 23. *Stratiomys canina* Panzer.
 — 24. *Stratiomys vulpina* Panzer.



Scarabaeus centrolineatus Mihi.



SCARABAEVS centrolineatus.

Der Linien - Dungk äfer.

Scarabaeus centrolineatus: scutellatus, thorace inermi immaculato, capite trituberculato: elytris punctato striatis griseis, futura maculisque dorso confluentibus nigris, relicta macula centrolineari grisea.

Habitat in stercore in montibus Silesiae.

Quaecunque in hac sectione describuntur insecta silesiaca, benevolentiae debeo L. B. de *Stillfrid*, rerum naturalium scrutatori praestantissimo, et in inquirendis insectis silesiacis felicissimo.

Habitus et statura *Sc. inquinati* sed maior. Clypeus ater punctatus nitens punctatus trituberculatus antice emarginatus, margine antico reflexo. Thorax ater nitens punctatus margine immaculato. Scutellum nigrum triangulare. Elytra

grisea punctato striata nitida, sutura maculisque oblongis nigris: hae maculae in dorso ita confluent, ut in centro lineolam griseam relinquunt, quae constanter observatur: macula ad apicem utriusque elytri nigra semper adest. Pedes fusi. Corpus subtus atrum nitidum..

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus equestris Mili.

J. St. fee



SCARABAEVS equestris.

Der Ritter - Dungkäfer.

Scarabaeus equestris: scutellatus thorace inermi marginibus lateralibus testaceis: capite trituberculato, elytris testaceis punctato-striatis, maculis in semicirculo positis nigris.

Habitat in stercore in Silesia.

Clypeus ater nitens punctatus trituberculatus angulatus, antice emarginatus, margine antico fusco reflexo. Antennae testaceae clava trifida nigra. Thorax ater punctatus nitens marginibus lateralibus antice macula testacea. Elytra rufo-testacea punctato striata, maculis in semicirculo positis nigris. Pedes testacei. Corpus subtus obscure testaceum, pectore fusco.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)

1874-1875 (1874-1875)



Scarabaeus nubilus Mihi.

J. St. fcc



SCARABAEVS nubilus.

Der wolkeichte Dungkäfer.

Scarabaeus nubilus: scutellatus thorace inermi, capite trituberculato, elytris testaceis punctato striatis, stria marginali maculisque sparsis nigris.

Habitat in stercore, Silesiae.

Magnitudo *Scar. subterranean. F.* Clypeus ater nitens, trituberculatus, punctatus subangulatus antice vix emarginatus, margine utrinque reflexo. Thorax ater nitens punctatus, macula marginali obsoleta fusca. Elytra testacea punctato striata, lineola marginali, maculisque baseos postice confluentibus nigris. Sutura nigra. Corpus subtus nigrum nitidum. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1892 - 1893

1894 - 1895

1896 - 1897

1898 - 1899

1900 - 1901

1902 - 1903

1904 - 1905

1906 - 1907

1908 - 1909

1910 - 1911

1912 - 1913

1914 - 1915

1916 - 1917



Scarabaeus sticticus Mihi.

250. 1/2



SCARABAEVS ficticus.

Der gesprenkelte Dungkäfer.

Scarabaeus ficticus: scutellatus thorace inermi, capite subtrituberculato, elytris testaceis punctato-striatis maculis inordinatis sparsis nigris.

Habitat in stercore, Silesiae.

Scar. inquinato F. minor. Clypeus ater nitens punctatus utrinque angulatus, antice emarginatus, tuberculis tribus obsoletis, margineque laterali fuscus. Thorax ater nitens punctatus margine laterali rufo testaceo. Elytra testacea punctato-striata maculis sine ordine sparsis nigris. Corpus subtus obscure testaceum. Pedes obscure testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus sphacelatus Mihi.

J. St. fec.



SCARABAEVS sphacelatus.

Der brandfleckigte Dungkäfer.

Scarabaeus sphacelatus: scutellatus thorace inermi, capite subtrituberculato, elytris griseis punctato-striatis, macula marginali nigra.

Habitat in stercore montium Silesiae.

Facies *Scar. conflagrat F.* sed omnino diversus. Clypeus ater punctatus nitens, margine omni reflexo, antice truncatus, tuberculis tribus obsoletis. Thorax ater punctatus nitens margine laterali testaceo. Elytra grisea punctato-striata macula oblonga marginali nigra. Corpus subtus fuscum, ano pallido. Pedes fusco testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus limicola Mihi.

J. St fec.

SCARABAEVS limicola.

Der Garten-Dungkäfer.

Scarabaeus limicola: scutellatus thorace inermi, capite trituberculato, elytris punctato striatis obscuro-griseis.

Habitat primo vere in hortorum pulvinis Silesiae.

Clypeus nitidus antice emarginatus fusco testaceus, postice ater trituberculatus, tuberculo medio maiori. Thorax nitidus laevis, punctis raris impressis, obscure griseus, margine laterali subtestaceo, medio lineola brevi impressa. Elytra obscure grisea punctato striata, sutura nigra. Corpus subtus obscure griseum, pedibus subtestaceis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus caenosus Miki.

J. St. fec.



SCARABAEVS coenosus.

Der fable Dungkäfer.

Scarabaeus coenosus: scutellatus muticus ater, thorace margine laterali rufo, elytris obscure rufis striatis.

Habitat in stercore, Silesiae.

Clypeus ater punctatus nitidus muticus margine omni subreflexo, antice parum emarginatus. Thorax ater inermis punctatus, margine laterali laete rufo. Elytra obscure rufa nitida argute striata, nullo modo punctata. Corpus subtus nigrum. Pedes fusci, femoribus secundi et tertii paris compresso dilatatis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus pusillus Herbst.



SCARABAEVS pusillus

Der kleine braune Dungkäfer.

Scarabaeus pusillus: scutellatus niger elytris piceis punctato-striatis. *Herbst* Natur. d. K. II. Th. n. 96. p. 155. tab. 12. fig. 12. tab. 18. fig. 6.

Preysler Inf. Bohem. n. 100. p. 104. tab. I. fig. 8. a.

Habitat in stercore bovino.

Sunt mihi huius speciei exempla clypeis tuberculatis et absque tuberculis, manifesto indicio, cum praesentia tum absentia tuberculorum neutiquam pro characteri constante assumi posse.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus foriorum Mithi.

J. St. fee.



SCARABAEVS fororiorum.

Der Cloak - Dungkäfer.

Scarabaus fororiorum: scutellatus muticus ater, thorace immaculato, elytris testaceis punctato striatis, futura margineque omni nigris.

Habitat in stercore, Silesiae.

Similis *Sc. merdario* F. at omnino differt, magnitudine maiori atque thoracis margine laterali haud maculato, elythroque margine omni nigrorum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Scarabaeus semicornis Mihi.

J. St. fec.



SCARABAEVS femicornis.

Der halbgebörnte Dungkäfer.

Scarabaeus femicornis: exscutellatus ater, thorace prominentia subtriplici, occipite cornu truncato emarginato.

Habitat in stercore, Silesiae.

Statura et habitus *Sc. ovati F. at* maior et distinctus. Clypeus ater opacus punctatus, antice emarginatus, margine undique reflexo: medio linea transversa elevata, occipite corniculo truncato apice emarginato. Thorax ater opacus punctis plurimis impressus, pubescens, antice prominentia triplici, media emarginata maiori. Elytra atra opaca abdomine breviora substriata, punctis plurimis elevatis exasperata. Corpus subtus nigrum nitidum. Pedes nigri.

Alter sexus differt corniculo truncato paullo breviori.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Lucanus Dorcas Mili.

Sec. Sturm fec.

L V C A N V S D o r c a s .

Der Dammschröter.

Lucanus Dorcas: mandibulis exsertis apice subbifurcatis, denticulis intus tribus obtusis.

Habitat in Silesiae fylvis.

Varietati cuidam morbosae *Luc. Cervi. F.*, cuius plures sunt, similis est, aſt mihi differre viſus. Differentia omnis in eo poſita equidẽm mihi videtur, quod mandibularum denticuli interni haud ultra tres numerentur; iique truncati obtuſiſſimiſque ſit; quod mandibulae relatione corporis admodum abbreviatae, raroque longitudine ſua capitis latitudinem ſuperent; quod thorax minime angulatus, neque dorſo inaequalis ſit, ſed planus, depreſſus, parumque antice declivis, qualis obſervatur in *Lucan. Capreolo F. (Americ. boreal.)*. Reliqua mihi cum *Luc. Cervo.* convenire videbantur.

Si quis attamen sit, qui hanc Lucani speciem, aliis quibuscunque *Lucan.*
Cervi varietatibus morbofis, in quorum numero mihi semper ite *fauces Luc.*
Hircus erit, associare putet, nullus sum qui contrarium strenue defendere cupit.

Vidi individuum huius Lucani, quod mandibulis instructum fuerat, altera
intus bis, altera terdentata.



Lucanus Capra Mihi.

J. Sturm fec.



L V C A N V S C a p r a .

Der Ziegenschrüter.

Lucanus Capra: ater opacus mandibulis intus bidentatis, fronte tuberculo genino, tibiis anticis ferratis.

Lucanus parallelipipedus F. varietas sexu distincta Auctorum.

Habitat in sylvaticis: in Silesia utroque sexu frequentior vulgatori *Lucano parallelipipede* F. et L.

Haecce Lucani *distincta* species inique a plurimis Entomologis hactenus pro varietate sexus *Luc. parall.* vendita fuit. *Geoffroy* (Inf. T. I. n. 3. p. 62.) ni fallor, primus fuerat, qui hanc pro *femina maris L. parall.* habebat, quo cum et alii consentiebant: sic Cl. Cl. *Rossi* (Faun. etrusc. I. p. 3.) et *Preysler* (Inf. bohem. n. 5. p. 10.) et *Herbst* (Naturg. d. Inf. T. III. n. 9. p. 309.) et ipse *Fabric.* (Ent. syst. T. II. n. 11. p. 239.) ut alios taceam.

Differentiae praecipuae, quae hunc a *Lucano parall.* distinguunt, in eo posita equidem mihi videntur: quod in *Lucano Capra*, mandibulae dente laterali haud elevato instructae sint, caeque multo breviores sint, denticulisque tantum duobus lateri interiori adiunctis satis minutis gaudeant: quod caput punctis plurimis impressis exasperatum, tuberculoque gemino frontali armatum sit: quod thorax convexus nitidus, neque adeo depressus dilatatus, et opacus sit, ut in *Luc. parall.*; quod tibiae anticae crebrioribus atque argutioribus denticulis munitae sint: quod sexus alter s. *huius mas.* (monendum, *feminam* *Luc. Caprae* duntaxat tuberculatam esse) eademque forma habitu et structura feminae suae omnino consimili gaudeat, multumque a *mare L. parall.* habitu plane alieno differat.



Lucanus caraboides Fabr.

J. St. fœc.



LVCANVS caraboides.

Der laufkäferartige Schröter. La Chevrette bleue. Geoffr.

Lucanus caraboides: caeruleescens mandibulis lunatis, thorace marginato. *Fabric.*

Ent. syst. T. II. n. 14. p. 239. Syst. Ent. n. 8. p. 3. Spec. Inf. T. I. n. 9.

p. 3. Mant. Inf. T. I. n. 12. p. 2.

Lucanus caraboides. *Linn.* Syst. Nat. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591. Faun.

Suec. n. 407.

Degeer Inf. T. IV. n. 3. p. 194. tab. 12. fig. 11.

Geoffr. Inf. T. I. n. 4. p. 63.

Dewill. ent. T. I. n. 3. p. 43. tab. 1. fig. 1.

Scop. carn. n. 2. ic. 2.

Laichard. tyr. Inf. T. I. n. 3. p. 3.

Herbst Nat. d. K. T. III. n. 10. p. 310. tab. 34. fig. 6. 7.

 Schaffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 6. fig. 8.

Harrer Besch. d. Schäff. Inf. 1. B. n. 3. p. 6.

Voet Coleopt. T. II. p. 38. n. 8. tab. 30. fig. 8.

Panzer Symb. ent. I. p. 21. tab. 3. fig. 1. 2.

Eiusd. Ent. germ. I. n. 4. p. 245.

Habitat in sylvaticis, et in locis suffocatis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Lucanus rufipes Herbst.

1801. 1. 1. 1.



LVCANVS rufipes.

Der rothfüßichte Schröter. La Chevette verte. Geoffr.

Lucanus rufipes: viridis subtus pedibusque rufis. *Herbst* Nat. d. Käf. III. Th. n. 11.
p. 311. tab. 34. fig. 8.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 75. fig. 7.

Habitat in Silesia.

Restituenda omnino, ut equidem mihi visum fuit, distincta species, inique, ex quo innotuerat, pro varietate inani *Luc. Caraboides* habita atque divendita. Vindicat autem ipsa paullo curatius cum *Lucan. caraboid. F.* comparata, sibi suum ius inter alias Lucanorum species militandi, nec indigeret mea confirmatione, nigratus, me et hanc addere debuisse, ne aliis ultra necessitatem, novam speciem, dudum iam oblivioni etiam post Cl. *Herbstii* conatus laudabiles traditam, revocare videar.

Differt enim non solis *rufescentibus* pectore, abdomine pedibusque, sed capitis thoracisque aliena fabrica et circumscriptione, quam verbis edere plagulae spatium vetant, et quod maximi est, *antennis*, iisque multo brevioribus, earumque lamellis duntaxat tribus, quas quatuor in *L. carab. semper* numerare cōtingit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Leucospis dorsifera Fabr.

LEVCOSPIS dorsigera.

Die Schenkelwespe.

Leucospis dorsigera: abdomine sessili nigro: fasciis duabus punctoque flavis. *Fabric. Syst. Ent. n. 1. p. 361. Spec. Ins. T. I. n. 1. p. 457.*
Mant. Ins. T. I. n. 1. p. 284. Ent. Syst. T. III n. 2. p. 246.

Leucospis dorsigera: thoracis (pectoris) squama abdominis sessilis fere longitudine. *Gmelin ed. XIII. Syst. Nat. T. V. n. 1. p. 2759.*

Vespa dorsigera. *Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 196. tab. 27. fig. 11.*

Fuesly Archiv 3 Heft. tab. 18. fig. 1 - 11.

Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 856. var. β.

Deville Ent. gall. T. III. n. 1. p. 260. tab. 8. fig. 17.

Ausser Italien, Helvetien, Frankreich, beherbergt auch *Deutschland* diese merkwürdige Wespe, woselbst sie, wie ich aus zuverlässigen Berichten schliessen darf, schon mehrere Male gefangen worden. In hiesigen Gegenden bin ich zur Zeit ihr noch vergeblich nachgegangen.

a. Natürliche Grösse. b. Vergrösserung. c. Im Profil, vergrössert.



Nemotelus villosus Fabr.

St. fœ.



N E M O T E L V S v i l l o f u s .

Die zottige Stiletsiege.

Nemotelus villosus: niger cinereo hirtus abdominis segmentis margine laterali albo.

Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 270.

Habitat in Silesia. *Lib. Bar. de Stillfrid.*



Stratiomys errans Fabr.



STRATIOMYS errans.

Die herumschweifende Waffensfliege.

Stratiomys errans: scutello bidentato atro, abdomine atro: segmento secundo tertioque lateribus albis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 263.

Habitat ad Silesiae aquas.

Illustr. *Fabricius* l. c. huius speciei patriam habitationemque ignorasse videtur, quoniam de utraque mentionem facere subersedit.

* Magnitudo naturalis. a Antenna. b Scutellum. c Tarsus posticus, aucta.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1215 Broadway, New York, N.Y. 10021

Acquired from the collection of the

Department of the Interior

U.S. Geological Survey

Washington, D.C.

Library of the U.S. Geological Survey

U.S. Geological Survey

U.S. Geological Survey



Stratiomys viridula Fabr.

J. St. fec.



STRATIOMYS viridula.

Die grünlichte Waffensfliege.

Stratiomys viridula: scutello bidentato, abdomine viridi: dorso atro. *Fabric.*
Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 267. Syst. Ent. n. 6. p. 760. Spec. Inf. T. II.
n. 8. p. 418. Mant. Inf. T. II. n. 13. p. 351.

Habitat Norimbergae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Stratiomys angulata Mihi.

J. St. f.



STRATIOMYS angulata.

Die winklicht gezeichnete Waffensfliege.

Stratiomys angulata: scutello bidentato, abdomine viridi, dorso nigro margine viridi angulato.

Habitat Norimbergae.

Caput flavum. Oculi fusci immaculati, orbita pallida. Antennae fuscae. Thorax viridi-pubescent. Scutellum flavum bidentatum. Halteres pallidi ciliati. Abdomen subtus viride nitidum glabrum: supra seu dorso nigro margine laterali utrinque viridi angulato. Alae hyalinae nervis et venis flavis. Pedes flavi. An species distincta?

a Magnitudo naturalis, b Eadem aucta.



Stratiomys tigrina Fabr.

201 18



STRATIOMYS tigrina.

Die Tieger-Waffenfliege.

Stratiomys tigrina: scutello bidentato atra, abdomine subtus rufo. *Fabric. Ent.*
syst. T. VI. n. 16. p. 267. Syst. Ent. n. 4. p. 760. Spec. Inf. T. II. n. 6.
p. 417. Mant. Inf. T. II. 11. p. 351.

Habitat ad Silesiae aquas. *Lib. Bar. de Stillfrid.*

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Volume 10, Part 1, 1880
Published by the Royal Society of London
Printed by W. Clarendon Press, Oxford

CONTENTS
The JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE



Stratiomys leonina Mihi.

J. St. fec.



STRATIOMYS leonina.

Die Loewen-Waffenfliege.

Stratiomys leonina: scutello bidentato atra, abdomine atro basi apiceque flavo.

Habitat ad Silesiae aquas. *Lib. Bar. de Stillfrid.*

Statura *Strat. hypoleon F.* aet minor. Caput nigrum nitidum pubescens ore flavo. Antennae nigrae seta elongata. Oculi fusci maculati orbita argentea, maculaque subraorbitali incrassata utrinque flava. Thorax ater nitidus, lineola marginali, punctoque ante alas calloso utrinque flavis. Scutellum flavum bidentatum: dentibus flavis apice fuscis. Alae hyalinae nervis et venis flavis. Abdomen nigrum nitidum, basi sub scutello anoque flavis. Halteres nigri clava flava. Pedes flavi nigro annulati, femoribus nigris apice flavis. Corpus subtus atrum nitidum nudum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Antenna. d Scutellum, aucta.



Stratiomys felina Mihi.

J. 67. f. 2.



S T R A T I O M Y S f e l i n a.

Die Katzen-Waffenfliege.

Stratiomys felina: scutello bidentato, abdomine viridi: dorso atro maculis utrinque triangularibus anoque flavis.

Habitat Norimbergae.

Statura et habitus *Str. strigatae* F. at paullo minor. Caput nigrum, ore argenteo-pubescente. Oculi nigri immaculati. Antennae fuscae asetae. Thorax ater pubescens immaculatus. Scutellum atrum bidentatum, macula dentibusque flavis. Squama halterum flava ciliata. Alae hyalinae nervis et venis flavicantibus. Abdomen compressum subtus viride nitidum, dorso laevi atra nitido margine laterali utrinque maculis triangularibus flavis. Pedes flavi. Anus flavus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Stratiomys canina Mihi.

J. S. f.



STRATIOMYS canina.


Die Hunds-Waffenfliege.

Stratiomys canina: scutello bidentato, abdomine flavo, dorso atro, maculis utrinque lateralibus, baseos maioribus, anoque flavis.

Habitat Norimbergae.

Caput nigrum nitidum. Oculi fusci orbita argentea. Antennae nigrae aestivariae. Thorax ater viridi pubescens immaculatus. Scutellum atrum bidentatum, dentibus minutis flavis. Abdomen compressum nitidum, subtus flavum, dorso atro nitido lateribus utrinque flavo maculatis, maculis baseos maioribus: anus flavus. Pedes flavi. Alae hyalinae nervis et venis flavis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





Stratiomys vulpina Mihi.

J. St. fec.



S T R A T I O M Y S v u l p i n a .

Die Fuchs - Waffenfliege.

Stratiomys vulpina: scutello bidentato, capite abdomine dorso maculis laterali-
bus pedibusque flavis.

Habitat Norimbergae.

Similis *Strat. felin.* aſt duplo maior. Caput flavum nitidum. Regio ſtem-
matum atra. Os flavum. Antennae aſetariae flavae. Oculi fuſci immaculati or-
bita flava. Thorax ater viridi ſericeus immaculatus. Squama halterum pallida ci-
liata. Scutellum atrum, baſi dentibusque flavis. Abdomen compreſſum flavum ni-
tidum, dorſo laevigato atro, maculis utrinque triangularibus anoque flavis. Pedes
omnes flavi unicolores. Alae hyalinae nervis et venis flavis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Antenna. d Scutellum aucta.

- Tab. 1. *Tenebrio spinimanus* Pallas.
— 2. *Chrysomela Baaderi* Femina Panzer.
— 3. *Claviger testaceus* Preysler.
— 4. *Myrmeleon pisanum* Rossi.
— 5. *Tertigonia tibialis* Panzer.
— 6. *Apis violacea* Fabric.
— 7. *Apis bidentata* Panzer.
— 8. *Lygaeus brevis* Panzer.
— 9. *Tipula Thomae* Fabric.
— 10. *Tipula feminigra* Panzer.
— 11. *Syrphus intricarius* Fabric.
— 12. *Syrphus bombylifformis* Fabric.
— 13. *Syrphus rupestris* Panzer.
— 14. *Syrphus alpinus* Panzer.
— 15. *Syrphus hemipterus* Fabric.
— 16. *Syrphus podagricus* Fabric.
— 17. *Syrphus glaucius* Fabric.
— 18. *Musca vagans* Panzer.
— 19. *Musca semiflava* Panzer.
— 20. *Musca nebulosa* Panzer.
— 21. *Musca formosa* Panzer.
— 22. *Musca gangraenosa* Panzer.
— 23. *Acarus frontalis* Panzer.
— 24. *Acarus tristriatus* Panzer.





Tenebrio spinimanus Pallas.

J. St. fce.



TENEBRIO spinimanus.

Der Pallasche Stachelfüßchte Mehlkäfer.

Tenebrio spinimanus: thorace marginato laevi, elytris laevissimis postice obtusis, tibis primoribus spina robustissima arcuata productis. *Pallas* Ic. Inf. Ross. n. 21. p. 55. tab. C. fig. 23.

Habitat in Silesia. *Lib. Bar. de Stillfrid.*

Specimen quod hic loci delineandum curavi, ad amussim cum data e *Pallasii* inf. ross. descriptione convenit, hinc non dubito fore idem, quod illustr. vir sibi describendum proposuerit insectum. Quaestionem, quam idem l. c. movit, "*an Tenebrio Gigas* 14 *Linnaei*?" eandem repetere eo magis vellem, quo magis cuique intersit, hanc obscuram adhuc speciem e latebris suis elicere. Pro *Pimelia laevigata Fabric.* a nonnullis hunc *Tenebrion Pallas.* haberi audio.

a Magnitudo naturalis. b Caput cum antennis auctum.



Chrysomela Baaderi fem. Mihi.

J. St. fce.



CHRYSOMELA Baaderi Femina.

Das Baadersche Goldbähnchen. Das Weibchen.

Chrysomela Baaderi. Panzer Faun. germ. XXIV. 14.

Habitat et in Silesia.

Non dubito, quin haecce Chrysomelae species, alter sexus huius speciei sit, quam l. c. descripsi. Sit autem aut non sit, aut memorabilis *maris* tantum varietas, tamen negligere nolui.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Claviger testaceus Preusler.



CLAVIGER testaceus.

Der Preyslersche muschelbraune Keulenträger.

Claviger testaceus : exscutellatus villosus : antennis quinque articulatis clavatis, clava ultima solida crassa cylindriciformi, capite postice bispinoso. *Preysler* inf. bohem. n. 65. p. 63. tab. III. fig. 5. a. b.

Habitat in Bohemiae et Silesiae formicarum acervis.

Quaestione hactenus nondum soluta, an *Claviger testaceus* *Preysl* l. c., declaratum iam sit insectum, aut potius nympha cuiusdam adhuc satis minus noti, restat nil aliud, quam denuo eum in medium proferre, ut accuratius entomologi in naturam huius memorabilis insecti inquirant. Adnotandum, specimina mecum ab amicissimo L. B. de *Stillfried* communicata a *Preyslerianis* in eo differre, quod glabra sint, eorundem abdomen nullis segmentis interruptum observetur: quod autem ma-

ximi mihi est, sunt in quocunque specimine tria puncta excavata, seu totidem fossulae in antico abdominis nudo oculo conspicuae, de quibus in praesenti decernere nollem, an sint naturae aut casus cuiusdam opus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Myrmeleon pisanum Rossi.

Jac. Sturm fec.



MYRMELEON pisanum.

Der Pisanische Aweisenlöwe.

Myrmeleon pisanum: villosum, alis griseis immaculatis, nervis nigro punctatis, thorace rubro cinereo, linea nigra duplici longitudinali, corpore toto nigro albo marginato unguis tiliarum recurvis. *Roffi* Faun. etrusc. T. II. n. 690. p. 14. tab. 9. fig. 8.

Myrmeleon occitanicum. *Dewill* Ent. T. III. n. 9. p. 63. tab. 7. fig. 10.

Habitat in confinibus Austriae et Pannoniae.

Nil obstat, quin hoc speciosum insectum, pro distincta et a *Myrm. libelluloide* F. omnino diversa habeatur specie: quod suadet cum alarum immaculata facies, tum typus et sculptura capitis thoracisque.



Tettigonia tibialis Mihi.

J. St. fec.

T E T T I G O N I A t i b i a l i s.

Die stachelfüßichte Singcicade.

Tettigonia tibialis: atra abdominis segmentis margine venisque basi rufis, tibiis anticis incrassatis flavis tridentatis.

Habitat in Austria.

Tettigon. violac. F. similis ast distincta. Caput inter oculos atrum pubescens transversim sulcatum, striga utrinque flava, medio linea insculpta, vertice nigro fulvo pubescenti. Stemmata tria lucida ferruginea. Thorax ater pubescens antice posticeque rufo marginatus, dorso linea obsoleta rufa. Scutellum atrum pubescens apice rufo marginatum. Elytra hyalina nervis venisque basi rufis, apice nigris. Abdomen atrum, segmentis margine postico rufis, subtus flavum segmentis margine nigris. Pedes flavi femoribus flavis striga media nigra, tibiis anticis flavis subtus argute tridentatis striga media nigra, tarsisque nigris. Cf. *Schäffer* Ic. Inf. Ratisb. tab. 4. fig. 14. Inter *Stoll. Cicadas* nullam huic similem vidi.

a Magnitudo naturalis. b Pes anticus auctus.



Apis violacea Fabr.

J. St. fec.

A P I S violacea.

Die violette Biene. Die Violettthummel. L'Abeille percebois. Geoffr.

Apis violacea: hirsuta atra alis violaceis. Fabric. Syst. Ent. T. III. n. 3. p. 315.

Syst. Ent. n. 2. p. 379. Spec. Inf. T. I. n. 2. p. 475. Mant. Inf. T. I. n. 2. p. 299.

Apis violacea. Linn. Syst. Nat. n. 38. p. 959. ed. XIII. n. 38. p. 2780. Mus. Lud.

Vlr. 414. *

Geoffr. Inf. T. II. n. 19. p. 416.

Schrank inf. austr. n. 795.

Scopol. carn. n. 812. ic. 812.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 102. fig. 7. 8.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1. p. 99.

Christ. Bien. p. 119. tab. 4. fig. 5. *descriptio bona, figura mala.*

Habitat in Silesia.

Femina est, quam in praesenti delineavimus. Mas minor antennarum articulis duobus penultimis rufis. Alae ad apicem aveniae eleganter punctis prominulis pictae. *Degeeri Apis Gigas* (Inf. III. tab. 8. fig. 15. minime huc referenda.)



Apis bidentata Muhl.

J. St. fec.



APIS bidentata.

Die zweyzähnlige Biene.

Apis bidentata: atra nitida abdomine conico acutissimo: segmentorum marginibus albis, scutello bidentato.

Habitat Norimbergae et Silesiae.

Species vere intermedia est, interque *Ap. tridentat.* F. eiusdemque *Ap. conic.* locanda; utrique enim omnino adeo similis et affinis, ut merito haesitandum utri associanda, nisi scutellum bidentatum, quod in altera *tridentatum*, in altera inerme est, omne dirimeret dubium. Novam ergo propono speciem, quam limites harum specierum vetant, alteruteri hanc adscribere. Addo: notam, quam illustr. *Fabric.* *A. trident* nro. 115 adposuit, ad nro. 116. *Ap. conicam* transferendam esse, cui rectius competit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Scutellum bidentatum lente auctum.



Lygaeus brevis Miki.



LYGAEVS brevis.

Die kurzleibige Wanze.

Lygaeus brevis: ater abdomine apice dilatato, fronte verticeque nigris.

Habitat in Silesia.

Corpus totum atrum opacum minime nitidum. Thorax transverse striatus gibbus. Scutellum minimum. Elytra coriacea tenuissime transverse striata abdomine paulo breviora. Abdomen atrum acutum ultra elytra prominet. Antennae pedesque nigri. Frons et vertex laevigata nitida.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Tipula Thomae Fabr.

J. St. fec.



TIPVLA Thomae.

Die Thomas Erdfliege.

Tipula Thomae: glabra atra alis nigris, abdominis lateribus linea crocea. *Fabric.*

Ent. syst. T. VI. n. 78. p. 250. Syst. Ent. n. 41. p. 754. Spec. Inf. T. II.
n. 54. p. 410. Mant. Inf. T. II. n. 67. p. 327.


Tipula Thomae. *Linn.* Syst. Nat. n. 39. p. 976. ed. XIII. n. 39. p. 2823.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 209. fig. 6. 7.

Habitat Norimbergae primo vere.

Antennae in nostris speciminibus thorace longiores. Abdomen lateribus ciliatum. Linea abdominalis crocea cum vita fere perit.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





Tipula feminigra Mihi.

J. St. féc.



TIPVLA *feminigra*.

Die halbschwarze Erdfliege.

Tipula feminigra: capite thorace femoribus apice tibiaeque annulis atris.

Habitat Norimbergae primo vere.

Parva. Antennae corpore dimidio breviores pallidae apice nigrae. Caput thorax, scutellum atra nitida parum pilosa. Abdomen cylindricum pallidum. Halteres pallidi. Alae hyalinae venis raris rectisque percurvae, minime reticulatae. Pedes pallidi, femoribus apice nigris. Tibiae posticae nigro annulatae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus intricarius Fabr.

SYRPHVS intricarius.

Die Wirrschwebefliege. Mouche embrouillée Degeer.

Syrphus intricarius: antennis plumatis tomentosus lutescens, abdomine nigro apice genubusque albis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 11. p. 281. *Spec. Inf.* T. II. n. 22. p. 426. *Maut. Inf.* T. II. n. 26. p. 336.

Musca intricaria. *Linn.* Syst. Nat. n. 33. p. 985. ed. XIII. n. 33. p. 2871. *Fn.* Suec. n. 1800.

Degeer Inf. T. VI. n. 3. p. 138. tab. 8. fig. 10.

Habitat in Silesiae floribus.

a Magnitudo naturalis. b Antenna seta plumata aucta.



Syrphus bombylifomis Fabr.

at St. fce.

SYRPHVS bombylifformis.

Die Stechfliegeartige Schwebefliege.

Syrphus bombylifformis: antennis subplumatis tomentosus lutescens, tibiis basi albis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 13. p. 281.*

Habitat in Silesiae floribus.

a Magnitudo naturalis. b Antenna setaria aucta.



Syrphus rupestris Miki.



SYRPHVS rupestris.

Die Felsenschwebefliege.

Syrphus rupestris: antennis setariis tomentosus ater, abdominis basi albo apice fulvo, alis macula media fusca.

Habitat in Silesiae montibus.

Caput atrum fronte albo pubescenti, labio albo barbato. Frons in medio tuberculo obtuso nitido instructa. Antennae setariae. Oculi fusci. Thorax ater cinereo villosus, lateribus villositate candida marginatus. Abdomen atrum lucidum hirsutum, basi villis candidis intermixtis rufescentibus, quibus segmentum tertium margine postico coronatur, ultimo segmento s. ano dense fulvo hirsuto. Alae hyalinae albae, macula media fusca. Pedes nigri pilosi, posticis elongatis. Corpus subtus atrum albido pilosum.



Syrphus alpinus Mihi.

SYRPHVS alpinus.

Die Alpenschwefliege.

Syrphus alpinus: antennis plumatis tomentosus, abdominis segmento primo lineolis duabus rufis, alis macula media fusca, tibiis arcuatis.

Habitat in Silesiae montibus.

Frons dense niveo villosa, linea intermedia atra nitidissima. Vertex ater nitidus. Oculi oblongi fusci, orbita niveo villosa. Antennarum patella orbiculata, seta flava plumosa. Thorax ater cinereo villosus, lateribus albido villosis. Scutellum flavum. Abdomen subnudum pilosum nitidum, segmento primo lineolis duabus rufis. Alae fuscescentes macula media fusca. Pedes elongati flavi, femoribus nigro maculatis, tibiis anticis et posticis arcuatis. Abdomen subtus flavum.

a Magnitudo naturalis. b Antennae seta plumata aucta.



Syrphus hemipterus Fabr.

J. St. fec.



SYRPHVS hemipterus.

Die halbflügelichte Schwebefliege.

Syrphus hemipterus: antennis fetariis tomentosus, thoracis limbo ferrugineo, alis
crassioribus cinereis fusco flavescenti variis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 22.*

p. 284.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 71. fig. 6.

Habitat Norimbergae.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus podagricus, Fabr.

J. St. f. c.

SYRPHVS podagricus.

Die podagrifche Schwebefliege.

Syrphus podagricus: antennis setariis nudus thorace aeneo, abdomine bifasciato, femoribus posticis clavatis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 77. p. 299. Syst. Ent. n. 30. p. 768. Spec. Inf. T. II. n. 43. p. 430. Mant. Inf. T. II. n. 50. p. 339.

Habitat in Silesiae floribus.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus glaucius Fabr.

St. f. c.



SYRPHVS glaucius.

Die graue Schwebefliege.

Syrphus glaucius: antennis setariis subtomentosus niger abdomine basi pellucido cingulisque duobus albidis interruptis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 97. p. 304. Syst. Ent. n. 37. p. 770. Spec. Inf. T. II. n. 53. p. 431. Mant. Inf. T. II. n. 61. p. 340.

Musca glauca. *Linn.* Syst. Nat. n. 47. p. 986. ed. XIII. n. 47. p. 2874. Fn. Suec. n. 1813.

Conops glaucius. Scop. carn. n. 966. *absque icone*.

Habitat Norimbergae.



Musca vagans Mihi.

J. St. fce.



MVSCA vagans.


Die herumschweifende Fliege.

Musca vagans: antennis plumatis pilosa cinerea, thorace punctato-striato, pedibus flavis.

Habitat in Austria.

Parva. Frons lactea hirta. Oculi fusci distantes orbita lactea. Vertex lacteus puncto fulvo. Antennae fuscae seta plumosa alba. Thorax cinereus hirtus, striis sex parallelis longitudinalibus punctatis fuscis. Scutellum cinereum. Alae hyalinae. Halteres capitati parvi albi. Abdomen conicum cinereum pilosum. Pedes flavi tarsi nigri.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Antenna plumosa aucta.





Musca semiflava Mihi.

J. St. f. co.

MVSCA semilava.

Die halbgelbe Fliege.

Musca semilava: antennis fetariis, abdomine cinerascens, capite thorace anoque flavis, pedibus pallidis.

Habitat in Austria.

Caput vesiculosum flavum raris pilis hirtum, ore pallide flavo. Antennarum clava ferruginea seta nigra. Oculi fusci distantes. Thorax flavus pilosus immaculatus. Alae magnae roseo albae venis rectis fere parallelis percursae, basi appendiculo foliaceo ciliato. Halteres parvi flavi capitati. Abdomen conicum lateribus pilosum plumbeum s. ex atro cinerascens, ano acuminato flavo. Pedes pallidi, tibiis posticis varis, unguiculis nigris.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca nebulosa Mihi.

J. St. fec.



MVSCA nebulosa.


Die wolkenflüchtige Fliege.

Musca nebulosa: antennis setariis atra nitida pilosa, thorace basi striato, alis irregularibus fusco nebulosis.

Habitat Norimbergae.

Magnitudo *Musc. domestic.* F. Frons lactea nitida. Antennae nigrae setariae. Oculi approximati rufi. Vertex lineola nigra oculos dividens. Thorax ater pilosus nitens, basi fascia cinerea striis quatuor abbreviatis percurfa. Scutellum nigrum nitidum longioribus pilis hirtum. Abdomen ovatum atrum f. atro aeneum nitidum lateribus hirtum immaculatum, segmentorum marginibus lacte lucidis. Pedes nigri pilosi, posticis elongatis. Alae irregulares lobiformes fascia fusca media nebulosa, basi appendiculo foliaceo fornicato lacteo. Halteres parvi flavi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca formosa Mihi.

J. St. fce



MVSCA formosa.

Die schön gezeichnete Fliege.

Musca formosa: antennis setariis cinerea, vertice sanguineo, thorace irregulariter striato, abdomine cylindrico fasciis quinque nigris, alis maculatis.

Habitat in Austria.

Caput triangulare, fronte orbitaque lacteis, vertice sanguineo pilosis. Oculi fusci. Antennae flavae setariae. Thorax cinereus, medio strigis duabus abbreviatis, margine laterali utrinque strigis duabus basi et apice connexis nigris. Scutellum cinereum immaculatum. Halteres capitati albi. Abdomen cylindricum cinereum, segmentorum marginibus nitidis atris. Pedes nigri. Alae vitreae hyalinae, basi striga maculari abbreviata e punctis s. maculis cohaerentibus conflata, apice punctis tribus, duobusque versus marginem posticam fuscis. Abdomen subtus atrum nitidum, pectore cinerascens.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca gangraenosa Mihi.

J. St. fee.



MVSCA gangraenosa.


Die brandfleckigte Fliege.

Musca gangraenosa: antennis setariis cinerea, alis albis maculis fuscis quinque, pedibus testaceis.

Habitat in Austria.


Caput, frons, vertex pallide flava. Oculi fusci orbita lactea. Antennae fulvae seta fusca. Thorax scutellum cinerea immaculata. Abdomen cylindricum cinereum, segmentorum marginibus fuscis. Alae vitreae hyalinae punctis macularibus quinque apiceque fuscis. Halteres parvi capitati pallidi. Corpus subtus cinereum. Pedes flavi tarsi fuscis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.





Acarus frontalis Mili.



ACARVS frontalis.

Die gelbgestirnte Milbe.

Acarus frontalis: oblongus ater nudus capite antennis pedibusque testaceis.

Habitat in *Paro maiori* Linn.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Acarus tristriatus Miki.

ACARVS trifstriatus.

Die dreygestreifte Milbe.

Acarus trifstriatus: subovatus testaceus nudus, corpore albo marginato apice striis brevibus lacteis.

Habitat in *Paro maiori* Linn.

Eodem tempore in eodem individuo uterque *Acarus* detectus fuit, quem quum nullibi descriptum deprehenderim ceu novam speciem introduxi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

des sechzigsten Hefts.

- Tab. 1. *Syrphus equestris* Femina Fabric.
 — 2. *Syrphus equestris* Mas. Fabric.
 — 3. *Syrphus segnis* Fabric.
 — 4. *Syrphus ignavus* Panzer.
 — 5. *Syrphus piger* Fabric.
 — 6. *Syrphus spinipes* Femina Fabric.
 — 7. *Syrphus spinipes* Mas. Fabric.
 — 8. *Syrphus mixtus* Panzer.
 — 9. *Syrphus vulneratus* Panzer.
 — 10. *Syrphus variabilis* Panzer.
 — 11. *Syrphus annulatus* Fabric.
 — 12. *Syrphus Thymiastris* Fabric.
 — 13. *Musca nigripes* Fabric.
 — 14. *Musca testacea* Fabric.
 — 15. *Musca arcuata* Panzer.
 — 16. *Musca brachyptera* Panzer.
 — 17. *Musca dimidiata* Panzer.
 — 18. *Musca taeniata* Panzer.
 — 19. *Musca continua* Panzer.
 — 20. *Musca conica* Panzer.
 — 21. *Musca stigma* Panzer.
 — 22. *Musca flavifrons* Panzer.
 — 23. *Musca rufipes* Panzer.
 — 24. *Musca hyalinata* Panzer.



Syrphus equestris Femina Fabr.

SYRPHVS equestris Femina.

Die Ritter Schwebefliege. Das Weibchen.

Syrphus equestris: antennis setariis tomentosus cinereus thorace fascia atra, abdomine fulvo, femoribus tibiisque posticis apice dentatis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 51. p. 292.*

Habitat Norimbergae.

Feminam, ut mihi videtur, huius Syrphi illustr. *Fabricium* descripsisse haec figura testatur.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus equestris Mas Fabr.



SYRPHVS equestris. Mas.

Die Ritter Schwebefliege. Das Männchen.

Syrphus equestris. Fabric. l. c.

Habitat cum Femina.

Marem huius Syrphi hic me delineasse non dubitandum: demonstratur id, habitu, statura, forma, fabricaque corporis pedumque in omnibus confirmari, et quod maximi est, venarum in alis directione nexu situque aequali: differt autem thorace toto, abdomineque basi apiceque griseo villosis, et variat interdum colore hirsutiei mox magis pallido mox obscuriori.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus Segnis Fabr.

SYRPHVS segnis.

Die träge Schwebefliege. Die Einschnittsfiege. La Mouche dorée à ventre brun et noir. Geoffr. Mouche à segment. Degeer.

Syrphus segnis: antennis setariis nudus, thorace aeneo, abdomine ferrugineo apice nigro. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 61. p. 295. Syst. Ent. n. 47. p. 772. Spec. Inf. T. II. n. 36. p. 428. Mant. Inf. T. II. n. 42. p. 338.

Musca segnis. *Linn.* Syst. Nat. n. 57. p. 988. ed. XIII. n. 57. p. 2877. Faun. Suec. n. 1823.

Geoffr. Inf. T. II. n. 62. p. 526.

Degeer Inf. T. VI. n. 12. p. 54. tab. 7. fig. 10.


Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 107. fig. 7.

Habitat in floribus.

Quoniam huius Syrphi figura, quam in Faun. germ. Sect. XXII. 22. suppeditavi, minus e votis successit, aliam nunc, et ut sperare fas est, meliorem et cor-

rectiorem subnectere volui. Femorum enim posticorum denticulatio, in animalculo ad vivum delineato haud ita commode fisti potuit, quae nunc in lente aucta figura clarius dignosci potest: addendum: exemplar secundum quod prior figura depicta fuerit, magis variabilem huius Syrphi indolem prodere, quam ipsum Syrphum, quemadmodum ille frequentissime occurrere solet: si quis vero in illa figura, qua in Faun. germ. XX. 20. *Muscam brassicariam* F. adumbrare voluerim, *Syrphum segnem* F. me delineasse accuset, inique agit graviterque hallucinat. Tibiae in nostris specimenibus omnes incurvae sunt, anticis albis, mediis posticisque nigro maculatis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus ignavus Miki.



Ph. ruficornis

SYRPHVS ignavus.


Die schwebrfällige Schwebestiege.

Syrphus ignavus : antennis setariis nudus ater thorace aeneo, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, tibiis flavis.

Habitat Norimbergae.

Habitus et statura *Syrph. segn. et pigr. Fabric.* ast distinctus mihi videtur. Caput atrum nitidum. Frons labiumque villosa argentea. Antennarum clava compressa fusca seta nigra. Oculi fusci. Thorax nitidus pubescens subaeneus. Scutellum nigrum subaeneum. Halterum clavae capitatae incurvae. Alae aquaeae immaculatae nervo antico crassiori nigro. Abdomen cylindricum subcompressum atrum nitidum nudum margine laterali leviter pubescenti, segmento secundo tertioque ferrugineis s. laete rufis. Femora nigra subnuda posticis incrassatis levibus. Tibiae omnes flavae posticis incurvo flexuosis. Corpus subtus ut supra.

a Magnitudo naturalis, b Eadem aucta.



Syrphus piger Fabr.



SYRPHVS piger.


Die faule Schwebefliege.

Syrphus piger : antennis setariis nudiusculus niger abdomine ferrugineo : ano nigro femoribus posticis clavatis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 63. p. 295.*

Habitat Norimbergae.

Abdomen in nostris speciminibus segmento secundo tertioque toto, quarto apice ferrugineis s. laete rufis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus spinipes Femina Fabr.



SYRPHVS spinipes. Femina.

Die stachelfüßchte Schwebefliege. Das Weibchen.

Syrphus spinipes: antennis setariis tomentosus abdomine atro: lineolis albis, segmento primo rufo, femoribus posticis dentatis. *Fabric*, Ent. syst. T. VI. n. 66. p. 296.

Sturm Verz. n. 40. p. 63. tab. 4. fig. 8. i. k.


Habitat Norimbergae.

Feminam huius *Syrphi* duntaxat illustr. *Fabricium* descripsisse verosimile est, quippe altero sexu abs me detecto, marem demum innotuisse sequenti pagella demonstrabitur.

a Magnitudo naturalis b Eadem aucta.



Syrphus spinipes Mas Fabr.



1817. 1818. 1819. 1820.

SYRPHVS spinipes. Mas.

Die stachelfüßigte Schwebefliege. Das Männchen.

Syrphus spinipes. Fabric. l. c.

Habitat cum femina.

En marem *Syrph. spinipes Fabric.*, quem a femina sua differre thorax immaculatus, abdomen basi utrique macula triangulari flava, habitusque procerior docet: reliqua, inprimis alarum venae, harumque divisio, situs, nexusque conveniunt.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. e Pes posticus auctus.



Syrphus miatus Mihi.



SYRPHVS mixtus.

Die vermischtfärbigte Schwebefliege.

Syrphus mixtus: antennis setariis nudiusculus ater, abdominis segmentis secundo tertioque sanguineis, his quartoque lunulis bis tribus albis.

Habitat in Austria.

Ne iniquus ingratusque in merita Viri M. R. Megerle Musaei Imperial. rerum natural. Inspectoris, erga Faunam insectorum germanicam meam videar, ea qua per est animi observantia gratus testor, me quaecunque entoma, quae ex *terrīs austriacis* sectiones excipiebant praecedentes, quaeque ego ad genera sua reduxi, speciebusque definivi, omnia manu faultrici huius egregii viri debere, cui et ea, quae in hac recensuntur sectione debemus.

Habitus et statura *Syrph. spiniped. Fabr.*, ast omnino alius et plane distinctus. Caput atrum nitidum vertice nigro hirsuto. Frons labiumque hirsuto pallida.

Antennarum clava compressa fusca, seta nigra. Oculi nigri. Thorax ater nitidus, nudus. Scutellum atrum subquadratum nitidum nudum. Halteres subflavi capitati. Alae appendiculo foliaceo ciliato. Alae subobscurae apice umbra hyalina rufa, nervis venisque nigris. Abdomen subcompressum subconicum atrum nudum, segmento primo atro, secundo sanguineo striga media atra, tertio sanguineo subimmaculato, quarto quintoque nigris: secundo tertio quartoque vero lunulis bis tribus albis. Pedes omnes nigri, femoribus posticis clavatis subserratis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus vulneratus Miki.

J. St. fec.



Calliphora vicina L.

SYRPHVS vulneratus.

Die verwundete Schwebefliege.

Syrphus vulneratus: antennis setosis tomentosus viridi aeneus, abdominis segmentis medio obscure sanguineis, antennis pedibusque flavis, his nigro maculatis.

Habitat in Austria. M. R. Negerle.

Habitus et statura *Syrph. volvul.* F. ast alius et distinctus. Caput atrum nitidum cinero pubescens. Antennarum clava compressa flava seta nigra. Oculi fusci. Thorax viridi aeneus nitidus subtomentosus immaculatus. Halterum squama subclavata flava apice nigra. Alae corpore maiores albae nervo antico crassiori duplici nigro. Abdomen cylindricum tomentosum viridi aeneum nitidum, segmentis medio umbra obscure rufa. Anus obtus. Pedes obscuro viridi aenei basi apiceque flavi. Corpus subtus obscure aeneum nitidum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus variabilis Mihi.



SYRPHVS variabilis.

Die schillernde Schwebefliege.

Syrphus variabilis: antennis setariis tomentosus thorace aeneo, abdomine atro violaceo, alis obscure fuscis, pedibus atris.

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

Habitus et statura *Syrph. devii Fabr.* est distinctus. Distinguitur corpore maiori, ore minime argenteo, sed atro nitido, antennis haud elongatis sed breviusculis, alis obscure fuscis praesertim ad marginem anteriorem crassiores, pedibus exilibus tennibusque atris immaculatisque, thorace aeneo, corporeque cylindrico obscurius violaceo, utrinque flavo pubescenti.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus annulatus Fabr.



SYRPHVS annulatus.


Die geringelte Schwebefliege.

Syrphus annulatus: antennis fetariis tomentosus abdomine atro segmentorum marginibus albis, femoribus posticis clavatis dentatis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 67. p. 296.*

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

Differt nostrum specimen abdominis marginibus segmentorum haud *omnino* albis, sed abdomine atro margine laterali rufo lunulisque bis tribus albis. Reliqua convenire videntur.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Syrphus Thymiastris Fabr.



SYRPHVS Thymiaſtri.

Die Quendel - Schwebefiege.

Syrphus Thymiaſtri: antennis ſetariis tomentofus thorace ſubaeneo, abdomine atro: faſciis tribus albidis; ſecunda interrupta. *Fabric.* Ent. ſyſt. T. VI. n. 103. p. 306. *Spec. Inf.* T. II. n. 60. p. 433. *Mant. Inf.* T. II. n. 69. p. 340.

Habitat in Auſtria. *M. R. Megerle.*

In noſtro ſpecimine tibiae poſticae nigro annulatae ſunt, abdomenque atrum faſciis tribus glaucis, nullaue interrupta eſt. Reliqua ad amuſſin conveniunt.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca nigripes Fabr.



MVSCA nigripes.

Die schwarzfüßige Fliege.

Musca nigripes: antennis plumatis pilosa nigra, abdominis lateribus testaceis albo tessulatis. *Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 30. p. 319.*

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca testacea Fabr.

St. fce

MVSCA testacea.


Die gelblichte Fliege.

Musca testacea: antennis plumatis cinerea scutello abdomine pedibusque testaceis..

Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 32. p. 320. Spec. Inf. T. II. n. 22. p. 440. Mant.
Inf. T. II. n. 24. p. 344.

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

a: Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca arcuata Mihi.

J. St. f.



MVSCA arcuata.

Die wachsgelbe Fliege.

Musca arcuata: antennis setariis thorace cinereo, capite antennis abdomine pedibusque flavis, alis punctis duobus lineolaque fuscis.

Habitat in Austria. M. R. Megerle.

Statura et magnitudo *M. testaceae* F. at differt antennis setariis, capite antennisque flavis alisque punctis maculaque fuscis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca brachyptera Miki.



Pieris rapae L.

MUSCA brachyptera.

Die kurzflügelichte Fliege.

Musca brachyptera: antennis setariis flava, thorace cinereo nigro lineato postice nigro, alis basi flavo fuscoque maculatis.

Habitat Norimbergae.

Singularis structurae Musca. Caput sericeo albidum vertice subflavo. Oculi brunnei. Antennae fuscae seta nigra. Thorax antice cinereus lineolis quatuor nigris, postice obscure fuscus s. niger. Scutellum fuscum. Halteres fornicati flavi. Alae brevès obtusae erectae hyalinae, basi flavae fascia fusca. Abdomen flavo holosericeum compressum obtusum immaculatum. Femora subtus flava, supra nigra. Tibiae nigrae. Thorax subtus cinereus, abdomenque villosio albidum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca dimidiata Mihi.

J. St. f. ex.



MVSCA dimidiata.

Die halbgelbe Fliege.

Musca dimidiata: antennis setariis grisea, thorace sublineato, abdomine flavo apice fusco, alis basi flavis fascia fusca.

Habitat in Austria. **M. R. Megerle.**

Habitus et statura fere *Musc. brachypter* ast alae maiores minusve erectae. Caput albido-sericeum, vertice lineola fusca. Antennae fuscae seta nigra. Oculi fusci pone ciliati. Thorax cinereus sub- s. obscure lineatus. Scutellum fuscum pilosum. Halteres foliacei fornicati. Alae hyalinae basi flavae fascia transversa late fusca. Abdomen flavum, basi lineola apiceque late nigris. Anus pallidus. Pedes nigri femoribus flavis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca lienaria Mihi.

MVSCA taeniata:


Die gelbbauchigte Fliege mit der braunen Rückenstreife.

Musca taeniata: antennis setariis pilosa cinerea, abdomine testaceo dorso linea apiceque fuscis, alis basi subflavis macula fusca.

Habitat Norimbergae.

Caput sericeo cinereum lineola frontali rufa. Antennae flavae apice nigrae, seta nigra. Thorax cinereus sublineatus apice fuscus. Scutellum fuscum. Abdomen subcompressum sericeo - testaceum dorso linea apiceque fuscis. Halteres foliacei pallide flavi. Alae breves erectae apice hyalinae basi subflavae macula fusca.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca continua Mihi.

J. St. J.

MVSCA continua.

Die gelbbauchigte Fliege mit ununterbrochener Rückenstreife.

Musca continua: antennis setariis cinereo pilosa, capite abdomineque flavis, abdomine linea dorsali apiceque nigris.

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

Os albido sericeum. Vertex flavus. Antennae nigrae. Oculi fusci. Thorax cinereus sublineatus. Scutellum fuscum. Halteres foliacei flavi. Alae hyalinae basi flavae. Abdomen pilosum flavum, linea dorsali apiceque nigris. Pedes nigri.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta,



Musca conica Mihi.

J. St. fec



MVSCA conica.

Die Kegelförmige Fliege.

Musca conica: antennis setariis testacea nuda, thorace lineato, abdomine conico nitido segmentis margine apiceque nigris.

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

Habitus et statura *M. scybalar.* F. Os cum fronte pallide flavo-fericennum. Antennae flavae seta pallide flava. Oculi approximati fuscis. Thorax dorso cinereus, lineolis quatuor fuscis, intermediis duabus approximatis, margine laterali testaceo. Scutellum testaceum. Halteres clavati flavi. Alae corpore duplo longiores apice fuscae. Abdomen conicum nudum nitidum flavum, segmentis margine apiceque fuscis. Pedes testacei.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

1877

1878

1879

1880

1881

1882



Musca stigma Mili.

J. St. fec.

MVSCA Stigma.

Die Metallfliege mit der schwarzen Fliegenarbe.

Musca Stigma: antennis setariis aenea, abdomine clavato viridi aeneo nitidissimo apice flavo, alis hyalinis stigmate fusco.

Habitat in Austria. M. R. Megerle.

Parva. Caput nigrum opacum ore flavo. Oculi nigri semoti orbita fusca. Antennae testaceae apice fuscae seta nigra. Thorax opacus subaeneus dorso obscure cinereo. Scutellum obscurum. Halteres clavati flavi. Alae hyalinae basi subflavae, stigmate pone apicem fusco distincto. Abdomen clavatum nitidum viridi aeneum, basi flavum. Pedes flavi mediis et posticis elongatis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta,



Musca flavifrons Mihi.

MVSCA flavifrons.

Die gelbgestirnte Fliege.

Musca flavifrons: antennis plumatis obscure plumbea, capite antennis thoracis striis pedibusque flavis, alis reticulatis.

Habitat in Austria. M. R. Megerle.

Habitus et statura *Musc. rufifrons*. F. Os albido-sericeum, vertice flavo, linea frontali punctisque utrinque tribus nigris. Antennae flavae hirtae acuminatae, apice nigrae seta plumata alba. Thorax obscure plumbeus striis tribus flavis abbreviatis. Scutellum plumbeum. Halteres clavati pallidi. Alae obscurae reticulatae costa marginali nigra. Abdomen obscure plumbeum opacum. Pedes flavi.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta. c Antennae, seta plumata aucta.



Musca rufipes Mihi.

J. Sl. fec.

MVSCA rufipes.

Die rotbfüßigte Fliege.

Musca rufipes: antennis elongatis setariis nigra, pedibus rufis, posticis elongatis.

Habitat Norimbergae.

Antennae elongatae longitudine thoracis nigrae hirtae seta brevi pallida. Caput atrum nitidum. Oculi semoti nigri supra macula flava. Thorax ater opacus pallide sublineatus. Halteres clavati pallidi. Alae fuscae immaculatae. Abdomen atrum opacum ano acuminato. Pedes sanguinei, posticis elongatis, tarsis fuscis.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.



Musca hyalinata Mihi.

J. St. f. e.



[Faint, illegible handwritten text]

MVSCA hyalinata.

Die glasflüglichte Fliege.

Musca hyalinata: antennis fetariis nigra, alis hyalinis strigis duabus abbreviatis punctisque apice tribus nigris.

Habitat in Austria. *M. R. Megerle.*

Caput sericeo flavum, ore nigro, vertice rufo. Antennae porrectae acuminatae rufae, seta nigra. Oculi semoti fusci. Thorax ater opacus postice cinereo pubescens. Scutellum fuscum. Halteres capitati albi. Alae vitreae hyalinae basi flavae, strigis brevibus duabus, maculisque apicis tribus nigris. Abdomen atrum nitidum fasciis duabus albis, Pedes rufi, femoribus nigris. Corpus subtus atrum nitidum.

a Magnitudo naturalis. b Eadem aucta.

