

kannten Standortes seltene *Wulfenia carinthiaca*, sondern auch eine große Zahl anderer zum Theil noch seltener und schwerer zu cultivirende Alpenpflanzen meist im üppig blühenden Zustande, von denen wir nur *Rhododendron Chamaecistus*, nebst *hirsutum* und *ferrugineum*, *Primula integrifolia*, *pubescens*, *Clusiana*, *Leontopodium umbellatum*, *Gentiana pannonica*, *Braya alpina*, *Mandragora officinalis*, *Ranunculus parnassifolius* und *Thora*, *Pedicularis rostrata*, *Androsace lactea* und *Chamaejasme*, und einige 40 größtentheils seltene Arten von *Sempervivum* erwähnen wollen.

II. L i t e r a t u r.

1. *Ueber das Vaterland der Erdäpfel und ihre Verbreitung in Europa*, von Grafen Kaspar Sternberg. (Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. 1ster Jahrgang, Februar S. 19 — 31.)

Unter dieser Ueberschrift giebt der gelehrte Hr. Vfr. in gedrängter Kürze eine kritische Geschichte der Erdäpfel und ihres Anbaues mit Benutzung der neuesten Nachrichten über ihr Vaterland von DeCandolle, Lambert, Pavon, Zea, Baldwin, Bowler, Dickson u. a. nebst Zusammenstellung und Erläuterung der verschiedenen widersprechenden Nachrichten über ihre Verpflanzung und allmähliche Verbreitung innerhalb Europa.

2. *Dissertatio inauguralis geographico-botanica de territorio Vindobonensi — publicae disquisitioni submittit A. E. Sauter.*

Wenn gehaltreiche Arbeiten als Inaugural-Dis-

sertationen erscheinen, so ist das Geschenk um so erfreulicher wegen der für die Zukunft gesteigerten Erwartungen. Der Verf. schon längst als emsiger Erforscher unserer Alpenflora bekannt, giebt hier in einem Hefte die Frucht 6jähriger eigener Excursionen so wie der Mittheilungen von fast allen dortigen Botanikern. Nach einer gedrängten und vollständigen Darstellung der physischen Beschaffenheit der Gegend von Wien und der Angabe der den verschiedenen Lagen und Gebirgsformationen eigenthümlichen Pflanzen folgt die Aufzählung der 1330 Phanerogamen der Wiener - Flora, und einiger Farrrn, indem der Verf. die Ordnungen der Cryptogamen nur im allgemeinen nach ihrem bezugsweisen Vorkommen aufführt; etwas vollständiges läßt sich allerdings hinsichtlich dieser Ordnungen gegenwärtig kaum in irgend einer Specialflora liefern. Die Arten folgen der natürlichen Ordnung nach, wobei der Vfr. es auch versucht die Familien zu größern Abtheilungen zusammenzureihen. Die Coniferen stehen bei den Acotyledonen nach den Equisetaceen. 15 neue Bürger der deutschen Flora ausser 11 ganz neuen Arten von Host erhöhen den Gehalt.

III. Deutsche Flora.

Carex Gynomane Bertol.; eine für die Flora von Deutschland neue *Carex* - Art.

Diese Pflanze wurde von Hrn. Müller, einem der Reisenden für den Württembergischen naturhistorischen Reise-Verein, im verflossenen Sommer in Istrien entdeckt, wo sie auf der kleinen Insel Bryoni, welche nicht weit von Fasana entfernt ist, im schattigen Gebüsche vorkommt. Anfangs wurde

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1827

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literatur 445-446](#)