

FLORA.

N^o. 25.

Regensburg.

7. Juli.

1844.

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal-Landes. Fortsetzung. (Rosaceae—Loranthaceae). — The Calcutta Journal of Natural-History. Vol. IV. n. 13. (Griffith, on some remarkable plants in the H. C. Botanic Gardens, Calcutta).

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. FERDINAND KRAUSS.

(Fortsetzung.)

(Hiezu Steintafel I.)

Rosaceae Juss.

1200. *Rubus rosaefolius* Sm., DC., Meisn. l. c. p. 527. — Ad lat. occident. mont. Tafelberg, Julio, Alt. 1000'.
1201. *R. pinnatus* Willd., DC., Meisn. l. c. — Ad rivulos in planit. capens., Sept.
- s. n. *Agrimonia Eupatorium* L., Meisn. l. c. p. 528. — Ad sylvarum margines in Outeniqua, George, Febr.
- s. n. *Alchemilla capensis* Thunb. — Ad radicem mont. Tafelberg, Sept., Alt. 6—800'.
1202. *Cliffortia odorata* L. fil., DC., Meisn. l. c. Stirps mascula. — Ad rivulos per totam terram Outeniqua, Febr.
1204. *C. filifolia* L. fil., DC., Meisn. l. c. — Ad lat. mont. Dnyvelskop, George, Febr., Alt. 1800'.
1203. *C. laricina* E. Mey. mss. in Hb. Drèg., var. *longifolia* Meisn. l. c. p. 528.* — In montibus prope fl. Kleine R., Zwillingendam, Dec.
1209. *C. ericaefolia* L. fil., DC., Meisn. l. c. — *C. teretifolia* Thunb.? var. *tenuior* E. Mey.!, Meisn. l. c. — In arenosis prope Constantiam, Sept.
1211. *C. eriocephalina* Cham. in Linnaea 6, p. 349, Meisn. l. c. — In planit. capens., Julio.
1212. *C. falcata* L. fil., DC., E. Mey.!, Meisn. l. c. — In arenosis planit. capensis, Julio.
1210. *C. ternata* L. fil., DC., Meisn. l. c., — *C. polygonifolia* E. Mey. l. c. — In arenosis planit. capensis, Sept.
- s. n. *C. ruscifolia* L. — Ad latera montium Duyvelsberg et Tafelberg, Julio, Alt. 1—2000'.

s. n. *C. strobulifera* L. — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenberg, Mai, Alt. 1000'.

s. n. *C. trifoliata* L. — Inter frutices prope Paarl, Stellenbosh, Julio.

s. n. *C. obcordata* L. — In arenosis prope Constantiam, Sept.

Lythrariceae Juss.

1085. *Lythrum Thymifolia* L. — Ad latera montis Duyvelskop, George, Febr., Alt. 1000'.

Rhizophoraceae R. Br.

267. *Rhizophora mucronata* Lam. — In limosis salsis circa Natalbai, Aug.

309. *Bruguiera gymnorhiza* Lam. — In limosis salsis circa Natalbai, Julio. Sub nomine „Mengerhout.“

Combretaceae R. Br.

n. sp. 253. *Combretum Kraussii* Hochst. Frutex vel arbor 15—20pedalis, ramis cinereis. Folia opposita 2—3pollicaria obovato-lanceolata, obtusa apice mucronulato, basi in petiolum brevem decurrentia, integerrima, utrinque glaberrima, subtus pallide olivacea et lucidula, venis obscurioribus reticulato-venosa; spicae axillares pedunculatae foliis plerumque breviores; flores calyce cyathiformi, limbo intus villosus, petalis brevibus, stylo staminibus longiori erecto. (Hochst.) — In sylvis primitivis circa Umlaas River, Octobri 1839 florens lectum.

n. sp. 350. *Poirrea bracteosa* Hochst. Differt a *P. aculeata* Dec. foliis majoribus et bracteis pedicellatis ovalibus calyces aequantibus vel superantibus, nec non calycis limbo paulo profundius inciso. Frutex 8—10pedalis; forsitan *P. aculeatae* varietas? (Hochst.) — In sylvis prope fl. Umlaas Natal, Octobri lecta.

Melastomaceae Don.

n. sp. 201. *Osbeckia phacotricha* Hochst. Radix perennis; caules plerumque plures pedales quadrangulares atro-purpurei, pilis flavidis rigidis patulis hispidi; folia opposita, inferiora breviter petiolata, superiora sessilia, ovato-lanceolata vel lanceolata, 3—5nervia, acuta, leviter serrulata, supra e punctis elevatis saepe nigricantibus hispida, flavo-viridia, inferne densius hispida (praesertim ad nervos) et viridi-flava; flores terminales capitato-conglomerati, bracteis foliaceis deflexis capitulo suppositis fulciti (quandoque etiam capitulum alterum inferius e ramulo axillari ortum adest); calyces pilis longis atro- vel fusco-purpureis rigidulis hispidissimi, petala purpurea. (Hochst.) — In graminosis planit. prope Natalbai, Decembri florens lecta.

n. sp. 120. *O. Umlaasiana* Hochst. est *O. incana* E. M. secundum exemplar Dregeanum, quod inspicere et comparare licuit, no-

tis sequentibus describenda: Caulis quadrangularis purpurascens, tomento brevissimo subincanus; folia opposita, brevissime petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, basi subcordata, supra punctis stellatis scabra, subtus nervis quinque prominulis et venis transversis notata et incana; flores racemoso-paniculati, panicula seu racemus compositus terminalis, 2—4 pollicaris, calyces pilis stellatis minutis incani, tubo globoso, segmentis ovato-lanceolatis tubum aequantibus, petala calycis limbo plus duplo majora, purpurea, glabra. (Hochst.) — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Jan.

Myrtaceae Juss.

n. sp. 136. *Syzygium cordatum* Hochst. Arbor 30—40 pedalis. Ramuli floriferi subquadranguli; folia opposita subsessilia, subrotundo-vel elliptico-cordata, integerrima, glaberrima, penninervia, nervis copiosis transversalibus venisque reticulatis in pagina inferiori prominulis; cyma terminalis ramis ramulisque quadrangulis, calycibusque brevissime 4dentatis glabris, stylus stamina numerosa superans. Fructus acidulo-adstringens. — Num *Jambosa cyminifera* E. M.?, sed petala apice in calyptrae formam cohaerentia apertae flore decidunt — hinc potius *Syzygii* quam *Jambosae* species. (Hochst.) — In sylvis dunarum per totam terram natalensem, Octobri, Nov.

Onagrariceae Juss.

1805. *Montinia acris* L. fil. — In planit. capensi et in Langekloof (George), Mart., Jul.

n. sp. 36. *Jussiaea fluitans* Hochst. Caulis inferne fluitans glabriusculus, superne erectus parce hispidus; folia lineari-lanceolata in petiolum longiusculum attenuata, cum petiolo 2—3 pollicaria, glabriuscula vel subciliata, uninervia, venosa; flores axillares solitarii, pedunculati, calyces hispido-pilosi segmentis angustis acuminatis, petala flava calycis limbo majora. (Hochst.) — In fluvio Umlaas Decembri florens lecta.

n. sp. 73. *J. linearis* Hochst. Caulis ramosus quadrangulus (saltim rami quadranguli), pubescens; folia alterna vel rarius opposita, linearia 3—4 pollicaria in caule primario, 1½—2 pollicaria in ramis, 1—2 lineas lata, subtrinervia, margine scabriuscula vel subciliata, facie hispidula; flores axillares solitarii breviter pedunculati, calycis lacinae lineari-lanceolatae trinerves acutae tubo longiusculo breviores, hispidulae; petala calycis limbum vix superantia. (Hochst.) — In arenosis ad ripas fl. Umslutje et Umgani, Natal, Junio.

1598. *Epilobium villosum* Thunb. — Ad rivulos et in paludosis Zitzikamma, Mart.

154. *E. montanum* L. — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 1599. *E. capense* Buchinger in litt. Caulis teretiusculus purpurascens inferne glabriusculus, superne ramosus puberulus; folia opposita et subterna nec non alterna, breviter petiolata lanceo-

lata vel lineari-lanceolata, denticulis vel serraturis calloso-glandulosis ad marginem instructa, inferiora subglabra, superiora puberula (praesertim ad nervum dorsale et marginem); flores in axillis supremis solitarii longe pedunculati, corolla mediocris, stigmata (ut videtur) in clavam coalita vel apice subpatentia; capsula linearis angustissima, pubescentia brevissima incana, pedunculo paulo longior. (Hochst.) — Species inter *Epilobium roseum* Schreb. et *virgatum* Fries quasi intermedia, sed utrumque florum magnitudine superans, qui minores tamen quam in *E. hirsuto*. — In locis humidis prope fl. Knysna, George, Jan.

* * *

540. *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham. — In fluvio Umlaas, Natal, Octobr.

Podostemoneae.

n. gen. *Sphaerothylox* Bisch. *Spatha subglobosa*, vertice irregulariter rupta. Flos inclusus, pedicellatus. Perigonium nullum. Stamina 3, collateralia, basi connata, 2 lateralibus sterilibus, intermedium bifidum, antheras 2, loculis inaequalibus, gerens. Stigmata 2 sessilia, tuberculiformia. Capsula exserta nutans, costata, bilocularis, bivalvis, polysperma, dissepimento crasso placentiformi libero, valva inferiore sub dehiscendum decidua.

n. sp. *S. algiformis* Bisch. (*Hydrobryum nutans* Bisch. n. sp. mss.) Frons linearis, pinnatifida v. bipinnatifida, 2—3 uncias et ultra longa, saxis adpressa et quasi adglutinata, absque radiculis. Flores marginales in axillis et crenaturis laciniarum solitarii. Involucrum brevissimum, e bracteis binis distichis semivaginantibus formatum, spatham subglobosam vix $\frac{1}{2}$ lineam longam basi cingens. Capsula ellipsoidea v. subglobosa, lineam circiter longa, octocostata, fusca; dissepimentum totum seminibus confertis tectum, cum capsulae valva deorsum spectante solubilis et mox decidua. — In rivulis montanis regionis Buschmanns Rand prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Sept.

Explicatio tabulae I.

- Fig. 1 et 2. Plantulae lapidi schistoso irrepentes — magn. nat.
 „ 3. Frondis ramulus florifer et fructiger: a. spatha apice jam rupta, sed florem adhuc totum recludens; b. spatha magis rupta cum fructu immaturo erumpente; c. fructus maturus e spatha emersus; d. pedunculus post valvas capsulae dejectas remanens.
 „ 4 et 5. Spathae in axillis frondis sessiles, bracteis binis distichis fultae.
 „ 6. Flos nutans spatha excerptus, staminibus instructus.
 „ 7. Fructus semimaturus, staminibus evanidis.
 „ 8. Idem cultri ope apertus, semina immatura continens.
 „ 9. Semina immatura magnitudine magis aucta.
 „ 10. Capsula matura subglobosa, cum spatha et involucro diphylo pedunculum vaginantibus.
 „ 11. Capsula altera, subellipsoidea, antice visa, cum stigmatibus tuberculiformibus.

Fig. 12. Capsulae valva superior pedunculo continua et diutius remanens, ab imo visa, cum dissepimento crasso placentiformi.

„ 13. Semen maturum siccum, ellipsoideum, leviter compressum.

„ 14. Idem humectatum, ob epidermidem e cellulis vesiculosi mucilaginis distentis conflatum intumescens.

„ 15. Idem longitudinaliter dissectum, testam sub epidermide tenuem et embryum dicotyledoneum monstrans.

Cucurbitaceae Juss.

s. n. *Bryonia africana* Thunb. — In sylvis primitivis Knysna, George, Febr.

68. *B.* ? — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Jan.

1818. *Pilogyne scabra* Eckl. et Zeyh. — Ad lat. orient. montis Duyvelsberg, Julio, et in sylvis Outeniqua.

s. n. *Citrullus caffer* Schrad. ? — In sylvis prope Natalbai, Novembr.

s. n. *Cucumis prophetarum* L. — Inter arundines prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

90. *Momordica Balsamina* L. — In sylvis prope Natalbai, Octobr.

1819. *M. quinqueloba* E. Mey. — Ad sylvarum margines in Zitzikaunna, Uitenhage, Mart.

47. ? — Arundines scandens, ad fluv. Umlaas, Natal, Nov.

Samydeae Gaertn.

n. gen. 133. *Candelabria micrantha* Hochst. in Flor. Ratisb. 1843, I. p. 79. — In sylvis prope Natalbai, Nov.

Paronychiaceae St. Hil.

2, 1083. *Pollichia campestris* Ait. — Ad lat. montium Winterhoek, Uitenhage, et in terra natalensi, Majo.

1843. *Stuedelia galioides* Prest. — In arenosis prope litus Houtbai, Cap, Sept.

1844. *St. diffusa* Eckl. et Zeyh. — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenberg, Sept., Alt. 1000'.

1842. *Spergula marina* Bartl. — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, April.

1848. *Sp. media* Bartl. — Ad ripas fl. Knysna prope lit., Jan.

1850. *Pharnaceum reflexum* Eckl. et Z. — In solo argillaceo circa urbem, Sept.

1849. *Ph. gracile* Fenzl ? — In arenosis planit. capens., Sept.

1851. *Ph. incanum* L. — Ad lat. montis Duyvelsberg, Cap, Julio.

1852. *Ph. lineare* L. — In arenosis planitie capensis prope Rietvalley, Junio.

1853. *Ph. croceum* E. Mey. — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, April.

4. *Psammotropha androsacca* Fenzl, Meisn. in Hook. Journ. 2, p. 529. — *Ginginsia glaucescens* E. Mey. ? — Inter rupes in summis montibus Tafelberge, Natal, Jan., Alt. 2000—3000'.

1845. *Corrigiola telephiifolia* Pourr. — Ad litus Van Campsbai, Cap, Junio.

135. *Limeum glomeratum* Eckl. et Z. — In graminosis circa Natalbai, Nov.

1857. *L. africanum* L. — In solo argillaceo prope Uitenhage, April, Majo.

Crassulaceae DC.

1603. *Helophytum natans* Eckl. et Zeyh. — In stagnantibus planit. capensis, Julio.

1701. *Sarcolipes pubescens* Eckl. et Zeyh. — In hiatibus rupium umbrosis prope Constantiam, Sept.

1685. *Crassula rubricaulis* Eckl. et Z. — In collibus prope Plettenbergsbai, George, Febr.

1684. *C. ramosa* Thunb. — In planit. Zoetendalsvalley, Zwelendam, Dec.

1689. *C. centauroides* L. — In uliginosis planit. capens. prope Constantiam, Sept.

1132. *C. glomerata* L. — In planit. capensi, Nov.

1683. *C. ciliata* L. — In planitie Zoetendalsvalley, Zwelendam, Dec.

1682. *C. filicaulis* Haw. — In solo argillaceo prope fl. Notsinakamma, George, Jan.

1846. *Crassulae pellucidae* L. *affinis*. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

s. n. *Crassula flava* L. — In solo argillaceo prope villam Zwelendam, Dec.

s. n. *C. ?* (Hb. Drèg. n. 6902.) *ibid.*

1694, 1695. *Tetraphyle furcata* Eckl. et Zeyh. — In solo argillaceo prope villam Uitenhage, April.

1679. *T. muscosa* Eckl. et Z. — Inter rupes sylvarum prope George, Jan.

1680, 1681. *T. lycopodioides* Eckl. et Zeyh. — Prope fl. Zout R. in planit. capensi et in collibus prope George, Jan.

1678. *Thisantha glabra* Eckl. et Zeyh. — Ad latera montis Duyvelsberg, Cap, Sept.

1686. *Rochea coccinea* DC. *var. minus ciliata*. — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500'.

1687. *R. odoratissima* DC. — Ad latera montium Peninsulae, Septembr.

1688. *R. jasminca* DC. — In summis montibus prope Genadenthal, Zwelendam, Dec., Alt. 3000'.

1690, 1692. *Septas capensis* L. — Inter rupes prope Van Campsbai et in Tulbaghskloof, Majo.

1691. *S. cap. var. parviflora*. — Inter rupes in Tulbaghskloof, Worcester, Majo.

Ficoideae Juss.

1704. *Mesembryanthemum deflexum* Haw. — In arenosis planitiei capensis, Majo.
1703. *M. mutabile* Haw. — In arenosis prope urbem, April.
1702. *M. crinifolium* Thunb. — In solo argillaceo - arenoso prope Van Campsbai, Julio.
1700. *M. cuneifolium* Jacq. (*M. sabulosum* Eckl. et Zeyh.) — Prope Van Campsbai, Julio.
1698. *M. testaceum* Haw. — In solo argillaceo prope fl. Koega, Uitenhage, April.
1696. *Tetragonia decumbens* Mill. — In dunis prope Zwartevalley, George, Febr.
- s. n. *T. herbacea* L. — In arenosis planitiei capensis, Julio, August.
1699. *Aizoon sarmentosum* L. fil. — In arenosis planitiei capensis, Aug.
1697. *A. hirsutum* Eckl. et Z. — In arenosis ad fl. Koega, Uitenhage, April.
1653. *Galenia africana* L. — In solo argillaceo prope fl. Brakke R., Zwellendam, Jan.

Saxifrageae Juss.

- s. n. *Cunonia capensis* L. Meisn. in Hook. Journ. 2, p. 529. — Ad lat. montium Tafelberg et Winterhoek, Uitenhage, April, Alt. 800—1500'.
1026. *Weinmannia trifoliata* Thunb. β . *grandiflora* Klotzsch. — Ad rivulos in distr. Zwellendam, Dec.

Bruniaceae DC.

1855. *Brunia nodiflora* L. — In Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Cap, Majo.
778. *B. microphylla* Thunb., DC., Meisn. l. c. p. 59.* — *Raspailia teres* E. Mey. in pl. Drèg.? — Certe Bruniae nec Raspailiae sp. — In summitate montium Bavianskloof, Zwellendam, Decembr.
- s. n. *Berzelia lanuginosa* Brongn. — In arenosis planitiei capensis, Julio.
1854. *B. superba* Eckl. et Zeyh. — In montibus prope fl. Kleine R., Zwellendam, Dec.
- 1856, 1857. *B. rubra* Schlecht. — In arenosis planitiei capensis, Nov.
- s. n. *Staavia glutinosa* L. — Ad lat. mont. Tafelberg, Majo, Alt. 200'.
- s. n. *St. radiata* Th. β . *ericetorum* Hb. Un. itin. n. 768. — In planit. capensi, Majo.
- s. n. *Audouinia capitata* Brongn. — Ad lat. mont. Muysenburg, Cap, Julio.

Umbelliferae Juss.

n. sp. 127. *Hydrocotyle caffra* Meisn. l. c. p. 529.* — Affin. *H. Bonariensi* Lam. et petiolaris DC. — In solo argillaceo-arenoso circa Natalbai, Nov.

1175. *H. interrupta* Mühlenb., DC., Meisn. l. c. p. 530. — *H. verticillata* Thunb. — In locis humidis prope fl. Knysna, Jan.

1176. *H. ficarioides* Lam., DC., Meisn. l. c. — In locis humidis planitiei capensis, Junio.

1177. *H. eriantha* Rich., DC., Meisn. l. c. — In sylvis primitivis Outeniqua, George, Jan.

1178. *H. calliodus* Cham et Schlecht. ! DC., Meisn. l. c. — Prope fl. Zonder-Ende R., Zwellendam, Dec.

s. n. *H. Solandra* L. — Ad radicem montis Leuwenkop, Cap, Julio.

1174. *H. tridentata* L. fil., DC., Meisn. l. c. — Ad radicem montium prope Genadenthal, Zwellendam, Dec., et in terra Nataland, Octobr.

1170, 1171, 1172. *H. virgata* L. fil., α . *glaberrima* DC., Meisn. l. c. — Ad radicem montium Bavianskloof, Outeniqua et Winterhoek, Dec.—Febr.

1173. *H. virgata* L. fil. δ . *nana* DC., Meisn. l. c. — Ad lat. montis Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 2000'.

1193. *Sanicula europaea* L. β . *capensis* Cham. et Schl., DC., Meisn. l. c. — In sylvis primitivis Knysna, Jan.

605. *Alepidea ciliaris* Laroche. — In collibus prope villam George, Jan.

1198, 1199. *Apium graveolens* L., DC., Meisn. l. c. — *Helosciadium Ruta* DC. ? *Smyrniolum laterale* Thunb. — Ad rivulos in Zitzikamma, Febr.

187. *A. graveolens* L. — Ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 418. *Petroselinum humile* Meisn. (*Apium*? *humile* Meisn. in schedul.) l. c. p. 531.* — Ad fluv. Umlaas, Natal, Octobr.

1197. *Sium* (*Berula*) *Thunbergii* DC., E. Mey. !, mss. in Hb. Drèg., Meisn. l. c. — *Sium angustifolium* Thunb. Un. itin. n. 60. ! — Ad rivulos in Zitzikamma, George, Febr.

s. n. *Bupleurum difforme* L., C. D., Meisn. l. c. — Inter rupes in Langekloof, George, Febr.

1189. *Heteromorpha collina* E. et Z. enum. p. 342., Meisn. l. c. — Ad fl. Notsinakamma, George, Jan.

196. *Lichtensteinia pyrethrifolia* Cham. et Schl., DC. (excl. syn.), Meisn. l. c. p. 531. — In graminosis prope fl. Umlaas, Dec.

1180. *L. inebrians* E. Mey. ! mss. in Hb. Drèg., Meisn. l. c. p. 532. — *Oenanthe inebrians* Thunb. — *Lepisma paniculatum* E. Mey. l. c. ? — Ad rivulos prope Genadenthal, Zwellendam, Decembr.

s. n. *Oenanthe filiformis* Lam., DC., E. Mey. ! l. c., Meisn. l. c. — In summis montibus prope Genadenthal, Dec.

n. sp. 140. *Foeniculum* ? *Kraussianum* Meisn. l. c. p. 532.* (Pimpinella Kraussiana Meisn. olim in sched.) — In planit. prope fl. Umlaas, Natal, Nov.

n. sp. 403. *Seseli* (*Hippomarathroides*) *castrum* Meisn. l. c. p. 533.* — In graminosis per totam terram natalensem, August., Septembr.

1196. *Heteroptilis* (nov. gen.) *arenaria* E. Mey.! mss. in Hb. Drèg., Meisn. l. c. p. 534* cum diagn. generis et sp. — Genus *Selino* proximum. — In dumis prope Zwartevalley, George, Febr. Martio.

433. *Seseli* ? n. sp.? (*Seseli* filifolium Thunb.? olim in sched.) — In summis montibus Tafelberge, Natal, Aug., Alt. 2—3000'.

1188. *Peucedanum capillaceum* Thunb., DC., Meisn. l. c. p. 535. — Ad rivulos montium Bavianskloof, Dec., Alt. 1000.

1181. *P. elongatum* E. Mey.! l. c., Meisn. l. c.* — Ad lat. montis Tigerberg, Cap, Nov., Alt. 1000'.

1179. *P. abbreviatum* E. Mey. l. c., Meisn. l. c. — In summis montibus Peninsulae, Mart., Alt. 2—3000'.

1185. *P. virgatum* Cham. et Schl., DC., Meisn. l. c. — *Dregea virgata* Eckl. et Zeyh. p. 351. — In locis humidis ad sylvarum margines Knysna, Jan.

1184. *P. lanceolatum* E. Mey.! l. c., Meisn. l. c. p. 536. — *Dregea collina* E. et Z. — Praecedentis var.? — Prope fl. Not-sinakamma, George, Jan.

1186, 1186 b., 1178. *Bubon Galbanum* L., DC., Meisn. l. c.* — Ad radicem montis Tafelberg et Bavianskloof, Dec.

1183. *B. hypoleucum* Meisn. l. c. p. 536.* (*Seseli* hypoleucum Meisn. olim in sched.) — Ad rivulos montium Bavianskloof, Jan.

s. n. *Arctopus echinatus* L. — In locis aridis argillaceis planitiei capensis, Junio.

1194. *Hermas villosa* Thunb., DC., Meisn. l. c. p. 537. — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500'.

1195. *H. capitata* L. fil., DC., Meisn. l. c. — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500'.

Araliaceae Juss.

1082. *Cussonia thyrsiflora* Thunb. — In sylvis primitivis Zitzi-kamma, Mart.

n. sp. 1081. *C. Kraussii* Hochst., folia novena glaberrima supra lucida, foliola in petiolos attenuata, duo infima simplicia lanceolata, media utriusque duo ternata, suprema tria pinnata, pinnis decurrentibus, integerrimis (etiam impari) mucronato-acuminatis; spicae 5—S umbellatae, pedunculus spica longior. Similis *Cussoniae* spicatae Thunb., a qua differt foliolis integerrimis, spicarum numero et pedunculi longitudine. Forsan varietas insignis. — In solo argillaceo prope fl. Geelbecks B., George, Jan.

1216. *Curtisia faginea* Ait., DC., Meisn. l. c. p. 539. — In hiatibus ad lat. montis Duyvelsberg et Tafelberg, Cap, Septembr., Alt. 1—2000'.

Loranthaceae Rich.

1217. *Loranthus Schlechtendalians* Schult., Meisn. l. c. p. 539. — *L. elegans* Cham. et Schl. (non Walt. DC.) — In Acaciis et aliis arboribus parasiticus, prope fl. Zwartkop R., Uitenbage, April.

n. sp. 208. *L. Natalitius* Meisn. l. c. p. 539.* — Affin. *L. Belvisii* DC. — In Acaciis parasiticus, ad radicem montium Tafelberge, Natal, Dec.

n. sp. 125. *L. Kraussianus* Meisn. l. c. p. 539.* — In umbris sylvarum circa Natalbai, Nov.

s. n. *L. oblongifolius* E. Mey. — In Partio tiliaceo St. Hil. parasiticus, circa Natalbai, Jan.

s. n. *L. oblongifolius* E. Mey. var. *peduncularis* Hochst., differt a priori florum capitulis longius pedunculatis, pedunculo subpollicari et corollis minus villosis. — In dunis circa Natalbai, Febr.

n. sp. s. n. *L. quinquenervis* Hochst. Cortex olivaceo-fuscus laevis nitidulus; folia alterna coriacea, ovata, obtusa, quinquenervia; flores umbellati, umbellae sessiles laterales, pedicelli breves; bractea cupulaeformis valde obliqua ad basin calycis, calyx cylindrico-cupularis, subaequaliter truncatus; corolla pollicaris vel ultra glaberrima, basi ventricosa, ad medium usque vel paulo profundius quinquefida, tubo laciniisque rectis angustis; stylus corollam aequans stigmate globoso. — In arboribus parasiticus prope Natalbai, Dec.

(Fortsetzung folgt.)

The Calcutta Journal of Natural-History. Vol. IV. nr. 13. Apr. 1843.

Dieses Journal scheint in Deutschland wenig bekannt zu seyn, da wir bis jetzt keine Auszüge aus demselben gefunden haben. Das genannte Heft enthält zwei botanische Abhandlungen; nämlich eine Zusammenstellung der von William Jack in verschiedenen Schriften mitgetheilten Descriptions of Malayan plants, welche weit den grössten Theil dieses Heftes einnimmt, und nur durch eine Abhandlung von W. Griffith: „On some remarkable plants in the H. C. Botanic Gardens, Calcutta“ unterbrochen ist. Wir betrachten hier die letztere Abhandlung, welche ohne weitere Einleitung Folgendes enthält:

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Krauss Christian Ferdinand Friedrich

Artikel/Article: [Pflanzen des Cap - und Natal-Landes 423-432](#)