

FLORA.

N^o. 39.

Regensburg.

21. October.

1844.

Inhalt: C. H. Schultz, Enumeratio Compositarum a cl. Dr. Krauss in Cap. b. sp. et ad portum Natalensem lectarum.

KLEINERE MITTHEILUNGEN. Preisaufrage der Gesellschaft Flora in Dresden. — Anzeige von Hirschwald in Berlin.

Enumeratio Compositarum a cl. Dr. KRAUSS annis 1838—40 in Capite bonae spei et ad portum Natalensem lectarum, auctore C. H. SCHULTZ Bipontino.

(Fortsetzung von Dr. Krauss Pflanzen des Cap- und Natallandes.)

Trib. I. Vernoniaceae Less.

Subtr. I. VERNONIEAE CASS.

Div. I. Euvernonieae DC.

Subdiv. I. Ethuliaeae DC.

n. sp. 228. *Ethulia Kraussii* C. H. Schultz Bipont. in Walpers repert. bot. syst. suppl. I. p. 945. = *E. conyzoides* β. africana Drège! Herb. — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Junio.

Subdiv. II. Heterocomeae DC.

223. *Vernonia angulifolia* DC. β. *Kraussii*: foliis obtusis, non acuminatis inter alia a planta Dregeana! differt. — Frutex scandens, ad sylvarum margines per totam terram natalensem, Junio.

525. *V. mespilifolia* Less. — In sylvis primitivis prope fl. Goukamma, Febr.

566. 592. 612. *V. pinifolia* Less. in Linnaea IV. p. 257. = *Webbia pinifolia* DC. pr. V. 72. = *Vernonia canescens* C. H. Sz. Bip. (non H. B. K.) in sched. — In solo lapidoso, arenoso ad latera montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili et in collibus prope George, Januario.

443. *V. natalensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. p. 947. = *Webbia aristata* DC. pr. V. 73. = *Vern. aristata* C. H. Sz. Bip. in sched. non Less. — Ad latera et in summitate montium Tafelberge, Natal, 1500—2500', b. Sandst.

Flora. 1844. 39.

39

462. 48. *V. Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. p. 947. = *Webbia elaeagnoides* DC. pr. V. 73. = *Vern. elaeagnoides* C. H. Sz. Bip. in sched. non H. B. K. — In graminosis ad radicem (Octobri) et in summitate mont. Tafelberge, Natal, Augusto.

293. *V. hirsuta* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. p. 947. = *Webbia hirsuta* DC. — In solo arenoso ad sylvarum margines circa Natalbai, Julio.

Div. III. *Rolandreae* Cass.

582. *Corymbium nervosum* Thb., DC. — Ad latera montium prope Gnadenthal, Zwellendam, Decembri.

583. *C. filiforme* Linn. fil., DC. pr. V. 89. — In solo granitaceo ad latera montium, Hottentottsholland, et in arenosis planitiei capensis, Novembri.

s. n. *C. glabrum* Thb., DC. — Ad latera montium prope Gnadenthal, Decembri. — Hoc non vidi: C. H. Sz. Bip. Specimen meum Dregeanum 2—3pedale.

Trib. II. *Eupatoriaceae* Less.

Subtr. I. *EUPATORIAE* DC.

Div. II. *Agerateae* Less.

234. *Ageratum conyzoides* Linn., DC., *c. natalense*, caule, cum foliis obtusis, hispido. — In locis humidis ad sylvarum margines prope Natalbai, Junio.

Div. III. *Adenostyleae* DC.

289. *Mikania natalensis* DC. — In sylvis primitivis circa Natalbai, Junio. — Frutex scandens.

Subtr. II. *TUSSILAGINEAE* LESS.

Div. II. *Eutussilagineae* DC.

558. *Alciope tabularis* DC. — In summitate montis Tafelberg, Cap, Martio. Alt. 3500'.

Trib. III. *Asteroideae* C. H. Schultz Bipont. in Walpers repert. bot. syst. II. p. 951.

Subtr. I. *ASTERINEAE* C. H. Sz. Bip. l. c.

Div. I. *Bellideae* C. H. Sz. Bip. l. c.

Subdiv. I. *Eubellideae* C. H. Sz. Bip. Ms.

563. *Garuleum pinnatifidum* DC. — In solo argillaceo prope fl. Koega, Uitenhage, Aprili.

Subdiv. II. *Grangeinae* C. H. Sz. Bip. l. c.

609. *Dichrocephala capensis* DC. — In sylvis Outeniqua, George, Januario.

Div. III. Astereae C. H. Sz. Bip. l. c.

Subdiv. I. *Erigereae* C. H. Sz. Bip. l. c.

n. sp. 651. *Mairia pinifolia* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. 955. — Ad latus occidentale montis Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 2000'. — Achaeniis breviter hirtis a *M. laxifolia* DC. pr. VI. 218. distincta, forsitan tamen, monente amiciss. Hochstetter, var. *Achaenia enim M. laxifoliae*, quae a cl. DC. l. c. glabra dicuntur, in specimine Dregeano etiam breviter hirta invenio.

671. *Felicia tenella* Nees., DC. — Inter rupes in Tulbaghs Kloof, Worcester, Majo, et in solo argillaceo montis Tygerberg, Septembri s. n.

362. *F. erigeroides* DC. var. *natalensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 946. — Ad sylvaram margines prope Natalbai, Octobri.

585. *F. fascicularis* DC. β . *laevigata* C. H. Sz. Bip., glaberrima, involucri imbricati squamis obtusiusculis, inferioribus apice rotundatis. An sp. propria? — In solo argillaceo ad radicem montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

n. sp. 537. *F. Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 956. — In summitate montium prope Gnadenthal, Zwelldam, Decembri, Alt. 3000'.

502. *F. echinata* Nees. Ast. 216. β . *paralia* C. H. Sz. Bip. = *F. paralia* DC. pr. VI. 222. quae mihi var. est glabrescens *F. echinatae*. — In dunis Zitzikamma, Uitenhage, Majo.

549. *F. reflexa* DC. — Ad latera montium prope Duyvelsberg et Tafelberg, Julio.

559. *Munychia Cymbalaria* Nees. Ast. 218. DC. γ . *involucro hirta* C. H. Sz. Bip. — In Kloof montis Tafelberg, Cap, Martio, Alt. 3000'. — Cl. DC. involucrum glabrum, Nees vero cavo-villosum describit. Speciminibus herbarii mei Dregeanis involucri squamae pariter sunt hirtae.

n. sp. 650. *Agathaea amoena* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 956. — In arenosis ad litus Houtbai, Septembri.

549. *Ag. hispida* DC. — In solo lapidoso-arenoso montis van Stadenberg, Uitenhage, Martio.

n. sp. 647. 648. *Ag. Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 956. Affinis etiam *Ag. microphyllae* Cass. DC. pr. VI. 225. sed foliorum forma differt. An tamen varietas? — n. 647. ad latera montis Constantiaberg, Cap, Septembri (= *Ag. amelloides* DC. β . *Kraussii* C. H. Sz. in sched. olim); n. 648. in graminosis prope Waterfall, ad lat. mont. Duyvelsberg, Julio. (= *Ag. amelloides* β . *oblongifolia* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c.)

591. *Ag. strigosa* Nees., Ast. 363, DC. = *Ag. hirta* C. H. Sz. Bip. in sched. — In solo argillaceo ad rad. mont. Winterhoek, Uitenhage, April.

n. sp. 381. *Ag. natalensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept.

II. p. 956. — Inter fissuras rupium in summitate mont. Tafelberge, Augusto, Alt. 2500—3000'.

s. n. *Erigeron incisus* Thunb. = *Conyza incisa* Ait. DC. pr. VI. 387. — Winterhoek, Uitenbage, Aprili.

s. n. *E. ivaefolius* C. H. Sz. Bip. = *Conyza ivaefolia* Less. DC. pr. V. 388. — In locis humidis in Tulbagh Kloof, Majo.

344. 503. *E. mespilifolius* C. H. Sz. Bip. in Walpers repert. II. p. 958. — a) *natalensis*, foliis obtusis, glabrescentibus, paucidentatis = *E. (Nidorella olim) natalensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. — In sylvis primitivis prope fl. Umlaas, Natal, Octobri. — b) *clematideus*, foliis acuminatis, parce hirtis, pluridentatis = *E. clematideus* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. = *Nidorella scaudens* C. H. Sz. Bip. in sched. — In sylvis Zitzikamma, Uitenbage, Martio.

n. sp. 604. *E. (Conyza in sched.) Sprengelii* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. — In solo argillaceo-arenoso, prope Melkhout-Kraal, George, Januario.

123. *E. Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers l. c. — a) foliis ovato-ellipticis subintegrifolius. — In solo argillaceo, inter gramina, ad collium latera prope fl. Ungani, Natal, Novembri. — b) foliis obovatis, dentatis, supremis integrifolius = *Nidorella obovata* DC. Drèg.! in graminosis ad litus inter Omtendo et Omsamculo infra 500', Februario.

s. n. *E. hyssopifolius* C. H. Sz. Bip. = *Nidorella hyssopifolia* DC. pr. V. 323. — Prope urbem, Junio.

s. n. *E. Coma-aurea* C. H. Sz. Bip. = *Chrysocoma Coma-aurea* Linn. DC. pr. V. 353. — Klooft inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Junio.

531. 578. *E. tenuifolius* C. H. Sz. Bip. = *Chrysocoma tenuifolia* Berg. DC. pr. V. 353.—531 in lapidosis collium prope Gnadenthal, Zwellendam, Decembri major, gracilior; 578 in solo argillaceo prope fl. Koega, Uitenhage, Aprili, minor, robustior.

Subdiv. II. *Diplostephieae* C. H. Sz. Bip. l. c.

n. gen. 602. *Webbia obscura* C. H. Sz. Bip. = *Conyza obscura* DC. pr. V. 387. = *Webbia Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers repert. II. p. 971. — In collibus prope fl. Knysna, George, Januario.

553. *Diplopappus asper* Less., DC. — In solo argillaceo-argilloso ad radicem mont. van Stadensberg, Uitenbage, Martio.

n. sp. 399. *D. natalensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers repert. II. p. 957. — In summitate mont. Tafelberge, Septembri et in collibus, Augusto, Natal.

Subdiv. III. *Euastereae* C. H. Sz. Bip. l. c.

560. *Pteronia acerosa* DC. δ . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. in Walpers repert. II. p. 970. — In solo lapidoso-arenoso prope fl. Kromme, Uitenhage, Martio.

n. sp. 556. *Pt. elegans* C. H. Sz. *Bip.* apud Walpers l. c. Affinis *Pt. connatae* DC. pr. V. 360. sed folia opposita in vaginam non concreta. — In solo argillaceo prope Hemel en Aarde — statio fratrum moravicornorum, Zwellendam, Decembri.

702. *Pt. camphorata* DC. — In solo argillaceo-arenoso prope Constantiam, Septembri.

Subtr. II. CONYZEAE C. H. Sz. *Bip.* l. c. p. 952.

Div. I. Micropeae C. H. Sz. *Bip.* l. c.

Subdiv. II. *Tarchonantheae* C. H. Sz. *Bip.* l. c.

1269 et s. n. *Tarchonanthus camphoratus* Linn. — ♂ ad latera mont. Winterhoek, Aprili, s. n.; et in solo calcareo collium in Zoetendalsvalley, Zwellendam, Junio, n. 1269.

Div. II. Deneckieae C. H. Sz. *Bip.* l. c.

115. *Deneckia capensis* Thunb. C. H. Sz. emend. β . *latifolia* DC. pr. V. 462. γ . *glabrata* C. H. Sz. *Bip.* = *D. glabrata* DC. l. c. quae mihi tantum var. *glabrata* est, non species distincta. — Ad rivulos prope P. Mauritzburg, Natal, Octobri.

Div. III. Euconyzeae C. H. Sz. *Bip.* l. c.

n. sp. 227. *Conyza* (*Blumea* in sched.) *natalensis* C. H. Sz. *Bip.* in Walpers repert. II. p. 971. — In locis humidis prope Natalbai, Junio.

n. sp. s. n. *C.* (*Pluchea* in sched. olim) *Kraussii* C. H. Sz. *Bip.* in Walpers repert. II. p. 972. Natal.

216. *C.* (*Blumea* DC. pr. V. 436) *Dregeana* C. H. Sz. *Bip.* — Inter arundines prope fl. Umlaas, Natal.

Subdiv. IV. *Brachylaeneae* C. H. Sz. *Bip.* l. c.

1268. *Brachylaena nerifolia* R. Br. — Ad ripas fl. Büffel-jagdsr., Zwellendam, Januario. — Non ipse vidi: C. H. Sz. *Bip.*, sed sec. cl. Krauss recepi.

568. *Br. elliptica* Less. β . *latifolia* C. H. Sz. *Bip.* foliis ovato-oblongis = *Br. discolor* C. H. Sz. in sched. olim non DC. — In solo lapidoso-arenoso ad latera montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili, Alt. 1000'.

n. sp. 243. *Br. natalensis* C. H. Sz. *Bip.* in Walpers repert. II. p. 972. — In sylvis primitivis Natalbai, Junio. Affinis *Br. discolori* DC. sed notis l. c. indicatis abunde differt.

Subtr. III. INULEAE C. H. Sz. *Bip.* l. c. p. 953.

Div. III. Euinuleae C. H. Sz. *Bip.* l. c.

Subdiv. I. *Inuleae legitimae* C. H. Sz. *Bip.* l. c.

n. sp. 610. *Klensea lycopodioides* C. H. Sz. *Bip.* l. c. p. 973. — Inter rupes montium prope Roodenwall, George, Januario.

Subdiv. II. *Pulicariaeae* C. H. Sz. Bip. l. c.I. *Eupulicariaeae* C. H. Sz. Bip. l. c.

603. *Pulicaria capensis* DC. — In locis humidis prope Melk-hout Kraal, George, Januario.

III. *Printzieae* C. H. Sz. Bip. l. c.

526. *Printzia aromatica* Less., DC. pr. VII. 13. — In lapidosis ad latera mont. prope Gnadenthal, Decembri, Alt. 2—3000'. Me judice Asteroidea nec Mutisiacea.

n. gen. 571. *Carphopappus baccharidifolius* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 974 = *Pegolettia baccharidifolia* Less. DC. pr. V. 481. C. H. Sz. Bip. in sched. olim. — Ad radicem mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili, Alt. 1000', inter frutices et arbusculos.

Subtr. IV. *AMELLEAE* C. H. Sz. Bip. l. c. p. 954.

Div. I. *Euamelleae* C. H. Sz. Bip. l. c.Subdiv. II. *Ceruaneae* C. H. Sz. Bip. l. c.

n. gen. 575. *Kraussia capensis* C. H. Sz. Bip. in Walpers rept. II. p. 974. — In solo arenoso prope fl. Kleinrivier, Zwel-lendam, Decembri. — *Obs.* Cl. Walpers l. c. nomen *Kraussiae* in Haeneliam (= *Haenelia capensis* Walpers l. c.) mutavit, quia genus Harweyanum (*Kraussia floribunda* Harv. in Hook, Lond. Journ. of bot. I. 27.) agnovit. *Kraussia* Harv. vero est *Coffeae* sp. sec. cl. Hochstetter, et *Canthii* sp. ex Endl. gener. suppl. III. p. 72, nec proprium constituit genus. — *Kraussia* mea ab *Amello* notis indicatis differt, et insuper ab *Amello flosculoso* DC. pr. V. 214, quocum l. c. comparavi, sec. specimina *Dregeana*, toto dif-fert coelo. Ergo *Kraussia* nostra restituenda et conservanda.

Div. II. *Sphaeranthaeae* C. H. Sz. Bip. l. c.

712. *Sphaeranthus peduncularis* DC. — In locis humidis prope fl. Ungani, Natal, Julio.

Trib. IV. **Senecionoideae** C. H. Sz. Bip. in Webb et Berthelot. hist. nat. d. isles Canaries III, 2. p. 240.

Subtr. II. *HELIANTHAEAE* C. H. Sz. Bip.

31. *Lipotriche Brownei* DC. pr. V. 544. = *Trigonothea* na-talensis C. H. Sz. Bip. in sched. = *Psaturochaeta Dregei* DC. ! pr. V. 608. sec. specimina *Dregeana*. — Inter arundines prope fl. Umlaas, Natal, Decembri. — Character generis *Lipotriches* emen-datus: Capitulum multiflorum, heterogamum, floribus radii lingula-tis, bidentatis, 1 serialibus, foemineis, disci hermaphroditis, tubulo-sis, 5-dentatis. Involucri subimbricati foliola lanceolata. Receptacu-lum convexum paleatum, paleis acutis v. acumatis, subcomplexi-caulibus. Stylus *Senecionoidearum* et *antherae* ecaudatae, apice appendicibus triangularibus, basi in collum coarctatis, inclusa.

Achaenia turbinata, crassa, radii triangularia, disci ancipiti-compressa, omnia pappo superata e setis circiter n. 10. constante inaequalibus, scabris, fragillimis, achaenii longitudinem subaequantibus. (Herba Africae aequinoctialis, scabra, foliis oppositis petiolatis, triangulari-lanceolatis, crenato-serratis, pedunculis elongatis, ebracteatis, subcorymbosis, floribus flavis). *Obs.* Est quasi *Melanthera capitulo radiato* = *Melanthera Brownei* C. H. Sz. Ms.

sp. recogn. 510. *Bidens pilosa* C. H. Sz. *Bip.* in Webb et Berth. l. c. — I. *discoidea* = *Bidens pilosa* DC. pr. V. 437. β . *Kraussii*: glabra, foliis petiolatis, in caulis parte superiore ovatis, crenato-serratis, capitulis longe pedicellatis, discoideis, involucri squamis lato-lanceolatis, obscuris, margine scariosis, pallidis, serie externâ foliolorum parriorum, breviorum, oblongo-cuneatorum cinctis, achaeniis exterioribus oblongis, 2 lin. longis, robustis, triangularibus, setis brevibus exasperatis, pappo triaristato (arista intermedia rudimentaria) duplo longioribus, achaeniis disci glabris, linearibus, gracilibus, $3\frac{1}{2}$ lin. longis, aristis 3 aequalibus, 1 lin. longis, coronatis. Differt a forma II. *radiata* = *Bidens leucantha* Willd. DC. pr. V. 598, quam cl. Krauss in lit. ad ripas fl. Umlaas, Natal, Decembris (n. 11.) legisse indicat: capitulo discoideo, a forma I. *discoidea* vulgari glabritie, petiolisque vix ciliatis. — Ad rivulos et in paludosis Zitzikamma, Uitenhage, Martio.

303. *Spilanthes africana* DC. β . *natalensis* C. H. Sz. *Bip.* in sched. achaeniis subciliatis, foliis utrinque hirtis distincta. Num sp. propria? — Ad rivulos circa Natalbai, Julio.

s. n. *Eclipta erecta* L., DC. pr. V. 490. — Inter arundines ad ripas fl. Umlaas, Natal, Decembris.

Subtr. V. HELENIFAE DC.

Div. II. Galinsogae DC.

Subdiv. I. *Eugalinsogae* DC.

281. *Callilepis glabra* DC. β . *Kraussii* (= C. *Kraussii* olim in schedul.) C. H. Sz. *Bip.* foliis integerrimis. — In arenosis graminosis circa Natalbai, Julio. — Species hujus generis tres a cl. DC. l. c. propositae unius mihi formae esse videntur.

Subdiv. II. *Sphenogyneae* DC.

704. *Sphenogyne anthemoides* R. Br., DC. pr. V. 681. β . *microcephala* C. H. Sz. *Bip.* Ms. foliis pinnatipartitis, pinnis plerisque integris = *S. microcephala* DC. pr. V. 682. — In solo argillaceo-arenoso prope Constantiam, Cap, Septembri. Forma α . *anthemoides* foliis bipinnatipartitis differt, quod mihi a cultura ortum esse videtur. — *Sphenogyne*s species in universum nimis multiplicatae, plurimaeque reducendae.

681. *Sph. dentata* R. Br., DC., α . *ligulis concoloribus*, β . *lig. discoloribus*, C. H. Sz. *Bip.* Ms. — Ad latera montium Tafenberg et Duyvelsberg, Augusto, Septembri, Alt. 1000',

n. sp. 446. *Sph. natalensis* C. H. Sz. Bip. Ms. a *Sph. dentata* differt: lobis foliorum angustis, elongatis $2\frac{1}{2}$ lin. longis, setisque brevioribus transitum quasi ad divisionem γ . DC. pr. V. 684. efficientibus. — Radix \mathcal{Z} fibris longis crassisque instructa; caulis palmaris parce pubescens, folia pellucido-punctata, pinnatipartita, 3—4-juga, apice setas breves gerentia; pedunculi elongati, nudi; involucri squamae exteriores ovatae, late nigro-marginatae, dorso virides et punctis resinosis luteis numerosis munitae; ligulae discolors involucri duplo longiores. — In graminosis summitatis mont. Tafelberge, Natal, Alt. 2000—2500' Augusto

s. n. *Sph. nudicaulis* Less., DC. pr. V. 684. — In summitate mont. Tafelberg, Majo.

599. *Sph. chamomillaefolia* DC. pr. V. 684 = *Sph. Kraussii* C. H. Sz. Bip. in sched. — Ad latera mont. Bavianskloof, Zwelendam, Decembri.

s. n. *Sph. tenuifolia* DC. pr. V. 684. — In latere orientali mont. Duyvelsberg, Julio.

577. *Nasinia nana* DC. — In solo argillaceo prope fl. Zwartkop, Uitenhage, Aprili.

Subtr. VI. ANTHEMIDEA DC.

Magnam hujus tribus partem in dissertatione de Tanaceteis, nunc sub praelo sudante, exposui et in tribus sequentes distribui.

Dimorphotheceae C. H. Sz. Bip. Ms.

684. *Dimorphotheca pluvialis* Moench. — In solo argillaceo ad latera mont. Tigerberg, Augusto.

687. *D. nudicaulis* DC. pr. VI. 71. β . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. (= *D. Kraussii* olim in sched.) caule ad, vel ultra medium foliato. — Radix cylindrica \mathcal{Z} , inferne fibris longis crassisque stipata; caulis herbaceus subspithameus, subsimplex, pilis articulatis, sub involucri elongatis munitus, ultra medium foliatus; folia radicalia spathulata, sinuato-dentata, caulina oblongo-linearia, 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa, repando-sinuato-dentata, superiora integra, pilis articulatis brevibus modice adspersa; capitulum speciosum diametri bipollicaris; involucri squamae lanceolatae, dorso dense hirtae, margine scariosae, glabrae, purpurascens; flores disci bisexuals. — In solo argillaceo ad lat. mont. Tigerberg, cum simili *D. pluviali* Moench, Augusto.

s. n. *D. fruticosa* DC. pr. VI. 71. β . *natalensis* C. H. Sz. Bip. floribus disci bisexualibus. — In dunis prope Natalbai.

686. *D. cuneata* DC. pr. VI. 72. = *D. Dregei* C. H. Sz. Bip. in sched. — In solo argillaceo ad radicem mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

Tanaceteae C. H. Sz. Bip. l. c.

461. *Gamolepis pectinata* Less., DC. pr. VI. 40. β . *natalensis* C. H. Sz. Bip. lobis foliorum acutis (non mucronatis) corpusculo

subcorneo rotundato terminatis. — In summitate mont. Tafelberge, Natal, Augusto, Alt. 2000'.

608. *Peyrousea calycina* DC. pr. VI. 77. = *Osmithyllum Kraussii* C. H. Sz. Bip. in sched. — Ad lat. mont. Outeniqua, George, Januario. Alt. 1000'.

584. *Tanacetum?* *multiflorum* Thunb., DC. pr. VI. 132. — In distr. Zwelldam, Decembri.

547. β . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. Ms., humile, palmare, ramossimum. — In arenosis planitie Zoetendalsvaley, Zwelldam, Decembri.

149. *T.?* *hippiaefolium* DC. pr. VI. 133. = *T. heptalobum* C. H. Sz. Bip. in sched. — In locis paludosis prope fl. Umlaas, Natal, Novembri.

n. sp. 611. *Pentzia trifurcata* C. H. Sz. Bip. MS. = *P. cotuloides* DC. pr. VI. 138. γ . *trifurcata* C. H. Sz. Bip. in sched. — Glabra, inermis, fruticosa, capitulis campanulatis, ad apicem ramorum solitariis, involucri squamis ovatis, intimis superne valde scariosis, foliis crassis cuneiformibus, basis attenuatis, apice truncatis breve trifurcatis, ramis elongatis ad apicem usque foliatis, capitulis radiatis, ab omnibus *Pentziis* differt, licet iis affinis. Sec. principia Cass., Less. et DC. genus consitueret novum. Habitus *Eumorphiae*, folia *Gamolepidis trifurcatae* Less. — In solo argillaceo colium prope fl. Gauritz, Zwelldam, Januario.

Cotuleae C. H. Sz. Bip. l. c.

669. *Cotula filifolia* Thunb., DC. pr. VI. 77. — In arenosis ad litus prope Greenpoint, Cap, Julio.

668. *C. coronopifolia* α . DC. pr. VI. 78. — Ad rivulos in Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenkop, Cap, Majo.

509. *C. heterocarpa* DC. pr. VI. 80. = *C. barbata* C. H. Sz. Bip. in sched. — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof, George, Martio.

670. *C. turbinata* Linn. = *Cenia turbinata* Pers. DC. pr. VI. 82. — In solo argillaceo circa urbem, Junio, Julio.

508. *C. sericea* Thunb. = *Cenia sericea* DC. pr. VI. 82. β . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. Ms. ligulis concoloribus, caule solitario pedali. An species distincta? — In solo argillaceo-arenoso in Zitzikamma, Uitenhage, Martio.

Hippieae Less.

511. *Hippia frutescens* L., DC. pr. VI. 166. — Ad rivulos in Zitzikamma, Uitenhage, Martio.

701. *H. gracilis* Less. β . *longiloba* DC. l. c. — In summitate mont. prope Constantiam, Martio. Alt. 2000'.

536. *H. repens* DC. l. c. — Inter rupes in summis montibus Genadenthal, Zwelldam, Decembri, Alt. 3000'.

Anthemideae C. H. Sz. Bip. l. c.

50. *Oederia prolifera* L., DC. pr. VI. 2. — In summitate mont. Duyvelsberg et in Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Alt. 3000', Julio, Septembri.

s. n. *O. latifolia* Less., DC. pr. l. c. — E rhizomate lignoso caulis oritur pedalis, crassus, dense foliatus, foliis ovato-lanceolatis, arcuate reflexis, ciliatis. Flos speciosissimus. — In summitate mont. Steenberge, Cap, Septembri.

543. *Hymenolepis parviflora* DC. pr. VI. 85. — Ad rivulos mont. Bavianskloof, Zwelldam, Decembri.

519. *Athanasia dimorpha* DC. pr. VI. 87. = Holophyllum capitatum C. H. Sz. Bip. in sched. — In ruderalis distr. capens. et Zwelldam, Novembri.

s. n. *Ath. ebracteata* E. Mey. α . *brachypoda* DC. l. c. — In Kloof prope Tulbagh, Majo.

s. n. *Ath. trifurcata* Linn., DC. l. c. — In radice mont. Bavianskloof, Decembri.

663. *Ath. crithmifolia* Linn., DC. pr. VI. 89. — In solo argillaceo ad lat. mont. Tigerberg, Novembri.

662. *Morysia dentata* DC. pr. VI. 91. α . *vulgaris*, foliis confertis, erectis, 3 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ lin. latis, utrinque serraturis 2 notatis. — In collibus prope villam George, Januario.

517. β . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. ut spec. propria in sched., foliis remotis, late ovatis, 5—6 lin. longis, 3—4 lin. latis, utrinque 6—12 serraturis munitis, semiamplexicauli-decurrentibus, arcuate reflexis. — In solo argillaceo inter fl. Bot R. et Zonder Ende R., Zwelldam, Novembri.

nov. sp. s. n. *M. pachyphylla* C. H. Sz. Bip. Ms. Ab omnibus hujus generis speciebus facile differt: foliis reniformi-orbiculatis, semiamplexicaulibus, crassiusculis, integerrimis, obtusis. Glaberrima, capitula 13flora, magnitudine capitulorum *Morysiae* dentatae. Diagnosis *Athanasiae* rotundifoliae DC. pr. VI. 87 non male convenit, sed *achaenia* *M. pachyphyllae* sunt calva! — In sabulosis Kapshe Hackte, Julio.

Eriocephalea Leess.

s. n. *Eriocephalus sericeus* Gaudich. DC. pr. VI. 145. — In Kloof prope Tulbagh, Majo.

512. *E. punctulatus* DC. pr. VI. 146. = *E. pteronoides* C. H. Sz. Bip. in sched. — An *E. umbellatus* DC. var. glabra, brevifolia? — In solo lapidoso-arenoso collium prope fl. Kromme R., Uitenhage, Martio.

653. *E. umbellatus* γ . *argenteus* DC. pr. VI. 147. — Ad lat. boreale mont. Duyvelsberg, Cap, Alt. 1000', Julio.

654. *E. umbellatus* DC. l. c. δ . *Kraussii* C. H. Sz. Bip. ut species propria in sched. Differt ab *E. umbellato* γ . sericeo: foliis duplo brevioribus 2—3 lin. longis, involucri squamis latissime oryaceo-scariosis. — Inter frutices prope Tulbagh, Majo.

Artemisieae C. H. Sz. Bip.

516. *Artemisia afra* Jacq., DC. pr. VI. 106. — Ad sylvarum margines in Zitzikamina, Martio.

Subtr. VI. GNAPHALIEAE LESS.

Div. III. Helichryseae Less.

637. *Eriosphaera coriacea* DC. pr. VI. 167. — Inter rupes in summitate montium Bavianskloof, Zwellendam, Dec., Alt. 3000'.

527. *Leontonyx tinetus* DC. pr. VI. 168. — Ad latera mont. Bavianskloof, Zwellendam, alt., 1—2000'. Dec.

n. gen. 562. *Manopappus* C. H. Schultz & Bip. Ms. (μάνος, rarus et παππος, pappus). *Character genericus.* Capitulum multiflorum, discoideum, floribus vix unâ lineâ longioribus, tubulosis, 5-dentatis, hermaphroditis vel exterioribus foemineis, omnibus superne glandulis resiniferis munitis. Involucri imbricati campanulati squamae ovatae, scariosae, aureae, intimae oblongo-lineares, subradiantes. Receptaculum fimbrilliferum, fimbrillis $\frac{3}{4}$ lin. longis, aurantiacis, lanceolatis, acutis, utrinque ultra medium dente acuto notatis. Achaenia parva, glabra, oblonga, pappum subaequantia $\frac{1}{3}$ lin. longum, e setis, ad 4, simplicibus caducissimis constantem. Imo-pappus nullus ab auctoribus indicatur, quod nondum observavi. Verosimiliter ob pappum caducissimum error hic ortus. —

Fruticulus rigidus, tomentosus, ramosus, ramis ad apicem usque foliatis, foliis 2 lin. longis, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. latis, oblongo-linearibus, sessilibus, margine revolutis, obtusis, tomentosis, omnibus adpressis. — *Manopappus* differt a *Helichryso*: pappi radiis caducissimis raris, n. 1—4, brevibus, achaenia vix aequantibus.

sp. 1. *M. anomalus* C. H. Sz. Bip. Ms. = *Helichrysum anomalum* Less., DC. pr. VI. 204 excl. var. lanata pl. Dregeanae! = *Helichrysum commutatum* C. H. Sz. Bip. Ms. — In solo calcareo summitatis collium Gras-Rüggen, Alt. 1000', Uitenbage. — *Obs.* Species Lessingiana a nostra foliis duplo longioribus, acutis differre videtur. Forsan huic generi plures adhuc *Helichrysi* species in posterum adnumerandae.

Helichrysum DC. pr. VI 169.

Secto I. Argyreia DC.

§. 1. Leptorhiza DC.

535. *Helichrysum expansum* Less. & erectum DC. pr. VI. 170. — Ad radicem montium distr. Zwellendam, Novembri.

§. 2. Oxybelia DC.

n. sp. 557. *H. callunoides* C. H. Sz. Bip. Proximum *H. metalasioidi* DC. pr. VI. 171. — Caule spithameo, fruticoso, suberecto, superne ramoso, foliis sessilibus, confertis, patulis, lineari-teretibus, punctatis, crassis, obtusis, glabris, ramis cinereo-pubescentibus, ca-

pitulis $\frac{1}{2}$ lin. longis, cylindricis, ad apicem ramorum n. 30 conglomeratis in globum 4—5 lin. diametro habentem, 5floris, involucri squamis exterioribus villosis, interioribus linearibus acutiusculis, carneo-lacteis, floribus flavis, pappo longo, niveo, setaceo. — In solo arenoso-calcareo planitieci Zoetendalsvaley, Zwellendam, Decembri.

642. *H. ericaefolium* Less., DC. pr. VI. 172. — In solo argillaceo prope fl. Gauritz, Zwellendam, Januario.

§. 3. Declinata DC.

518. *H. lineare* DC. l. c. — In solo argillaceo collium inter fl. Bot R. et Zonder Ende R., Zwellendam, Novembri.

n. sp. 421. *H. comosum* C. H. Sz. Bip. Ms. — Radix multicaulis; caules filiformes, fruticulosi, spithamei, ramosi; rudimenta caulium anni praecedentis numerosissima, subpollicaria comam in radicis capite efficiunt; folia anguste linearia, 3—5 lin. longa, mutica, margine revoluta, juniora ramique albidè tomentosa, summa circa glomerulum terminalem polycephalum quasi verticillata, bracteiformia, comam efficientia capitula superantem; capitula glomerata axillaria v. terminalia, cylindræa, 10-flora, involucri squamæ sordide albentes, obtusiusculæ; pappus setaceus superne scaber. A proximo *Hel. lineari* DC. inter alia differt: foliis floralibus glomerulos superantibus. — In arenosis planitieci inter fl. Umlaas et Natalbai, Octobri.

615. *H. serpyllifolium* Less., DC. pr. VI. 172. — In locis humidis Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, alt. 1000'. Majo.

§. 5. Sphaerocephala DC.

s. n. *H. grandiflorum* Less., DC. pr. VI. 175. — Inter rupes summitatis mont. Tafelberg, Junio.

619. *H. crassifolium* Less., DC. l. c. β . *involucri lacteo* C. H. Sz. Bip. — In dunis planitieci capensis, Novembri.

H. fetinum Less., DC. pr. 176. formæ foliis supra scabris:

635. α . *latifolium*: foliis ovato-lanceolatis. — In solo argillaceo-arenoso ad lat. mont. Duyvelsberg, George, alt. 2000', Februario.

633. β . *angustifolium*: foliis oblongo-linearibus = *H. linearifolium* C. H. Sz. Bip. in sched. — Ad latera montium Bavianskloof, Zwellendam, Decembri.

§. 7. Xeranthemoidea DC.

544. *H. mucronatum* Less. β . *niveum* DC. pr. VI. 178. — In arenosis planit. Zoetendalsvaley, Zwellendam, Decembri.

545. *H. intermedium* Less., DC. l. c. — In arenosis planit. Zoetendalsvaley, Zwellendam, Dec. Involucri foliola straminea.

641. *H. argenteum* Thb., DC. pr. VI. 179. — In solo argillaceo-arenoso radicis mont. van Stadensberg, Uitenhage, Martio.

638. *H. striatum* Thb. β . *villosum* DC. l. c. — In solo argillaceo prope fl. Kromme R., Uitenhage, Martio.

Sectio II. Chrysolepidea DC.

§. 1. Stoechadina DC.

* * species capenses seu australi-africanæ.

533. *H. rutilans* Less., DC. pr. VI. 185. — Ad latera mont. Hottentotts-Holland, Stellenbosh, Novembri.

H. squamosum Thb., DC. l. c. = *H. diversifolium* C. H. Sz. Bip. in sched. olim, ob foliorum diversitatem eximiam, inferiora enim sunt elliptico-lanceolata, superiora linearia

596. α . folia virginea cum caule albo-tomentosa. — Inter lapides ad latera mont. Winterhoek, alt. 2000', Uitenhage, Aprili.

630. β . *denudatum*, folia serius pagina supra cum caulis parte inferiore glabrescunt. — In solo argillaceo sylvarum, Outeniqua, Februario.

§. 2. Xerochlaena DC.

530. *H. foetidum* Cass., pr. VI. 187. — Ad rivulos mont. Bavianskloof, Zwellendam, Decembri et e colonia capensi s. n.

629. *H. fulgidum* Willd. β . *angustifolium* DC. l. c. — In solo argillaceo-arenoso in Zitzikamma, Uitenhage, Martio.

315. *H. decorum* DC. pr. VI. 188. (*H. fulgidi* an var.?). — In graminosis circa Natalbai, Julio.

§. 5. Cylindrica DC.

556. *H. imbricatum* Less β . *rufostramineum* DC. pr. VI. 101. — In arenosis planitie capensis, Novembri.

Sectio III. Taxostiche DC.

590. *H. (Taxostiche) Burchellii* β . *intermedium* DC. pr. VI. 196. — In solo lapidoso-arenoso ad latera mont. Winterhoek, Uitenhage, alt. 2000', Majo.

n. sp. *H. (Taxostiche) Kraussii* C. H. Sz. Bip. Ms. Caule fruticoso, ramoso, cum ramis pubescente, foliis linearibus utrinque attenuatis acutis, integerrimis, supra glabris, infra tomentosus, capitulis in corymbos compositos, rotundatos, 1 poll. et ultra diametro metientes dispositis, sub-essilibus 5floris, flore 1 foemineo, 4 hermaphroditis. Involucri cylindrici squamis imbricatis, 4—5serialibus, oblongo-linearibus, obtusis, glabris, receptaculo miniuo, subnudo. (Rami spithamei-pedales, folia 4 lin. longa, medio $\frac{1}{2}$ lin. lata, involucri squamæ stramineo-splendentes.) In arenosis prope Natalbai, Julio, Augusto.

Sectio IV. Lepicline DC.

631. *H. folliculatum* β . *purpurascens* DC. pr. VI. 197. — Ad radicem austr. mont. Outeniqua, in Zitzikamma, Martio.

H. discolor DC. p. VI. 197. — 398. α . *stramineum* C. H. Sz. Bip., involucri squamis concoloribus, stramineis, radice 24 crassa, fibrosa. — In arenosis circa Natalbai, Augusto,

169. β . *bicolor*, involucri squamis superioribus stramineis, inferioribus vinoso-purpurascensibus. — In planitie inter Natalbai et fl. Umlaas R., Decembri.

s. n. *H. pedunculare* DC. pr. VI. 198. Caulis sesquipedalis, crassitie pennae anserinae, sericeo-tomentosus. — Ad latera mont. Outeniqua, George, Februario.

369. *H. allioides* Less., DC. l. c. — Ad radicem mont. Tafelberge, prope P. Mauritzburg, Natal, Septembri.

384. 50. *H. latifolium* Less., DC. l. c. — In summitate et ad latera mont. Tafelberge, Natal, Augusto.

s. n. *H. undatum* Less., β . *elongatum* DC. pr. VI. 199. — In latere mont. Hottentotts-Holland, Decembri.

17. *H. crassinerve* DC. l. c. — In summitate mont. Buschmanns-Rand, Natal, Decembri.

H. nudifolium DC. pr. 200. — 614. β . *medium* DC. l. c. — In collibus graniticis inter fl. Gauritz et Kotzinakamma George, Jan.

s. n. γ . *plantagineum*, ad latera mont. Outeniqua, Febr.

§. 2. Decurrentia DC.

627. *H. odoratissimum* Less., β . *undulaefolium* DC. pr. VI. 202. — Ad lat. occident. mont. Tafelberge et Duyvelsberg, Cap, Julio.

628. *H. cymosum* Less., DC. l. c. — Inter rupes summitatis mont. Tafelberg, Cap. Alt 3500', Majo. — *Obs.* *H. cymosum* Drège Docum. p. 100. III. D. a. prope Bergrivier, et p. 88—89. III. A. e. 30. 31. in monte Tafelberg lecto cum nostro prorsus convenit.

939. *H. subdecurrens* DC. pr. l. c. — In collibus prope Genadenthal (stat. fratr. moráv.), Zwellendam, Decembri. — *Obs.* *H. cymosum* Drège Docum. p. 148. V. b. 44. Omtata in graminosis lectum cum stirpe nostra identicum. Tomentum vero magis adpressum panosum, villosum observo.

§. 3. Aptera DC.

* Involucris luteis.

n. sp. 280. *H. auronitens* C. H. Sz. Bip. Ms. Ab omnibus speciebus affinibus inter alia differt: capitulis 40—50floris cauleque humili. — Caulis palmaris, suffruticosus, ramosus, dense foliatus, cum foliis sessilibus, oblongis, subpanduratis, integris, obtusis, acumine brevi brunneo coronatis, tomento denso, cinereo, subsericeo obductus, corymbi terminales, compositi, 20—25-cephali, capitula breve pedicellata, hemisphaerica, 40—50-flora; flores exteriores foemineae 1-seriales; involucri imbricati squamae ovatae, auronitentes; receptaculi alveoli fimbriifero-dentati; achaenia minuta glabra; pappi 1-serialis, pilosi radii scabri superne subincrassati, bifidi. — In soli arenosi graminosis circa Natalbai, Julio.

* * Involucris rufescentibus DC. (vel stramineis C. H. Sz. Bip.)

H. teretifolium Less., DC. VI. 205. — 621. α . *congestum* DC. l. c. — In solo argillaceo mont. Tigerberg, Cap, Novembri.

291. β . *rufescens* DC. l. c. — In dunis prope Natalbai, Julio.

589. *H. roseum* Less., DC. pr. 205. = *H. lamprosphaerum* C. H. Sz. Bip. in sched. — Caulis palmaris, adscendens, suffruticosus, ramosus, cum ramis teretibus, gracilibus, tomento tenui, pannoso-cinereo obductus; folia linearia, 1-nervia acuta, sessilia, utrinque paulisper sagittato-decurrentia, margine revoluta, supra glabra, infra tomentosa; corymbi compositi, 7—16-cephali, capitula pedicellata, pedicelli capitula subaequantes, hemisphaerica, 20—25flora; achaenia minuta; pappi 1-serialis, candidi, scabri denticuli superne magis distincti; receptaculi alveoli dentato-fimbrilliferi, aurantiaci; involucri imbricati squamae ovato-oblongae, albide stramineae *nitidae!* (unde nomen meum specificum), glabrescentes, intimae apice lacteae. (Folia 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, involucrium 2 lin. altum). — Ad latera montium Winterhoek, Uitenhage, alt. 1000', Aprili, Majo. — *Obs.* In speciminibus Dregeanis et Ecklonianis caulis spithameus-pedalis adscendens vel decumbens, involucrium stramineum rubellum.

n. s. 988. *H. rugulosum* Less., DC. l. c. = *H. galactosphaerum* C. H. Sz. Bip. in sched. Ab antecedente simili differt: caule altiore, foliis longioribus 1 poll. longis, lineari-lanceolatis, subtriplinerviis, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. latis, magis sessilibus; corymbi divaricati 30cephali capitulis duplo majoribus, 30floris, involucri 3 lin. longi squamis ovato-oblongis, pubescentibus, omnibus, exceptis basilaribus, apice appendice glabra, *lactea!* (unde nomen meum specificum) hemisphaerico-ovata, subreflexa munitis, et hinc subsquarrosis. — In solo lapidoso arenoso ad latera mont. Winterhoek, Uitenhage, alt. 1000', Majo.

515. *H. capitellatum* Less., DC. pr. VI. 206. (excl. var. β . molli DC. l. c., quae = *H. concolorum* DC. l. c., saltem sec. specimina Dregeana, in cujus herbario *H. capitellatum* Less. e. etiam *H. concolorum* Less. est) = *H. polycephalum* C. H. Sz. Bip. in sched. — Caulis suffruticosus, sesquipedalis, cum ramis dodrantalibus, gracilibus, dense foliatis, tomento, in planta adulta detergibili, obductus; folia lanceolata, acuta, integra, sessilia, margine revoluta, tomento tenui, arachnoideo obducta; corymbi terminalis compositi capitula innumera ovato-cylindrica, brevissime pedicellata, parva, 10—12flora; involucri imbricati, 1 lineâ paulo altioris squamae albide stramineae, ovato-oblongae subpubescentes, superiores appendice glabra, lactea, subreflexa munitae; achaenia minima; pappi 1-serialis candidi radii scabri, superne paulo incrassati; receptaculi fimbriae croceae. — In collibus prope Genadenthal (statio frat. morav.), Zwellendam, Decembri. — *Obs.* Tres species praecedentes pro novis habui in schedulis, quia falso a cl. DC. l. c. sub *Apteris*, involucri *rufescentibus* enumerantur. Involucri enim non sunt rufescentia sed pallide straminea, saltem in speciminibus a cl. Kraussio communicatis.

*** Involucri albidis DC.

623. *H. petiolatum* DC. pr. VI. 208. — In sylvis primitivis Outeniqua, George, Jan.

Sectio V. Chionostemma DC.

667. *H. vestitum* Less., DC. VI. 209. — In arenosis planitiei capensis Novembri.

(Continuabitur.)

P r e i s a u f g a b e.

Da die Erfahrung gelehrt hat, dass man bisher bei der Vertilgung der den Pflanzen schädlichen Insecten zu wenig auf die von der Natur dargebotenen Mittel Rücksicht genommen hat, so nimmt die Flora, Gesellschaft für Botanik und Gartenbau, in Dresden, hiervon Veranlassung, folgende Preisfrage zu stellen:

„Welche Thiere sind als die natürlichen Bekämpfer der der Pflanzenwelt schädlichen Insecten zu schützen?“

Es wird hierbei gewünscht eine kurze, klar und bündig aufgefasste Schilderung der betreffenden Thiere mit wissenschaftlicher Bestimmung der Gattungen und Arten in Deutschland. Man wünscht diese Schrift leicht fasslich bis zum Umfange von etwa 6—10 Druckbogen. Abbildungen hinzuzufügen, bleibt dem Ermessen des Verfassers überlassen.

Die von der Gesellschaft Flora gekrönte Schrift wird dadurch Eigenthum der Gesellschaft, über deren Veröffentlichung sie nach Belieben verfügen kann.

Der Preis ist 30 Stück Ducaten. Die Abhandlung wird in deutscher Sprache geschrieben, mit einem Motto und versiegeltem Zettel versehen, welcher im Innern den Namen und Wohnort des Verfassers leserlich geschrieben enthält. Die Einlieferung muss bis zu Ende des Jahres 1845 unter der Adresse: „An das Directorium der Flora, Gesellschaft für Botanik und Gartenbau, in Dresden“ stattfinden, worauf die Preisvertheilung bis zum 1. Mai 1846 erfolgt.

Die verehrlichen Redactionen von naturhistorischen etc. Zeitschriften werden freundlichst und ergebenst ersucht, zur Verbreitung vorstehenden Programmes möglichst beizutragen.

A n z e i g e.

Bei August Hirschwald in Berlin ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Die Entdeckung der wahren Pflanzennahrung. Mit Aussicht zu einer Agrikulturphysiologie. Dargestellt von Dr. C. H. Schultz, Professor ord. an der Universität zu Berlin. 8. Preis 2½ Thlr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Schultz Carl Heinrich [Bipontinus]

Artikel/Article: [Enumeratio Compositarum a cl. Dr. KRAUSS annis 1838 — 40 in Capite bonae spei et ad portum Natalensem lectarum 667-682](#)