

FLORA.

N^o. 20.

Regensburg.

28. Mai.

1845.

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal Landes. (Fortsetzung.) — Pöppig et Endlicher, Nova genera ac species plantarum. — Reichenbach, Deutschlands Flora. — Andersson, Observatio stirp. circa Christinehamn provenient. — Angström, Dispositio muscor. in Scandinav. cognitor.

KLEINERE MITTHEILUNGEN. Grischow, Versuche über die Respiration der Blätter. — Thomson, über die anorganischen Bestandtheile der Flechten. — Aschoff, Analyse der Wachholderbeeren. — Krämer, Analyse der Rinde von Viburnum Opulus.

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. FERDINAND KRAUSS.
(Fortsetzung.)

CLASS. II. ENDOGENAE.

Subcl. I. Petaloideae.

Subdiv. I. *Monoepigynae* Juss.

Balanophoreae Rich.

s. n. *Mystropetalon Thomii* Harvey in Annals of nat. hist. Vol. II. Tab. XIX. — Prope Caledon, (Zwellendam), Majo.

Orchideae Juss.

Trib. Vandaeae.

254. *Eulophia emarginata* Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 202. — In graminosis prope Piet.-Mauritzburg, Natal, Sept.

251. *E. lissochiloides* Lindl. l. c. p. 203. — In graminosis prope Piet.-Mauritzburg, Natal, Sept.

406. *E. platypetala* Lindl. l. c. p. 202. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Sept.

51, 406 b. *E. ovalis* Lindl. ibid. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Sept.

1306. *E. clavicornis* Lindl. ibid. — In graminosis prope Natalbai, Sept.

s. n. *E. ensata* Lindl. Orch. gen. et sp. p. 183. — In graminosis prope fl. Umlaas, Natal, Sept.

1305. *Lissochilus streptopetalus* Lindl. l. c. p. 191. — In graminosis prope Natalbai, Sept.

Flora 1845. 20.

20

s. n. *L. aequalis* Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 204?
— Ad radic. mont. Winterhoek, Uitenhage, Majo.

Trib. Ophrydeae.

1326. *Schizodium arcuatum* Lindl. Orch. p. 359. — In summitate mont. prope Constantiam, Sept., Alt. 2000'.

1311. *Penthea melaleuca* Lindl. ibid. p. 361. — In uliginosis ad montes Bavianskloof, Zwelldam, Dec.

1310. *P. reflexa* Lindl. ibid. — In uliginosis in summitate montis Tafelberg, Cap, Febr.

1312. *P. patens* Lindl. ibid. p. 362. — In uliginosis ad latera montium Bavianskloof, Zwelldam, Dec.

1319. *Disperis capensis* Sw., Lindl. ibid. l. c. p. 370. — In graminosis ad latus australe m. Tafelberg, Duyvelsberg, Cap, Sept.

1327. *D. secunda* Sw., Lindl. ibid. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1321. *D. villosa* Sw., Lindl. ibid. p. 371. — In arenosis prope Greenpoint, Cap, Aug.

1324. *Pterygodium catholicum* Sw., Lindl. ibid. p. 366. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1325. *Pt. platypetalum* Lindl. ibid. — In arenosis prope Constantiam, Sept.

1322. *Pt. caffrum* Sw., Lindl. ibid. p. 367. — In solo argillaceo-arenoso planitiei capensis, Sept.

s. n. *Pt. carnosum* Lindl. ibid. — In graminosis prope Genadenthal, Zwelldam, Dec.

id. *Herschelia coelestis* Lindl. ibid. p. 363. — In summitate montis Paardekop, George, Jan.

id. *Corycium microglossum* Lindl. ibid. p. 369. — In summitate m. Houtbosch-Rand, Natal, Dec., Alt. 4000'.

id. *Pachites appressa* Lindl. Orch. p. 301.? — Ad lat. mont. Bavianskloof, Zwelldam, Dec.

1313. *Ceratandra parviflora* Lindl. ibid. p. 464. — In uliginosis ad latera montium Bavianskloof, Dec.

15. *Disa nervosa* Lindl. ibid. p. 352. — In montibus inter fl. Umgani et Mooi R., Natal, Dec., Alt. 4000'.

1307. *D. venosa* Lindl. ibid. p. 351. — Ad rivulos montis Hottentotts-Holland, Stellenbosh, Nov.

22. *D. gracilis* Lindl. ibid. p. 348. — In graminosis prope Natalbai, Dec.

1314. *D. bracteata* Lindl. p. 354. — Ad lat. mont. Bavianskloof, Zwelldam, Dec.

1328. *D. barbata* Sw., Lindl. p. 354. — Ad sylvarum margines Outeniqua, George, Jan. et in summis montibus Peninsulae, Cap, Mart.

334. *D. polygonoides* Lindl. p. 349. — In planitie prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

23. *D. obtusa* Lindl. p. 355.? Forma spica abbreviata. — In graminosis prope fl. Umgau, Natal, Dec.

1329. *D. ferruginea* Thunb., Lindl. p. 355. Hook. ic. t. 214! — *D. porrecta* Sw., Lindl. l. c. p. 352. Cfr. Harvey in Hook. Lond. Journ. 1. p. 15. — In summo monte Tafelberg, Mart.

s. n. *D. grandiflora* L. suppl. — In summo monte Tafelberg, Cap, Mart., Alt. 3500'.

1315. *D. cornuta* Sw., Lindl. l. c. p. 351. — In arenosis planitiei capensis, Nov. et in summo m. Tafelberg, Mart.

s. n. *D. natalensis* Lindl. in Hook. Lond. Journ. 1. p. 16. — In planitie prope Natalbai, Nov.

1316. *Monadenia densiflora* Lindl. Orch. p. 357. — Ad latera montium Bavianskloof, Zwellendam, Dec.

1308. *Bonatea micrantha* Lindl. l. c. p. 329. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

101, 1309. *B. tetrapetala* Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2, p. 208. — In planitie prope fl. Umlaas, Natal, Dec. et ad radicem m. Tafelberg, Cap, Aug.

12. *Satyrium rostratum* Lindl. Orch. p. 338. — In graminosis prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

s. n. *S. longicauda* Lindl. ibid. p. 327. — In summo monte Tafelberg, Cap, Mart.

1320. *S. parviflorum* Sw., Lindl. ibid. p. 336. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

1317. *S. foliosum* Lindl. ibid. — Ad radicem montis Muisenburg, Cap, Sept.

172. *S. macrophyllum* Lindl. p. 338. — In planitie inter fl. Umlaas et Natalbai, Dec.

1318. *S. coriifolium* Sw., Lindl. ibid. p. 341. (Drège n. 1256!) — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1323. *S. striatum* Thunb., Lindl. ibid. p. 345. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

Musaceae Juss.

s. n. *Strelitzia Reginae* Ait. — In montibus prope fl. Camtoos, Uitenhage, Aprili.

s. n. *St. juncea* Andr. — In collibus prope Uitenhage, April. Alt. 800—1000' (bunt. Sandst.)

s. n. *St. augusta* Thunb. — In sylvis ad riv. Pisang, prope Plettenbergsbai, Febr. (bunt. Sandst.)

397. *St. augusta* Thunb. — Ad ripas fl. Umlaas et in insul. King, Natal, Aug.

Irideae Juss.

1391. *Hesperantha pilosa* Ker. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1390. *H. falcata* Ker. — Ad radicem m. Duyvelsberg et Tigerberg, Julio.

1378. *H. angusta* Ker. — In sol. argillaceo-arenoso ad radicem m. Tafelberg, Sept.
1394. *Geissorrhiza secunda* Gawl. — In solo argillaceo-arenoso prope Constantiam, Sept.
1382. *G. arenaria* Eckl. et Zeyh. — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1346. *Sparaxis pendula* Ker. — Ad rivulos in Zitzikamma, Martio.
1380. *Sp. tricolor* Ker. — Ad latera m. Koeberg et Tigerberg, Cap, Aug.
1395. *St. anemoneflora* Ker. — In arenosis planitiei capensis, Sept.
430. *Gladiolus* . . . ? — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Aug.
- 1404, 1410, 1415. *Gl. punctatus* Jacq. — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.
1414. *Gl. gracilis* Jacq. — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.
1413. *Gl. tristis* L. — Ad latera mont. Steenberge et prope Constantiam, Sept.
- s. n. *Gl. gramineus* L. — In montibus Koeberg et Tigerberg, Cap, Aug.
1412. *Gl. laevis* Thunb. — Ad latera mont. Duyvelsberg et Tafelberg, Julio.
1411. *Gl. Merianus* Thunb. — Ad latera montium Peninsulae, Julio.
1409. *Gl. hastatus* Thunb. — In uliginosis dunarum planitiei capensis, Nov.
1408. *Gl. ?* — In arenosis planitiei capensis prope Constantiam, Sept.
1407. *Gl. brevifolius* Thunb. — In summitate et ad latera montium Peninsulae, Martio, Alt. 1—3000'.
1406. *Gl. pilosus* Eckl. et Zeyh. — Ad latus occident. m. Muysenburg, Cap, Julio.
1403. *Gl. ?* — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1416. *Gl. ? trimaculatus* Thunb. (*G. angustifolium* Spr. vocat sed falso). — In arenosis planitiei capensis, Nov.
1417. *Gl. ?* — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.
- s. n. *Gl. Psittacinus* Hook. — In sylvis primitivis natalensibus, Octobri. Novembri.
1423. *Watsonia marginata* Ker. — In uliginosis planit. cap. et ad fluv. Guayang, George Nov.
1339. *W. ?* — In graminosis prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Dec.
1424. *W. Meriana* Ker. — In argillaceo-arenosis planitiei capensis, Sept.
1422. *W. ?* — Ad rivulos, Zwellendam, Dec.

1359. *Micranthus plantagineus* Eckl. — In arenosis planitiei capensis et ad radicem montium prope Zwellendam, Nov.
265. *Tritonia* ? — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Octobr.
1362. *T. fenestrata* Ker. — Inter frutices prope fluv. Zwartkop, Uitenhage, Aprili.
45. *T.* ? — In summitate montium Tafelberge, Natal, Dec. s. n. *T. longiflora* Ker. — In arenosis prope Groenekloof, Cap, Sept.
1366. *Beilia triticea* Eckl. — Ad radicem m. Canonberg, Hottentotts-Hollaud, Stellenbosh, Nov., (Granit).
1438. *Babiana plicata* Ker. ? — Inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Aug., Alt. 1000'.
1440. *B. villosa* Ker. — In planitie capensi, Junio.
1439. *B. angustifolia* Eckl. ? — In arenosis planitiei capensis, Aug.
1437. *B. disticha* Eckl. — In argillaceo-arenosis prope Constantiam, Sept.
s. n. *B. ringens* Ker. — In arenosis planitiei capensis, Sept.
200. *Ixia* sp. n. ? — In summis montibus Tafelberg, Natal, Dec., Alt. 2000'.
- s. n. *I. viridis* Thunb. — Inter frutices prope Tulbagh, Oct.
1459. *I. speciosa* Andr. — In arenosis prope Groenekloof, Augusto.
1331. *I.* ? — In arenosis planitiei capensis, Nov.
s. n. *I. candida* Red. — In arenosis prope Groenekloof, Cap, Sept.
177. *Diasia* n. sp. — In sylvarum umbrosis prope Natalbai, Decembri.
1441. *Romulea fragrans* Eckl. — In argillaceis circa urbem, copiose, Julio.
1443. *R. recurva* Eckl. — In solo argillaceo prope Greenpoint, Cap, Aug.
1451. *R. reflexa* Eckl. — Prope litus van Campsbai, Sept.
1421. *Hebea orchidiflora* Eckl. — In arenosis planitiei capensis, Nov.
1360. *Antholyza lucidior* L. — Ad latera montium prope Constantiam, Mart.
1347. *A. nervosa* Thunb. — In collibus prope Hemel en Aarde, Zwellendam, Dec.
1419. *A. aethiopica* L. — Ad sylvarum margines Outeniqua, Januario.
1420. *A. praealta* DC. — In paludosis et ad rivulos circa urbem, Junio, Julio.
- n. sp. 358. *Aristea compressa* Buching. — Ad sylvarum margines prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.
1350. *A. major* Andr. ? — In arenosis planitiei capensis, Novembri.

1349. *A. pusilla* Ker. — In planitie Zoetendalsvalley, Zwel-
lendam, Dec., (Meereskalk).
1353. *A. cyanea* Ait. — In planitie prope Constantiam, Sept.
1444. *Galaxia ovata* Thunb. — In argillaceis circa urbem,
Julio.
1446. *G. graminea* Thunb. ibid.
1445. *G. ?* Thunb. — In solo argillaceo prope Greenpoint,
Aug., Sept.
1345. *Moraea spathacea* L. — Planta copiosissima in terri-
torio capensi, zwellendamensi etc., Mart.
1448. *M. polystachya* Ker. — In arenosis planitiei capensis,
Septembr.
1449. *M. ?* — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1450. *M. aurantiaca* Eckl. — Copiose circa urbem, Julio,
Augusto.
1453. *M. ciliata* Ker. — Ad latera m. Tigerberg et Koeberg,
Cap, Aug.
1454. *M. ?* — In summo monte Tigerberg, Aug.
1455. et 1456. *M. ?* — In planitie capensi, Aug., Sept.
1457. *M. collina* Thunb. — Ad latera m. Tafelberg, Julio.
1447. *M. ?* — In planitie prope Constantiam, Sept.
1455 b. *Vieusseuxia fugax* Laroche. — In arenosis planitiei
capensis, Sept.
1377. *V. unguicularis* R. et Sch. — In arenosis prope Con-
stantiam, Sept.

Haemodoraceae R. Br.

1340. *Dilatris corymbosa* Thunb. — Ad mont. latera prope
Hangklip, Nov., Alt. 1000'.
1351. *D. viscosa* Thunb. — Inter rupes in summis montibus
prope Genadenthal, Dec., Alt. 3000'.
1355. *D. paniculata* Thunb. — In paludosis et ad rivulos per
totam coloniam, Mart.
1341. *Lanaria plumosa* Ait. — Ad latera m. Hottentotts-Hol-
land, Stellenbosh, Nov., Alt. 1—2000'.
1436. *Wachendorfia hirsuta* Thunb. — In arenosis planitiei
capensis, Sept.

Amaryllideae R. Br.

- s. n. *Amaryllis Belladonna* L. — In arenosis planitiei capen-
sis, Martio.
n. sp. 250. *A. ?* — In sylvarum umbrosis prope Natalbai,
Augusto.
1354. *A. ?* — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof,
George, Febr.
n. sp. 449. *A. ?* — In collibus prope Pieter-Mauritzburg,
Natal, Sept., (Dolerit).
n. sp. 255. *A. ?* n. sp. — In uliginosis ad latera montium
Tafelberge, Natal, Sept.

- n. sp. 394. *A.* ? — In arenosis circa Natalbai, Aug.
 1396. *A. undulata* Jacq. In Tulbaghskloof, Majo.
 1354. *A. sarniensis* L. — Ad lat. m. Tafelberg (Tafelbergs-
 kloof), Martio, Alt. 2500'.
 1392. *Strumaria spiralis* Ker. — Inter m. Tafelberg et Leu-
 wenberg, Juli.
 s. n. *Haemanthus coccineus* L. — Ad latera montium prope
 Constantiam, Martio.
 s. n. *H. albiflos* Jacq. — In sylvis Zitzikamma, Martio.
 s. n. *Cyrtanthus Smithii* Watt. — Ad rivulos prope Pieter-
 Mauritzburg, Natal, Aug., Octobr.
 1397. *C. angustifolius* L. ? — In summis montibus prope Con-
 stantiam, Martio, Alt. 1—2000'.
 266. *C.* ? n. sp. — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Na-
 tal, Aug.

Hypoxideae R. Br.

1388. *Hypoxis stellata* L. — In uliginosis ad radicem mont.
 Tafelberg, Sept.
 1442. *H. serrata* L. ? — In arenosis in mont. Tigerberg,
 Cap, Majo.
 1385. *H. juncea* Eckl. — In locis humidis ad lat. m. Tiger-
 berg et Tafelberg, Aug.
 1384. *H. affinis* Schult. — In arenosis planit. capensis, Majo.
 1393. *H. affinis* Schult. ? — In locis humidis inter m. Tafel-
 berg et Leuwenberg, Julio.
 1378. *H.* ? — Ad radicem m. Tafelberg, Sept.
 1383. *H.* ? — In uliginosis ad radicem m. Tigerberg, Aug.
 1379. *H. linearis* Andr. ? — In Langekloof, George, Febr.
 1387. *H. obliqua* Thunb. ? — In pascuis prope Grootte Berg,
 Stellenbosh, Majo.
 n. sp. 104. *H. Kraussiana* Buchinger. — In collibus prope
 Pieter-Mauritzburg, Natal, Sept.
 155. *H.* ? — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Dec.
 n. sp. 248. *H. multiceps* Buchinger. 248 b. *H.* ? — In gra-
 minosis prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Aug.
 1348. *H. sobolifera* Jacq. — In solo argillaceo prope fluv.
 Zwartkop, Uitenhage, Martio.
 1458. *H. stellipilis* Ker. — Inter frutices prope Zwellendam,
 Januario.
 1361. *H. alta* L. — In solo argillaceo prope Uitenhage, April.
 1386. *H. minuta* Thunb. — In arenosis prope Pampoen-
 kraal, Tigerberg, Majo.

Dioscoreae R. Br.

- s. n. *Testudinaria Elephantipes* Lindl. — Inter saxa ad mon-
 tium latera prope Uitenhage, Aprili.

Smilacaceae R. Br.

1331. *Asparagus scandens* Thunb. Fl. Cap. p. 334. (non Drège.)
= Drège n. 8570. — In locis umbrosis ad latera montis Tafelberg,
Cap, Sept., Alt. 1000'.

1330. *A. decl'natus* Linn., Thunb. l. c. p. 333. — *A. scan-*
dens Hb. Drège! nec Thunb. — Inter rupes ad latera montis Duy-
velsberg, Cap, Julio, Alt. 2000'.

356. *A. (inermis)* n. sp.? — In umbrosis sylvarum prope fl.
Umlaas, Natal, Octobr.

1335. *A. subulatus* Thunb. l. c. p. 333.? — An potius *A.*
retroflexus L.? — Inter frutices ad radicem montium Winterhoek,
Uitenhage, Majo.

1332. *A. Nivenianus* Steudel ex Roem. et Schult. syst. 7. p.
331. — An ab *A. decumbente* Jacq. satis distinctus? — In are-
nosis ad fl. Grootte Berg R., Stellenbosh, Majo.

413. *A. dependens* Thunb. l. c. — Inter arundines prope fl.
Umlaas, Natal, Octobr.

s. n. *A. capensis* L., Thunb. l. c. — In lapidosis circa urbem,
Junio.

1334. *A. spinescens* Steudel l. c. p. 329. — In solo argilla-
ceo prope fl. Büffeljagts R., Zwellendam, Jan.

1336. *A. tetragonus* Bresler ex Röm. et Schult. l. c. p. 329. ?
(= Drège n. 3489!) — Inter frutices et arbuscula prope villam
Uitenhage, Aprili.

1333. *Myrsiphyllum angustifolium* Willd. Roem. et Schult.
l. c. p. 1495. — *Medeola angustifolia* A. Rich. — ? *Asparagus vo-*
lubilis Thunb. l. c. p. 332. (Drège n. 2204.) — In hiatibus rupium
umbrosis prope Constantiam, Cap, Sept.

n. sp. 316. *Smilax Kraussiana* Meisner, fruticosa subinermis,
glaberrima, cirrhis saepe abortientibus, stipulis petiolo brevi ultra
medium adnatis; foliis ovalibus, utrinque obtusissimis v. subemar-
ginatis, mucrone callosio inermi breviter acuminatis, 5-nerviis, inte-
gerrimis; pedunculis axillaribus petiolo vix longioribus, apice glo-
boso incrassato minute multibracteatis, umbellis multifloris, flori-
bus patulis pedicellos subaequantibus, antheris exsertis recurvis,
baccis globosis. — In sylvis per totam terram natalensem, Julio
(Drège n. 4503!)

Rami volubiles, acute sulcato-angulati, hinc inde aculeo par-
vulo obsolete armati (internodiis plerisque inermibus.) Petioli 4—5
lin. longi. Folia $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ -pollicaria, 14—20 lin. lata, acumine vix
 $1\frac{1}{2}$ lin. longo, nervis venisque utrinque acute prominulis inermibus.
Umbellae 30—50-florae. Calyx 2 lin. longus, lobis lanceolatis ob-
tusis. Antherae albae. Baccae mole pisi majoris, fuscae? pedicel-
lis 6—8 lin. longis.

Asphodelaceae R. Br.

3181. *Tritoma media* Ker. — In uliginosis planitiei capensis
prope Muysenburg, Sept.

1358. *Agapanthus umbellatus* L'Herit. — In locis humidis, Zitzikamma, Martio.
1463. *Cyanella orchidiformis* Jacq. — In arenosis prope Constantiam, Sept.
1429. *Anthericum* ? 1425. *A.* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1430. *A. hispidum* L. — In Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Julio.
1427. *A. muricatum* Thunb. — Ad latera mont. Tigerberg, Cap, Sept.
74. *A.* ? — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Aug.
1431. *Bulbine* ? — Ad latera mont. Tigerberg, Aug.
1426. *B.* ? — Ad latera montium Leuwenberg, Duyvelsberg, Tigerberg etc., Cap, Julio.
1364. *B. praemorsa* Spr. — In solo argillaceo prope Uitenhage, Martio.
1363. *B. aloides* Willd. — Ad radicem mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili, Majo, (Grauwacke).
1432. *B.* ? — Inter frutices prope m. Paarseberg, Stellenbosh, Majo.
275. *B.* ? — In graminosis prope Natalbai, Julio.
1428. *Ornithogalum* ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1418. *O.* ? — In locis humidis in Langekloof, George, Mart.
1352. *O. aureum* Curt. — Ad montium latera prope Genadenthal, Zwellendam, Dec.
- s. u. *O. thyrsoides* Jacq. — Prope Zwellendam, Dec.
- n. sp. 1345. *Tulbaghia* ? — In solo argillaceo prope fl. Kromme, Uitenhage, Martio.
1402. *T. alliacea* L. — In locis argillaceis depressis ad lat. m. Tigerberg, Cap, Sept.
- n. sp. 1401. *T.* — In solo argillaceo in Langekloof, George, Febr., Martio.
1338. *Scilla* ? — In summitate montium Tafelberge, Natal, Sept., Alt. 1500—2500', (bunt. Sandstein).
- n. sp. 437. *Albuca*. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Aug., Alt. 1000—1500'.
1357. *A.* ? — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof, George, Febr., Martio.
1343. *Eucomis regia* Ait. — In Zitzikamma, Martio.
1370. *Drimia ovalifolia* Schrad. — In collibus circa Plettenbergsbai, George, Febr.
- n. sp. 464. *D.* ? — In graminosis ad radic. montium Tafelberge et circa Natalbai, Julio, Aug.
158. ? — In arenosis circa Natalbai, Aug.
1472. *Lachenalia orchioides* Ait. ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.
1371. *L. glaucina* Jacq. — In argillaceis prope Constantiam, Septembr.

1373. *L. isopetala* Jacq. — Ad latera m. Outeniqua, George, Jan, Alt. 1000', (bunt. Sandstein).

1374. *L. angustifolia* Jacq. — In arenosis m. Koeberg et Dasenberg, Cap, Octobr.

1375. *L. reflexa* Thunb. — In argillaceis circa urbem, Julio.

1376. *L. tricolor* Jacq. — In argillaceis ad latera montium Tigerberg, Aug.

Melanthaceae Batsch.

n. sp. 450. *Melanthium*. — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Sept.

s. n. *Androcymbium leucanthum* Willd. — In arenosis planitiei capensis, Junio.

1435. *Kolbea Breyniana* Schlecht. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1462. *Ornithoglossum glaucum* Salisb. — In arenosis ad radicem m. Muysenburg, Cap, Julio.

1434. *Wurmbea purpurea* Dryand. — Ad latera mont. Tigerberg, Julio, Aug.

1433. *W.* ? — Ad rivulos mont. Tigerberg, Aug.

(Continuabitur.)

Nova genera ac species plantarum, quas in regione chilensi - peruviano et in terra amazonica annis MDCCCXXVIII ad MDCCCXXXII legit Eduardus Poeppig et cum Stephano Endlicher descripsit iconibusque illustravit. Vol. I—III. Lipsiae sumtibus Friderici Hofmeister. MDCCCXXXV — MDCCCXLV.

Seitdem die von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland gesammelten botanischen Schätze durch Beschreibung und bildliche Darstellung das Eigenthum der Wissenschaft geworden, sind noch ausgezeichnete Botaniker in deren Fusstapfen getreten, um das grosse von ihnen begonnene Werk für die südamerikanische Flora weiter zu führen. Unter diesen nimmt Professor Pöppig eine der ersten Stellen ein, welcher auf seiner Reise in Peru und Chile, sowie am Amazonenstrom, so vieles Neue entdeckte, und diess mit einer solchen Virtuosität zu bewältigen wusste, dass die Ergebnisse dieser 3 Reisen einen sehr wichtigen Beitrag

1373. *L. isopetala* Jacq. — Ad latera m. Outeniqua, George, Jan, Alt. 1000', (bunt. Sandstein).

1374. *L. angustifolia* Jacq. — In arenosis m. Koeberg et Dasenberg, Cap, Octobr.

1375. *L. reflexa* Thunb. — In argillaceis circa urbem, Julio.

1376. *L. tricolor* Jacq. — In argillaceis ad latera montium Tigerberg, Aug.

Melanthaceae Batsch.

n. sp. 450. *Melanthium*. — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Sept.

s. n. *Androcymbium leucanthum* Willd. — In arenosis planitiei capensis, Junio.

1435. *Kolbea Breyniana* Schlecht. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1462. *Ornithoglossum glaucum* Salisb. — In arenosis ad radicem m. Muysenburg, Cap, Julio.

1434. *Wurmbea purpurea* Dryand. — Ad latera mont. Tigerberg, Julio, Aug.

1433. *W.* ? — Ad rivulos mont. Tigerberg, Aug.

(Continuabitur.)

Nova genera ac species plantarum, quas in regione chilensi - peruviano et in terra amazonica annis MDCCCXXVIII ad MDCCCXXXII legit Eduardus Poeppig et cum Stephano Endlicher descripsit iconibusque illustravit. Vol. I—III. Lipsiae sumtibus Friderici Hofmeister. MDCCCXXXV — MDCCCXLV.

Seitdem die von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland gesammelten botanischen Schätze durch Beschreibung und bildliche Darstellung das Eigenthum der Wissenschaft geworden, sind noch ausgezeichnete Botaniker in deren Fusstapfen getreten, um das grosse von ihnen begonnene Werk für die südamerikanische Flora weiter zu führen. Unter diesen nimmt Professor Pöppig eine der ersten Stellen ein, welcher auf seiner Reise in Peru und Chile, sowie am Amazonenstrom, so vieles Neue entdeckte, und diess mit einer solchen Virtuosität zu bewältigen wusste, dass die Ergebnisse dieser 3 Reisen einen sehr wichtigen Beitrag

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Krauss Christian Ferdinand Friedrich

Artikel/Article: [Pflanzen des Cap - und Natal - Landes 305-314](#)