

FLORA.

N^o. 8.

Regensburg. 28. Februar.

1846.

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal-Landes. Fortsetzung. (Gramineae). — Fürnrohr, über eine besondere Wucherung der faulen Kartoffeln. — Kirschleger, Essai historique de la Tératologie végétale. — Botanische Abbildungen.

KLEINERE MITTHEILUNGEN. Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. FERDINAND KRAUSS.

(Fortsetzung.)

Gramineae Juss.

Trib. Paniceae.

71. *Panicum numidianum* Lam. — Inter frutices prope fluv. Koega, (Uitenhage), Aprili.

54. *P. numid.* Lam. var. *vaginis hirsutis*. — In sylvar. umbros., Zitzikamma, Mart.

52. *P. serratum* R. Br. = *P. scopuliferum* Trin. — Prope fl. Kromme, Uitenhage, Mart.

183. *P. maximum* Jacq. — In collibus prope fluv. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 58. 188. *P. natalense* Hochst. Radix perennis caespitosa, culmus erectus pedalis vel sesquipedalis glaber, vaginae striatae et folia culmum subaequantia (vel breviora) convoluto-setacea rigida glaberrima; panicula capillaris, ovato-lanceolata, spithamaea vel brevior, ramis alternis, ramulis pedicellisque flexuosis glabris; spiculae subrotundo-ovatae acutae, mediocres (vix lineales), glaberrimae; glumae parum inaequales, inferior spicula paulo brevior ovata quinquenervis, superior spiculam aequans valde concava 5—7-nervis, flosculus inferior masculus bivalvis diander, valvula inferior glumae superiori similis 5—7-nervis, superior pellucida binervis, flosculus hermaphroditus acutus candidus laevis. — Ad sylvarum margines prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

Ad P. Dregeanum N. a E. (Illustr. Fl. Africae austr. I. p. 42) prope accedit, sed recedit vaginis, foliis nodisque omnino glabris, panicula laxiori et gluma inferiori constanter quinquenervi. (H.)

130. *P. Lindenbergianum* Nees. — In sylvarum umbrosis prope fl. Umgani, Natal, Nov.

50. *P. (Digitaria) Rottleri* Kunth. (commutatum N. a E.) — In graminosis, Zitzikamma, Mart.

47. *P. (Digitaria) sanguinale* L. Ibidem.

51. *P. (Setaria) intermedium* Roth. (Kunth). — In solo argillaceo arenoso, Zitzikamma, Mart.

73 b. *P. (Setaria) dasyurum* N. a E. — Inter frutices prope Uitenhage. *)

88. *Oplismenus Crus Galli* Kunth. — In locis humidis, Zitzikamma, Mart.

n. sp. 91. *O. (Orthopogon) capensis* Hochst. Culmus repens ramosus, vaginae ad oras hirsutae, folia lanceolata pilosiuscula, ad marginem serraturis minutissimis scaberrima, spicae terminales solitariae, rhachis simplex glabriuscula 5—6-nodis, spiculae glabrae, infima et summa solitariae, caeterae geminae, glumae et valvula flosculi masculi vel neutrius quinquenerves, sub apice bifido aristatae, arista glumae inferioris spiculam triplo superans, superioris fere aequans, valvulae brevissima. — Ad rivulos sylv. prope fl. Knysna, (George), Jan.

Ad *Oplismenum* loliaceum R. et S. et africanum Beauv. accedit, ab illo spicis solitariis (non racemosis), ab hoc spiculis geminis aliisque notis differt. (H.)

55. *Bluffia Eckloniana* Nees. — In graminosis prope Natalbai.

68. *Stenotaphrum glabrum* Trin. (*Rottboellia dimidiata* L.) — In arenosis planitiei capensis, Nov.

204. *Paspalus dissectus* L. — In graminosis planitiei inter fl. Umlaas et Natalbai, Dec.

147. *P. diss.* var. *pilosus*. — In paludosis ad fluv. Umlaas, Natal, Nov.

382. *Tricholaena rosea* var. *alba* Nees. — Ad radices montium Tafelberge, Natal, Augusto.

75. *Lappago occidentalis* Nees. — In sol. argillaceo prope fl. Koega, (Uitenhage), April. (Thonschiefer.)

67. *Gymnothrix caudata* Schrad. — In uliginosis planitiei capensis prope Royal Observatory, Nov.

97. *G. purpurascens* Schrad. — Ad rivulos lateris borealis mont. Duyvelsberg, Jul.

Trib. *Andropogoneae*.

Spodiopogon arcuatus Nees. (Illustr. Fl. Afr. austr. I. 97.) — Prope Umlaas R. Natal, Oct.

*) Huic speciei proxime accedit *Setaria aurea* Hochst. (in pll. exsiccatis Un. itin. Abyssinicus nr. 409. — Flora 1841. T. I. p. 276.), unde factum est, ut in schedulis scriptis plantarum Kraussianarum hoc nomine insignita sit. Satis tamen inter se differunt.

77. 98. *Andropogon hirtus* L. — Ad radices mont. Tafelberg, Duyvelsberg et Tigerberg, Julio, Augusto, et in distr. Zwellendam et Uitenhage.

163. *A. eucomus* Nees (in schedulis scriptis: *Eriopodium Kraussii* Hochst.) *) — In graminosis inter Umlaas R. et Natalbai, Decembri.

65. 66. *A. appendiculatus* Nees. — Ad radicem mont. Vanstaden, (Uitenhage), Mart.

29. *A. punctatus* Roxb. — In graminosis ad radicem mont. Tafelberge, Natal, Dec.

n. sp. 28. *A. (Heteropogon) filipendulus* Hochst. Culmus ramosus et folia anguste linearia, complicata, glaberrima; spicae geminae (aristis inter se contortis specie simplices) paniculatae, pedunculi filiformes e vaginis pauci vel plurimi, supra medium bractea lineari-subulata vaginaeformi instructi, inde tenuissime curvati vel penduli; spicae tenues conjugatae, aristarum duarum vel trium torsione in unam quasi coalitae; spica singula bi- vel trinodis, superior pedicello brevi tenuissimo suffulta; spiculae glabriusculae, masculinarum glumae inferiores in setam elongatae, foemineae gluma inferior truncato-bidentata 7-nervis, valvulae arista longissima, bisgeniculata, parte inferiori ferrugineo-hirsuta; illa rhacheos pars, cui spiculae hemigamo-foemineae insident, cum pedicellis adstantium masculinarum albido-barbata. — In graminosis per totam terram natalensem, Dec., Jan.

164. *A. (Heteropogon) β. pilosus* (in schedulis scriptis *Heteropogon natalensis* Hochst.) — In graminosis prope Natalbai, Novembri lectus.

Ab α non differt nisi pedunculis superne (infra spicas) valde pilosis et glumis spicularum eximie hirsutis (etiam sub nr. 28. exemplaria vidi glumis hirsutis).

Huic *Heteropogonis* speciei novae inflorescentia *Cymbopogonis* est, sed spicularum par infimum masculum et sequentium difformium constructio omnino generis illius. Spicae geminae jam in *Heteropogone* filifolio N. a E. occurrunt.

78. 79. 80. *A. (Cymbopogon) Iwarancusa* Blanc (N. a. E.) — In Tafelbergskloof, Bavianskloof et in Zitzikamma, Mart. — Sept.

*) *Anatheri* species est, sed propter plures species aristatas nomen ineptum (a defectu aristae derivatum) mutare et in ejus vicem *Eriopodium* substituere in animo erat. Speciei tunc indescriptae cognomen *Kraussii* addidi, sed inde ab hoc tempore Florae Africae australioris Illustrationes a Neesio nostro scriptae in lucem prodierunt, ubi hoc gramen novum inter *Andropogones* sub nomine supra allegato descriptum inveni. *Anatheri* species sane *Andropogoni* associari possunt; attamen sectionem distinctam constituunt habitu et lana longissima partium inflorescentiae statim dignoscendam, unde pari jure ac aliae sectiones generis vastissimi, e. gr. *Heteropogon*, *Spodiopogon*, *Cymbopogon*, *Trachypogon* proprium genus efficere merentur. (H.)

n. sp. 26. *A. (Cymbopogon) excavatus Hochst.* Culmus simplex tripedalis laevis, folia culmo breviora in acumen setiforme attenuata glaberrima, vaginae sulcato-striatae, ligula obtusa brevis; spicae geminae pluriflorae (5—6-nodes) fasciculato paniculatae bracteatae, paniculam 3—5 pollices longam contractam formantes, rhachis albido-hirsuta, spiculae glabrae, gluma spiculae fertilis inferior quadrinervis (rarius trinervis), nervis omnibus versus basin abruptis, utrinque ad nervos exteriores superne alata, marginibus vero inflexis, superior carinato-convexa uninervis vel subtrinervis (nervis lateralibus vix conspicuis), nervo carinali superne costato (alato) versus basin evanido; valvula floris fertilis inferior aristata, arista flosculo quadruplo longior, ab insertione usque ad partem mediam geniculatam nigro fusca et torta, inde scabriuscula tenuissima pallida; spiculae pedicellatae, pedicellus bifariam dense pilosus, apice dilatato *profunde excavatus*, spicula in cavitatis parte superiori ope squamulae brevissimae lateraliter affixa, ejus gluma inferior acuta novemnervia, superior trinervis, flosculus univalvis masculus. — In graminosis per totam terr. natalens. Dec. Gramen vulgatissimum et fere unicum in planitie inter m. Boshmannsrand et m. Quathlamba. Alt. 2—4000'.

Species inter priorem et sequentem intermedia, sed ab utraque certissime diversa. Magnitudine et habitu priori simillima, sed folia versus basin paulo latiora et ligula brevior ad oram vaginae minus producta, rhacheos villositas parcior et brevior, gluma spiculae fertilis inferior nonnisi quadrinervis, nervis omnibus versus basin abruptis (in *A. Iwarancusa* nervi plerumque 5—6, extimis usque ad basin productis), pedicellus spiculae masculae apice profunde cavus, spicula ipsa basi ad latus glumae superioris squamula vel appendiculo minimo stipitifor mi in cavitate pedicelli lateraliter affixa, quod appendiculum nec in *A. Iwarancusa* nec in sequente specie conspicitur. A sequente specie, quae orgyalis et arundinacea, foliis latioribus, firmioribus longioribusque et ligula magna ovata instructa est, praeterea panícula minus composita breviori aliisque notis differt, glumis tamen prope accedit.

87. *A. (Cymbopogon) nardoides N. a E.* (in schedulis scriptis: *A. quadrinervis Hochst. n. sp.* *) — Gramen aromaticum et vulgare in locis humidis per tot. terram natalens., Jan.

*) In exemplaribus Kraussianis glumam spiculae fertilis inferiorem semper quadrinervem vel trinervem video, quam Neesius diagnosi binervem dicit (vide *Illustr. Florae Afric. austr.* I. p. 116); sed caetera omnia tam exacte congruunt, ut de identitate dubitare non possim, Neesio ipso in descriptione speciei uberiori (pag. 117 operis citati) quandoque uervulos binos intermedios tenuissimos accedere affirmante. *Andropogon pachnodes Trin.* nec non *A. Martini Wight Cat.* ex auctoritate Neesii synonyma sunt.

In plantis Dregeanis video exemplar *A. nardoides Nees.* b inscriptum; quod cum *A. excavato* meo (specie antecedente) omnino con-

81. *Anthistiria ciliata* Retz. α . *hispida* Thunb. — In graminosis Zitzikamma, Uitenhage, Febr.

99. *A. ciliata* Retz. β . *imberbis* Nees. — Ad lat m. Tafelberg et Duyvelsberg, Julio.

64. *Erianthus capensis* N. a E. — Ad ripas Kromme Rivier et ad rivulos radicum m. Winterhoek, Mart. Aprili.

159. *E. Ecklonii* N. a E. (in schedulis scriptis *E. pungens* Hochst. n. sp.? an *Ecklonii* Nees var.?) — Inter arundines ad fluvium Umlaas, Natal, Dec.

Parum inter se differunt hae duae species, nec tertia ex Africa australi, quam habeo exsiccatam (*Sorghum* N. a E.), multum recedit, ut facile omnes in unam speciem confluere credas. *Erianthus Ecklonii* intermedia est inter duas reliquas.

260. *Imperata Thunbergii* Nees. — Ad rivulos prope P. Mauritzburg, Natal, Sept.

184. *Sorghum halepense* Pers. — In collibus prope fluvium Umlaas, Natal, Dec.

n. gen. 92. *Psilopogon* *) *capensis* Hochst. (*Eulalia capensis* Hochst. mnspt.) Character generis: Spiculae geminae, conformes, altera pedicellata, utraque uniflora fertilis, flosculo utriusque bivalvi hermaphrodito (vel rectius forsitan: utraque spicula biflora, flosculo utroque univalvi, inferiori neutro, superiori hermaphrodito). Calyx biglumis, gluma inferior 6-nervis, lanceolata, acuminata, apice subbidentata, medio obtuse canaliculata, marginibus inflexa, superior subaequalis, paulo angustior, acuminatissima, carinato-convexa, subtrinervis; palea flosculi inferior lineari-lanceolata hyalina, uninervis, apice integra vel brevissime bifida, nervo in aristam tenuissimam vix vel non tortam spicula multo longiorem excurrente; palea superior (ni est flosculus neuter) hyalina enervis; stamina duo, stylus profunde bifidus stigmatibus penicillato-plumosis; lodiculae duae cuneatae, apice emarginatae.

Descriptio speciei: Culmi graciles adscendentes, plerumque

venit. Si recte inscripta (Neesius vere in opere citato varietatem β . minorem a Drege o in Africa australi lectam ad *A. nardoidem* suum citat), haec varietas Neesiana amovenda et cum priori specie conjungenda, quam specificè differre a planta Kraussiana nr. 87. certissime persuasum habeo. (H)

*) *Psilopogonis* nomen prius gramine Abyssinico dedi (vide *Psilopogon* Schimper in schedulis pll. Un. itin. exsicc. ex itinere Abyssinico nr. 96.), quod postea ad *Lucaeam Kunth* (*Pleuroplitis Trin.*) pertinere cognovi et *Lucaeam Schimper* appellavi. Intermixta tamen fuit huic gramine Abyssinico alterius generis species nova simillimi habitus indeque per errorem sub eodem numero et nomine edita, quam *Bathratheri* speciem esse generis celeberrimus auctor ipse certior me fecit et cui *Bathratherum Schimper* N. a E. nomen et numerus 96 b. inter plantas Schimper Abyssinicas sit. Haec duo gramina Abyssinica, quorum characteres et differentias alio loco exponam, cum gramine capensi supra descripto, quamvis habitu simili gaudeant, non commiscenda nec ejusdem generis habenda esse moneo.

ultra pedales, inferne repentes, nodi barbati, vaginae arctae, ad oras villosae, folia $1-\frac{1}{2}$ pollicaria, lanceolata, acuminata, glabriuscula, ad marginem scabra; spicae in summitate culmi geminae vel ternae, articulatae, gracillimae, pallide virides; rhachis, pedicelli et glumae inferioris nervi extimi scabriusculi, spiculae omnes basi circulo villorum cinctae, caeterum extus glabrae, gluma superior intus ad margines superne villosa-pubescent; paleae arista tenuissima subflexuosa pallida, spiculam longitudine subtriplica superans. — Ad rivulos sylvarum, Knysna, Jan.

Generis caractere proxime accedit ad *Eulaliam* Kunth, a qua non recedit nisi spicularum teneritate, glumarum glabritie, palea inferiori integra vel brevissime bifida, arista vix torta tenuissima, staminum numero et lodicularum praesentia. Habitu proxime accedit ad *Bathratheri* N. a E. species vel *Lucaeae* Kunth. Si has differentias minoris aestimes, hoc gramen *Eulaliae* adscribas, uti in manuscripto prius feci. (Hochst.)

Trib. *Rottboelliaceae*.

14. *Lodicularia capensis* Trin. — Ad fluv. Umlaas, Natal, Decembri.

Trib. *Stipeae*.

Stipa capensis Thunb. — In sylvar. umbrosis, Zitzikamma, Martio.

Aristida capensis Thunb. — In sol. granitaceo m. Canonberg prope fl. Erste, Stellenbosh, Nov.

Lasiagrostis elongata Nees. — In graminosis prope fl. Umlaas, Natal, et in umbrosis sylvar. Knysna, Jan.

Trib. *Agrosteae*.

Agrostis Bergiana Trin. — In locis humidis prope Melkhoutkraal, (Knysna), Jan.

67. *Sporobolus virginicus* Kunth. — In arenosis dunarum circa Natalbai, Jan.

7. *S. capensis* Beauv. — Ad sylv. margines prope fl. Umlaas, Natal, Dec., et prope fl. Krömme, Uitenhage, Mart.

212. *S. subtilis* Kunth. — In graminosis planitie inter fluv. Umlaas et Natalbai, Dec. — Novam *Sporoboli* speciem capensem, quam habeo a Barone de Ludwig et Drege lectam, vide in nota. *)

*) *Sporobolus Ludwigii* Hochst. Rhizoma graminis pumili crassum reptans, vaginarum vestigiis dense vestitum (vel si culmi pars infima, quae rhizomatis nomine insignitur, terrae minus immersa est et radículas non gignit, tamen illi appressa et tunc foliis distichis homomallis, scilicet omnibus sursum spectantibus, brevibus densissime tectus). Rami steriles ex rhizomate vel ima culmi parte assurgentes brevissimi, densissime distichis-foliosi, florens plerumque solitarius, adscendens, basi pariter

Trib. *Chlorideae*.

Chloris petraea Thunb. (*Eustachys petraea* Desv.) — In solo calcareo, Zoetendalsvalley, Dec.

Dactyloctenium aristatum Link. — In sylvis Zitzikamma, Mart.

Diplachne capensis Nees. — In uliginosis planitiei capensis, Nov., et ad ripas fl. Koega, (Uitenhage), Aprili.

Cynodon Dactylon Pers. — In graminosis in Zitzikamma, Mart.

445. *Harpechloa capensis* Kunth. — In graminosis prope Pieter Mauritzburg, Natal, Sept., Alt. 1—2000'.

Trib. *Hordeaceae*.

Triticum distichum Thunb. — In dunis prope litus, Struysbai, Zwellendam, Dec.

foliis indutus, in culmum digitalem vel spithamaeum bifolium simplicem et paniculam brevem patentem terminatus. Foliorum infimorum vaginae laeviusculae, culmeorum striatae, omnium lamina e basi lata ovato-lanceolata vel in superioribus lanceolata brevissima multistriata plana, margine cartilagineo cincta, obtusiuscula. Culmus, ubi vaginam supremam plerumque lamina destitutam excedit, usque ad paniculam sulcato - vel angulato - striatus. Panicula sicut tota planta (exceptis foliorum marginibus apicem versus plerumque scabris) glaberrima, rami infimi verticillati (4—5), superiores bini vel solitarii, omnes basi callosi, a medio fere in ramulos floriferos divisi: spiculae $2\frac{1}{3}$ lineas longae, oblongo-lanceolatae, gluma inferior spicula quadruplo brevior, ovata, obtusa, enervis, pallida, superior spiculam fere aequans, oblongo-lanceolata, uninervis, violacea, subacuta, flosculi valvula inferior ovato - vel lanceolato - oblonga, pallide violacea, uninervis vel subtrinervis, plerumque obtusa vel obtusissima (rarius subacuta), superior latitudine, longitudine et colore fere aequalis, obtusissima vel subemarginata, binervis.

Gramen sub nomine *Sporoboli brevifolii* a Drege o inter plantas exsiccatas capenses, quas vendidit, editum (saltem illa exemplaria, quae mihi misit) huc pertinet, nec ad verum *Sporobolus brevifolius* Nees (tenellum Kunth — *Ehrhardta tenella* Spr.), quem sub nomine *Vilfae brevifoliae* in *Linnaea* VII. p. 294 accuratissime descripsit celeberrimus auctor et in *Illustr. Florae Afr. austr.* I. p. 160 et 161 repetivit descriptionem addita tamen p. 161 animadversione, specimina ad flumen Zondagsrivier a cl. Drege o lecta differre gluma superiori flosculum fere aequante, spiculis magis ovalibus — unde patet haec specimina Dregeana, quae auctor ante oculos habuit, cum meis Dregeanis omnino convenire, sed differentias a planta genuina Neesio levioris momenti visas esse. Equidem *Sporoboli brevifolii* N. a E. genuini specimen ante oculos habeo, cum descriptione Neesiana accuratissime congruum a Barone de Ludwig communicatum nec non specimen aliud Ludwigianum *Sporoboli* supra descripti, quam Ludwigio dedici, cum exemplaribus Dregeanis perfectissime congruum, et ex comparatione video species duas quamquam statura et habitu simillimas, tamen notis constantibus et optimis certissime diversas. *Sporobolus Ludwigii* differt a *brevifolio* non solum foliis omnino non conduplicatis, multo minus obtusis (fere subacutis), ad basin latioribus et fere duplicem striarum numerum referentibus, sed etiam culmo evidenter sulcato-striato vel angulato (in altera specie estriato tereti), paniculae ramis infimis verticillatis et glumis maxime inaequalibus, superiori flosculum aequante aut vix breviori, aliisque notis. (Hochst.)

Brachypodium flexum N. a E. (sylvaticum R. et S.?) — In solo argillaceo-arenoso, Zitzikamma, Mart.

Trib. *Avenaceae*.

82. *Tristachya leucothrix* Nees. — Ad latera m. Tafelberg et Duyvelsberg, Julio.

n. sp. 366. *T. monocephala* Hochst. (Tr. leucothrix var. monocephala, si magis placet.) Culmus spithameus erectus nodis barbatus, in capitulum tristachyum solitarium terminatus, folia angustissima convoluta brevia (etiam radicalia culmo multoties breviora), vaginae pilosae; spiculae plane ejusdem constructionis, formae, coloris et pilositatis ac in specie antecedenti, solummodo paullisper minores, aristae tamen longiores. Forsan mera prioris varietas, sed culmo in exemplaribus omnibus loco infra indicato lectis monocephalo valde insignis. (H.) — In summitate montium Tafelberge, prope Pieter Mauritzburg, Natal, Sept.

Pentameris macrantha Nees. — In colonia capensi.

? 89 b. *P. stricta* Nees. — In solo argillaceo prope fl. Breede, Zwelldam, Dec.

P. Thouarsii P. Beauv. (*Danthonia speciosa* Lehm. ? in schedulis.) — Ad lat. montium prope Genadenthal, Dec. 1839.

95. *Danthonia lanata* Schrad. — In planitie capensi prope Constantiam, Sept.

100. *D. trichotoma* Nees. Illustr. Fl. Afr. austr. p. 318. (*Pentameris Thouarsii* in schedulis scriptis.) — In lapidosis prope Uitenhoek, (Cap), Sept.

74. *D. curva* N. a E. (Illustr. Fl. Afr. austr. I. p. 328.)*) β . culmo glumis viridibus (*Danthonia Kraussii* Hochst. in schedulis scriptis.)

Annotatio. Opus Neesianum citatum, in quo haec species primum descripta est, nondum publici juris factum erat eo tempore, quo plantae Kraussianae a me determinatae sunt. — Ad radicem m. Winterhoek, Uitenhage, Majo.

*) Haec species *Danthoniae* aequae ac *D. lanata* ad divisionem vel subgenus *Himantochaete* Nees pertinet. Ejusdem divisionis *Danthoniam* nondum descriptam a Barone de Ludwig e Capite bonae spei missam hoc loco propono.

Danthonia (*Himantochaete*) *obtusifolia* Hochst. (*Avena rigida* Steudel? Flora 1829. p. 482.) Culmi pedales, plures ex una radice, basi sublignosi, vaginis superstitibus tecti, deinde folia disticha brevia, rigida, angulato-convoluta, obtusa, ut culmus glabra, vaginae ore barbatae, spica brevis racemosa, spiculae biflorae, pedicellus et glumae flosculis plus duplo longiores subaequales glaberrimae, valvula inferior inde a basi septemnervis, pilis arrectis villosa, setae laterales flosculo paulo longiores basi coloratae, arista triplo longior.

Species foliis obtusissimis rigidis valde insignis; sub lente acri foliorum superficies alutacea apparet, scilicet minutissime elevato-punctata, sed obtuse punctulata, non scabra, solummodo apex interdum muriculato-scaber invenitur. (Hochst.)

Airopsis Steudelii Nees. — Ad latera m. Baavianskloof, Zwel-
lendam, Dec.

Trib. *Festucaceae*.

60. *Lasiochloa longifolia* Kunth. — In arenosis planitiei ca-
pensis, Nov.

93. *Briza minor* L. — In vineis Constantiae, Sept.

73. *B. geniculata* Thunb. — In solo argillaceo prope Uiten-
hage, Aprili.

94. *B. maxima* L. — In vineis Constantiae, Sept.

72. *Melica cafferorum* Schrad. — Inter frutices prope Uiten-
hage, Aprili.

101. *Poa Uniolae* Schrad. — In solo argillaceo prope Con-
stantiam, Sept.

365. *P. brizoides* L. — In graminosis per tot. terr. natalens.
Sept., et prope fl. Kromme, Uitenhage, Febr.

349. *P. (Eragrostis) ciliaris* L. — Ad sylvar. margines prope
fl. Umlaas, Natal, Octobr.

295. *P. (Eragr.) chalcantha* Trin. (= *racemosa* Thunb.?) —
In graminosis circa Natalbai, Julio.

33. *P. (Eragr.) filiformis* Thunb. — In graminosis prope fl.
Umlaas et Pieter Mauritzburg, Natal, Dec., et ad radic. m. Tafel-
berg, (Cap), Julio.

58. *P. (Eragr.) filiformis* Thunb. β . minor. — Per tot. Lange-
kloof, Mart.

61. *P. (Eragr.) glabrata* Nees. — In arenosis planitiei ca-
pensis, Nov.

59. *P. (Eragr.) gummiflua* Nees (Illustr. Flor. Afr. austr. I.
p. 393) non *Lasiochloa laevis* Kunth, uti in schedulis scriptis per
errorem insignita est. — Ad lat. mont. Winterhoek, Uitenhage,
Aprili.

Trib. *Oryzeae*.

414. *Ehrhardta undulata* var. *submutica* Nees. — In graminosis
dunarum prope ostium fl. Umlaas, Natal, Octobr.

102. *E. calycina* Sm. — Ad vias prope urbem, Sept.

9. *Leersia mexicana* Kunth. — In fluvio Umlaas, Natal, Dec.

Trib. *Phalarideae*.

62. *Phalaris capensis* Thunb. — In graminosis circa urbem,
Novembri.

(Continuabitur.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Krauss Ferdinand

Artikel/Article: [Pflanzen des Cap- und Natal - Landes, gesammelt und zusammengestellt \(Fortsetzung.\) 113-121](#)