

FLORA.

N° 29.

Regensburg.

8. August.

1849.

Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. Al. Jordan, einige neue Pflanzen der Flora Frankreichs. — LITERATUR. Garecke, Flora von Nord- und Mittel-Deutschland. — ANZEIGEN. Tropaeolum Deckerianum. Billot, Flora Galliae et Germaniae exsiccata. Verkehr der k. botanischen Gesellschaft im Juli 1849.

Einige neue Pflanzen der Flora Frankreichs, aufgestellt von ALEXIS JORDAN.

Der seharsichtige Verfasser der „Observations sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou critiques de la France“ hat sich leider in Folge der Revolution genöthiget gesehen, die Fortsetzung seiner Fragmente aufzugeben, und desshalb in dem „Catalogue des graines récoltées au jardin botanique de la ville de Dijon en 1848“ einen Theil seiner Novitäten publicirt. Da dieses Samenverzeichniss nur in die Hände sehr weniger Botaniker gelangen dürfte, so halten wir es im Einverständnisse mit dem Herrn Verfasser für angemessen, die darin enthaltenen „Adnotationes“ durch Wiederabdruck in der Flora der Vergessenheit zu entreissen.

Die Redaction.

1. *Anthemis collina*. Jord.... Pedunculis in apice ramorum solitariis longe nudis, involuci hemisphaerici basi haud umbilicatis foliolis adpressis tomentoso-pubescentibus dorso viridibus caeterum scarioso-pallidis, exterioribus brevioribus ovato-lanceolatis acutis convexis leviterque carinatis, interioribus elliptico-oblongis obtusis, capitulis fructiferis oroides, akeniis griseis lineari-oblongis basi attenuatis coronula oblique truncata brevissima terminatis, receptaculi paleis deciduis oblongo-cuneatis leviter concavis apice subtruncato dentatis carina viridi breviter excurrente mucronatis flosculos subacquantibus, foliis adpresso pubescentibus subincanis petiolatis omnibus basi auriculatis subbipinnatipartitis, laciinis linearibus subacutis patulis, caulis ramosissimis patulo-diffusis superne ascendentibus, caudice ramoso sureulis radicantibus aucto dense caespitoso.

Hab. in pinetis et aridis, etiam in arvis collium graniticorum vivariensium, prope *Tournon!* (*Ardèche*). — Majo., Jun. 24. — Semi-flosculi albi, elliptici: caules vix ultra 1-2 dec. alti.

Obs. *A. montana* L.. montium excelsorum praecipue incola, dig noseitur: capitulis conspicue majoribus, fructiferis minus rotundato-ovoideis, semi-flosculis longioribus, foliolis involueri eximie nigro-marginatis dorso *planiusculis* fere ecarinatis; akeniis majoribus *albidis* nec griseis basi minus attenuatis, receptaculi paleis valde con cavis vix apice dentatis longius cuspidatis flosculos fere supereminentibus, foliis minus adpresso pubescentibus, caulinis basi ascendentibus *erectis omnibus simplicissimis*.

2. Artemisia suavis. Jord. Panicula racemosa virgata, capitulis *globoso-ovoideis* nutantibus, involueri foliolis canescensibus, exterioribus *lanceolato-linearibus* subaeutis, interioribus *elliptico-obovatis* obtusis basi attenuatis ad marginem *latissime* scarioso-fuscis flo sculos subaequantibus, akeniis oblongis, *receptaculo glabro*, foliis viridibus vel subcanescensibus ambitu late ovatis petiolatis fere omnibus ad basin petioli auriculatis, inferioribus bipinnatipartitis laciinis *subparallelis* angustissime linearibus *tenuibus nervo latissimo* fere utrinque (etiam *in vivo*) pereursis, superioribus simpliciter pinnatis, floralibus integris elongatis erecto-patulis *capitula longe superantibus*, caulinis fruticosis caespitosis erectis basi ascendentibus.

Hab. in herbosis et rupestribus collium graniticorum; *Vienne* prope *Lyon*. Flor. Sept. 24. — Racemuli tenues simplices saepe axi adpressi vel in panicula luxuriante subpatuli elongati fere a basi capitulis onusti: flores flavescentes extus violacei: lobi erecti haud recurvati: odor suavissimus: caules 6-10 dec. alti.

3. Bunias arvensis. Jord. Sepalis erectis, petalis obcordatis calyce duplo longioribus, racemis fructiferis longissimis, pedicellis patentibus fructo longioribus, siliculis *oratis obscure tetragonis subteretibus* glandulis obsitis, stylo pyramidato siliculam subaequante. foliis radicalibus oblongis *runcinato-pinnatifidis* petiolatis caulinis sessilibus linear-lanceolatis subdentatis integris acutis, caule erecto ramosissimo vel subsimplici, ramis *virgatis elongatis erecto-patentibus*.

Hab. in arvis argillosis; *Chasselay*, *Quincieux*, &c., prope *Lyon*, haud infrequens. — Flor. Majo., Jun. ⊖. — Flores flavi: glandulae cylindricae aequa longae ac latae ore apertae in ramis, pedicellis, fructibus undique adsunt.

Obs. Ab affini *B. Erucagine* L. differt praesertim siliculis omnino apteris utrinque magis attenuatis, stylo paulo longiore, foliis caulinis aentioribus minus dentatis, glandulis numerosioribus conspicue longioribus, denique habitu proceriore racemisque magis elongatis.

4. *Fumaria confusa*. Jord. — *F. media* Lois. Duby et auct. ex part. — *F. muralis* Gren. et Godr., Fl. de Fr., I, p. 67, ex parte non Sonder! Racemis evolutis laxis, bracteis oblongis acutis pedicelli *patulo-erecti* latitudinem aequantibus ipso *duplo brerioribus*, sepalis ovatis acutis *obiter dentatis* corollae latitudinem *aequanti-bus* longitudine sua *triplo* brevioribus in fructu juniore saepe *per-sistentibus*, calcare elongato sepalis *subduplo* longiore, fructibus rotundatis obtusis laevibus vel demum paulisper rugulosis, basi fructus *latissima* diametrum suum (*in vivo*) *aequante* pedicelloque apice parum iuerassato conspicue *latiore*, foliorum laciniis oblongis.

Hab. in arvis et ad muros Galliae mediterraneae praesertim, circa *Toulon*, *Marscille*, *Montpellier*, &c., haud infrequens. Crescit etiam in Gallia occidentali et circa *Paris*. — Flor. Majo. ⊖. — Flores pallide purpurei apice saturiores: habitu et magnitudine florum medium tenet exacte inter *F. officinalem* L. et *agrariam* Lag.

Obs. 1. *F. muralis* Sonder, ex speciminibus authenticis siccis aliisque vivis ab am. Verlot communicatis ab hac certissime differt: racemis *paucifloris* conspicue brevioribus, floribus *minoribus* intensius coloratis apice atro-purpureis, bracteis pedicello *paululum* nec *duplo* brevioribus, pedicellis apice magis incrassatis patentibus *fere recurvatis* brevioribusque, sepalis minoribus inferne tantum dentatis corollae tubo *eximie angustato latioribus* haud persistentibus, fructibus *laevibus* figuram *sub-rotundo-oratam* exhibentibus aequa longis ac latis basi sua angustiore pedicelli latitudinem *haud superantibus*, foliis magis cirrhiformibus laciniisque brevioribus, denique habitu humiliore. — Specimina hujus in Gallia lecta nondum vidi.

Obs. 2. *F. Bastardi* Boreau Rev. bot. — *F. muralis* Gren. et Godr. I. cit., ex parte, mihi videtur *F. murali* et *F. confusae* valde affinis, sed tamen ab utraque diversa. A *F. confusa* recedit: bracteis pedicello brevioribus sed non duplo, pedicellis magis patentibus saepe recurvatis, sepalis apice *subintegris* nec *obiter dentatis* petalo inferiore saepe *libero et patulo* ut in *F. agraria* Lag., fructibus aequa longis ac latis nec latioribus basi fructus diametrum suum haud aequante pedicelloque *fere angustiore*. Habitu magis accedit ad *F. capreolatam* L. vel potius *F. agrariam* Lag. cui floribus

simillima. — Specimina quae ab ipso auctore accepi, alia vernalia floribus majoribus alia serotina floribus minoribus praedita, caeterum simillima, duas suas *F. Bastardi* formas exhibent, sed et auctor *F. confusam* meam sub nomine *F. Petteri* Rehb. olim misit et hanc forsitan cum *F. Bastardi* varietate minore postea confudit.

F. Bastardi Bor. a *F. murali* Son d. dignoscitur: floribus conspicue majoribus, sepalis multo majoribus, corollae tubo multo minus angustato, petalo inferiori saepissime libero et patulo, capsula paulo majore exakte orbiculari rugulosa nec omnino laevi.

F. flabellata Gasp. valde accedit ad *F. Bastardi*, sed bonam constituit speciem minime cum *F. capreolata* L. associandam, a qua differt fructibus majoribus evidenter rugulosis et calcare sepalis sub-duplo longiore nec ipsa aequante.

F. alexandrina Ehr. pro specie dubia habita et *F. capreolatae* L. varietatibus saepissime adjuncta valde insignis est foveolis siliculae intus nigricantibus, et hoc egregio charactere ab omnibus generis speciebus statim dignoscitur.

5. *Fumaria Kraliki*. Jord. — *F. pulchella* Kralik. ined. non Salisb. — *F. anatolica* Boiss. ined. Racemis evolutis laxiusculis, bracteolis oblongo-ovatis *pedicello longioribus*, pedicellis fructiferis brevissimis *omnino recurvatis*, sepalis ovatis denticulatis, corollae latitudinem et ipsius longitudinem dimidiam superantibus, calcare sepalis breviore, fructibus parvis *laevibus exakte orbiculatis* obtusissimis, fructus basi pedicello apice sensim inerassato *paululum angustiore*, foliorum lacinias planis oblongo-linearibus linearibusve saepe tenuissimis.

Hab. in cultis et ad muros loco dicto *Sainte-Marguerite* prope *Marseille* (Kralik.), in *Canaria* (Pinard). — Flor. Majo. ⊖. — Florum racemi brevius pedunculati fere a basi floribus onusti pulcherrime albido-purpurei: sepala albida, corolla amoena purpurea apice intensius colorata: caules graciles saepe scandentes petiolique sub-cirrhosi.

Ob pedicellos fructiferos reflexos et habitum ad *F. capreolatum* L. accedit, sed gratilitate omnium partium et certis characteribus ab hac et affinibus speciebus eximie differt.

6. *Galeopsis sulfurea*. Jord. Verticillis in summo caule ramisque approximatis dense multifloris, calycis dentibus ex basi anguste lanceolata longe subulato-spinosis tubum vix superantibus, corollae sulfurear tubo calyce *sub-duplo longiore* a basi ad tertiam partem

superiore lineari-cylindrico superne ampliato, labio superiore tubum dimidium aequante erecto ovato convexo obsolete trilobato apice acute denticulato, labii inferioris lobis patulo-deflexis, lateralibus ovatis subdentatis intermedio longiore obovato quadrato denticulato, carpellis ovatis sere aequae longis ac latis, foliis laete virentibus sparsim pubescentibus late *ovato-lanceolatis* longe acuminatis basi *rotundatis* in petiolum dimidium limbum aequantem *contractis* margine serrato-dentatis, serraturis ovatis subacutis, caule hispido sub geniculis incrassato.

Hab. ad oras sylvarum et ad fosas; *Charpennes!* prope *Lyon*, *Morestel*, *Avinières*, *Saint-Laurent-du-Pont (Isère)*. — *Flor.* Aug., Sept. ○. — Corolla tota sulfurea, cum tubo inferne et lobis labii inferioris margine pallidioribus loboque intermedio punctis lineisque purpureis et versus basin area pulchre citrina insignito.

Ad *G. versicolore* Curt., *Tetrahit* L. et *bifida* Boenningh. facile dignoscitur, praeter alias notas, forma foliorum. — Ad *G. pubescens* Bess. recedit corolla sulfurea, carpellis conspicue minoribus, foliis longius acuminatis et pubescentia caulis diversissima.

7. *Hieracium approxinatum*. Jord. Paniculae subcorymbosae ramis valde inaequalibus erecto-patulis elongatis subflexuosis apice pedunculis involucrisque canescensibus hirtisque, pilis basi atris glanduliferis in involuero longiusculis et in pedunculo brevibus paucis, involueri foliolis linearibus apice attenuatis subacutis, receptaculi alveolis margine *subintegris* ad angulos cilio brevi lanceolato praeditis, areolis mammula leviter prominula impositis *ore latiusculo* apertis, foliis *obscure* virentibus saepe maculatis utrinque sparsim pilosis ad petiolas villosis, radicalibus *ovato-ellipticis* acutis basi in petiolum brevem latiusculum attenuatis profunde dentatis, dentibus *lanceolatis* acutis *patentibus*, *caulinis* 4-6 breviter petiolatis valde acutis; caule piloso seabriuscule striato parum fistuloso erecto flexuoso *dichotome ramoso*, ramis *subaphyllis*.

Hab. in nemorosis argillosis praesertim regionum graniticarum prope *Lyon*; *Dardilly!* *Charbonnière!* *Alix!* (*Rhône*). — *Fl.* Jun. ♀. — Flores pulchre flavi: folia saepe maculis nigrescentibus adspersa: caulis 4-8 dec. alt.

A simillimo *H. sylvatico* Vill. non distingui potest nisi attenta speciminum comparatione. Tamen ab hoc certissime differt. In iisdem locis saepe cum illo promiscue crescit, et in horto indelem servat. Dignoscitur ramis paniculae paucifloris minus racemosis nec

apice fastigiatis magis patulis inaequalibus pedunculisque longioribus haud strictis, foliis obscure virentibus magis basi attenuatis brevius petiolatis, dentibus eorum profundioribus, caule apice subnudo.

8. *Hieracium commixtum*. Jord. Paniculae subcorymbosae ramis erecto-patulis substrictis apice praesertim pedunculis involucrisque subcanescensibus hirtisque, pilis atris glanduliferis, involuci foliolis linearibus apice attenuatis acutis, exterioribus sublaxis, receptaculi alveolis *ad marginem dentatis* ad angulos cilio lanceolato acuto praeditis, areolis parum prominulis, foliis pallide virentibus subtus fere glaucescentibus supra glabratis caeterum villosulis venoso-reticulatis, radicalibus *elliptico-lanceolatis* acutis vel acuminatis inferne in petiolum longiusculum angustatis dentatis, dentibus baseos *patentibus* acutis, caulinis 3-4 brevius petiolatis acuminatis, caule inferne piloso *eximie scabrido fistuloso* erecto *virgato* apice ramoso aphyloque.

Hab. in nemorosis et pratis montium graniticorum lugdunensem et vivariensem; *Saint-Bonnet-le-Froid! Mont-Pilat!* prope Lyon; *la Champ-Raphaël! Mont-Mezenc!* (Ardèche). — Flor. Jun. 24. — Flores flavi parvi; caulis 4-6 dec. alt.

Ab affini *H. diviso* differt: ramis pedunculisque brevioribus magis patulis strictioribusque, involuci alveolis margine dentatis, foliis elongatis magis acuminatis rarius maculosis pallidioribusque brevius dentatis, caule virgato apice tantum ramoso nec fere a basi bifido dichotomo.

Obs. Hanc speciem aliasque multi sine dubio pro *H. sylvatico* Gou. sumunt. *H. sylvaticum* Gou., sicut *H. vulgatum* Fries., Koch., &c., videtur ex pluribus speciebus compositum. Quam autem formam in sylvaticis argillosis regionum sive calcarearum sive graniticarum frequentem ubique vidi, hanc pro vero *H. sylvatico* Gou. et Vill. agnosco. Paniculam exhibet in specimiinibus luxuriantibus fere racemosam ramis strictis erecto-patulis, superioribus *eximie corymboso-fastigiatis*; folia numerosa late virentia minime glaucescentia saepius elliptico-ovata acuta aperte dentata, caulem striete erectum multifoliatum inferne valde hirsutum superne ramosum 4-8 dec. altum.

9. *Hieracium divisum*. Jord. Paniculae subcorymbosae ramis *valde inaequalibus* *patulo-erectis* subflexuosis apice involucrisque subcanescensibus hirtisque, pilis glanduliferis fusco-atris, involuci foliolis linearibus attenuatis acutis, exterioribus laxis, receptaculi alveolis *ad marginem subintegris* ad angulos cilio brevi lanceolato-

lineari praeditis, areolis parum prominulis, foliis viridibus maculis fusco-nigrecentibus plus minusve adspersis subtus ad marginem et petiolis villosulis supra glabrescentibus, radicalibus ovato-vel lanceo-lato-*ellipticis* imis obtusis caeteris acutis inferne in petiolum *tenuem* limbū aequantem vel ipso longiorem *sensim attenuatis* inciso-dentatis, dentibus baseos *lanceolatis acutis patentibus*, caulinis 2-4 acuminatis basi in petiolum brevem attenuatis, caule tenuiter puberulo superne *eximie scabrido fistuloso* erecto flexuoso inaequaliter *bi-trifido vel dichotome ramoso*.

Hab. in nemorosis et rupestribus graniticis prope Lyon: Oullins! Francheville! &c. — Flor. Majo, Jun. 24. — Flores flavi illos *H. murorum* L. magnitudine fere aequantes: folia maculata in planta spontanea et ex seminibus culta semper vidi: caulis 3-5 dec.

Ab affini *H. lacinioso* differt: corymbo magis glanduloso minus tomentoso, involucris floribusque paulo minoribus, foliis longius et tenuius petiolatis fere viridibus minus acuminatis multo minus lacinatis, dentibus remotioribus patentibus nec assurgentibus, caule eximie scabrido.

A *H. bifido* Koch. differt corymbo atro-glanduloso, caule folioso nec fere nudo, haud patenti-ramoso.

10. *Hieracium ellipticum* Jord. Paniculae corymbosae ramis pedunculisque *patulis eximie arcuato-ascendentibus* apice praesertim involucrisque subcanescentibus hirtisque pilis fuscis glanduliferis aliisque longioribus canis basi atris intermixtis, involuci foliolis adpressis linearibus omnibus apice attenuatis acutis, receptaculi alveolis ad angulos ciliis lanceolatis praeditis, areolis parum prominulis *ore latiusculo* apertis, foliis supra *lacte virentibus mollibus* pubescentibus, radicalibus *ovato-ellipticis* in petiolum limbū haud aequantem *basi attenuatis* vel rarius subcontractis apice acutis vel imis fere rotundatis obtusis postice inciso-dentatis, dentibus ovatis lanceolatisve omnibus patulis vel antrorum versis, caulinis 2-4 breviter petiolatis parum acuminatis, caule laevi inferne praesertim puberulo *haud fistuloso* erecto *flexuoso* apice corymboso.

Hab. in sylvis Alpium Sabaudiae prope Lanslebourg ad pedem montis Cenisii. — Fl. Jul., Aug., et in horto Majo. 24. — Flores pulchre flavi fere magnitudine *H. murorum* L.: semiflosculi involucrum haud duplo superantes: akenii fusti: caules 3-5 dec. alti.

Ab *H. murorum* L. et *H. nemorensi* dignoscitur caule plurifolio, foliis nunquam basi cordatis.

Ab *H. sylvatico* Vill. dignoscitur: corymbi ramis eximie patulis et arcuatis nec stricte erectis, akeniis haud atris, foliis paucioribus elliptico-ovatis, caule valde flexuoso graciliore et omni habitu.

11. *Hieracium farinulentum*. Jord. Pedunculis involuerisque *farinoso-tomentosis*, pilis albidis brevibus hispidulis ramosisque laxe incumbentibus *eglandulosis*, involuci foliolis adpressis linearibus apice attenuato-acuminatis, receptaculi alveolis ad marginem ciliatodentatis subpilosisque, areolis parum prominulis, foliis radicalibus pallide virentibus supra fere glabris subtus et ad marginem leviter *ad petiolos dense farinoso-lanatis oratis* vel ovato-lanceolatis apice acutis basi paulo angustatis vel in petiolum limbo suo fere breviorem *contractis* inferne praesertim grosse dentatis, caulino solitario angustato vel nullo, caulibus pube *farinosa densissima* tectis erectis subflexuosis simplicibus vel superne bifidis, ramis *unifloris* haud *patulis*.

Hab. ad rupes calcareas montium Beugesi; *Roussillon* (*Ain*). — *Flor.* Jun.-Jul. 24. — Flores laete flavi: folia saepe colore fusco vel rubello suffusa rarius submaculata: caules 1-2 dec. saepe uniflori et aphylli.

Medium fere exakte tenet inter *H. andryaloidem* Vill. et *H. murorum* L., et ab utroque aequaliter recedit. Ab *H. andryaloide*, differt foliis magis ovatis supra glabris subtusque parce lanatis et aliis notis. Ab *H. murorum* et speciebus huic affinibus pilis involuci et foliorum plumosis eglandulosis differt.

Ab *H. rupestri* All. dignoscitur involuero pilis densis ramosis plumosis eglandulosis tecto, foliis latioribus haud acuminatis, caule humiliori subaphyllo, &c.

12. *Hieracium firmum*. Jord. Panicleae *racemosae* apice *corymboso-fastigiatae* ramis inaequalibus *strictis patulo-erectis*, pedunculis involuerisque canescentibus subhirtisque, pilis glanduliferis basi atris paucissimis vel nullis, involuci foliolis apice attenuatis *obtusis*, exterioribus *taxis* alabastrum juniores *supereminibus*, receptaculi alveolis ad angulos ciliis rigidulis auctis, foliolis viridibus parce pilosis, *radicalibus nullis*, caulinis numerosis *elongato-lanceolatis* acuminatis *longissime* in petiolum angustatis grosse serrato-dentatis, dentibus *linearibus elongatis* omnibus antrorsum versis vel patulis, caule *multifoliato* fere glabro sebriuscule haud fistuloso *stricto erecto* elato superne ramoso.

Hab. in sylvaticis argillosis prope *Lyon!* — *Flor.* Aug., Sept.

2. — Panicula racemosa ampla illi *H. sabaudi* L. simillima: caulis 10-15 dec. altus.

A similissimo *H. affini* Tausch., *rigido* Hartm. dignoscitur: racemo saepe magis ampliato, involueri foliolis apice obtusis, akeniis conspicue minoribus, foliis fere glabris omnibus nec imis tantum petiolatis longissime basi angustatis et apice acuminatis, dentibus longioribus magis antrorsum versis, caule multo minus scabro robustiore fere glabro, inflorescentia serotina; nam ex ultimis sub fine aestatis cum *H. sabaudo* flores praebet, dum *H. affine* saepe initio Junii cum *H. sylvatico* flores aperire incipit.

13. *Hieracium glaucinum* Jord. Paniculae subcorymbosae ramis pedunculisque elongatis erecto-patulis haud strictis saepe divergentibus apice praesertim involuerisque canescentibus hirtisque, pilis glanduliferis fusco-atris, involueri foliolis adpressis linearibus attenuato-acuminatis, receptaculi alveolis margine subdentatis ad angulos ciliis basi ovata acuminato praeditis, areolis parvis, foliis glaucescentibus saepe maculatis ad marginem et petiolos molliter villosis caeterum glabreseeentibus, radicalibus longe petiolatis *ovatis* vel ovato-lanceolatis acutis basi in petiolum limbo subaequalem *contractis* vel imis leviter subcordatis postice profunde inciso-dentatis rarius subintegris, dentibus elongatis acuminatis omnibus patulis vel antrorsum versis, caulinus *solitario* breviter petiolato, caule laevi vix puberulo fistuloso erecto apice bifido vel dichotome ramoso.

Hab. in collibus et sylvis prope Lyon, et forsitan ubique in Gallia orientali haud infrequens. — Fl. Majo. 2. — Flores pulchre flavi illis *H. murorum* L. fere maiores: caules 3-5 dec. alti.

Ab *affini* *H. murorum* L. cum quo confunditur statim dignoscitur: ramis paniculae pedunculisque longioribus patulis, involueri foliolis longius acuminatis, foliis glaucescentibus dentibusque omnibus antrorsum versis.

Ab *H. inciso* Hopp. differt pedunculis involuerisque semper atroglandulosis, habitu robustiore et aliis notis.

Obs. *H. Schmidtii* Tausch. ab *H. glaucono* longe recedit et optimam constituit speciem, me judicante, *H. murorum* L. minime affinem, et potius ad *H. decipientem* Froel. accendentem. Ut optime monuit Froelich, in DC. Prodr. 7, pag. 230, facile dignoscitur pagina superiore foliorum pilis rigidiusculis more Pilosellarum teeta. Koch, in Syn. ed. 2, p. 522, pilos tales non vidisse profert, sed errat profecto cel. auctor et rem sane non observavit.

14. *Hieracium laciniatum*. Jord. Paniculae subcorymbosae ramis pedunculisque valde inaequalibus subincurvato-erectis haud strictis apice praesertim involucrisque tomentoso-canescensibus subhirtisque, pilis glanduliferis fuscis brevibus paucis, involueri foliolis linearibus attenuato-acuminatis, receptaculi lati alveolis margine subdentalis ad angulos cilio brevi ex ovata basi linearis praeditis, areolis ovariferis mammula prominula impositis ore minuto apertis, foliis glaucescentibus saepe maculatis ad marginem praesertim et petiolaris villosum, radicalibus ovato-vel lanceolato-ellipticis apice acuminatis basi in petiolum latiusculum limbo breviorum attenuatis postice profunde inciso-laciatis, laciis inferioribus approximatis linearibus elongatis acuminatissimis, omnibus antrorum versis, caulinis paucis 2-3 vel solitariis in petiolum brevem attenuatis valde acuminatis. Caule laevi inferne villoso superne tenuiter tomentoso erecto bifido vel dichotome ramoso.

Hab. in sylvis et rupestribus montium graniticorum prope Lyon. Haud frequens. — Fl. Majo, Jun. 2. — Flores flavi illis *H. murorum* L. fere maiores: folia saepe maculata rubentibus adspersa: caulis 3-6 dec. altus.

A praecedenti specie differt paniculae ramis haud divergentibus sed omnibus erectis flexuosis, pilis glanduliferis brevibus paucisque, foliis basi attenuatis magis acuminatis longe et anguste laciatis.

Obs. *H. bifidum* Kit. videtur huic affine, sed est planta valde dubia. Ex Koch ramis patentibus praeditum est, et Froelich, in DC. Pr. 7, p. 214, eum cum foliis basi cordatis descripsit.

15. *Hieracium laevicaule*. Jord. Paniculae corymbosae subfastigiatae ramis inaequalibus erectis vix patulis apice involucrisque tomentoso-canis subhirtisque, pilis glanduliferis in involuero paucis et in pedunculo fere nullis, involueri foliolis linearibus apice attenuatis rix acutis, receptaculi alveolis ciliato-dentalis, ciliis angulorum lanceolatis denticulatis, areolis parum prominulis supra depresso ore minuto apertis, foliis pallide virentibus subtus fere glaucescentibus supra glabris caeterum parce pilosis, radicalibus orato-vel lanceolato-ellipticis inferne in petiolum limbo breviorum subtus teretem paullisper attenuatis, imis apice rotundatis obtusis, caeteris acutis, postice dentatis, dentibus linearis-oblongis antrorum versis, caulinis 3-4 breviter petiolatis, caule laevissimo fere glabro haud fistuloso erecto firmo ramoso dichotomo, ramis strictis aphyllis.

Hab. in sylvaticis argillosis montium lugdunensium; Chenellette!

Monsol! Alix! (Rhone). — Flor. Junio. 24. — Flores flavi illis *H. sylvatici* subaequales: folia et omnis planta saepe sunt glabrata, caulis 4-6 dec. altus.

A simillimo *H. commixto* Jord. dignoscitur: ramis paniculae strictioribus magis fastigiatis, pilis glanduliferis subnullis, foliis minus acuminatis, caule laevissimo nec sebro.

16. *Hieracium nemorens*e. Jord. Paniculae corymbosae ramis pedunculisque erectis vel leviter subarcuatis apice praesertim involucrisque subcanescensibus hirtisque, pilis glanduliferis atris fuscisve diametrum pedicelli haud aequantibus, involuci foliolis adpressis linearibus omnibus attenuatis acutis, receptaculi alveolis ad marginem subdentatis, ciliis angulorum lanceolatis brevibus, areolis mammula brevi impositis; foliis laete flavido-virentibus tenuibus pubescentibus, radicalibus longe petiolatis oblongis acutis basi leviter subcordatis vel in petiolum tenuem contractis breviter postice dentatis vel subintegris, caulinis fere duobus acuminatis breviter petiolatis, caule puberulo laevi haud fistuloso erecto firme apice bifido vel inferne 1-2 ramulis aucto.

Hab. in sylvis montosis Delphinatus; *Grande-Chartreuse* (Isère) &c. — Fl. Jun., Jul., et initio Maji in horto. 24. — Flores pulchre flavi: semiflosculi involucro duplo et ultra longiores: akeniis atris: petioli tenues canaliculati villosi saepe rubentes: caules fragiles duri 3-5 dec. alti.

A simillimo *H. murorum* L. differt: ramis pedunculisque magis erectis, involucris et akeniis minoribus, foliis magis conspicue venoso-reticulatis haud ovatis sed omnino oblongis, petiolo longiore et duplo angustiore, foliis caulinis rarius solitariis, caule graciliore haud fistuloso, inflorescentia praecociore.

17. *Hieracium obliquum*. Jord. Paniculae laxe racemosae apice subcorymbosae ramis inaequalibus erecto-patulis superne inclinatis saepe subsecundis, pedunculis apice paulo incrassatis pluribracteatis involucrisque canescensibus eglantulosis, involuci foliolis obscure virentibus sicitate immutatis linearibus obtusis, exterioribus laxiusculis, receptaculi alveolis ad angulos dentato-ciliatis, ciliis in pilum longissimum solutis, foliis intense virentibus saepe valde hirsutis, radicalibus post anthesin vegetis caulinisque elliptico-lanceolatis acutis acuminatisve basi attenuatis sessilibus dentatis, dentibus brevibus patulis, caule multifolio praesertim inferne hirsut-

tissimo superne fere glabrescente striato *scabro* haud fistuloso *oblique erecto vel ascendente* apice ramoso.

Hab. in nemorosis regionum graniticarum prope Lyon. — Flor. Aug., Sept. 24. — Folia radicalia sub anthesi omnino deficiunt, sed post anthesin fasciculi foliorum perhyemantes adsunt: akenia atra, caulis 4-6 dec. altus.

Ab *H. sabaudo* L. et *boreali* Fries. recedit foliorum fasciculis perhyemantibus aliisque notis.

Ab *H. sylvatico* Vill. et speciebus affinibus differt foliis omnibus sessilibus et panicula eglandulosa &c.

18. *Hieracium rupicola*. Jord. Paniculae *laxe racemosae* subcorymbosae ramis *erecto-patulis* saepe leviter *ascendentibus*, omnibus pedunculis involuerisque subcanescens hirtisque, pilis glanduliferis densis tenuibus aquose luteolis basi nigricantibus, involueri foliolis *linearibus* apice ciliato-plumosis attenuato-acutis, receptaculi alveolis *parce subpilosis* ad angulos dente *brevi* auctis, foliis pallide virentibus *mollibus tenuibus* pilis minutis glanduliferis utraque pagina obsitis aliisque longioribus ad petiolas praesertim ciliatis villosisque, radicalibus *elliptico-ovatis* basi in petiolum attenuatis, postice dentatis, dentibus ovatis longe acuminatis patentibus, caulinis lanceolatis acutis basi *paulo attenuatis sessilibus vel semi-amplexicaulibus*, caulibus humilibus striatis hirtis a basi *ramoso-paniculatis*.

Hab. in rupestribus calcareis Galloprovinciae prope Sisteron. (Basses Alpes). — Flor. Majo-Junio. 24. — Flores pallide flavi: panicula pauciflora: caulis 1-2 dec. altus.

Obs. *H. pulmonarioides* Vill. huic affine differt: panicula fastigiata dense multiflora, ramis pedunculisque stricte erectis nec subarcuatis, involueri foliolis acuminatissimis, floribus intense flavis, pilis glandulosis magis longis crebrisque, akeniis duplo majoribus, receptaculo valde piloso, alveolis brevioribus, areolis ovariferis magis prominulis, foliis caulinis basi magis attenuatis haud amplexicaulibus, caule duplo altiore et omnibus partibus duplo crassiore.

H. amplexicaule L. saepe cum *H. pulmonarioide* confusum ab hoc et ab *H. rupicola* plane differt involueri foliolis basi late lanceolatis et foliis caulinis amplis eximie cordato-amplexicaulibus.

19. *Hieracium umbrosum*. Jord. Paniculae corymbosae subfastigiatae ramis patulis arcuato-ascendentibus apice pedunculis in voluerisque caucentibus hirtisque, pilis glanduliferis densis lutescentibus basi atris, involueri foliolis linearibus apice attenuatis acutis,

receptaculi alveolis ad marginem *dentatis* ad angulos *obsolete ciliatis*, areolis parum prominulis, foliis flavescenti-viridibus subreticulatis supra parce pilosis subtus ad marginem et petiolas molliter villosulis, radicalibus *ovato-ellipticis* acutis basi subcontractis vel in petiolum inferne dilatatum limbum vix aequantem paulisper attenuatis margine *dentatis*, dentibus baseos *brevibus ovatis patentibus*, caulinis 3-4 breviter petiolatis acutioribus, caule leviter piloso superne seabrido glandulosoque *fistuloso striato erecto firmo* apice ramoso corymboso vel inferne ramulis aucto.

Hab. in sylvis Alpium Delphinatus; *Rabou!* *La Granette!* prope *Gap*, &c. — Flor. Jul., Aug., in horto Jun. 24. — Flores pulchre flavi illis *H. murorum* paulo majores: akenia brunnea: folia ampla mollia: caulis 4-6 dec. altus.

Paniculae forma et pubescens *H. murorum* L. exacte refert, sed foliis latis haud obtusis et caule foliato ab hoc recedit.

20. *Hieracium virgultorum*. Jord. *H. boreale* auct. gall. ex parte non Fries. Paniculae racemosae *angustae* ramis gracilibus *erectis superne inclinatis* saepe subsecundis, pedunculis elongatis pluri-bracteatis involuerisque parum canescentibus subhirtis, pilis glandulosis paucissimis, involueri foliolis *pallide virentibus* siccitate immutatis linearibus apice obtusiusculis, akeniis rubro-fuscis, receptaculi alveolis ad angulos dentato-ciliatis, ciliis *lanceolatis acutis*, foliis *laete virentibus* modo glabrescentibus modo mollissime hirsutis, radiis nullis, caulinis *anguste lanceolatis* utrinque angustatis acuminatis inferne in petiolum attenuatis, superioribus sessilibus basi fere rotundatis, omnibus breviter dentatis dentibus *patulis* saepe minutis, caule molliter hirsuto vel fere glabro haud sebro tenuiter striato vix fistuloso erecto *virgato* apice ramoso.

Hab. in sylvaticis collum graniticorum inter virgulta, prope Lyon, haud infrequens.

Ab *H. obliquo* recedit: panicula angustiore, ramis minus patulis tenuioribus, involueri foliolis pallidis, akeniis conspicue minoribus, receptaculi ciliis brevioribus tenuioribusque, foliis radicalibus nullis, caulinis elongatis laetius virentibus, caule erecto virgato haud sebro, pubescens molli et inflorescentia paulo magis serotina.

Ab *H. boreali* Fries. differt: racemo haud stricte erecto, involueri foliolis pallidis siccitate immutatis nec nigricantibus, foliis angustatis, pubescens molli, caule fere laevi, &c.

21. *Iberis affinis*. Jord. Racemis fructiferis haud contractis modice elongatis, siliculis suborbicularibus apice paululum angustatis basi rotundatis subtus leviter convexis, alis valvarum latitudinem apice aequantibus inferne angustatis usque ad basin conspicuis, emarginatae lobis ovatis acutis basi sua in stylum non coeuntibus angulum acutum efficientibus quartam totius siliculae partem aequantibus stylum brevem haud excedentibus, foliis intense viridibus sparsim ciliato-pubescentibus vel subglabris leviter canaliculatis, primordialibus oblongis obtusis, caeteris linearie-oblongis, omnibus basi in petiolum sensim angustatis lobato-pinnatifidis, lobis utrinque 2 ovato-oblongis linearibusve obtusiusculis basi haud angustatis, caule erecto saepe a basi ramosissimo, ramis inferne arcuatis statim erectis superne corymboso-fastigiatis.

Hab. in collibus apricis et in arvis, solo calcareo vel arenoso: *Vernay!* prope Lyon. — Fl. Majo, Jun. ♂ vel ♀. — Flores albi illis *I. pinnatae* L. similes: caulis 2-4 dec. altus.

Ab affini *I. pinnata* L. facile dignoscitur racemis fructigeris maturis haud contractis, stylo minus exerto, foliis omnibus ambitu oblongis in petiolum sensim angustatis, lobis minus elongatis haud obtusissimis nec basi attenuatis, caulinibus magis stricte erectis statura, paulo majoribus. — In *I. pinnata* L. folia sunt omnia ambitu ovata, basi in petiolum tenuem fere contracta, lobis utrinque 3 obtusissimis versus basin paulo attenuatis in foliis caulinis anguste linearibus elongatis pinnatifida; caules patulo-erecti a basi sensim ascendentes.

Ab *I. amara* L. dignoscitur: racemis fructigeris multo brevioribus, siliculis magis basi rotundatis minus apice angustatis, emarginata laiore, stylo breviore, foliis pinnatifidis, caulinibus magis stricte erectis, inflorescentia praecociori.

Obs. 1. In variis generis speciebus, praesertim in *I. pinnata* L., racemos fructigeros apice novo florum corymbo auctos et plantam igitur bicorymbiferam saepe vidi. Haec modisatio praesertim per aestatem pluviosam frequens invenitur.

Obs. 2. *I. pinnata* L. est planta biennis, sed specimina inveniuntur quae primo anno florent et foliis rosularum latis adhuc praedita sunt. Haec sunt *I. crenata* auctor. gall. non Lam.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1849

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Jordan Alexis Claude Thomas

Artikel/Article: [Einige neue Pflanzen der Flora Frankreichs 449-462](#)