

FLORA.

Nº 34.

Regensburg. 14. September. 1857.

Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. Hasskarl, Genera aliquot nova horti botanici bogoriensis. — LITERATUR. Th. Fries, de Stereocaulis et Pilophorae commentatio. — GETROCKNETE PFLANZENSAMMLUNGEN. Hepp, die Flechten Europa's. Fascic. V—VIII. — REPERTORIUM DER PERIODISCHEN BOTANISCHEN LITERATUR. Nro. 291.

Genera aliquot nova horti botanici bogoriensis proponit et describit J. K. Hasskarl.

Flacourtineæ.

Taractogenes Hassk. Flores polygami. Calyx in alabastro imbricatus 4-phyllo, foliis deciduis, exterioribus paulo minoribus. Corolla 8-petala, squamis totidem, iis oppositis basi coram adnatis. Masc. Stamina 8, petalis duplo longiora; filamentis filiformibus liberis hirsutis; antheris sagittatis, loculis spicè convergentibus, basi divergentibus, longitudinaliter dehiscentibus. Hermaphbr. Stamina triplici petalorum numero, iis masc. conformia et fertilia (?), germen subgloboso-pyriferme hirsuto-sericeum uniloculatum, basi leviter attenuatum; stigma sessile peltatum 4-radiatum; placenta parietales 4; gemmulae plurimæ.

Nomen derivatum e verbis ταραχτος, turbatus, et γενος, genus.

Spec.: *T. Blumei* Hassk. (*Hydnocarpus heterophyllus* Bl.) habitat Javam occidentalem, ubi in provincia Bantam Kandar Jutung dicitur.

Genus novum a Blumeo celebrr. in monographia sua *Pangienianum* praetervisum et cum *Hydnocarpo* confusum inter hoc genus et *Pangium* collocandum erit. Ab *Hydnocarpo* floribus 4-nariis, petalis calycis laeiniarum duplo numero et staminibus petalorum 2—4-plo numero distinctum; a *Pangio* floribus 4-nariis, calyx imbricativo, staminibus in floribus masculinis et in primis hermaphroditis plurimis, 3-placi petalorum numero, germinis subglobosis, foliis stipulatis, breviter petiolatis subintegerrimis, floribus hermaphroditis sucedaneo cymulosis, fructu globoso.

Violaceae.

Dioryctandra Hassk. Flores minuti; calyx 5-partitus, lacinis imbricativis acutis; corolla 5-petala, petalis unguibus tenuibus hyalinis suffultis, oblongo lanceolatis viridiusculis patentibus, in alabastro imbricativis, sub anthemis mox subelastice patentim reflexis et convoluto-tortuosis; stamina 5 hypogyna, petalis alterna, filamenta gracillima tenuissima, e fauibus petalorum exerta, unguibus sublongiora, inter se plus minus conglutinata; antherae ad basim bastatae, è basi latiuscula attenuatae, apice connectivo elongato terminatae, introrsum ab apice ad basin dehiscentes; pollen 3-gono-subglobosum; germen superum minutum subtrigono-globosum glabriuscum uniloculare, placentis parietalibus 3, gemmulis ∞ ; stylus filiformis strictus erectus subtrigono-pilosus, antheras superans; stigma minutum terminale; fructus basi calyce vegeto suffultus, unilocularis, 3-valvis, valvis medio placentiferis, seminibus plerumque omnibus abortivis, excepto tantum uno remanente, e margine valvulae unius pendulo glabro. — Frutex humilis, 0,6' vix excedens; rami patentes, subscandentes, distische alternatim foliati, glabri; stipulae acuminatae caducae. Folia subsessilia oblongo-lanceolata acuminata, basi attenuata, ibique subintegerima, caeterum serrato-crenata, subtus albescens viridia, 0,026—0,04" longa 0,013" lata. Flores parvi, albidi, axillares sessiles, plerumque terni succedaneè evoluti, antherarum cono albido et petalis viridiusculis contortis patentibus sat insigae, 0,004" vix excedentes. Capsulae glabrae, styli rudimento coronatae, 3-gono-pyramidae, plerumque abortu 1-spermae.

Nomen a verbo græcis διογύτως, perforatus et ἄνη, vir derivatum, ob conum antherarum stylo perforatum.

Spec.: *D. Roxburghii* Hassk. Retz, I. p. 125. 83.

Sub nomine *Alsodeiae Roxburghii* Will. haec planta fuit missa ex horto botanico Calcuttensi. — Walpers (Rpt. I. 225.) hanc synonymam dicit cum *Pentaloba Roxburghii* Will.; specimina nostra autem haud congruunt cum charactere generico ni *Alsodeiae* (Endl. Gener. no. 5047), ni *Pentalobae* (I. c. 5048), quea genera teste Arnott haud inter se sunt distinguenda (cf. Endl. Gen. Sppl. III. 89. IV. m. 45). Differunt a planta nostra; *Cohonoria* D C. (Prdr. I. 512) filamentis breviter unguiculatis, hinc in ligulam dilatatis, urceolo appendiculato, corolla et calyce peristasti capsulam indusiatibus; — *Ceranthera* Palis. urceoli inter petala et stamina praesentia et staminum fabrica; — *Pentaloba* Lour. nestario 5-dentato, stylo brevi, bacca subrotunda 5-leba; — *Physiphora* Sol. staminum fabrica et fructu inflato. (cf. D C. Prdr. I. 512—14). Ex Endl. Gen.

no. 5047 *Alaodeia* differt: disco urceolari inter petala et stamina, filamentis brevissimis, petalis patentiusculis; et *Pentaloba* ex Arnott, ut supra dictum fuit, nil nisi fructu baccato diversa est. — *Prosthesia* Bl. Bijdr. 866 filamentis in urceolum connatis distincta.

E u p h o r b i a c e s .

Calypteriopetalum Hassk. Flores monoici; ♂ racemosi, singuli 3-bracteati; calyx petaloideus, prefunde 5-fidus, aestivatione imbricatus, campanulato-connivens; petala 5, calyci subaequilonga, aestivatione imbricativa; glandulae 5 carnosulae rotundato-subquadratae, petalis alternae; stamina 10, ima basi connata, receptaculo villosa inserta; filamenta villosa; antherae aestivatione inflexae, demum exsertae, utrinque emarginatae subrotundae biloculares; ♀ calyx robustior 5-fidus campanulatus; laciniae aequales patentes; petala viridia minora; glandulae quam in ♂ maiores, caeterum aequales; germen trigono-globosum, 3-loculare; gemmulae solitariae; styli 3-partiti; laciniae 6-partitae, stigmatoso-papillosae; fructus subglobosi pisiformes, calyce suffulti, longitudinaliter 3 sulcati, dein 3-cocci; cocci dein secedentes, decidui, dorso medio a basi apiceim verius dehiscentes, endocarpio vix bivalvi; semina in coccis solitaria, subtrigona complanata; testa crustacea.

Nomen derivatum a verbis graecis καλυπτηγον, imbrica et πέταλον, petalum.

A genere hoc novo differunt: *Croton* L. (Endl. Gen. 5827): calycis aestivatione valvata, petalorum convolutiva, filamentis liberis, corolla ♀ deficiens; — *Julocroton* Mrt. (Endl. Gen. 5828): calyce ♂ rotato-campanulato, lacinis 3 longioribus et angustioribus, petalis linearis-spathulatis, germinis rudimento, ♀ calycis laciinis exterioribus multo latioribus, lobatis, interioribus linearibus, corollae defectu, stylo 3-fido. — Omnia retinua genera Klotzschiana (Endl. Gen. Suppl. II. p. 90 et III. p. 98) aut corolla ♂ convoluta, aut corollae ♀ defecta aut glandulis deficientibus diversa sunt; — *Acalia* Kitzsch. (l. c. 5828/3) maxime accedit, differt autem: calyce globose, glandulis squamaeformibus, in ♀ membranaceis, corollae ♀ defectu, stigmatibus sessilibus 3 bipartitis, capsulaque setosa.

Spec.: *C. brasiliense* Hassk. sua sponte e solo brasiliensi in hort. bot. bogoriensi enata species et nunc ubetima ibi florens et fructificans.

Cocloctenias Hassk. Flores monoici; ♂: calyx 3-5-fidus, petala et glandulae nullae; stamina 4, nunc 5—6; monadelpha; filamenta in cupulam 4- (5—6-)lobam, basi turbinatam connata, lobis et sinibus inter lobos intus carinatis, carinis centrum attingentibus

cellulae 8 (10—12) fermantibus, in alabastro antherarum locules recipientes; antherae tot quot cupulae lobi, introrsae, inclinatae 2-loculares; loculi fere discreti. Flores ♀: calyx 4—5-partitus, germini valde adpressus eique basi adnatus; germen trigono-subglobosum, 3-loculare; gemmulae in loculis solitariae; styli 3 multifidi, palmatim etpansi ramis stigmatosis; fructus calyce suffulti, trigono-subglobosi, stellato-tomentosi, 3-loculares, 3-spermi.

Nomen derivatum a verbis graecis *κοιλος*, cellula et *δημας*, cupula, ob staminum conformatiōnem singularem.

Genus hoc novum ob staminum conformatiōnem singularem ab omnibus *Acalypheis* (Crotoneis Brtl.) diversum, a pluribus autem etiam corollae defectu stylorumque ramis multipartitis distinguendum.

Spec.: *C. bantamense* habitat sylvas montesas litoris meridionalis Bantam Javae occidentalis, ubi reperi et ad hortum transmisi arborem hanc anno 1841.

Aepidandra Hassk. Flores dioici; ♂: calyx irregulariter 3—4-partitus, laciinis aestivatione valvatis; corollae petala 5 lanceolata, sericea, basi squamula lanata aucta, aestivatione valvata, patentia; stamina in columnam petalis breviorem connata, apice antheriferam; antherae in capitulum peltatum depresso globosum connatae 10-loculatum. — ♀?? — Fructus? — Arbor mediocris foliis alternis petiolatis integerrimis, nervoso reticulatis, opacis subtus glaucescentibus, adpresso pilosis, floribus ♂ spicato-racemosis axillaribus fragrantibus crebris; ♀?

Nomen derivatum a verbis graecis: *ασπις*, scutum, et *ανγ*, vir, stamen.

Ob flores ♀ deficientes dubius sum, an *Acalypheis* aut *Phyllantheis* sit adrumerandum genus hoc novum, quibus ulterioribus e symphysi antherarum valde accedit, dum habitus magis ad priores inclinet. — *Ryparia* Bl. (Endl. Gen. 5836) differt: corollae petalis in ♂ aquamula haud praeditis, staminibus circa germinis rudimentum insertis, antheris extrorsum adnatis; — *Elachidium* Jck. (Endl. Gen. 5838): calyce 5-partito, antheris radiatim patentibus; — *Stachystemon* Plnch. (Endl. Gen. Sppl. IV. m. p. 92. 5845/2): floribus monoicis, calyce 5—6-partito, laciinis coloratis, corolla deficiente, antheris ♂, secus columnam inordinate dispositis.

Spec.: *A. fragrans* Hassk. habit. forsitan vicinitatem horti bogoriensis e. g. pedem montis Salak s. montis Sèribu, unde in hortum fuit transplantata arbor haec et sub nomine *Rypariae caesiae* Bl. culta. — Nomen sundense est *Djedjer teko*.

Tetractinostigma Hassk. I. Flores dioici; ♂: calyx minimus 4-partitus; petala et glandulae nullae; germen oblongum, calyce multo longius, 2-loculare; gemmulae in loculis binae; stylus brevissimus; stigmata 2 profunde bipartita, patentia reflexa, plana, superne papilloso-fimbriata; fructus oblongi, stylo persistenti apiculati, abortu 1-loculares, 1-spermī, dehiscentes? 2-valves?, pericarpio coriaceo, endocarpio chartaceo; semen pendulum, oblongum, inversum, arillo intus carnosō involutum; testa chartacea; embryum intra albumen bipartitum axillare; radicula 4-angularis truncata; cotyledones orbicularis cordatae.

Nomen a verbis graecis τετράς, quatuor, ακτίνη, radius, στιγμή, stigma florū derivatum.

Riocarpus Bl. (Endl. Gen. 5844) differt: calyce 4—6-dentato, germine 3-loculari, stigmatibus 3 foveae germinis immersis, capsula apice foveata, corticata 3-cocca; — **Drypetes** V bl. (Endl. Gen. 5874): disco glanduloso germen sustinenti, stylis 2 brevibus, stigmatibus capitatis, drupa bi- aut 1-loba, hinc plana.

Spec.: **T. microcalyx** Hassk. hab. sylvas montanas sublitorales provinciae Bantam, Javae occidentalis, ubi anno 1841 reperi et ad hortum botanicum bogoriensem misi; sub nomine **Leiocarpus serrati** culta fuit haec arbor et in catal. horti inedito pag. 196 et 251. 86 recepta. Nomen sundense **Sassa** dicitur.

Dodecastemon Hassk. I. Flores dioici; ♂: calyx 4-partitus, imbricatus; petala nulla; stamina 12, receptaculo plano circa pistilli rudimentum inserta; filamenta libera, antherae oblongae, cruciatim dehiscentes; ♀ et fructus? —

Nomen derivatum a verbis graecis δοδεκάς, duodecim et στρυμών, stamen.

Differre videntur a genere hoc novo: **Macaranga** (Endl. Gen. 5789): foliis peltatis v. cordatis, floribus ♂ spicatis et (e Wght. Icon. 1883) staminibus centro floris insertis; — **Hemicyclia** W. et A. (Endl. Gen. 5816): staminibus 8, rudimento pistilli plano, filamentis exsertis, antheris dorso insertis (e Wght. Icon. 1872); — **Cyclostemon** Bl. (Endl. Gen. 5837): filamentis basi annulo insertis ♂; — **Phaedra** Klitzsch. (Endl. Gen. Sppl. V. 5787/4): glo- merulis ♂ spicatis, calyce 3-partito valvato, defectu rudimenti pistilli (?); — **Chrysostemon** Klitzsch. (Endl. Gen. Sppl. IV. 5850/1; Wlp. Ann. III. 377): floribus ♂ solitariis, calycis laciniis dentato-incisis, staminibus 8 centralibus, antherarum loculis subglobosis. — **Pycnosandra** Bl. (Mus. II. 191): pistilli rudimento nullo, an forsitan

ab autore elbrr. praesterviso? Certo nullum genus affinius videtur et forsitan congruens.

Spec.: *D. Teysmanni* Hassk. habitat. Javae occidentalis sylvas montanas, unde ab hortulano diligentissime J. E. Teysmann in hortum fuit introducta species, ad eius honorem eam dedicavi.

Nanopetalum Hassk. Flores monoici; calyx 5-fidus, disco membranaceo ad fauces 5-lobato vestitus; petala 5 minuta, calycis laciniis alterna, ad fauces calycis inter lobos disci inserta, breviter unguiculata, ♂ obtuse 3—5-loba, laciniis acutis; ♀ obovato-rotundata acuta, margine erosula; ♂: stamina 4—5; filaments inferne cum stipite germinis rudimenti coalita, superne distincta, erecta, subulata; antherae incumbentes, cordato-ovatae; ♂: stamina sterilia 5 membranacea, pistillo sublongiora, conniventia; germen oblongo-ovoideum, basi calycis tubo inclusum, 3-loculare; gemmulae in loculis binae; stylus brevis persistens; stigma 3-lobum lobis brevibus patentibus; fructus trigono- et depresso-subglobosi, 3-lobi, coriacei, 3-cocci, 3-valves, a basi apicem versus dehiscentes, 3-spermi; epicarpium ab endocarpio secedens et separatim dehiscens; semina ovata, complanata; testa coriaceo-membranacea arcte nucleo adhaerens; albumen nullum; cotyledones crassae; radicula brevis.

Nomen derivatum a verbis graecis γανός, pygmaeus et πτεράλον, petalum.

Genus novum *Buxearum* Amanoae Anbl. (Endl. Gen. 5862 et Wght. Icon. 1911, ubi glandulae 5, calycis lacinias alternantes, petalis nostris correspondent) valde accedens, etsi sat diversum: squamulis disci perigyni glandulosi petalis alternis, petalorum praesentia, pistilli rudimento bilobo, filamentis apice subulatis, basi connatis, antheris incumbentibus, germe disco glanduloso cincto (nec insidenti!), stigmatibus longe bifidis (e Wght. l. c.); floribus spicatis etc.

Spec.: *N. myrianthum* Hassk. (Anonacea, Kakaduan Hassk. Cat. p. 176. Exp. bant. 518) habitat. sylvas montosas littoris meridionalis provinciae Bantam, Javae occidentalis, unde hanc arborem, quam anno 1841 reperi, ad hortum bot. bogoriensem transmisi; anno 1853 eadem ab hortulano Teysmann in insula Bali, Javae orientali vicina, reperta est. Nomen sundense est *Kakadujan*, nomen et Anonacea quibusdam commune.

Pimeledendrum Hassk. Flores dioici; ♂: calyx a latere utroque compressiusculus, basi carnesus bifidus; laciniae subrotundae membranaceae, valvatae; petala et glandulae nullae; stamina

12 receptaculo hemisphaerio carnoso nudo inserta; filamenta basi compacta, erecta teretipacula; antherae basi fixae erectae oblongae 2-loculares, dein cruciatae. — Flores ♀ et fructus ?? — Arbor amboinica mediecris, succo lacteo, siccando flavescenti, vernicino aquatens, ramis teretibus lenticulatis; folia alterna petiolata, articulatum inserta, acuminata grosse serrata, utrinque glaberrima; flores ♂ racemosi subpaniculati axillares aut laterales; flora ♀ ??

Nomen derivatum a verbis græcis: πίγκιος, pinguis et δένδρος, arbor.

Differunt a genere hoc novo: *Omalanthus* A. Juss. (Endl. Gen. 5779) calyce diphylo, foliolis basi emarginata glandulosis, antheris extrorsis; — *Trewia* L. (Endl. Gen. Suppl. III. 5819/1) calyce membranaceo diphylo, foliolis profunde bifidis, dein reflexis, staminibus ♂, antheris parvis, — ab hoc genere autem differt: *Trewia* B. L. (Bijdr. 612): calyce 3—5-fido, aut partito, antheris extorsum adnatis, germine 3—4-loculari, stylo profunde 3—4-partito, lacinias longis 2-fidis, fructu capsulari.

Spec.: *P. amboinicum* Hassk. habitat Moluccas insulas, unde vir illa W. Cleerens, alim summam potestatem in insulis dieticis tenens, ad hortum hot. bogoriensem misit sub nomine amboinico; *Mamina*.

Synon.: *Arbor pinguis* Rumph. herb. amb. II, 249 P. tab. 83 mala! opponunt autem racemi rari, calycis foliola 3 et imprimis serum delineatio saperque foliorum haud acidulus et dein amaricantis dulcis.

L i t e r a t u r .

De Stereocaulis et Pilophoris commentatio, auctore Theod. Magn. Fries Upsaliae, 1857. 12 p. in 8. — Recenset W. Nylander.

Clar. Theod. Fries litteraturam lichenographicam monographia generis difficilis *Stereocauli* ditavit, quod opus diligenter elaboratum varias passim continet sententias non probandas, ut credo. Utilitatis igitur ejusdam sit, ut animadversiones nonnullae eo respectu explicantur, et has breviter, sincere faciam, persuasus equidem disquisitionibus criticis scientiae potius quam laudibus consultum fore.

Pag. 2 dicit auctor „Usu microscopii — in interna fructuum structura praecipue (specierum) exoticarum eximios inter formas habita simillimas inveni characteres“. Nemo autem alias viderit cha-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Genera aliquot nova horti botanici bogoreinsis 525-529](#)