

FLORA.

№. 46.

Regensburg. 14. December. 1857.

Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. v. Thümen-Gräfendorf, systematische Aufzählung der in der Umgebung der Stadt Jüterbog wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. — PERSONALNOTIZEN. Beförderungen, Ehrenbezeichnungen, Reisende. Todesfall. — ANZEIGEN. Versteigerung von Jussieu's Bibliothek. Verkauf von Lechler's Pflanzensammlung. Beiträge zu den Sammlungen der kgl. botanischen Gesellschaft.

Systematische Aufzählung der in der Umgebung der Stadt Jüterbog wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. Nach dem Reichenbach'schen System zusammengestellt von F. von Thümen-Gräfendorf.

Seit mehreren Jahren schon beschäftige ich mich mit Liebe und Eifer mit der Flora der näheren Umgebungen der Stadt Jüterbog, und ich bin nun in den Stand gesetzt, diese Aufzählung hier, auf gütige Nachsicht rechnend, dem Publicum zu übergeben. Die geringe Ausdehnung des Florenbezirks gestattete mir sämtliche Standorte selbst aufzufinden, und ich hoffe, dass ich nur wenige Pflanzen übersehen haben werde. — In der Anordnung bin ich ganz und gar Reichenbach gefolgt, wie er das natürliche System in seinem Herbarienbuche aus einander setzt. Seine Flora Saxonica, sowie Rabenhorst's Flora Lusatica habe ich ebenfalls zu Hilfe gezogen. — Gegründete Berichtigungen werde ich von Jedem mit dem grössten Danke annehmen.

Gräfendorf bei Jüterbog 4. Novbr. 1857.

F. von Thümen-Gräfendorf.

Coleophyta.

Scheidepflanzen oder Spitzkeimer.

Fam. XLV. Aroidesæ, Aroideen.

I. *Arum* L. Aroiswurz, Aronsstab.

1. *A. maculatum* L. var. *β. immaculatum*. Einmal von mir gefunden am 25. Mai 1857 bei Cossin.

Fam. LXVI. Potamogetonessæ, Laichkräuter.

II. *Lemna* L. Wasserlinse.

2. *L. polyrhiza* L. In der Nuthe bei Jüterbog.
3. *L. minor* L. In allen Gewässern.

III. *Staurgeton* Rehbch.

4. *St. trisulcum* (L.) Rehbch. Bei Schönewalde; bei Dennewitz.

IV. *Potamogeton* L. Laichkräuter.

5. *P. lucens* L. Sehr selten bei Fröhden im Amorphubl.
6. *P. crispus* L. Bei Hohen-Cuhnsdorf.
7. *P. natans* L. Bei Jüterbog. Fröhden, Wendisch-Ahlsdorf.

Fam. XLVII. *Alismaceæ*, Alismaceen.V. *Sagittaria* L. Pfeilkraut.

8. *S. sagittifolia* L. Bei Wendisch-Ahlsdorf, Hohen-Cuhnsdorf, Jüterbog.

VI. *Alisma* L. Froschlöffel.

9. *A. Plantago* L. Bei Gräfendorf, Wendisch-Ahlsdorf, Sernow, Jüterbog.
10. *A. natans* L. Selten bei Jüterbog.

VII. *Butomus* L. Blumenbinse.

11. *B. umbellatus* L. Selten bei Schönewalde; 1854 bei Sernow gefunden, aber seitdem verschwunden.

Fam. XLVIII. *Hydrocharidææ*, Nixenkräuter.VIII. *Stratiotes* L. Krebssehre.

12. *S. Aloides* L. Selten bei Schönewalde, Hohen-Cuhnsdorf.

IX. *Hydrocharis* L. Froschbiss.

13. *H. Morsus ranae* L. Fast in allen Gewässern.

X. *Nymphæa* L. Seerose.

14. *N. alba* L. var. *C. sphaerocarpa*, a. *chlorocarpa*, a. *flava* Casp. (in Walp. Ann. IV.). Bei Schönewalde.

Fam. XLIX. *Gramineæ*, Gräser.XI. *Agrostis* L. Windhalm.

15. *A. Spica venti* L. Gemein.
16. *A. vulgaris* With. Gemein.
17. *A. canina* L. Ziemlich häufig.

XII. *Catamagrostis* Roth. Rölthgras.

18. *C. Epigeios* Rth. Nur selten bei Pechüle.

XIII. *Deyeuxia* Clar. Dejeuxie.

19. *D. sylvatica* Clar Häufig.

XIV. *Phragmites* Trin. Schilfrohr.

20. *P. communis* Trin. Bei Jüterbog, Rohrbeck, Lindenberg.

XV. *Corynephorus* Beauv. Keulengrab.

21. *C. canescens* Beauv. Gemein.

XVI. *Deschampsia* Beauv. Deschampsie.

22. *D. caespitosa* Beauv. Gemein.
var. *parviflora* Thuill. Bei Niedergöhrsdorf.

XVII. *Aira* L. Schmiele.

23. *A. flexuosa* L. Bei Wahlsdorf, Schlanger, Riedsdorf.

24. *A. curvophyllacea* Wigg. Häufig.

25. *A. praecox* L. Sehr selten bei Malterhausen.

XVIII. *Trisetum* P.

26. *T. pubescens* L. Häufig.

. XIX. *Avena* L. Hafer.

27. *A. sativa* L. Ueberall gebaut: bei Dalichow verwildert.
 28. *A. s'rigosa* Schreb. Bei Jüterbog selten.

XX. *Arrhenatherum* P. B. Haferraygras.

29. *A. elatius* P. B. Manchmal bei Gräfendorf.

XXI. *Alopecurus* L. Fuchsschwanzgras.

30. *A. nigricans* Horn. Häufig.

31. *A. pratensis* L. Gemein.

32. *A. geniculatus* L. Gemein.

33. *A. fulvus* Sm. Selten bei Zinna.

XXII. *Phleum* L. Lieschgras.

34. *P. pratense* L. Gemein.

var. β . *nodosum* Richch. Bei Gräfenlorf.

35. *P. Boehmeri* Wibl. Sehr selten bei Gräfendorf.

XXIII. *Phalaris* L. Glanzgras.

36. *P. arundinacea* Fl. d. Wett. Häufig.

XXIV. *Anthoxanthum* L. Ruchgras.

37. *A. odoratum* L. Ziemlich häufig.

XXV. *Holcus* L. Pferdegras.

38. *H. lanatus* L. Gemein.

XXVI. *Digitaria* Scop. Fingergras.

39. *D. sanguinalis* Scop. Gemein.

XXVII. *Echinochloa* P. B. Stachelhirse.

40. *E. crus galli* Beauv. Sehr selten bei Koltzenburg, Gröna, Neuhof.

XXVIII. *Setaria* P. B. Borstengras.

41. *S. viridis* Beauv. Gemein.

42. *S. glauca* Beauv. Bei Werbig.

XXIX. *Nardus* L. Borstengras.

43. *N. stricta* L. Ziemlich verbreitet; bei Jüterbog fehlend.

XXX. *Lolium* L. Lolch.

44. *L. perenne* L. Gemein.

45. *L. arvense* L. Gemein.

XXXI. *Agropyrum* Gärtn. Queckengras.

46. *A. caninum* Gärtn. Gemein.

47. *A. repens* Gärtn. Gemein.

var. α . *arvense* Schrk. Gemein.

γ . *dumetorum* Schrk. Gemein.

XXXII. *Triticum* L. Weizen.

48. *T. vulgare* Vill. Ueberall cultivirt.

var. α . *aestivum* L. Gebaut.

β . *hybernum* L. Gebaut.

XXXIII. *Secale* L. Roggen.

49. *S. cereale* L. Ueberall gebaut.

XXXIV. *Hordeum* L. Gerste.

50. *H. vulgare* L. Ueberall gebaut.

51. *H. murinum* L. Gemein.

XXXV. *Poa* L. Rispengras.

52. *P. bulbosa* L. Gemein.

53. *P. compressa* L. Sehr selten auf der Jüterboger Stadtmauer.
 54. *P. annua* L. Gemein.
 55. *P. pratensis* L. Gemein.
 var. γ . *variegata* Rchbch. Häufig bei Nonnendorf.
 56. *P. trivialis* L. Häufig.
 XXXVI. *Glyceria* R. Br. Manngras.
 57. *G. aquatica* Wtlbg. Häufig bei Schönewalde, Wendisch-Ahlsdorf, Hohen-Kuhnsdorf, Niebendorf.
 XXXVII. *Briza* L. Zittergras.
 58. *B. media* L. Gemein bei Zinna und Jüterbog.
 XXXVIII. *Melica* L. Perlgras.
 59. *M. nutans* L. Einmal bei Wiezersdorf.
 XXXIX. *Koeleria* Pers. Koelerie.
 60. *K. cristata* Pers. Selten bei Gräfendorf und Hohen-Görsdorf.
 XL. *Cynosurus* L. Kammgras.
 61. *C. cristatus* L. Ziemlich häufig.
 XLI. *Dactylis* L. Knäulgras.
 62. *D. glomerata* L. Sehr häufig.
 XLII. *Festuca* L. Schwingel.
 63. *F. pratensis* Huds. Gemein.
 64. *F. duriuscula* L. Gemein.
 65. *F. rubra* L. Bei Grüna und Zinna, Hauschteckslust.
 66. *F. nemorum* Leyss. Häufig.
 67. *F. gigantea*. Sehr selten bei Wendisch-Ahlsdorf.
 XLIII. *Bromus* L. Trespe.
 68. *B. mollis* L. Gemein.
 69. *B. secalinus* L. Gemein.
 70. *B. tectorum* L. Gemein.
 var. β . *murorum* Brnh. Sehr selten bei Gräfendorf.
 71. *B. inermis* Leyss. Bei Reiusdorf und Nonnendorf.
 Fam. L. Cyperoides, Cypergräser.
 XLIV. *Vignea* P. Beauv. Segge.
 72. *V. canescens* Rchbch. Bei Jüterbog.
 73. *V. stellulata* Rchbch. Bei Schönewalde, Hohen Kuhnsdorf.
 74. *V. remota* Rchbch. Gemein.
 75. *V. canescens* Rchbch. Gemein.
 76. *V. vulpina* Rchbch. Bei Wendisch-Ahlsdorf, Cossin.
 77. *V. leporina* Rchbch. Bei Wendisch-Ahlsdorf, Schönewalde.
 78. *V. acuta* Rchbch. Bei Schönewalde.
 XLV. *Carex* L. Rietgras.
 79. *C. pilulifera* L. Gemein.
 80. *C. digitata* L. Selten bei Jüterbog, Hauschteckslust, Zinna, Grüna, Rohrbeck.
 81. *C. montana* L. Ziemlich häufig.
 82. *C. praecoq* Jacq. Bei Schönewalde, Wendisch-Ahlsdorf.
 83. *C. panicea* L. Ziemlich häufig.
 84. *C. glauca* Scop. Selten bei Schönewalde, Beerwalde.
 85. *C. paludosa* Good. Bei Schönewalde, Zinna.
 86. *C. hirta* L. Gemein.

87. *C. pallescens* L. Bei Jüterbog, Zinna, Grüna.
 88. *C. sylvatica* Huds. Häufig.
 89. *C. riparia* Curt. Bei Hohen-Kuhnsdorf.
 90. *C. flava* L. Gemein.
 91. *C. Oederi* Retz. Ziemlich häufig bei Wendisch-Ahlsdorf.
 XLVI. *Pycreus* P. B. *Pycreus*.
 92. *P. flavescens* Beauv. Häufig bei Schönewalde.
 XLVII. *Eriophorum* L. Wollgras.
 93. *E. angustifolium* Rth. Gemein.
 94. *E. latifolium* Hoppe. Gemein.
 XLVIII. *Scirpus* L. Binse.
 95. *S. lacustris* L. Gemein.
 96. *S. maritimus* L. Bei Schönewalde, Welsigkendorf, Jüterbog.
 Waldau.
 97. *S. sylvaticus* L. Meist häufig.
 98. *S. uniglumis* Lk. Bei Hohen-Kuhnsdorf, Gräfendorf.
 99. *S. palustris* L. Häufig.

Fam. LII. *Typhaceae*, Rohrkolben.

XLIX. *Typha* L. Rohrkolben.

100. *T. angustifolia* L. Sehr selten bei Jüterbog, Lindenberg nur
 einmal.
 L. *Sparganium* L. Ngelskolben.
 101. *S. simplex* Huds. Bei Wendisch-Ahlsdorf, Schönewalde.
 102. *S. ramosum* Huds. Bei Schönewalde selten.

Fam. LIII. *Iridaceae*, Schwertlilien.

LI. *Gladiolus* L. Siegwurz.

103. *G. communis* L. Sehr selten in Cossin verwildert.

Fam. LIV. *Juncaceae*, Simsenlilien.

LII. *Luzula* Desv. Hainsimse.

104. *L. albida* De C. Gemein.
 105. *L. campestris* De C. Ziemlich häufig.
 106. *L. multiflora* Lej. Bei Jüterbog, Pechüle.
 LIII. *Juncus* L. Simsenlilie.
 107. *J. supinus* Mnch. Bei Schönewalde, Hohen-Kuhnsdorf, Grüna,
 Hauschtecklust, Zinna.
 108. *J. conglomeratus* L. Bei Jüterbog, Zinna.
 109. *J. effusus* L. Ziemlich häufig.
 110. *J. bufonius* L. Gemein.
 111. *J. articulatus* L. Hohen-Kuhnsdorf, Wendisch-Ahlsdorf.
 112. *J. acutiflorus* Ehrh. Häufig.

LIV. *Colchicum* L. Zeitlose.

103. *C. autumnale* L. Sehr selten bei Jüterbog, Zinna.

Fam. LVI. *Smilacaceae*, Smilaceen.

LV. *Acorus* L. Kalmus.

114. *A. Calamus* L. Selten bei Pechüle, Lindenberg, Stälze.
 LVI. *Majanthemum* Wigg. Schattensauke.
 115. *M. bifolium* De C. Sehr selten bei Cossin.

Fam. LVII. *Liliaceæ*, Liliengewächse.

LVII. *Gagea* Salisb. Gilbsterne.

116. *G. arvensis* Schult. Ziemlich häufig.

117. *G. lutea* Ker. Selten bei Jüterbog.

LVIII. *Porrum* T. Porrey.

118. *P. vineale* Sm. Sehr selten, nur an der Gräfendorfer Windmühle.

LIX. *Allium* T. L. Lauch.

119. *A. acutangulum* Schrad. Einmal bei Wiegersdorf.

LX. *Anthericum* L. Zaunlilie.

120. *A. ramosum* L. Sehr selten bei Kaltenborn.

LXI. *Asparagus* L. Spargel.

121. *A. officinalis* L. Nur einmal bei Körbitz.

Fam. LVIII. *Orchidaceæ*, Knabenkräuter.

LVII. *Orchis* L. Knabenkraut.

122. *O. Morio* L. Bei Schönewalde, Hohen-Kuhnsdorf.

123. *O. maculata* L. Ziemlich häufig.

124. *O. majalis* Richbch. Bei Jüterbog, Zinna.

LXIII. *Platanthera* Rich. Platanthere.

125. *P. bifolia* Rich. Selten bei Jänigkendorf.

Synchlamydeae.

Zweifelblumige.

Fam. LXII. *Characeæ*, Armeleuchtergewächse.

LXIV. *Nitella* Ag. Nitella.

126. *N. flexilis* Ag. Sehr selten bei Hohen-Kuhnsdorf.

LXV. *Chara* L. Armeleuchter.

127. *Ch. vulgaris* L. Bei Schönewalde, Jüterbog, Zinna.

Fam. LXIV. *Lycopodiaceæ*, Bärlappe.

LXV. *Lycopodium* L. Bärlapp.

128. *L. annotinum* L. Ziemlich häufig.

129. *L. clavatum* L. Selten bei Malterhausen.

Fam. LXVII. *Equisetaceæ*, Schachtelhalme.

130. *E. palustre* L. Häufig.

131. *E. orrense* L. Gemein.

132. *E. sylvaticum* L. Selten bei Dalichow, Niedergörsdorf, Kaltenborn.

Fam. LXX. *Coniferæ*, Zapfenbäume.

LXVI. *Juniperus* L. Wachholder.

133. *J. communis* L. Gemein.

134. *J. Sabina* L. Sehr selten verwildert, nur bei Gräfendorf.

LXVII. *Pinus* L. Kiefer.

133. *P. sylvestris* L. Gemein.

136. *P. excelsa* L. Selten bei Lindenberg, Stülze.

137. *P. Larix* L. Selten verwildert, z. B. bei Wiegersdorf.

Fam. LXXIV. *Amentaceæ*, Kätzchenblüthler.

LXVIII. *Salix* L. Weide.

138. *S. cinerea* L. Selten bei Schönewalde, Wendisch-Abldorf.

139. *S. caprea* L. Gemein.

140. *S. amygdalina* L. Hin und wieder.
 141. *S. purpurea* L. Nur selten bei Gröna, Hanschtecklust.
 142. *S. riminalis* L. Gemein.
 143. *S. aurita* L. Bei Hohen-Kuhnsdorf, Wendisch Abladorf.
 144. *S. reprints* L. Nur selten bei Jüterbog, Zinna.
 145. *S. fragilis* L. Gemein.
 146. *S. alba* L. Gemein.
 147. *S. pentandra* L. Ziemlich häufig.
 LXIX. *Populus* L. Pappel.
 148. *P. alba* L. Selten verwildert, z. B. beim Jüterboger Bahnhof.
 149. *P. tremula* L. Selten bei Nonnendorf, Werbig, Hohengörsdorf,
 Langen Lipsdorf, Welsigkendorf.
 150. *P. nigra* L. Gemein.
 151. *P. dilatata* L. Gemein.
 LXX. *Betula* L. Birke.
 152. *B. alba* L. Gemein.
 var. β . *pendula* Ehrh. Gemein.
 LXXI. *Alnus* T. Erl, Eller, Else.
 153. *A. glutinosa* Gärtner. Gemein.
 LXXII. *Corylus* L. Haselnuss.
 154. *C. Avellana* L. Selten bei Cossin, Wahlsdorf, Jäntzkendorf.
 LXXIII. *Quercus* L. Eiche.
 155. *Q. pedunculata* L. Häufig.
 156. *Q. Robur* L. Selten.
 Fam. LXXV. *Urticaceae*, Nesseln.
 LXXIV. *Urtica* L. Nessel, Brennnessel.
 157. *U. dioica* L. Gemein.
 158. *U. urens* L. Gemein.
 LXXV. *Morus* L. Maulbeerbaum.
 159. *M. alba* L. Selten verwildert.
 160. *M. nigra* L. Selten.
 LXXVI. *Ulmus* L. Rüster, Ulme.
 161. *U. suberosa* Ehrh. Häufig.
 162. *U. campestris* L. Gemein.
 Fam. LXXVI. *Aristolochiaceae*, Osterluzeien.
 LXXVII. *Aristolochia* L. Osterluzei.
 163. *A. Clematitis* L. Selten bei Gröna, Zinna.
 Synpetalae.
 Ganzblumige.
 Fam. XXIX. *Dipsacaceae*, Kardengewächse.
 LXXVIII. *Knautia* L. Knautie.
 164. *K. arvensis* L. Gemein.
 var. β . *trivialis* Schm. Ziemlich häufig.
 LXXIX. *Asterocephalus* Vaill. Köpfchenstern.
 165. *A. ochroleucus* Vaill. Häufig bei Dennewitz, Jüterbog.
 166. *A. Columbaria* L. Gemein.
 LXXX. *Spongostemma* Rehb. Schwammkranzscabiose.
 167. *S. atropurpurea* Rehb. Aus Gärten und in Gärten ver-
 wiltet, z. B. bei Schönwalde.

- LXXXI. *Succisa* Vaill. Teufelsabbiss.
168. *S. vulgaris* Prsl. Gemein.
LXXXII. *Valeriana* L. Baldrian.
169. *V. officinalis* L. Ziemlich häufig.
170. *V. dioica* L. Selten bei Hohen-Kuhnsdorf, Wendisch-Ahlsdorf, Cossin, Beerwalde.
LXXXIII. *Valerianella* T. Rapünzchen.
171. *V. oltoria* Mn ch. Häufig.
- LXXXIV. *Sambucus* L. Hollunder, gemeiner Flieder.
172. *S. nigra* L. Gemein.
Fam. LXXX. *Caprifoliaceae*, Geisblattgewächse.
- LXXXV. *Viscum* L. Mistel.
173. *V. album* L. Sehr selten bei Malterhausen.
Fam. LXXXI. *Rubiaceae*, Rubiaceen.
LXXXVI. *Galium* L. Labkraut.
174. *G. Aparino* L. Gemein.
175. *G. Mollugo* L. Gemein.
176. *G. vero-Mollugo* Schiede. Häufig bei Gräfendorf.
177. *G. verum* L. Gemein.
178. *G. sylvestre* Pollich. Gemein.
179. *G. sylvaticum* L. Gemein.
180. *G. palustre* L. Sehr häufig.
LXXXVII. *Asperula* L. Waldmeister.
181. *A. cynanchica* L. Sehr selten bei Fröhden, Merkendorf.
LXXXVIII. *Sherardia* L. Sherardie.
182. *S. arvensis* L. Sehr selten bei der Jüterboger Bahnhofsziegelei.
Fam. LXXXII. *Synanthereae*, Verwachsenbeutelige.
LXXXIX. *Calendula* L. Ringelblume.
183. *C. officinalis* L. Selten verwildert in Gräfendorf.
XC. *Achillea* L. Schafgarbe.
184. *A. Millefolium* L. Gemein.
var. β . *flore roseo*. Sehr häufig.
XCI. *Plarmica* T. Niessgarbe.
185. *P. vulgaris* De C. Sehr selten bei Wendisch-Ahlsdorf.
XCII. *Maruta* Cass. Maruta.
186. *M. Cotula* Cass. Sehr selten bei Jüterbog, Cappan.
XCIII. *Anthemis* L. Kamille.
187. *A. arvensis* L. Gemein.
var. β . *agrestis* Wallr. Selten bei Gräfendorf.
XCIV. *Leucanthemum* T. Priesterkrause.
188. *L. vulgare* Lam. Gemein.
XCV. *Pyrethrum* Gärtn. Bertram.
189. *P. Parthenium* Sm. Gemein.
190. *P. inodorum* L. Selten bei Jüterbog.
XCVI. *Bellis* L. Maassliebe, Gänseblümchen.
191. *B. perennis* L. Gemein.
XCV. *Erigeron* L. Dürrwurz.
192. *E. canadensis* L. Ueberall.
193. *E. acris* L. Gemein.

XCVI. *Aster* L. Aster.

194. *A. concinnus* W. Einmal bei Körbitz gefunden.

XCVII. *Tussilago* L. Huflattig.

195. *T. Farfara* L. Selten bei Zinna, Haussteckelst.

XCVIII. *Senecio* L. Kreuzkraut.

196. *S. vulgaris* L. Gemein.

197. *S. Jacobaea* L. Häufig um Schönnewalde.

198. *S. viscosus* L. Sehr häufig.

199. *S. sylvaticus* L. Häufig.

XCIX. *Pulicaria* Gärtn. Badekraut.

200. *P. vulgaris* Gärtn. Gemein.

201. *P. dysenterica* Gärtn. Sehr selten in Gräfendorf.

C. *Inula* L. Alant.

202. *I. germanica* L. Sehr selten bei Nieder Görzdorf.

203. *I. britannica* L. Gemein.

CI. *Artemisia* L. Wermuth, Beifuss.

204. *A. Absinthium* L. Häufig.

205. *A. vulgaris* L. Gemein.

206. *A. campestris* L. Gemein.

CII. *Tanacetum* L. Rainfarn.

207. *T. vulgare* L. Gemein.

CIII. *Antennaria* Gärtn. Katzenpötchen.

208. *A. dioica* Gärtn. Gemein.

CIV. *Filago* L. Schimmelkraut.

209. *F. germanica* L. Selten bei Jüterbdg, Zinna.

210. *F. arvensis* L. Gemein.

211. *F. montana* L. Nur sehr selten bei Stülze.

CVI. *Gnaphalium* L. Ruhrkraut.

212. *G. sylvaticum* L. Gemein.

β. *flavescens* Rehbch. fil. Gemein.

213. *G. uliginosum* L. Gemein.

CVI. *Helichrysum* Gärtn. Immortelle.

214. *H. arenarium* De C. Gemein.

var. β. *aurantiacum* Rehbch. Gemein.

CVII. *Bidens* L. Zweizahn.

215. *B. tripartita* L. Gemein.

216. *B. cernua* L. Gemein.

var. β. *minima* L. Selten bei Gräfendorf.

γ. *radiata* Rehbch. Häufig.

CVIII. *Helianthus* L. Sonnenblume.

218. *H. annuus* L. Selten verwildert bei Gräfendorf.

CIX. *Centaurea* L. Flockenblume.

217. *C. Cyanus* L. Gemein.

219. *C. Jacea* L. Gemein.

var. γ. *angustifolia* Schrk. Bei Gräfendorf.

δ. *elata* Rehbch. Selten bei Gräfendorf.

220. *C. Scabiosa* L. Selten bei Jüterbog.

221. *C. paniculata* L. Häufig.

CX. *Lampyris* T. Rainkohl.

222. *L. communis* L. Gemein.
var. β . *pubescens* Brnh. Sehr selten bei Kaltenhausen, Petkus.

CXI. *Cichorium* L. Cichorie.

223. *C. Intybus* L. Gemein.
var. β . *minima* Thm. Bei Gräfendorf.

CXII. *Leontodon* L. Löwenzahn.

224. *L. autumnalis* L. Gemein.
225. *L. hispidus* L. Häufig.
var. β . *ericolorum* Kl. et Richt. Gemein.

CXIII. *Tragopogon* L. Bocksbart.

226. *T. pratensis* L. Sehr selten bei Jüterbog.

CXIV. *Picris* L. Bitterkraut.

227. *P. hieracioides* L. Selten bei Zinna, Gröna.

CXV. *Taraxacum* Hall. Pfaffenröhrlin.

228. *T. Scorzonera* Roth. Sehr selten bei Hohen Kuhnsdorf.

229. *T. patustre* DeC. Häufig.

230. *T. officinale* Wigg. Gemein.

231. *T. laevigatum* DeC. Selten bei Lindenbergl, Stülze.
var. β . *corniculatum* Kit. Sehr selten bei Liessen.

CXVI. *Lactuca* L. Salat.

232. *L. Scariola* L. Sehr selten bei Wahlsdorf, Niehendorf.

CXVII. *Sonchus* L. Distelsalat.

233. *S. oleraceus* L. Gemein.
234. *S. asper* Villars. Gemein.
235. *S. arvensis* L. Gemein.

CXVIII. *Chondrilla* L. Knorpelsalat.

236. *Ch. juncea* L. Ziemlich häufig.

CXIX. *Mycelis* Cass. Mauersalat.

237. *M. muralis* Rchbch. Selten bei Jüterbog, Waldau.

CXX. *Crepis* L. Pippau.

238. *C. biennis* L. Gemein.
239. *C. agrestis* W. K. Häufig.
240. *C. tectorum* L. Gemein.
var. β . *segetalis* Roth. Ziemlich häufig.

241. *C. virens* Vill. Gemein.
var. γ . *ascendens* Rchbch. Gemein.

CXXI. *Hieracium* L. Habichtskraut.

242. *H. Auricula* L. Gemein.
243. *H. Pilosella* L. Gemein.
244. *H. murorum* L. Gemein.
var. β . *nemorosum* Pers. Selten bei Cossin.
245. *H. pratense* Tausch. Häufig.
246. *H. Lichenalii* Gm. Auf der Jüterboger Stadtmauer.
247. *H. umbellatum* L. Ziemlich allgemein.
248. *H. sylvestre* Tausch. Häufig.

CXXII. *Hypochaeris* L. Ferkelkraut.

249. *H. radicata* L. Gemein.
250. *H. glabra* L. Häufig.

- CXXIII. *Eupatorium* L. Wasserdost.
251. *E. cannabinum* L. Sehr selten bei Hohen-Kubusdorf.
- CXXIV. *Lappa* T. Gärtn. Klette.
252. *L. major* Gärtn. Sehr selten in Werbig.
253. *L. minor* De C. Gemein.
254. *L. tomentosa* Lam. Häufig.
- CXXV. *Cirsium* L. Distel.
255. *C. palustre* Scop. Gemein.
256. *C. acaule* All. Selten bei Dalichow, Denschwitz.
257. *C. oleraceum* All. Gemein.
258. *C. lanceolatum* Scop. Häufig.
259. *C. arvense* Scop. Gemein.
var. β . *horridum* Rehbch. Bei Gräfendorf.
260. *C. Chailletii* Gaud. Sehr selten bei Zinna, Hauschteckslust.
- CXXVI. *Carduus* L. Distel.
261. *C. nutans* L. Gemein.
262. *C. crispus* L. Gemein.
263. *C. acanthoides* L. Ziemlich häufig.
 δ . *horridus* Rehbch. Selten bei Waldau.
- CXXVII. *Onopordon* Vaill. Krebsdistel.
264. *O. Acanthium* L. Gemein.
- CXXVIII. *Xanthium* L. Spitzklette.
265. *X. strumarium* L. Bei Jüterbog, Zinna, doch einzeln.
Fam. LXXXIII. Cucurbitaceæ, Kürbisgewächse.
- CXXIX. *Bryonia* L. Gichtrübe.
266. *B. alba* L. Sehr selten bei Jüterbog.
Fam. LXXXIV. Campanulaceæ, Glöckler.
- CXXX. *Campanula* L. Glockenblume.
267. *C. rotundifolia* L. Gemein.
268. *C. rapunculoides* L. Gemein.
269. *C. patula* L. Gemein.
- CXXXI. *Jasione* L. Jasione.
270. *J. montana* L. Gemein.
Fam. LXXXV. Labiatæ, Lippenblüthler.
- CXXXII. *Lycopus* L. Wolfsfuß.
271. *L. europæus* L. Gemein.
- CXXXIII. *Mentha* L. Münze.
272. *M. aquatica* L. Häufig.
273. *M. palustris* Mueh. Sehr häufig.
274. *M. sativa* L. Gemein.
275. *M. arvensis* L. Gemein.
var. ϵ . *agrestis* Sole. Häufig.
276. *M. viridis* L. Selten bei Schönwalde Zinna.
277. *M. sylvestris* L. Sehr häufig.
- CXXXIV. *Lamium* L. Taubnessel.
278. *L. album* L. Gemein.
279. *L. maculatum* L. var. β . *nemorale* Rehbch. Gemein.
280. *L. purpureum* L. Gemein.

- CXXXV. *Galeobdolon* Huds. Gelbnessel.
 281. *G. luteum* Sm. Häufig.
 CXXXVI. *Leonurus* L. Wolfstrapp.
 282. *L. Cardiaca* L. Gemein.
 CXXXVII. *Galeopsis* L. Hohlzahn.
 283. *G. Tetrahit* L. Gemein.
 284. *G. pubescens* Bess. Selten bei Hohen Kuhnsdorf.
 285. *G. Ladanum* L. Häufig.
 CXXXVIII. *Stachys* L. Ziest.
 286. *S. palustris* L. Häufig.
 287. *S. sylvatica* L. Gemein.
 CXXXIX. *Betonica* L. Betonie.
 288. *B. officinalis* L. var. β . *hirta* Leyss. Selten bei Pechüle.
 CXL. *Glechoma* L. Gunderman.
 289. *G. hederacea* L. Häufig.
 CXLI. *Ballota* L. Ballote.
 290. *B. fortida* Lam. Sehr selten bei Lindenberg.
 291. *B. nigra* L. Gemein.
 CXLII. *Thymus* L. Thymian, Quendel.
 292. *T. vulgaris* L. Gemein.
 293. *T. Serpyllum* L. Gemein.
 CXLIII. *Acinos* Mneh. Basillenthymian.
 294. *A. thymoides* Mneh. Selten bei Gräfendorf, Werbig, Reinsdorf.
 CXLIV. *Salvia* L. Salbey.
 295. *S. pratensis* L. Gemein.
 CXLV. *Prunella* L. Prunelle.
 296. *P. vulgaris* L. Gemein.
 297. *P. grandiflora* L. Selten bei Jüterbog.
 CXLVI. *Ajuga* L. Günsel.
 298. *A. reptans* L. Gemein.
 299. *A. montana* Dill. Sehr selten bei Gräfendorf.
 CXLVII. *Scutellaria* L. Helmkraut.
 300. *S. galericulata* L. Gemein.
 CXLVIII. *Verbena* L. Eisenkraut.
 301. *V. officinalis* L. Gemein.
 Fam. LXXXVI. *Asperifoliaceae*, Rauchblätterige.
 CXLIX. *Echium* L. Natterwurz.
 302. *E. vulgare* L. Gemein.
 303. *E. Wierzbickii* Haberl. Sehr selten, auf dem Gräfendorfer Kirchhofe einigmal.
 CL. *Pulmonaria* L. Lungenblume.
 304. *P. officinalis* L. Selten bei Schönewalde, Jüterbog.
 CLI. *Lithospermum* L. Steinsame.
 305. *L. arvense* L. Gemein.
 CLII. *Myosotis* L. Vergissmeinnicht.
 306. *M. arvensis* Sibth. Gemein.
 307. *M. intermedia* Lk. Häufig.

308. *M. palustris* L. Gemein.
var. β . *parviflora* Rehbch. Gemein.
309. *M. strigulosa* Rehbch. Gemein.
310. *M. sylvatica* Ehrh. Sehr häufig.
CLIII. *Lycopsis* L. Krummhals.
311. *L. arvensis* M.B. Gemein.
CLIV. *Anchusa* L. Ochsenauge.
312. *A. arvensis* Rehbch. Gemein.
313. *A. officinalis* L. Selten bei Zinna, Hauschteckslust, Gröna.
CLV. *Symphytum* L. Beinweil.
314. *S. officinale* L. Selten bei Jüterbog.
CLVI. *Borrago* L. Boretseh.
315. *B. officinalis* L. Verwildert nur in Gräfendorf.
- Fam. LXXXVII. *Convolvulaceæ*, Windengewächse.
CLVII. *Convolvulus* L. Winde.
316. *C. arvensis* L. Gemein.
var. β . *prostratus* Schm. Gemein.
 γ . *obtusifolius* Hall. Gemein.
CLVIII. *Calystegia* R. Br. Zaunwinde.
317. *C. septium* R. Br. Selten bei Schönewalde, Jüterbog, Lindenberg, Dalichow.
- Fam. LXXXIX. *Personatæ*, Larvenblüthler.
CLIX. *Melampyrum* L. Wachtelweizen.
318. *M. arvense* L. Gemein.
319. *M. pratense* L. Gemein.
320. *M. nemorosum* L. Selten bei Stülze.
CLX. *Euphrasia* L. Augentrost.
321. *E. officinalis* L. Gemein.
var. β . *parviflora* Rehbch. Häufig.
322. *E. pratensis* Scheuchz. Selten bei Jüterbog.
CLXI. *Odontites* Hall. Odentite.
323. *O. verna* Bellardi. Gemein.
324. *O. serotina* Lam. Ziemlich häufig.
CLXII. *Pedicularis* L. Läusekraut.
325. *P. sylvatica* L. Selten bei Wendisch-Ahlendorf.
CLXIII. *Alectorolophus* Hall. Hahnenkamm.
326. *A. minor* Ehrh. Ziemlich häufig.
327. *A. major* Ehrh. Gemein.
CLXIV. *Veronica* L. Ehrenpreis.
328. *V. verna* L. Nicht selten.
329. *V. triphyllos* L. Gemein.
330. *V. agrestis* L. Häufig.
331. *V. hederifolia* L. Ziemlich häufig.
332. *V. polita* Fries. Selten bei Jüterbog.
333. *V. serpyllifolia* L. Gemein.
334. *V. prostrata* L. Häufig bei Schönewalde, Hohen-Kabusdorf.
335. *V. Beccabunga* L. Gemein.

336. *V. Chamaedrys* L. Selten bei Dennewitz.

337. *V. officinalis* L. Gemein.

CLXV. *Linaria* T. Maulblume.

338. *L. vulgaris* Baub. Gemein.

339. *L. minor* Desf. Ziemlich häufig.

CLXVI. *Antirrhinum* L. Löwenmaul.

340. *A. Orontium* L. Sehr selten bei Pechüle, Matershausen.

341. *A. majus* L. Häufig.

CLXVII. *Scrofularia* L. Braunwurz.

342. *S. nodosa* L. Gemein.

CLXVIII. *Verbascum* L. Königskerze, Wollkraut.

343. *V. nigrum* L. Ziemlich häufig.

344. *V. nemorosum* Schrad. Selten bei Zinna.

345. *V. phlomoides* L. Häufig.

346. *V. elongatum* Willd. Einzeln bei Zinna.

CLXIX. *Limosella* L. Limoselle.

347. *S. aquatica* L. Selten bei Schönewalde.

CLXX. *Orobanchę* L. Ervenwürger.

348. *O. caryophyllacea* Sm. Sehr selten bei Jüterbog.

Fam. XC. Solanaceae, Nachtschatten.

CLXXI. *Hyoscyamus* L. Bilsenkraut.

349. *H. niger* L. Häufig.

var. β . *annuus* Sm. Selten in Gräfendorf.

CLXXII. *Datura* L. Stechapfel.

350. *D. Stramonium* L. Selten bei Zinna, Pechüle, Lindenberg.

CLXXIII. *Nicandra* Adans. Giftbeere.

351. *N. physaloides* Gärtn. Sehr selten verwildert in Gräfendorf.

CLXXIV. *Lycium* L. Bocksdorn.

352. *L. barbarum* L. Ziemlich häufig.

CLXXV. *Solanum* L. Nachtschatten.

353. *S. nigrum* L. Gemein.

var. β . *atriplicifolium* Desp. Nicht selten.

354. *S. pterocaulon* Desf. Häufig.

355. *S. viridescens* Kestetzsky. Sehr selten bei Gräfendorf.

356. *S. humile* Ehrh. Selten in Gräfendorf, Hauschockelust.

357. *S. villosum* Lam. Sehr selten bei Körbitz.

358. *S. Dulcamara* L. Selten bei Schönewalde.

Fam. XCI. Plumbaginaceae, Plumbaginaceen.

CLXXVI. *Plantago* L. Wegwisch.

359. *P. major* L. Gemein.

360. *P. media* L. Häufig.

361. *P. lanceolata* L. Gemein.

362. *P. humifusa* Brnh. Ziemlich häufig.

CLXXVII. *Armeria* L. Grasnelke.

363. *A. vulgaris* L. Gemein.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Thümen-Gräfendorf Felix Karl Albert Ernst
Joachim

Artikel/Article: [Systematische Aufzählung der in der Umgebung der Stadt Jüterbog wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. Nach dem Reichenbach"schen System 721-733](#)