

Die Sporen dieser Steine bewohnenden Varietät sind constant 4 zellig und kleiner, als bei obiger *Bil. cinerea*.

- ^{ad} nr. 223. (p. 537) *Tomasellia* Mass. — Diese neue in Flora 1856 nr. 18 beschriebene Gattung rechtfertigt Mass. *essame compar.* 53 im Verhältnisse zu *Melanthea* Nyl durch nachstehende Bemerkung: „il genere *Melanthea* Fée (*Porodithium* Fr.) „è ottimo, e differisce dalle *Tomas*: e dalle *Parmentarie* e dai „*Celothelium* etc. oltre che pelle spore 4 loculari alla foggia „delle *Pyrenula*, per la mancanza di peritecii singolari che rav- „volgono e coprono i nuclei indipendentemente dal sarcotecio, „come in tutti gli altri generi quivi nominati. — Tipo di questo „genere è la *Melan. anomala* Mass. (*Melan. Achariana* Fée ' „*Porodithium Acharii* Fr., *Trypethel anom.* Ach.)“ —
- ad nr. 140. (p. 536 Zeile 12) der Druckfehler Hepp 140 ist in Hepp 440 zu berichtigen.
- ad nr. 343. (p. 537 Zeile 5) zwischen die Worte zwei Nrn. ist: „vorausgehenden“ einzuschalten.

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Schluss.)

Cynareae.

Carlina acaulis L. selten; *vulgaris*. — *Centaurea Jacea* L., *austriaca* Willd., *cyanus* L., *Scabiosa* L., *maculosa* tam. — *Onopordon Acanthium* L. — *Carduus crispus* L., *acanthoides* L., *nuttans* L. selten. — *Cirsium lanceolatum* Scop., *palustre* Scop., *rivulare* Allion., *oleraceum* Scop., *acaule* Allion. selten, *arvense* Scop. — *Lappa major* Gärtn., *minor* DC., *tomentosa* Allion. — *Serratula tinctoria* L.

Cichoriaceae.

Lapsana communis L. — *Cichorium Intybus* L. — *Hypochaeris radicata* L. (?), *maculata* L. — *Leontodon autumnalis* L. — *Picris hieracioides* L. — *Tragopogon pratensis* L., *orientalis* L. — *Scorzonera humilis* L. — *Taraxacum officinale* Wigg. — *Lactuca scariola* L., *muralis* Less. — *Sonchus arvensis* L., *oleraceus* L., *asper* Vill. — *Crepis tectorum* L., *biennis* L., *praemorsa* L., *paludosa* Möach. — *Hieracium pilosella* L., *Auricula* L., *Bauhini* Schult., *pratense* Tausch., *echioides* L. mintz, *murorum* L., *sylvaticum* G., *umbellatum* L.

Die Sporen dieser Steine bewohnenden Varietät sind constant 4 zellig und kleiner, als bei obiger *Bil. cinerea*.

- ^{ad} nr. 223. (p. 537) *Tomasellia* Mass. — Diese neue in Flora 1856 nr. 18 beschriebene Gattung rechtfertigt Mass. *essame compar.* 53 im Verhältnisse zu *Melanthea* Nyl durch nachstehende Bemerkung: „il genere *Melanthea* Fée (*Porodithium* Fr.) „è ottimo, e differisce dalle *Tomas*: e dalle *Parmentarie* e dai „*Celothelium* etc. oltre che pelle spore 4 loculari alla foggia „delle *Pyrenula*, per la mancanza di peritecii singolari che rav- „volgono e coprono i nuclei indipendentemente dal sarcotecio, „come in tutti gli altri generi quivi nominati. — Tipo di questo „genere è la *Melan. anomala* Mass. (*Melan. Achariana* Fée ' „*Porodithium Acharii* Fr., *Trypethel anom.* Ach.)“ —
- ad nr. 140. (p. 536 Zeile 12) der Druckfehler Hepp 140 ist in Hepp 440 zu berichtigen.
- ad nr. 343. (p. 537 Zeile 5) zwischen die Worte zwei Nrn. ist: „vorausgehenden“ einzuschalten.

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Schluss.)

Cynareae.

Carlina acaulis L. selten; *vulgaris*. — *Centaurea Jacea* L., *austriaca* Willd., *cyanus* L., *Scabiosa* L., *maculosa* tam. — *Onopordon Acanthium* L. — *Carduus crispus* L., *acanthoides* L., *nuttans* L. selten. — *Cirsium lanceolatum* Scop., *palustre* Scop., *rivulare* Allion., *oleraceum* Scop., *acaule* Allion. selten, *arvense* Scop. — *Lappa major* Gärt., *minor* DC., *tomentosa* Allion. — *Serratula tinctoria* L.

Cichoriaceae.

Lapsana communis L. — *Cichorium Intybus* L. — *Hypochaeris radicata* L. (?), *maculata* L. — *Leontodon autumnalis* L. — *Picris hieracioides* L. — *Tragopogon pratensis* L., *orientalis* L. — *Scorzonera humilis* L. — *Taraxacum officinale* Wigg. — *Lactuca scariola* L., *muralis* Less. — *Sonchus arvensis* L., *oleraceus* L., *asper* Vill. — *Crepis tectorum* L., *biennis* L., *praemorsa* L., *paludosa* Möach. — *Hieracium pilosella* L., *Auricula* L., *Bauhini* Schult., *pratense* Tausch., *echioides* L. mintz, *murorum* L., *sylvaticum* G., *umbellatum* L.

Dipsaceae.

Succisa pratensis Mönch. — *Scabiosa ochroleuca* L., *arvensis* L.

Valerianaeae.

Valeriana officinalis L., *dioica* L. — *Valerianella auricula*.

Lonicereae.

Linnaea borealis L. — *Lonicera xylosteum* L. — *Sambucus nigra* L. — *Viburnum Opulus* L.

Campanulaceae.

Jasione montana L. — *Phyteuma spicatum* L. — *Campanula cervicaria* L., *glomerata* L., *Trachelium* L., *rapunculoides* L., *bononiensis* L., *rotundifolia* L., *patula* L., *persicifolia* L. — *Adenophora lilifolia* Ledeb.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.

Polypetalae.

Paronychinae

Herniaria glabra L. — *Spergularia rubra* Presl. — *Spergula arvensis* L.

Scleranthaeae.

Scleranthus annuus L., *perennis* L.

Alsineae.

Sagina procumbens L., *nodosa* Bartl. — *Arenaria serpyllifolia* L., *trinervia* L. — *Holosteum umbellatum* L. — *Stellaria nemorum* L., *media* Vill., *holostea* L., *glauca* With., *graminea* L. — *Cerastium semidecand.* L., *triviale* Lind., *arvense* L., *sylvaticum* Waldst. u. Kit. — *Malachium aquaticum* Fr.

Sileneae.

Dianthus superbus L., *arenarius* L., *deltoides* L., *carthusianorum* L., selten. — *Saponaria officinalis* L. — *Gypsophila fastigiata* L., *muralis* L. — *Silene inflata* Sm., *nutans* L., *chlorantha* Erh. selten, *otites* Sm., *noctiflora* L. — *Viscaria vulgaris* Röhl. — *Lycb. alba* Mill., *rubra* Weigel, *Flos. cuculi* L., *Agrostemma Githago* L.

Cruciferae.

Thlaspi arvense L. in Rademachers Arzneischatz aufgenommen. — *Lepidium ruderales* L. — *Capsella Bursa pastoris* Mönch. — *Camelina sativa* Crtz. — *Berteroa incana* DC. — *Draba verna* L. — *Cochlearia armoracia* L. — *Nasturtium*

sylvestre R. Br., *palustre* DC. — *Turritis glabra* L. — *Arabis hirsuta* Scop., *arenosa* Scop., *thaliana* L. — *Cardamine amara* L. *pratensis* L. — *Sisymbrium officinale* Scop., *sophia* L., *Alliaria* Scop. — *Erysimum cheiranthoides* L. — *Sinapis arvensis* L. — *Raphanistrum arvense* Wallr. — *Neslia paniculata* Desv.

Fumariaceae.

Corydalis intermedia Merut., *Halleri* Willd. — *Fumaria officinalis* L. — *Chelidonium majus* L. — *Papaver argemone* L. *dubium* L. — *Berberis vulgaris* L. — *Empetrum nigrum* L. — *Mercurialis perennis* L. — *Euphorbia helioscopia* L., *Esula* L., *Peplus* L.

Celastrinae.

Evonymus europaea L., *verrucosa* Scop.

Rhamneae.

Rhamnus cathartica L., *Frangula* L.

Loranthaeae.

Viscum album L.

Araliaceae.

Cornus sanguinea L. — *Hedera Helix* L.

Adoxeae.

Adoxa moschatellina L.

Umbelliferae.

Sanicula europaea L. — *Eryngium planum* L. selten. — *Cicuta virosa* L. — *Aegopodium Podagraria* L. — *Carum Carvi* L. — *Pimpinella saxifraga* L. — *Sium latifolium* L. — *Oenanthe Phellandrium* Lam. — *Aethusa Cynapium* L. — *Libanotis montana* All. selten. — *Seseli annuum* L. — *Angelica sylvestris* L. — *Peucedanum Oreoselinum* Mönch., *palustre* Mönch. — *Pastinaca sativa* L. — *Heracleum spondylium* L. — *Laserpitium latifolium* L., *pruthenicum* L. selten. — *Daucus Carota* L. — *Torilis Anthriscus* Gm. — *Anthriscus sylvestris* Hoffm. — *Chaerophyllum temulum* L., *aromaticum* L. *Conium maculatum* L.

Saxifrageae.

Saxifraga granulata L., *tridactylites* L., *Hirculus* L. — *Chrysosplenium alternifol.* L.

Crassulaceae.

Sedum Telephium L., *acre* L

Hypericinae.

Hypericum perforatum L., *quadrangulare* L., *tetrapterum* Frics, *montanum*.

Oxalideae.

Oxalis Acetosella L.

Droseraceae.

Drosera longifolia L., *rotundifolia* L.

Parnassinae.

Parnassia palustris L.

Violeae.

Viola palustris L., *oderata* L., *hirta*, *mirabilis*, *arenaria* Dc., *canina* L., *tricolor* L.

Cistineae.

Helianthemum vulgare Gärtn.

Lineae.

Linum catharticum L.

Geraniaceae.

Geranium sylvaticum L., *pratense* L., *palustre* L., *sanguineum* L., *pusillum* L., *columbinum* L. selten, *robertianum* L. — *Erodium cicutarium* Herit.

Balsamineae.

Impatiens Nolitangere L.

Polygaleae.

Polygala comosa Schk., *vulgaris* L., *amara* L.

Acerinae.

Acer platanoides L.

Malvaceae.

Malva Alcea L., *sylvestris* L. selten, *rotundifolia* L.

Tiliaceae.

Tilia parvifolia Ehrh.

Ranunculaceae.

Delphinium Consolida L. — *Aquilegia vulgaris* L. — *Isopyrum thalictroides* L. selten. — *Trollius europaeus* L. — *Caltha palustris* L. — *Ficaria ranunculoides* Mönch. — *Butachium aquatile* E. Mey. — *Ranunculus Flammula* L., *Lingua* L., *auricomus* L., *cassubicus* L., *acris* L., *lanuginosus* L., *repens* L., *bulbosus* L., *sceleratus* L., *arvensis* L. selten. — *Myosurus minimus* L. — *Hepatica triloba* Chaix. — *Anemone sylvestris* L., *nemorosa* L., *ranunculoides* L. — *Pulsatilla patens* Miller., *pratensis* Mill. — *Thalictrum aquilegifolium* L., *minus* L., *angustifolium* L., *flavum* L.

Paeoniaceae.

Actaea spicata L.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Smith. — *Nymphaea alba* L.

Ribesinae.

Ribes Grossularia L., *rubrum* L., *nigrum* L., *alpinum* L.

Onothereae.

Epilobium angustifolium R., *hirsutum* L., *parviflorum* Retz.,
montanum L., *palustre* L. — *O. Leucothera bennis* L. — *Circaea*
alpina L.

Halorrhagideae.

Myriophyllum spicatum L., *verticillatum* L.

Lythraeae.

Peplis portula L. — *Lythrum Salicaria* L.

Papilionaceae.

Genista germanica L. — *Anthyllis vulneraria* L. — *Mericago falcata* L., *lupulina* L. — *Melilotus officinalis* Pers., *vulgaris* Willd. — *Trifolium Lupinaster* L., *montanum* L., *repens* L.,
hybridum L., *fragiferum* L. selten, *arvense* L., *pratense* L., *medium*
L., *alpestre* L., *rubens* L., *procumbens* L. — *Lotus corniculatus* L.
— *Astragalus arenarius* L., *glycyphyllos* L., *pilosus* L. selten. —
Coronilla varia L. — *Vicia sylvatica* L., *dumetorum* L., *Cracca*
L., *villosa* Roth., *tenuifolia* Roth., *sepium* L., *sativa* L., *angustifolia*
Roth. — *Lathyrus sylvestris* L., *pratensis* L. — *Orobis tuberosus*
L., *vernus* L., *niger* L.

Amygdaleae.

Prunus spinosa L.

Rosaceae.

Spiraea Filipendula L., *ulmaria* L. — *Crataegus Oxyacantha* L. — *Pyrus communis* L., *Malus* L. — *Mespilus Cotoneaster* —
Sorbus aucuparia L. — *Rosa canina* L., *tomentosa* Smith.,
rubiginosa L. — *Agrimonia Eupatorium* L. — *Geum rivale* L.,
urbanum L., *hispidum* Fr. selten. — *Potentilla alba* L., *rupestris*
L., *supina* L., *anserina* L., *norvegica* L., *Tormentilla* Schrk., *reptans*
L., *argentea* L., *verna* L., *opaca* L. — *Comarum palustre* L. —
Fragaria vesca L., *collina* Ehrh. — *Rubus saxatilis* L., *idaeus*
L., *caesius* L. selten, *fruticosus* selten. — *Alchemilla vulgaris* L.
— *Aphanes arvensis* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Thienemann H. W.

Artikel/Article: [Pflanzen Masurens 756-760](#)