

Summa lichenum coniocarporum. Auctore V. Trevisan.

Tribus I. Sphaerophoreae Fries.

I. *Sphaerophorus Pers.* — Sporae uniloculares.

1. *Sph. melanocarpus Schär.* — 2. *Sph. australis Laur.*; var. *insignis Trev.* (*Sph. insignis Laur.*); var. *ceranoides Trev.* (*Sph. ceranoides Hampe*). — 3. *Sph. tener Laur.* — 4. *Sph. coralloides Pers.*; var. *candicans Fries*; var. *laccatus Trev.* (*Stereocaulon laccatum Fries.*) — 5. *Sph. fragilis Pers.*

II. *Acroscyphus Léveil.* — Sporae biloculares.

1. *A. sphaerophoroides Léveil.*

Tribus II. Calicieae Zenk.

Subtribus I. *Acolieae Mass.* — Apothecia orbiculata patellulaeformia, constanter omnino stipite destituta. Paraphyses isomacrae (ascos longitudine aequantes vel aliquantulum superantes.)

I. *Crateridium Trev.* — Apothecia orbiculata patellulaeformia, omnino sessilia, basi saltem innata, primitus subclausa subglobulosa, excipulo proprio aterrimo tenuiter marginata. Thalamum disciforme hypothecio simplici excipulari carnosogelatinoso albescen-ti-flavidulo impositum. Ascii elongato-clavae-formes, mox evanidi, octospori, paraphysibus isomacris flaccidis gelatinosis immixti. Sporae globoso-ovoideae, uniloculares, fusconigricantes, sporodermide constanter colorata, opaceae. Thallus crustaceus uniformis.

1. *Cr. virellum Trev.* (*Calicium virellum Nyl.*) — Estne *Thelomma mammosum Mass.* (in Att. Ist. Ven., Tom. V. Ser. III. p. 268.), mihi prorsus ignotum, altera hujus generis species?

II. *Cyphelium Ach.* (in Vet. Ac. Handl. — 1815), *Th. Fries* (Gen. Het. eur.) — Sporae biloculares.

Syn. Acolium Gray (Nat. arr. Brit. plant., I. p. 482—1821), *Fée* (Méth. lich.), *De Not.* (in Giorn. bot. ital.), *Mass.* (Mem. lich. *Körb.* (System. lich. Germ.)) — *Calicium Cheval.* (Flor. Par.) — *Trachylia Nyl.* (*Syn. lich.*, I. p. 164.)

Obs. Nisi omne prioritatis jus, omnes nomenclaturaes leges, violare velis, alii generi *Cyphelii* nomen antiquius imponere non licet. Genus sub *Acolii* nomine nullum determinavit Acharius, sed tantum sectionem generis sui *Calicilium* sub hoc nomine in *Lichenographia universalis* (ann. 1810) distinxit.

1. *C. lucidum Th. Fries.* (*Calicium viridulum Schär.* exs.

295., non Fries.) — 2. *C. tigillare Ach*; var. *prominulum Trev.* (*Trachylia tigillaris* var. *prominula Nyl.*) — 3. *C. viridulum Fries.* — 4. *C. inquinans Trev.* (*Lichen inquinans Smith.*); var. *ollare Trev.* (*Cyph. ollare et pileatum Ach.*) — 5. *C. ocellatum Trev.* (*Acolium ocellatum Körb.*) — 6. *C. cembrinum Ach.* — 7. *C. sessile Trev.* (*Calicium sessile Pers.* 1797; *Calic. stigonellum Ach.* 1803) — 8. *C. lecideinum Trev.* (*Trachylia lecidea Nyl.*) — 9. *C. subsimile Trev.* (*Trachylia subsimilis Nyl.*) — 10. *C. Neesii Trev.* (*Calicium Neesii Flot.*) — 11. *C. montellicum Trev.* (*Acolium montellicum Beltram.*)

III. *Acolium Trev.* (non alior.) — Apothecia orbiculata patellaeformia, innata, primitus subclausa, excipulo proprio aterrimo tenuiter marginata. Thalamum disciforme hypothecio simplici excipulari carnosō-gelatinoso albescente impositum. Ascī elongato-clavaeformes, mox evanidi, octospori, paraphysibus isomacris flaccidis gelatinosis immixti. Sporae ovoideae, polyblastae, fusco-nigricantes, sporodermide constanter colorata, opaceae. Thallus crustaceus uniformis.

1. *A. Notarissii Tulasn.* (*Cyphelium tigillare Reich. et Schub.* exs. 56., non *Ach.*) — Species a ceteris Acolieis sporis constanter polyblastis distinctissima. In Suecia, Germania, Gallia et Italia septentrionali parce, ut videtur, occurrit. Forte saepius cum *Cyphelio tigillari confunditur.*

IV. *Pyrgillus Nyl.* — Sporae longitrusus quadriloculares.

1. *P. javanicus Nyl.* — 2. *P. americanus Nyl.*

Subtribus 2. *Eucalicieae Körb.* — Apothecia capituliformia stipitata. Paraphyses isomacrae.

V. *Sphinctrina Fries.* — Sporae uniloculares.

1. *Sph. disseminata Trev.* (*Cyphelium disseminatum Fries* in *Ach.* 1817; *Calicium disseminatum Fries* exs. 16.) — 2. *Sph. atomaria Trev.* (*Calicium atomarium Ach.*, *Fries.* exs. 17.) — 3. *Sph. paroica Trev.* (*Calicium paroicum Ach.*) — 4. *Sph. tubaeformis Müss.* — 5. *Sph. fuscescens Nyl.* — 6. *Sph. microcephala Körb.* Par. p. 288. (*Sph. anglica Nyl.*; *Sph. microscopica Anzi*; *Sph. pinicola Körb.* exs. 203.) — 7. *Sph. turbinata Fries.* — 8. *Sph. leucopoda Nyl.*

VI. *Calicium Pers.* — Sporae biloculares.

1. *C. gomphilloides Trev.* (*Sphinctrina gomphilloides Nyl.*) — 2. *C. corynellum Ach.* — 3. *C. subparoicum Nyl.* — 4. *C. albo-atrum Flörk.*; var. *nigricans Trev.* (*C. nigricans Schär.* exs. 250.) — 5. *C. pusillum Flörk.*; var. *Heppii Trev.* (*C. pu-*

sillum var. populneum *Hepp.* exs. 339.); var. subtile *Hepp.* exs. 605. — 6. *C. triste Körb.* — 7. *C. abietinum Pers.* (*C. curtum Turn.* et *Borr.*) — 8. *C. lenticulare Ach.*; var. *virescens Trev.* (*C. virescens Hepp.* exs. 336.) — 9. *C. quercinum Pers.*; var. *decipiens Trev.* (*C. decipiens Mass.*) — 10. *C. Schleicheri De Not.* — 11. *C. atro-viride Körb.* — 12. *C. salicinum Pers.* (*C. trachelinum Ach.*); var. *xylonellum Trev.* (*C. xylonellum Ach.*) — 13. *C. adspersum Pers.*; var. *aureum Schär.* exs. 245. — 14. *C. incrassans Körb.* — 15. *C. validiusculum Trev.* (*C. adspersum* var. *trabinellum Schär.* exs. 246.; *C. trabinellum Mass.*, *Hepp* exs. 334., *Körb.*, *Arn.*, *Anzi*, non *Ach.*); var. *minimum Trev.* (*C. roscidum* var. *minimum Schär.*; *C. trabinellum* var. *minimum Hepp* exs. 335.) — 16. *C. hyperellum Ach.*; var. *filiforme Schär.*; var. *baliolum Fries*; var. *viride Nyl.* — 17. *C. hyperelloides Nyl.*

VII. *Stenocybe Nyl.* — Sporae longitrorsus quadriloculares.

1. *St. septata Arn.* — 2. *St. major Nyl.* — 3. *St. bysaccaea Nyl.*

Subtribus 3. Phacotiaeae Trev. — Apothecia capituliformia stipitata. Paraphyses anisomacrae (ascos longitudine insigniter superantes), invicem capillitii adinstar implexae.

VIII. *Phacotium Gray* (Nat. arr. Brit. plant. I. p. 482. — 1821).

Syn. *Cyphelium De Not.* (in Giorn. bot. ital., Ann. 2. P. I. p. 316. — 1847), *Mass.* (Mem. lich.), *Körb.* (Syst. lich. Germ.), non *Ach.* — *Chaenotheca Th. Fries* (Gen. Het. eur. 1861).

Obs. Novum Chaenothecae nomen, nuper a clarissimo Theodoro Fries propositum, revera supervacaneum erat, cum jam *Phacotium Sam. Friderici Grayi* aderat.

1. *Ph. chrysocephalum Gray*; var. *filare Trev.* (*Calic. chrysocephalum* var. *filare Ark.*); var. *melanocephalum Trev.* (*Calic. chrysoc. var. melanocephalum Nyl.*); var. *holochryseum Trev.* (*Calic. chrysoc. var. holochryseum Nyl.*); var. *ecrustaceum Trev.* — 2. *Ph. phaeocephalum Trev.* (*Lichen phaeocephalus Turn.*); var. *flavum Trev.* (*Calic. flavum Ach.*); var. *chlorellum Trev.* (*Calic. chlorellum Wahlenb.*); var. *trabinellum Trev.* (*Calic. trabinellum Ach.* Meth. suppl. p. 14!!); var. *obscurum Trev.* (*Calic. phaesc. var. obscurum Nyl.*) — 3. *Ph. aciculare Trev.* (*Lichen acicularis Smith*; *Phacotium hispidulum Gray*) — 4. *Ph. arenarium Trev.* (*Cyphelium arenarium Hanpe*; Co-

niocybe citrina *Leight.* exs. 269.) — 5. Ph. trichiale *Trev.* (Calic. trichiale *Ach.*); var. filiforme *Trev.* (Calic. trichiale var. filiforme *Schär.*); var. epidryon *Trev.* (Calic. glaucellum var. epidryon *Ach.*); var. cinereum *Trev.* (Calic. cinereum *Pers.*; Calic. trichiale var. physarellum *Schär.* exs. 452.) — 6. Ph. stemoneum *Trev.* (Calic. stemoneum *Ach.*; Phacotium aeruginosum *Gray*) — 7. Ph. physarellum *Trev.* (Calic. physarellum *Ach.*, *Fries* exs. 11.); var. Prévostii *Trev.* (Calic. Prévostii *Duby*) — 8. Ph. brunneolum *Trev.* (Calic. brunneolum *Ach.*) — 9. Ph. ferrugineum *Gray*. — 10. Ph. melanophaeum *Trev.* (Calic. melanophaeum *Ach.*) — 11. Ph. albidum *Trev.* (Cyphelium albidum *Körb.*) — 12. Ph. pusiolum *Trev.* (Calic. pusiolum *Ach.*) — 13. Ph. sphaerocephalum *Gray* (Mucor sphaerocephalus *Linn.* Flor. suec. n. 1286; Calic. parietinum *Ach.*; Cyphelium subtile *Körb.*); var. leucothallum *Trev.* (Calic. parietinum var. leucothallum *Ach.*) — 14. Ph. albo-nigrum *Trev.* (Calicinum albo-nigrum *Nyl.*) — 15. Ph. populneum *Trev.* (Calic. populneum *De Brond.*) — 16. Ph. Curtisii *Trev.* (Calic. Curtisii *Tuckerm.*)

IX. Fulgia Cheval. (in Journ. Phys. 1822.)

Syn. Coniocybe *De Not.* (loc. cit., p. 319), *Mass.* (Mem. lich., p. 159.)

Obs. Genus Coniocybes, ab Achario anno 1816 propositum, species quinque amplectit, nempe C. stilbeam, brachypodam, furfuraceam, griseolam et gracilentam, quarum C. stilbea tantum ad Lichenes revera pertinet, reliquae autem ad Fungos. Jam ab anno 1843 Coniocybes furfuraceae naturam conspicue fungosam primus omnium summus Montagne (in *d' Orbigny* Dictionnaire universel d' histoire naturelle; art. Coniocybe) indigitavit et argumentis firmissimis comprobavit. Quis autem, praeter amicum perillustrem De Notaris, assertionibus suis attentum se praebuit? Cave igitur ne ulterius Coniocybas veras (stromatis filamentosi natura evidenter mycetoidea, apotheciis veris nullis, sporis ascis prorsus destitutis facillime discernendas) cum Fulgiis (apotheciorum verorum, excipuli proprii ascorumque distinctorum praesentia non aequivoca insignibus) infauste confundas. Itaque Coniocybes nomen e Lichenum classe excludere necesse fuit. Strongylium Grayi (Nat. arr. Brit. plant., I. p. 485. — 1821) idem est ac Coniocybe sensu Acharii.

• 1. F. farinacea *Cheval.* (Coniocybe farinacea *Nyl.*) — 2. F. pallida *Trev.* (Calicium pallidum, *Pers.*); var. xanthocephala

Trev. (*Embolus pallidus* var. *xanthocephala Wallr.*) — 3. F. *hyalinella Trev.* (*Coniocybe hyalinella Nyl.*); var. *pistillaris Trev.* (*Calicium pistillare Ach.*) — 4. F. *baeomycioides Trev.* (*Conocybe baeomycioides Mass.*)

Obs. Consulto omisi *Calicium saxatile Schär.*, *Poetschiam buelliodem* et *Lahmiam Kunzei Körb.*, *Embolum ochreatum* et *sardoum De Not.*, *Cyphelium corallinum Heppii* (mihi non satis clarum), etc.

Die XX. Januarii 1862.

W. M. Streintz, Nomenclator fungorum, exhibens ordine alphabetico nomina tam generica quam specifica ac synonyma a scriptoribus de scientia botanica fungis imposita. Vindebonae, Car. Gorischek. 1862. gr. 8. p. 735.

Nachdem Referent die Anzeige obigen Werkes in diesen Blättern (1861. p. 672) gelesen, war derselbe und gewiss mit ihm mancher Freund der Pilzkunde sehr erfreut, ein Werk seiner Bibliothek einverleiben zu können, welches einem wahren Bedürfnisse abzuhelfen versprach. Denⁿ bei der grossen Zersplitterung der Pilzlitteratur ist kaum möglich, ohne einen solchen Nomenclator die vielen neu bekanntgewordenen Gattungen und Arten der Pilze zu überschauen und in's System einzuordnen, da der Index alphabeticus zu Fries Syst. mycologicum nicht mehr genügen konnte; allerdings hatte Hr. Hoffmann als Beilage zur Botanischen Zeitung von Schlechtendal u. Mohl (von 1860) einen sehr verdienstlichen Index mycologicus drucken lassen, in welchem ein sehr grosser Theil der neuerlich (vom Erscheinen des obengenannten Fries'schen Werkes an) bekanntgewordenen Pilze aufgenommen ist und welcher mit vieler Fleisse und grosser Sorgfalt ausgearbeitet worden. Wir durften daher hoffen, dass wir hier diesen Index mit in den Nomenclator einverleibt antreffen würden; doch leider fand Referent und wohl Mancher, der dieses Buch zu benützen Gelegenheit hatte, sich darin sehr getäuscht; nicht allein dass ein grosser Theil dieses Hoffmann'schen Index in den Anhang, Supplementum (p. 665—694), verwiesen wurde, so finden sich auch noch bei weitem nicht alle

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Trevisan Victor B. A.

Artikel/Article: [Summa lichenura coniocarporum 3-7](#)