

Fünf neue Arten der Gattung *Viola* aus Chile, von Fr. Leybold.

1. *Viola glechomoides* Leybold. *V. annua*, acaulis, dense rosulata; radice simplicissima; foliis late rhomboideis vel obverse ovoideis, valde crenatis, supra subtusque glabris; supra rugosis, rufo-viridibus; subtus laevibus glaucis, sulcis lirellae-formibus viridibus parce instructis; margine ciliatis, pilis apicem versus incrassatis; floribus in pedunculis folia vix aequantibus minutis; petalis calicem vix superantibus albidis vel pallide roseis, tenuiter pictis striis roseis; fauce luteo; calcare brevissimo non partito; calice glabro, viridi, margine albescente. — 7—8000' supra mare. — Auf Porphyrr.

Auf kurzbegrasten trockenen Bergwiesen. — In der Provinz Santiago; — hacienda de la dehesa an zwei verschiedenen Plätzen: „al pié de los Penquenes und in den Barancones im Valle largo. — Monat November.

2. *Viola nubigena* Leybold. *V. annua*, acaulis, rosulata; radice simplice; foliis ovato-lanceolatis integerrimis, supra nervosis, nervis albidis perductis, pubescentibus pilis tenuibus deinde evanescentibus, subtus laevibus et glabris, margine rubescente, petiolum versus ciliatis, pilis glandulosis; floribus folia vix aequantibus, roseis; sepalis glabris, rubescentibus aut viridibus, margine albescentibus, basin id est pedunculum versus in marginem rotundam protractis; petalis infra albis, apicem versus roseo-pictis, extus violaceis; fauce luteo; calcare brevi subsinuato. — 8—9000' über Meer. In der Quebrada azul chica en los Penquenes; hacienda de la dehesa; provincia de Santiago. — Porphyrr. Im Steingerölle. — November und December.

3. *Viola auricula* Leybold *V. annua*, acaulis, rosulata, radice simplice vel parce ramificata; foliis supra subtusque glabris e petiolo lato ovato-lanceolatis integerrimis, cochleatis deinde planis, supra valde nervosis albis nervis perductis; margine rubescenti ciliatis, pilis albis glandulosis, apicem versus simplicibus, subtus laevibus, glabris, sulcis paucis viridibus instructis; floribus flavis minutis in pedunculis brevioribus quam folia; calice glaberrimo; sepalis viridibus aut violaceo-pictis, margine albescentibus, pedunculum versus in segmenta rotunda protractis; petalis luteis intus tenuiter violaceo-striatis, extus apicem versus

violaceo-pictis; calcare brevi subsinuato. 7500 Fuss über Meer auf Porphyr. — In der Quebrada de los penquenes; hacienda de la dehesa; provincia de Santiago. — November. In einer tiefen feuchten Cordilleren-Schlucht.

4. *Viola Chamaedrys* Leybold. *V. annua*, acaulis laxe rosulata; foliis ellipticis in petiolum longe attenuatis, runcinato-crenulatis; supra subtusque glabris, margine petiolum versus et petiolo valde pubescentibus pilis tenuibus; lamina inferiore glauca sulcis paucissimis instructa; floribus majusculis roseis in pedunculis pubescentibus; sepalis minutis viridibus margine albidis pubescentibus; petalis triplo majoribus roseis obscure roseo-striatis, fauce flavescenti.

Ich erhielt dieses schöne Veilchen im August 1860 zugesandt von der Cuesta de Chacabuco gegen das Thal von Aconcagua durch Herrn Richard Pearce, einen englischen Sammler. — Obwohl dieser Freund selbe unter dem Namen meiner *Viola rhombifolia* zusandte, war doch keinen Augenblick ein Zweifel möglich. — Später sammelte auch Doctor Philippi selbe am gleichen Platze. — Circa 5—6000 s. m. Porphy.

5. *Viola aurantiaca* Leybold. *V. perennis*, acaulis, dense rosulata; radice simplice aut multiplicite; foliis rhomboe-orbiculatis, crenato-incisis, crenis sex usque decem profundis margine albo-ciliatis, pilis setosis, supra rugosis paucissimis pilis petiolum versus adspersis, subtus laevibus glandulis vitreis albis instructis; floribus aurantiacis in pedunculis folia subaequantibus; petalis sepalis duplo superantibus, undique aurantiacis; fauce flavo; sepalis viridibus hirsutis pilis setosis; calcare brevi.

Unter diesen fünf eigenthümlichen Cordilleren-Veilchen ist dieses letzte fast das schönste und ausserdem blos an einem einzigen Orte gefunden, dem: „Mal paso“ hacienda de la dehesa; provincia de Santiago. Porphyr auf steinigen Felsabhängen. — 8—9000' über Meer; blüht in den Monaten Novbr. und Decbr.

Santiago de Chile 25. Nov. 1863.

Friedrich Leybold.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Leybold Friedrich

Artikel/Article: [Fünf neue Arten der Gattung Viola aus Chile 40-41](#)