

Enumeratio synoptica Sticteorum.
 Scripsit W. Nylander.

I. *Stictina* Nyl.

a. *Pseudocyphellatae*.

1. *St. argyracea* (Bor.). — C. B. Sp., Ins. Afr. merid., Java, Polynesia.
2. *St. intricata* (Del.). — Afr. mer. et occid., Hibernia, Amer. merid.
3. *St. Dozyana* (Mnt. et v. d. B.). — Java.
4. *St. fragillima* (Bab.). — Nova Holl., N. Zelandia, Java, Peruvia.
5. *St. Hookeri* (Bab.). — N. Zelandia.
6. *St. faveolata* (Del.). — Amer. mer., Philippin.
7. *St. coerulescens* (Mnt.). — Chili.
8. *St. crocata* (L.). — Britannia, Hispania, Afr. occid. et merid., Ins. Mascaren., Java, Nova Holl., N. Zelandia, America fere tota (temperata et calida).
9. *St. gilva* (Thunb.). — C. B. Sp., Java, Australia. — Est *St. Eckloni* Spr. Syst. Veget. IV, 2, p. 330.
10. *St. carpoloma* (Del.). — Chili, N. Zeland., Tasmania, Polynesia, Java, Ins. Borbonia.
11. *St. Mougeotiana* (Del.). — Ins. Afr. merid., Java, Polynesia, Guyana.
12. *St. hirsuta* (Mnt. pr. p.) Nyl. Lich. Scandin. p. 95. — Chili, Brasilia.

b. *Cyphellatae*.

13. *St. cometia* (Ach.). — Peruvia.
14. *St. Humboldtii* (Hook.). — Mexico, N. Granata (coll. Lindig n. 707).
15. *St. tomentella* Nyl. — Peruvia.
16. *St. gyalocarpa* Nyl. — Nova Granata. Var. *hirta* Nyl. in Mexico.
17. *St. Kunthii* (Hook.). — Amer. calida montana. Var. *pilosella* Nyl. N. Granata.
18. *St. Lenormandii* (v. d. B.). — Cum priori.
19. *St. tomentosa* (Sw.) et var. *dilatata* Nyl. — In Americae regionibus calidis montanis plurimis. Valde variabilis (etiam thallo subtus subnudo). — Var. *pericarpa* Nyl. Peruvia.

20. *St. quercizans* (Mich. pr. p., *Weigeli* Ach.), America (latissime ibi distributa), Africa tropica, India or., Polynesia, Tasmania. — Var. *Peruviana* in Amer. calida et Var. *Gaudi-chaudii* (Del.) in maxime meridionali. Var. *lutescens* (Tayl.) in Ins. Sandwicensibus et in Java.
21. *St. Ambavillaria* (Bor.). — C. B. Sp., Ins. Mascaren. et Sandwic.
22. *St. limbata* (Sm.). — In Europa maxime occidentali. — Var. *umbilicariiformis* (Hochst.) in Abyssinia. * *Andensis* Nyl. Bolivia (Nyl. Lich. Boliv. p. 372), Nova Granata (coll. Lindig. 1863, n. 124).
23. *St. fuliginosa* (Dicks.). — Europa temperata et merid., Afr., Amer., N. Zelandia.
24. *St. sylvatica* (L.). — Eur., Amer. bor. — * *Dufourei* (Del.), Eur., Ins. Canar.
25. *St. Boschiana* (Mnt.). Java.
26. *St. filicina* (Ach. pr. p.). Amer., Polynesia. — Var. in Java (huc *filicina* Mnt. et v. d. Bosch-Jav. saltem pro parte) et in India or. (coll. Hook. Thomps. 2004).
27. *St. filicinella* Nyl. Columbia.
28. *St. ciliaris* Mnt. et v. d. B. Java.
29. *St. orbicularis* (Al. Br., *St. marginalis* Bor.). Ins. Borbonia.
30. *St. peltigerella* Nyl. Nova Granata (coll. Lindig. 2533).

c. *Lobaria* Bab.

31. *St. scrobiculata* (Scop.). Eur., As., Amer. sept.

II. *Sticta* (Ach. pr. p.).

a. *Lobariae* Bab.

1. *St. retigera* Ach. — C. B. Sp., Madag., Java, Ind. or. Sibir. or.
2. *St. pulmonacea* Ach. — Eur., Afr., Asia, Amer., Austral.
3. *St. linita* Ach. — Eur., Amer. arct.

b. *Cyphellatae*.

4. *St. laciniata* Ach. Amer.
5. *St. carpolomoides* Nyl. Java, Philippin., Nova Caledonia.
6. *St. lineariloba* (Mnt. Chil., non Jav.). Chili. Var. *hypopsila* Nyl. ibidem.
7. *St. dichotomoides* Nyl. Taiti.
8. *St. damaecornia* (Sw.). Hibernia, America, Africa, Java, Po-

- lynesia, Australia. — Var. *sinuosa* (Pers.), parum differens, in America, Philippinis. — Var. *macrophylla* (Del.) fere aequè distributa ac typus in terris exoticis. — Var. *caperata* (Bor.) in Ins. Borbonia, Java, Polynesia. — Var. *subcaperata* Nyl. (thallo tenuiore quam in *caperata*) in Nova Zelandia ¹⁾.
9. *St. dichotoma* Del. Forte separanda a priore. Ins. Borbonia, Mauritii, Java.
 10. *St. platyphylla* Nyl. India or.
 11. *St. variabilis* (Bor.). — Ins. Borbon., Mauritii, Java, Polynesia, Nova Hollandia.
 12. *St. Filix* Hffm. Pl. Lichen. t. LV. Nova Zelandia. Etiam ibi var. *parvula* Nyl. (thallo multo tenuiore, magis dissecto). Omnino separanda est haec species a *Stictina filicina* (Ach.) Nyl. Syn. Lich. p. 349 (exclusa novo-zelandica, quae *Stictam filicem* sistit); magis accedit sequens.
 13. *St. latifrons* Rich. et var. *Menziesii* (Hook.). Nova Zelandia. Gonidia diam. 0,009—0,023 millim.
 14. *St. hypopsiloides* Nyl. Lich. Nov. Caled. n. 42. Nova Caledonia.
 15. *St. subcoriacea* Nyl. Nova Zelandia ²⁾.
 16. *St. cinereoglauca* Tayl. Nova Zelandia.

c. Pseudocyphellatae.

17. *St. endochrysea* Del. Chili. Var. *vaccina* Mnt. ibidem.
18. *St. nitida* Tayl. Chili.
19. *St. Urvillei* Del. Chili, Nova Zelandia. Varr. *orygmaeoides* Nyl. et *flavicans* (Hook.) ibidem. Var. *Colensoi* (Bab.) in Tasmania et Nova Zelandia.
20. *St. orygmaea* Ach. Cap Horn, Tasmania, Nova Zelandia, ins. Auckland.
21. *St. aurata* Ach. Eur. occid., Afr., Asia tropica, Polynesia, Australia, Nova Zelandia.
22. *St. rubella* Hook. et Tayl. Tasmania, Nova Zelandia.
23. *St. granulata* Bab. Ad Fret. Magellanicum (Lechl. Pl. Magell. nis. 984, 985), Tasmania, Nova Zelandia.

1) Lecta ibi a Dre. Lauder Lindsay, 1861. Sporae longit. 0,026—46 millim., crassit. 0,009—0,011 millim. Accedit versus *Stictam variabilem*, sed facies fere *caperatae* Bor.

2) Legit ibi optimam Dr. Lindsay. Facie est *Stictae damaecornis* majoris firmioris, sed *St. subcoriacea* thallum habet superficie coriaceo-ruguloso, ambitu supra albo-pilosulum (accedit ad *Nicasollam corticeam* Tayl., at differt thallo magis divise, receptaculis medioribus, cyphellis, etc.).

24. *St. obvoluta* Ach., Nyl. Lich. Scand. p. 95, Lich. Nov. Caled. p. 41, et var. *Guillemini* (Mnt.). Chili. *St. obvoluta* datur in Lechl. Pl. Magell. n. 1010.
25. *St. dissimulata* Nyl. Java, Chili. * *St. multifida* Laur. Nova Zelandia, Polynesia.
26. *St. fossulata* Duf. Australia, Nova Zelandia, Chili. In Nova Zelandia formae 1) *Richardii* Bab.; 2) *subcyphellatu* Nyl. et 3) *cellulifera* Tayl.; in Tasmania et Chili typica (*Labillardieri* Del.). Var. *phycospora* Nyl. in Nova Hollandia, N. Zelandia et ins. Auckland.
27. *St. punctulata* Nyl. (*quercifolia* Tayl.). Philippin., Java, Ceylon.
28. *St. prolificans* Nyl. Lich. Nov. Caled. p. 42. Nova Caledonia.
29. *St. Freycinetii* Del. Chili, Australia, Nova Zelandia et in insulis antarcticis. — Var. *isidioloma* Nyl. in N. Zelandia. — Var. *lactucaeifolia* Pers. In America maxime meridionali.
30. *St. episticta* Nyl. Nova Zelandia¹⁾.

III. *Ricasolia* DN.

Speciesbus hujus generis 15 expositis in mea Synopsi Lichenum (pp. 365—378) nulla postea accessit parumque circa distributionem geographicam earumdem. Inutile igitur sit ut hic speciatim enumerentur. Solum in Nova Zelandia occurrit adnotanda forma *Ricasoliae herbaceae* (Huds.) satis recedens, ut forte specie distingui debeat; dicatur f. *adscripta* differtque ab *herbacea* thallo adpresso nonnihil tenuiore et infra passim fere subnudo cephalodiis haud raris munito. *R. erosa* (Eschw.) dicenda est *R. Ravenelii* (Tuck).

L i t t e r a t u r.

Synopsis der Nadelhölzer von Henkel und Hochstetter.
Stuttgart. J. G. Cotta. 1865. 8.

Mit Recht heben die Verf. dieses Werkes hervor, dass eine neue Darstellung der Coniferen (über die in Deutschland seit

1) Detexit ibi Dr. Lindsay, 1861. Accedere videtur ad *Stictam Freycinetii*, sed color thalli alius (albido-pallens vel pallido-glaucescens), cyphellae nullae (vel pseudo-cyphellae valde obsoletae), puncta pseudo-cyphelloidea in pagina superiora thalli. Variat color fuscescens.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Nylander William

Artikel/Article: [Enumeratio synoptica Sticteorum 296-299](#)