

# FLORA.

56. Jahrgang.

Nº 2.

Regensburg, 11. Januar

1873.

**Inhalt.** W. Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. — Dr. Hugo de Vries: Bericht über die im Jahre 1871 in den Niederlanden veröffentlichten botanischen Untersuchungen. Fortsetzung. — Dr. Heinrich Wawra: Beiträge zur Flora der Hawaï'schen Inseln. Fortsetzung. — Käufliches Herbarium.

## Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.

Continuatio quinta decima. — Scripsit W. Nylander.

### 1. *Pyrenopsis pleiobola* Nyl.

Thallus obscure umbrino-fuscus, sat tenuis, demum areolato-diffractus (crassit. 0,25 millim.); apothecia concoloria innata parva, extus parum visibilia; thecae polysporae, sporae circiter 32nae subglobosae, diam. circiter 0,004 millim., paraphyses nullae. Jodo gelatina hymenialis thecarum coerulescens, dein vinoze fulvescens.

Ad saxa dioritica prope Onegam (Norrlin).

Thallus lamina tenui visus rubicosus. Affinis *P. subfuliginea* sporis 8nis majoribus mox differens.

### 2. *Pannaria furfurascens* Nyl.

Thallus nigricans vel olivaceo-nigricans, tenuis, furfuraceo-gramulosus; apothecia nigricantia vel fusca, planiuscula vel convexiuscula (latit. circiter 0,5 millim.), immarginata, intus pallida; sporae 8nae ellipsoideae simplices, longit. 0,015—0,020 millim, crassit. 0,008—0,011 millim., paraphyses mediocres articulatae, epithecium lutescens, hypothecium incolor. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae vinoze fulvescentes.

1) *P. Flotoviana* (Hepp) et affines genus constituere videntur proprium, cui nomen *Collemopsis* dare conveniat.

Flora 1873.

2

In Finlandia orientali (Norrlin) supra terram inter Cladonias et muscos.

Facile dignota inter congeneres et a *P. deficiente*, forsan proxima, mox apotheciis nigrificantibus. Apothecia juniora marginata.

### 3. *Lecanora subcircinata* Nyl.

Diffr. a *L. circinata* jam thallo K e flavescente mox croceo-rubescente.<sup>1)</sup>

Ad saxa in Gallia et Italia.

Huc pertinet tamquam varietas *Squamaria circinata* var. *farinosa* Anzi Symb. p. 7.

### 4. *Lecanora cyrtellina* Nyl.

Thallus albidus vel albido-cinerascens, tenuis subrugoso-inaequalis, subrimosus, indeterminatus; apothecia fusca biatorina immarginata (latit. 0,2—0,4 millim.), margine scilicet cito revoluto excluso, intus albida; sporae 8nae oblongae vel fusiformi-oblongae simplices, longit. 0,008—0,011 millim., crassit. 0,002—3 millim., paraphyses non discretae, epithecium subicolor, thalamum hinc inde vage obscuratum. Jodo gelatina hymenialis viuose rubescens.

Ad corticem Sorbi aucupariae prope Petrosavodsk juxta One-gam (Norrlin).

Est *Lecanora* stirpis *L. umbrinae*, nam gonidia inveniuntur in margine revoluto apotheciorum et spermatia sunt arcuata (long. 0,011—16 millim., crassit vix 0,001 millim.). Sporis simplicibus mox differt a comparanda *cyrteilla* et paraphysibus non discretis a *L. piniperda* aliisque.

### 5. *Lecanora lividella* Nyl.

Affinis videtur *L. piniperdae*, sed apothecia livida. Spermatia duplo majora. Apothecia livido-caesia (latit. vix 0,25 millim.), convexiuscula, immarginata, epithecium dilute sordidum K violaceo-dissolutum. Sporae oblongae minutae, longit. 0,007—8 millim., crassit. 0,002—3 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae obscuratae.

Supra *Polyporum igniarium* in Finlandia boreali, Kuusamo (Silén).

Potius sit hoc quam ad viciniam *Lecideae globularis* ducenda.

1) Sic etiam *L. alphoplaca* specie differt a *L. melanaspide*.

### 6. *Lecanora praepostera* Nyl.

Thallus albidus tenuis sublaevigatus areolato-rimosus, ambitu bscure limitato (passim subfimbriato); apothecia nigricantia paca glaucescenti-suffusa (vel subdenudata), mediocria, margine hallino ruguloso vel subcrenato cincta; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,009—14 millim., crassit. 0,005—6 millim., paraphyses racilescentes, epithecium lutescenti-inspersum. Jodo gelatina hymenialis coerulescens (thecae praesertim tinctae).

Ad saxa basaltica in Jersey (Larbalestier).

Thallus K e flavo mox cinnabarino-rubescente. Facile sumatur pro varietate *L. atrynae (ceniseae)* Ach., sed differt jam reactione halli et gelatinæ hymenialis alia, sporis minoribus, etc. Affinior est *L. ochroideæ* Ach., at distinguuntur similiter fere reactionibus permatiis magis arcuatis, etc.

### 7. *Lecanora coniopta* Nyl.

Thallus fusco-cinereus mediocris (crassit. 0,5—0,9 millim.), inaequalis, rimoso-diffractus; apothecia nigra innata, parum marginata, demum convexiuscula immarginata (latit. 0,5—0,8 millim.), intus albida; sporae 8nae fusco-nigrescentes ellipsoideae 1-septatae, longit. 0,015—20 millim., crassit. 0,008—10 millim. epithecium fuscum, paraphyses mediocre subarticulatae, hypothecium neicolor. Jodo gelatina hymenialis bene coerulescens.

In Scotia, ad saxa gneissica in oris Kincardine (Crombie).

Comparari possit cum *Lecidea coniope*, sed est revera *Lecanora* lecideoides; spermogonia arthrosterigmatibus munita, sphaeridia tenuiter bacillaria, longit. 0,0045 millim., crassit. 0,005 mill. Affinis est *Lecanora sciodes* Nyl., e Pyrenæis orientalibus, quae faciem fere offert *Lecidea rivulosa*.

### 8. *Lecanora pseudopetraea* Nyl.

Thallus cinereus, grosse granulatus vel verrucoso-granulatus, mediocris (crassit. 1 millim. vel tenuior); apothecia nigra innata lecidea plana, marginata vel immarginata (latit. circiter 0,5 millim.), intus concoloria; sporae 8nae fuscae 1-septatae, longit. 0,013—18 millim., crassit. 0,007—9 millim., epithecium et hypothecium fusca paraphyses mediocre clava fuscescente. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose rubescens.

Ad saxa gneissacea prope La Mothe St. Héray in Gallia occidentali (J. Richard).

Omnino *Lecidea* haberetur, sed spermogonia exacte sicut in *Lecanora sciode* et *coniopta*, cur potissima ejusdem sit stirpis.

9. *Lecidea leucophaeopsis* Nyl.

Thallus albidus, e squamulis constans parvis rotundato-diformibus (latit. circiter 0,5 millim.) adnatis medioque depresso, dispersis aut contiguis; apothecia fusco-nigra opaca convexa (latit. circiter 1 millim.), intus concoloria (strato hymeniali obscure cinerascente); sporae 8nae incolores fusiformes 3—5-septatae, longit. 0,024—34 millim., crassit. 0,005—8 millim., paraphyses gracilescentes (non semper bene distinctae), epithecium et hypothecium luteo-fuscescentia. Jodo gelatina hymenialis coerulescens (thecae deinde vinose rubescentes).

Ad rupes quartzosas montis Ben Lawers in Scotia (Crombie).

Thallus K+ (flavens). Species ab omnibus cognitis recedens, forsitan prope *Lecideam subuletorum* disponenda. Specimen visum sine spermogoniis.

10. *Lecidea austera* Nyl.

Subsimilis *Lecideae subincompta*, sed thallo (fusco-nigricante) areolato, sporis brevioribus (3-septatis, longit. 0,015—18 millim., crassit. 0,0035 millim.).

Ad saxa calcarea dura in Finlandia orientali (Norrlin).

11. *Lecidea dolera* Nyl.

Thallus albidus inaequalis; apothecia sanguineo-nigricantia vel fusco-rufa, adnata, plana marginata (latit. 0,5—0,9 millim.), intus nigricantia (strato hymeniali pallido); sporae 8nae aciculares longit. 0,030—32 millim., crassit. 0,002 millim., paraphyses graciles, epithecium incolor, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, coerulescentia persistente.

Ad corticem abietis in Finlandia media (Norrlin).

Externa facie est *Lecideae tenebricosae*, sed sporae fere *arceutinae* et hypothecium infuscatum.

12. *Lecidea mesotropiza* Nyl.

Thallus albidus verrucosus mediocris (K+ flavens); apothecia nigra convexa (latit. 0,7—1,4 millim.), immarginata, intus coerulescenti-cinerascente; sporae 8nae incolores ellipsoideae, longit. 0,011—12 millim., crassit. 0,007 millim., paraphyses non bene discretae, epithecium obscure smaragdino-coerulescens (thalamum supra similiter dilutius tinctum). Jodo gelatina hymenialis coerulescens, thecae violacee tinctae.

Ad saxa schistosa murorum prope Abredonian in Scotia (Crombie, qui adnotavit: apothecia aliquando leviter pruinosa).

A *L. mesotropoide* mox differt thallo albido verrucoso (verrucis rugulosis), epithecio coerulecente, etc.

### 13. *Lecidea phylliscina* Nyl.

Thallus nullus visibilis; apothecia nigra phylliscoidea (latit. millim. vel quidem majora), crassa (crassit. 0,5 millim.), obtuse nmarginata et sublobulata, intus concoloria; sporae rite evolutae non visae, paraphyses fere mediocres, thalamium supra utescenti-fuscescens, hypothecium cum perithecio (lamina tenui) utescenti-infuscatum crassum (K purpurascens). Jodo g. b. intense coerulecents, thecae deinde vinose rubescentes.

Ad saxa argillaceo-schistosa in regione Onegensi (Norrlin).

Species sine dubio distinctissima, sed sporis nondum evolutis solum visa. Comparetur *L. proludens*, at nulla cognita affinis. Apothecia saepe aggregata; etiam haud raro umbonata.

### 14. *Lecidea praenubila* Nyl.

Thallus pallidus, minute areolatus, areolis (latit. circiter 0,25—0,45 millim.) innatis albido-obductis supraque rimosis, in hypothallo nigro tenui supra cinerascente et tenuiter rimuloso sparsis aut contiguis; apothecia nigra opaca (latit. circiter 0,5 millim.), obtuse marginata vel demum convexiuscula immarginata, intus obscura; sporae 8nae incolores ellipsoideae, longit. 0,012—16 millim., crassit 0,006—8 millim., epithecium smaragdino-infuscatum, paraphyses mediocres, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis intense coerulecents.

Ad saxa quartzosa in Finlandia orientali (Norrlin).

Ad stirpem pertinet *L. fuscoatrae* vel *tenebrosae*, sed notis datis est omnino distincta species.

### 15. *Lecidea subnigra* Nyl.

Thallus fusconiger tenuis subgranulosus; apothecia nigra convexa immarginata (latit. 0,5 millim.), intus obscura; sporae 8nae incolores fusiformes vel oblongae; simplices (vel obsolete 1-septatae), epithecium vage smaragdino-coerulecents, paraphyses crassiusculae non bene discretae, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens, praecedente coerulecentia.

Ad saxa calcarea in regione Onegensi ad Tindie (Norrlin).

Facile distinguenda species, saxum nigro maculans, forsitan potissimum prope *Lecideam encliticam* locum habens. Lamina tenuis apothecii fere sicut in *L. subincompta*.

16. *Lecidea platycarpiza* Nyl.

Thallus albidus vel sordidus, tenuis, rugulosus, aut evanescens; apothecia nigra opaca plana marginata, vel demum convexiuscula immarginata (latit. 0,4—0,7 millim.), intus concoloria; sporae 8nae incolores ellipsoideae vel suboviformes, 1-septatae, longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,004—5 millim., paraphyses mediocres apice incrassato coerulescente (inde thalamium et praesertim epithecium coerulescentia), hypothecium nigrum. Jodo gelatina hymenialis vinoise rubens.

In Finlandia orientali (Norrlin), ad saxa calcarea.

Affinis est *Lecideae athallinae* Hepp Flecht. No. 499, quae differt apotheciis immarginatis, hymenio altiore, hypothecio fusco etc.

17. *Arthonia chroolepida* Nyl.

Thallus albido-flavescens subfarinaceus vel tenuissime subtomentosus; apothecia sanguineo-atra opaca superficialia, oblonga subdifformia (latit. 0,3—0,5 millim.), convexiuscula, intus obscura; sporae 8nae incolores oblongo-oviformes (vel oblongae apice supero crassiores) 3-septatae, longit. 0,009—13 millim., crassit. 0,003—4 millim., hymenium (lamina tenui) lutescens et epithecium infuscatum. Jodo gelatina hymenialis vinoise fulvescens.

Ad ramulos abietinos emortuos prope Onegam (Norrlin).

Thallus quasi e Chroolepo constare videtur, cellulis diametro transversali circiter 0,025 millim.<sup>1)</sup> Gonidimia hymenalia adsunt glomerulis viridibus majusculis ellipsoideis passim in hymenio instratis inter thecas, quibus hi glomeruli multo sunt maiores.

---

*Calicium praestantius* Nyl. vix est nisi var. *Calicium parietini*; fere majus, sporis longit. 0,011—16 millim., crassit. 0,004—7 millim. In Finlandia media, ad corticem populi (Norrlin).

*Parmelia subaurifera* Nyl. Est quasi *P. glabra* thallo supra passim sorediis flavis parvis efflorescente. Ad corticem pini, populi et salicis in Finlandia et quoque ibi lignicola.

*Lecanora firma* (Nyl.) propria species videtur, ex spermogoniis visis.

*Pertusaria amara* (Ach. sub *Variolaria*) est bona species. Optime fructiferam legit ad corticem Carpini prope La Mothe cl. Richard. Thecae monosporae.

---

1) *Syngonidium* dico gonidia varie cuncta et *Syngonium* gonimia variis modis nidulantia in glomerulis vel vaginis ea involventibus.

*Lecidea lavata* Ach. specie distinguenda est a *L. petraea*.  
*Lecidea enalliza* Nyl. non differt a *L. myriocarpoide* Nyl.  
*Celidium subfuscum* Arn. est *Lecidea*, quam dicere liceat *L. subfuscum*. In Gallia occidentali supra *Lecanoram subfuscum* (*campestrem* Schaeer.) legit eam Richard.

---

## Bericht über die im Jahre 1871 in den Niederlanden veröffentlichten botanischen Untersuchungen.

Von

Dr. Hugo de Vries in Amsterdam.

(Fortsetzung.)

Ueber die chemische Constitution der Terpenharze und ihre Entstehung in den Pflanzen lieferte Dr. A. P. N. Franchimont eine ausführliche Arbeit<sup>1)</sup>), deren botanischer Theil vom Verfasser schon in dieser Zeitschrift Jahrg. 1871, S. 225 mitgetheilt wurde. Einem im „Nederl. Kruidk. Archief“ (2. Reihe, Heft I, S. 115) erschienenen Auszug<sup>2)</sup> aus seiner Arbeit fügte Franchimont Abbildungen in Farbendruck von Längs- und Querschnitten junger Zweige von *Pinus Laricio* zu, in denen durch vorheriges Aufbewahren des ganzen Sprosses in einer wässrigen Lösung von *Acetas cupricus* das Harz grün, die Gerbsäure braun gefärbt war. Diese Abbildungen zeigen nicht nur deutlich die anatomische Lage der harzführenden Intercellularräume und der Gerbsäure enthaltenden Parenchymzellen, sondern liefern auch einen Beweis für die Zweckmässigkeit dieser zuerst vom Verfasser empfohlenen Untersuchungsmethode.

Für die Parenchymzelle der rothen Runkelrübe habe ich versucht, den Nachweis zu liefern, dass das lebendige Protoplasma für viele in Wasser lösliche Körper keine oder nur eine äusserst geringe Permeabilität besitzt.<sup>3)</sup> Als Ausgangspunkt diente die durch Nägeli bekannte Thatsache, dass das lebendige Protoplasma für Farbstoffe nicht permeabel ist, und die Beobachtung, dass aus

1) Dr. A. P. N. Franchimont. Bydrage tot de kennis van het ontstaan en de chemische constitutie der zoogenaamde terpeenharsen. Leiden 1871. 8°. 133 S.

2) Uebersetzt in den Arch. Néerl. des Sc. exact. et natur. VI. 1871. p. 426—433. (Pl. VIII.)

3) Sur la permeabilité du protoplasma des betteraves rouges; Arch. Néerl. des Sc. exact. et natur. 1871. VI. p. 117—127.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Nylander William

Artikel/Article: [Addenda nova ad Lichenographiam europaeam 17-23](#)