

65. *Phoma macrothecium* Thm. nov. spec.

Ph. peritheciis amphigenis, sed praecipue epiphyllis, exsertis tuberculaeformibus, orbicularibus, epidermide expallescentia tectis, postremo liberis, atris; sporis numerosissimis, longo-ovoideis, utrinque minime acutatis, non septatis, binucleatis, interdum concatenatis, 10—12 mm. long., 3,5—4 mm. crass., hyalinis. — Ad folia viva *Vieusseuxiae grandiflorae* Eckl. (*Moraceae grandiflorae* Thnbg.) in summo montis „Boschberg“ pr. Somerset-East, Promont: bonae spei. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1240.)

66. *Depazea Buddleiae* Thm. nov. spec.

D. peritheciis sparsis, erumpentibus in foliorum paginae superioris macula rufo-brunnea, distincta, minutis, atris; sporidiis fusi-formibus, curvatis, uni-sed pro maxima parte non septatis, 20 mm. long., 6 mm. crass., hyalinis. — In foliis vivis *Buddleiae auriculatae* Benth. in dumetis montis „Boschberg“ prope Somerset-East, Promont: bonae spei, in consortione *Meliolae quinquespore* Thm. Aut. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1251.)

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.

Continuatio sexta et vicesima.. — Exponit W. Nylander.

1. *Collemopsis assimulans* Nyl.

Thallus fuliginosus scabridulo-opacus vel rugulosus, tenuis, areolato-rimosus; apothecia concoloria, demum lecanoroidea (latit. 0,2—0,3 millim. vel minora) et tenuiter thallino-marginatula; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,007—9 millim., paraphyses vix ullae. Jodo gelatina hymenialis dilute coeruleascens, dein thecae lutescentes.

Supra saxa riparia in Finlandia, Korpilahti (Norrlin.).

Facie est simul obviae *Pyrenopseos concordatulae* Nyl. in Flora 1875, p. 440, at thalli cellulae non rubricosae, sed superiores fuscescentes vel fusco-virescentes. Affinis vero est *Collemopsis Schaereri*, quae apothecia habet majora, cellulas thalli dilutiores et magis virescentes, minores etc. Epithecium lutescens.

2. *Cladonia frondescent* Nyl.

Subsimilis *Cladoniae cornucopioidi*, sed thallo foliolifero, foliolis flabellato-pinnatifidis (basi stipitata firma, laciniis ambitu

subcrenulato); scyphis parum evolutis. Sporae fusiformi-oblongae, longit. 0,006—0,010 millim., crassit. 0,003 millim.

In Finlandia, Holola, super saxa muscosa (Lang).

Distinguenda podetiis stenophyllo-folioliferis. 1) Podetia altit. 3 centimetra, vel minora, saltem semel prolifera; foliola subtus subnervosa (longit. 6 millim. vel minora).

3. *Physcia tribaciza* Nyl.

Est quasi *Ph. tribacia* (Ach.) minor, thallo subcaesio-albido, laciniis magis incisissimis, marginibus saepius sorediosis. Sterilis.

Supra saxa praerupta ad Helsingfors (Norrlin).

Facile sit subspecies *Physciae stellaris*, quacum reactione $K+$ convenit. A. *Ph. tenella* Scop. saxicola distat laciniis non fornicatis et fibrillis obsoletis vel vix ullis.

4. *Parmelia subsoredians* Nyl.

Similis *Parmeliae soredianti* Nyl. in Flora 1872, p. 426, sed medulla $K-$ absolute differt nec verisimiliter desunt aliae differentiae, at specimen modo sterile visum.

In Gallia, Mont-Dore, super corticem *Sorbi Ariae* (legit. E. Lamy).

5. *Lecanora subluta* Nyl.

Vix nisi varietas est *Lecanorae galactinae* Ach., thallo effuso albido, minute granulato; apotheciis testaceo-pallidis confertis; sporae longit. 0,010—12 millim., crassit. 0,005—6 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, deinde thecae violaceo-fulvescentes.

Supra saxa siccata in Hibernia ad Kylemore (Larbalestier).

Variat thallo minus effuso et quoque (f. *perspersa*) apotheciis sparsis (analogae *dispersae* Pers.).

6. *Lecanora spodomela* Nyl

Thallus cinereo-fuscus tenuis opacus subleprosus, passim rimoso-diffractus; apothecia nigricantia (latit. 0,4—0,5 millim.), margine thallino subintegrò cincta; sporae 8-nae incolores ellipsoideae, saepius 1-septatae, longit. 0,011—16 millim., crassit. 0,006—7 millim.

Analogae sub hoc respectu adest cum *Cladonia corallifera* Kunz., quae datur in collectione Amaz. Spruce no. 31.

lim., paraphyses graciles, epithecium coerulescens. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein violaceo-tincta.

Supra saxa arenacea prope Kylemore, Delphi etc. in Hibernia occidentali (Larbalestier).

Species peculiaris e stirpe *Lecanorae disparatae*, uti thallor, facie autem *L. sophodis*.

7. *Eccidea arridens* Nyl.:

Thallus albus vel albidus, tenuissimus, planus, rimosus, dispersulus; apothecia laete carneo-rosea, planiuscula, immarginata (latit. circiter 0,5 millim.), irregularia, margine spurio irregulari albo epithallino saepius munita, intus disco concoloria, sporae 8nae ellipsoideae simplices, longit. 0,014—18 millim., crassit. 0,007—0,010 millim., paraphyses sat graciles non confertae, perithecium cum epithecio et hypothecio incolor. Jodo gelatina hymenialis vinose fulvo-rubescens.

Supra saxa decomposita prope Lenane in Hibernia occidentali (Larbalestier).

Species est concinna e stirpe *Lecideae coarctatae*. Thallus nec K nec CaCl reagens.

8. *Lecidea paucula* Nyl.

Thallus virescens tenuissimus laevis continuus; apothecia livido-fusca minuta convexa immarginata (latit. 0,25 millim. vel minora), intus sub hymenio infuscata; sporae 8nae ellipsoideae simplices, longit. 0,006—7 millim., crassit. circiter 0,003 millim., paraphyses non discretae, epithecium incolor, hypothecium totum fuscum. Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens.

Supra saxa schistosa in montibus Hiberniae occidentalis ad Kylemore (Larbalestier).

Ad stirpem pertinet *Lecideae botryoidis*, notis affatis bene distincta.

9. *Lecidea thiopsoa* Nyl.

Thallus sulphureo-albidus granulato-conglomeratus, e granulis constans subpulvinato-concrescentibus (pulvinulis planiusculis latit. 1—3 millim. vel varie confluentibus), K flavo-reagens; apothecia nigra convexa (latit. fere 1 millim. vel minora), saepe 2—4 con-nata, intus concoloria; sporae 8nae bacillares vel subaciculares,

longit. 0,022—30 millim., crassit. 0,0025—0,0035 millim., paraphyses graeciles non bene discretæ, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis vix tineta, thecae (praesertim apice) coerulescentes.

Supra Jungermannias montium ad Kylemore in Hibernia (Larbalastier).

Species facile e stirpe propria. Gonidia diam. 0,004—6 millim. Sporae rectae vel rectiusculae, tenuiter 3-septatae. Spermogonia nondum visa.

10. *Lecidea supernula* Nyl.

Apothecia nigra plana marginatula vel demum convexa immarginata (latit. 0,4 millim. vel minora), intus concoloria; sporae 8nae incolores oblongo-oviformes, 1-septatae, longit. 0,009—0,014 millim., crassit. 0,004—5 millim., paraphyses mediocres vel fere crassiusculae, apice clavato coerulescenti-nigricante, hypothecium (cum perithecio) coerulescenti-nigricans supra rubricosco-rufescens. Jodo gelatina hymenialis vinose rubens.

Parasita supra *Lecanoram calcaream* (Hoffmanni Ach.) in insula Lismore Scotiae borealis (Crombie).

Species sine dubio affinis *Lecideae arthonizae*. Apothecia 3—6 vulgo aggregata crescunt.

11. *Lecidea alumnula* Nyl.

Thallus albus tenuis, maculatim vel insulatim crescens, iussulis sublobatulis (latit. 1—3 millimetrorum); apothecia nigra subinnata (latit. 0,2—0,3 millim.), plana, marginata et saepe centro umbonata, intus concoloria; sporae 8nae incolores ellipsoideae simplices, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,005—6 millim., paraphyses non discretæ, epithecium et hypothecium cum perithecio fusco-nigricantia. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae subvinose tinetae.

Super thallum *Lecideae contiguae* saxicolae (optime vegetae et spermogoniis fetissimunitae), in rivulo prope Letterfrack in Hibernia (occidentali) (Larbalastier).

Pertinet ad stirpem *Lecideae contiguae*. Thallus K non reagens. — Omnia analoga sunt *L. umbonellae* Nyl. in Flora 1866, p. 372, quae tangit *Lecideam lacteam* Flk.

12. *Lecidea perluta* Nyl.

Thallus albido-glaucescens, vel passim ochraceo-glaucescens, tenuis, continuus, rimosus; apothecia ferrugineo-rufescentia vel ferrugineo-fuscescentia, plana, marginata (latit. circiter 1 millim.), margine saepius dilutiore, intus subconcoloria, sporae 8-nae incolores ellipsoideo-oblongae murali-divisae, longit. 0,030—0,042 millim., crassit. 0,013—0,016 millim., paraphyses glauciscentes sat regulares, (in lamina tenui) epithecium et perithecium lateo-rufescentia, hypothecium (saltem centro) obscurum, nonnihil rufescens. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae obscure vinose fulvescentes.

Supra saxa quartzosa in Erriff River Hiberniae occidentalis (Larbalestier).

Fere est *L. ochrotropa* Nyl. in Flora 1875, p. 445, aquatilis, praecipue differens thallo continuo et apotheciis magis biatorinis. Hic Lichen etiam demonstrat, quomodo fallax est distinctio inter *Biatoras* et *Lecideas*, nam sistit *L. perluta* omnino *Biatoram*, tamen nexu affinitatis locum systematicum habet prope *Lecideam excentricam*.

13. *Graphis ramificans* Nyl.

Similis fere *Graphidi striatulae*, sed apotheciis dendroideo-ramosis. Sporae (demum dilute nigrescentes) 10—12-loculares, longit. 0,032—45 millim., crassit. 0,008—0,010 millim.

Supra corticem Ilicis in Hibernia occidentali (Larbalestier).

Thallus macula albida subrugulosa indicatus (K flavescens, dein aurantiaco-tinctus). Apothecia atra nuda striatula, parum prominula (latit. circiter 0,25 millim.). In *Graphide dendroide* Leight. comparanda (Spruce coll. Amaz. no. 285) apothecia hypothecio nigro et sporae incolores 12—14-loculares (longit. 0,048—62 millim., crassit. 0,010—11 millim.).

14. *Arthonia dispuncta* Nyl.

Thallus cinerascens vel cinereo-virescens, tenuis, ruguloso-inaequalis, late effusus et saepe tenuissimus, apothecia nigricantia vel fusconigra, rotundata (latit. 0,2—0,4 millim.) sic depressiuscula, adhaer., intus obscura, sporae 8-nae oblongo-oviformes 1-septatae, longit. 0,040—15 millim., crassit. 0,003—4 millim. Jodo gelatina hymenialis vinose purpureascentia, saep.

Late distributa videtur in Europa. Sorbicola in Finlandia; acericola in Hungaria (infra alpem Retyezat legit Lojka et distribuit no. 2224).

Ante cum *A. patellulata* fuit commixta quacum variis notis convenit, sed differt thallo alio et sporis minoribus. Gonidia globulosa, diam. 0,007—0,016 millim. Pertineat ad stirpem *A. spadiceae*. *A. mediella* parum, nisi sporis, distat.

Thallus sordidus, obscurus.

millim 22—710.0

15. *Arthonia hypobela* Nyl.

Thallus macula albidus obsoleta vaga indeterminataque indatus; apothecia nigra minuta rotundata vel oblongiuscula (latit. 0,2 millim. vel minore), parum prominula; sporae 8nae incolores oblongae 3—5-septatae et infra tenuiores demumque in apicem acicularem acuminatae, longit. 0,030—38 millim. (cum mucrone), crassit. 0,005 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose fulvescens.

Supra corticem *Pini sylvestris* ad Brionne in Gallia occidentali (Malbranche).

Species omnino distincta recedensque, sporis infra aciculari-acuminatis vel mucronatis. Gonidia globulosa. In genere prope *Arthoniam mediellam* ¹⁾ est disponenda.

16. *Endocarpon leptophyllodes* Nyl.

Analogum est *E. fluvialis* sicut *E. leptophyllum* est *E. miniati*, thallo cinerascens deminuto, fere adnato, subeffuso (non vero diffracto, ut in *E. brachytico* Hazsl.), subtus fusco. Sporae ong. 0,015—18 millim., crassit. 0,006—7 millim.

Super saxa rivulorum in Haute Vienne (Ripart et Lamy).

Thallus sordidus.

17. *Ferrucaria dissepta* Nyl.

Thallus sordidus.

Thallus (an proprius?) cinereo-albidus (passim leviter ochraceo-tinctus), rimoso-areolatus, tenuis; apothecia pyrenio integre nigro innato (latit. 0,2 millim.), supra convexule prominula; sporae 8nae fuscae ellipsoideae 3-septatae, longit. 0,018—23 millim., crassit. 0,007—0,010 millim., paraphyses mediocres. Jodo gelatina hymenialis non tincta.

Thallus sordidus.

Thallus sordidus.

Thallus sordidus.

¹⁾ *Erronea ea dissecta* fuit inter *Leclideas*.

Super saxa micaceo-schistosa in Hibernia occidentali (Larbalestier).

Species sit e stirpe *Verrucariae thelenae* vel affinis. Thallus forsau *Lecideae*.

18. *Verrucaria faginella* Nyl.

Forsan varietas *Verrucariae epidermidis*, sed apothecia minora subaggregata et sporae nonnihil majores (longit. 0,017—22 millim., crassit. 0,007—8 millim.).

In Gailia supra truncos fagorum prope Limoges (Lamy).

Observationes.

Lecanora luridatula Nyl. in Flora 1875, p. 298, varietas (vel subspecies) est *Lecanorae Hageni* Nyl. in Flora 1872, p. 250. *L. Zosterac* (Ach.) accedere videtur, sed iodo gelatina hymenialis ejus persistenter coerulescens (contra in *L. luridatula* e coerulescente vinose rubescens); sed etiam *L. Hageni* zostericola lecta in Jersey a cl. Larbalestier. — Zw. Exs. 64 comparari possit, at revera est *subluxurians* f. *L. subintricatae*. Comparabilis quoque *L. persimilis* Th. Fr. pertinet ad *L. Sambuci* (Pers.), sporis 8—16nis mox agnoscenda.

Dicatur *sincerior* subspecies vel varietas *Lecanorae erysibes* thallo cinerascanti-pallido vel subochraceo-albido, subgranulato, areolato-rimoso, apotheciis pallido-fuscescentibus lecanorinis. Ad mare in Guernsey et in Hibernia (Larbalestier), in Pyrenaeis orientalibus (ipse).

Dicatur *curvabilis* *Lecanora* omnino similis *L. subdepressae*, sed spermatiis leviter curvulis (longit. 0,008—0,011 millim., crassit. 0,0007 millim.). Sporae longit. 0,017—23 millim., crassit. 0,011—12 millim. Legit eam saxicolam prope Helsingfors E. Lang.

Ut suspicatus sum, *Pertusaria violaria* Nyl. in Flora 1875, p. 299, est *Urceolaria*, apotheciis et spermogoniis deinde lecta a cl. Lamy.

Lecidea tenuicula Nyl. in Flora 1875, p. 293, est solum forma betulicola *L. obscurellae* (*heterellae*).

Nomen *Lecidea meiocarpa*, quod jam 1863 et postea dedit in herbariis plurimis, recipienda sit pro „*L. minuta*“ nomine nrmis commixto dato in *L. Lapp. or.* p. 145. — *L. albobyatina* Nyl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Nylander William

Artikel/Article: [Addenda nova ad Lichenographiam europaeam 571-577](#)