

## Orchideae Kalbreyerianae.

Herr W. Kalbreyer hat für die berühmte Firma Veitch in London, Chelsea, eine Expedition nach dem tropischen Westafrika gemacht, um lebende Pflanzen einzuführen. Obschon die Jahreszeit der Orchideenblüthe ungünstig war, hat derselbe doch ein paar Orchideen getrocknet und mit Erlaubniss des Herrn Veitch mir überbracht. Ich will nicht zögern, sie zu veröffentlichen.

1) *Brachycorythis Kalbreyeri*: spithamea usque ultra pedalis, caule recto seu flexuoso, dense seu distanter folioso, vagina braccata ampla acuminata in basi, foliis ligulatis acuminatis ad duodecim, usque tres pollices longis,  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ , latis, racemo paucifloro, rhachi inter flores minute velutina, bracteis foliaceis ovaria velutina superantibus, sepalis latis oblongis acutis, epalis ellipticis latioribus apiculatis, labello ima basi angulato, amina obovata antice trifida, laciniis lateralibus late triangulis obtusis, obliquis, lacinia media in sinu minute triangula. „Blüthen weisslich. Knollen dick, wollig. Offene Stellen auf Lavagrund zwischen Felsen, 5500'—6300'. Cameroon Mopanza, 25/3 1877“.

Herrn Kalbreyer widme ich diese höchst ausgezeichnete Art, die schönste *Brachycorythis*, deren Blüthen mit denen der *Gymnadenia Helferi* wetteifern können an Grösse.

2) *Eulophia Sandersiana* Rchb. f. „Blüthen tiefbraun. Blüthenstand 1— $1\frac{1}{2}$ , Fuss hoch. Knollen lang, gerundet. Im Gebüsche im Schatten, 2—3000'. Cameroon mountais, 28/3 1877.“

3) *Galeandra gracilis* Lindl. „Blüthen grün mit braun. Ebene Gegenden. Busch. Bonny. 20/2 1877.“

4) *Lissochilus longifolius* Benth. „Blüthen weiss. Offene trockne Savannen. Bonny. 2. 1877.“

5) *Polystachya* sp. nov. pseudobulbo linear-ligulato elongato nonophyllo, folio linear-ligulato obtuse acuto, racemo folio superiori paucifloro, floribus — —. Fand sich unter *Lissochilus longifolius*.

6) *Bulbophyllum (Megaclinium) tentaculigerum*: „pseudobulbo etragono“ foliis cuneato-ligulatis obtuse acutis, pedunculo vaginis ad 5, superioribus amplis laxis, rhachi foliiformi variegata laevi, loribus in lineis excentricis ordinatis, bracteis oblongoligulatis acutis seu acuminatis, demum deflexis, sepalو summo ligulato acuto, sepalis lateralibus oblongis acuminatis, tepalis filiformibus pice spatulatis, aequilongis, labello ancipiti sigmoideo, cariculis

triangulis erectis in basi, columna elongata, basi utrinque alata, apice utrinque acuta. „*Megaclinium tentaculigerum*“. „Blüthe braun, zuletzt gelblich. Offne trockne Stellen auf Lavagrund, 5—6000'. Cameroon Mopanza, 25/3 1877.“

Anm. Soweit ich die Abtheilung *Megaclinium* jetzt übersehe, dürfte es sich gut schicken, diese durch die fadigen Tepala höchst ausgezeichnete Art in eine besondere Gruppe zu stellen mit zwei andern Species mit eben solchen Tepalen. Diese sind:

*Bulbophyllum Sandersoni*: pumilum, pseudobulbis tetragono pyriformibus diphyllo, foliis linearis ligulatis obtuse acutis, rhachi apice dilatata pauciflora, bracteis triangulis acutis, sepalo summo ligulato sursum linearis caudato, sepalis lateralibus triangulis intus scabris, tepalis linearis subulatis a basi latiori, labello triangulo lobulato membranaceo, columna trigona. „*Megaclinium Sandersoni* Oliver Bot. Mag. 1871 sub 5936. (nomen) Natal Sanderson Nr. 898. Plantula pusilla pedunculo 4 pollices alto. (Vid. sicc. in herb. Kew.)

*Bulbophyllum Melleri*: pseudobulbis conicis tetragonis, crassiusculis monophyllis, folio lato oblongo a cuneata basi apice obtuso, pedunculo vaginis ad 6 amplis membranaceis, rhachi latiuscula pauciflora floribus excentrica seriatis, bracteis triangulis deflexis, sepalis triangulis, tepalis linearibus incurvis apice obtusis, labello ancipiti basi utrinque rotundato auriculato, columna trigona apice tridentata, carina progrediente in basi. Praecedenti non majus, sed folia plus duplo latiora, rhachis multo amplior. „*Megaclinium Melleri*“ Hook. f. in Bot. Mag. 1871 sub 5936. (nomen) Name low — growing on trees from 500' to summit about 2000—2500'. Mount Chincadzuca. Marganjo range. Sept. 1861. C. J. Meller. (Vid. sicc. in herb. Kew.)

H. G. Reichenbach, fil.

## A n z e i g e .

Verkauf eines grossen Mikroskopos von J. Pössl in Wien; 5° Okulare und 7 achromat. aplanatische Objektivlinsen; 2 Glas-, 1 Schraubenmikrometer nach Fraunhofer; Mikrometerschraube am Objecttisch und Stahlprisma; Sömmerring'scher Spiegelchenapparat und Prisma, nebst vielem anderen Zubehör. Vergrösserungen von 31—540—1000—1300 mal linear mit höchst über-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenbach Heinrich Gustav

Artikel/Article: [Orchideae Kalbreyerianae 77-78](#)