

FLORA.

61. Jahrgang.

Nº 26. Regensburg, 11. September 1878.

Inhalt. M. Gandoger: Rosae novae Galliam austro-orientalem colentes. (Fortsetzung.) — Dr. Oscar Drude: Ueber die Anwendung analytischer Schlüssel und die Anordnung der Familien in den neueren deutschen Floren. (Schluss.) — Literatur. — Anzeige. — Warnung. —

Rosae novae **Galliam austro-orientalem colentes**

auctore Michaelae Gandoger.

(Fortsetzung).

H. *Trichophyllae Urbicae* Gdgr. Essai p. 31 (*Canineae pubescentes* Crép. p. p.)

51. *Rosa Borderi* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 336! —

Gracilescens, arcuato-flexuosa; aculeis ad ramos tenues copiosis, parvis, valde acutis, saepius geminatis; foliolis ovato-acutis, basi rotundatis, supra glabris saturateque viridibus, subtus praeter nervos villosos hinc inde hirtellis, simpliciter serratis; petiolis villosis, eglandulosis, subinermibus; stipulis angustatis, subtus pilosis, auriculis divergentibus; pedunculis 1—3nis, gracilibus, sparse pilosis; calicis tubo ovoideo, glabro; sepalis deciduis, eglandulosis, margine dentatis, late breviterque pinnatis; stylis e disco conico glabris; petalis parvis, subalbis, haud ciliatis; fructu parvo, ovoideo, rubro.

Flora 1878.

26

Hab. in lapidosis nemorum quercet. circa pagum Alix (Rhône).

E silvaticis prope Gèdre (Hautes-Pyrénées) ab amic. Bordère etiam copiosissime accepi.

A *R. silvularum* Rip. et *Forsteri* Smith recedit primo intuitu pedunculis sparse pilosis nec glaberrimis et disco stylari sat conico.

52. *Rosa labrellata* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 132! —

Aculeis debilibus, inclinatis, parum dilatatis, ad ramos floriferos sat copiosis; foliolis obovato-oblongis, basi cordatis, apice breviter attenuatis, subtus praeter nervos villosos hinc inde hirtellis, simpliciter apertaeque serratis; petiolis eglandulosis, villosis, superioribus solis aculeatis; pedunculis 1—2 nis, laevibus, 13—15 mill. longis; calicis tubo laevi, breviter ovoideo; sepalis anguste pinnatis, deciduis, margine 2—4 dentato-glandulosis; stylis e disco subconico hirsutis; petalis; fructu parvo, ovato, apice attenuato, sanguineo.

Hab. in sepibus collium ad Arnas (Rhône).

R. clavoides Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 11, ab ea differt stylis subglaberrimis, fructu oblongo et foliolis basi cuneatis; *R. Collieri* Gdgr. loc. cit. p. 12, cui magis accedit facile distinguitur foliolis basi sensim attenuatis, sepalis longioribus haud glandulosis et fructu majore, subgloboso.

R. pilhyophila Gdgr. Essai p. 31 (*R. opaca* Gren. in Schultz Archiv. p. 332 non Fries; Schultz Herb. norm. Nr. 1478!) ab affinibus recedit foliolis orbiculato-ovalibus, crassioribus, disco stylari plano et fructu sphaerico. — Ad eandem gregem spectant *R. brachyacantha* Gdgr. in Bull. soc. dauph. 1873, p. 15, et *R. stenopetala* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 12.

I. *Trichophyllae Pilosae* Gdgr. Essai p. 31 (*Canineae pubescentes* Crép. pro parte).

53. *Rosa elisophora* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 93! —

Aculeis compresso-falcatis, ad ramos floriferos foliosos subnullis, decurrentibus, parum dilatatis; foliolis atrovirentibus, nervosis, elliptico-obovatis, utrinque attenuatis, subtus toto griseo-pubescentibus, simpliciter serratis; petiolis villosis, eglandulosis, inermibus; stipulis subtus hirtellis; pedunculis

1—3nis, laevibus, 16—20 mill. longis; calicis tubo anguste oblongo, glabro; sepalis pubescentibus, deciduis, late integreque pinnatis; stylis brevibus, raris, sparse pilosulis, disco conico; petalis sat magnis, pallide roseis, basi attenuatis, haud ciliatis; fructu oblongo-clavato, sanguineo, apice turgido, basi longe attenuato in pedunc. decurrente.

Hab. in sepibus vinetorum prope Arnas (Rhône).

Est de grege *R. Borreri* Woods et *frutesorum* Bess. sed ab eis differt stylis subglabris nec dense hirsutis.

54. *Rosa macrostigma* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 144! —

Turionibus purpureis; aculeis copiosis, falcato-dilatatis; foliolis late obovato-oblongis, saturate viridibus, utrinque attenuatis, subtus toto pubescentibus, simpliciter serratis; petiolis eglandulosis, villosis, extra-inferioribus solis inermibus; stipulis dilatatis; pedunculis 2—4nis, laevibus, 10—15 mill. longis; calicis tubo laevi, obovato-oblongo; sepalis elongatis, integre lateque pinnatipartitis, deciduis; stylis e disco subplano valde lanatis in capitulum magnum (4 mill. diam. lat.) amplissime conglobatis; petalis sat pallide roseis, haud ciliatis, basi sensim attenuatis; fructu breviter ovoideo, purpureo, haud aut vix depresso.

Hab. in dumetis ad vias prope Arnas (Rhône).

Ad hanc accedunt *R. mesomorpha* Gdgr. in Bull. soc. Murith. du Valais (1876) p. 33, et *R. Leontonyx* Gdgr. loc. cit. p. 32. — Inter formas affines *R. erythrantha* Bor. fl. Centr. Nr. 850 petalis purpureis praedita eminet. — *R. canescens* Baker Rev. p. 28 a meipso (Essai p. 31, Nr. 494) ad Crepinias Trichophylleas et Pilosas relata, melius forsam ad Pugetias (Tomentosae Auct.) adnumerari debet propter foliola biserrato-glandulosa, canescentia et attritu digitorum odorem resinoso-terebinthinaceam eximie redolentia.

55. *Rosa Blyttii* Gdgr. Essai p. 31 — *R. pubescens* A. Blytt Fl. Sogn., non Fisch., nec Lem., nec Schleich.; Scheutz Stud. Skand. Rosa, Nr. 9! *R. coriifolia* β. *pubescens* Scheutz. Oefvers. Sverg. och Norg. Ros. in Bot. Not. 1877, et extr. p. 6!; *R. tomentella* var. *Vexioniensis* Scheutz plant. exsicc. ad am.! — Vetustorum caulium aculeis validis, dilatatis, aduncis, ad ramos floriferos nullis; foliolis late oblongo-rhomboeis, nervosis, utrinque sensim attenuatis, eglandulosis, adultis supra glabris, subtus vero cano-villosis, crebre biserratis; petiolis

inermibus, tomentosis, minute glandulosis; stipulis latis, dorso glandulosis, auriculis divergentibus; pedunculis 1—2nis, laevibus, 4—6 mill. longis; calicis tubo laevi, obovato-oblongo; sepalis post anthesim erectis, serius deciduis, parce integreque pinnatis, apice dentato-dilatatis; stylis e disco plano lanatis; petalis; fructu magno, subturbinato, obovato-oblongo, apice incrassato, basi valde depresso, coccineo.

Hab. in Norvegia, Sogn ad Stedjeberget (A. Blytt!) in Suecia media prope Wexjö Smolandiae (J. N. Scheutz!). — Etiam e silvaticis Galliae austro-orientalis, Ain, Savoie, etc. vidi.

Species in gregulo foliolis biserratis conspicua. — *R. submitis* Gren. in Schultz Archiv. p. 332 recedit foliolis ovatis, petiolis eglandulosis, fructu obovato-oblongo nunquam subturbinato.

56. *Rosa ramusculosa* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 244! —

Elongata, gracilescens, dense dumosa, aculeis parvis, sat raris; foliolis ovato-acutis, nitidis, subtus omnino villosis, simpliciter serratis; petiolis inermibus, subeglandulosis, pubescentibus; stipulis sat latis, subtus villosis, auriculis parum divergentibus; pedunculis 2—4nis, hirtellis; calicis tubo oblongo, basi villosulo; sepalis deciduis, pinnatis, eglandulosis, virentibus; stylis e disco subconico glabris; petalis roseis, haud ciliatis; fructu obovato, nitide rubro.

Hab. in frondosis ad Arnas (Rhône).

Haec a sequente recedit foliolis ovatis, minoribus et fructu obovato.

57. *Rosa plagiophylla* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 376! —

Ramis elongatis, flexuosis, sat aculeatis; aculeis falcato-dilatatis; foliolis ample oblongo-lanceolatis, basi attenuatis, atrovirentibus, subtus omnino villosis, simpliciter serratis; petiolis inermibus, laxe pilosis, eglandulosis; pedunculis 2—3nis, pilosis, 11—15 mill. longis; calicis tubo glabro, anguste oblongo; sepalis deciduis, eglandulosis, pinnulis latis, integris; stylis e disco subconico glabris; petalis subalbis, haud ciliatis, basi attenuatis; fructu glabro, oblongo, inferne valde attenuato.

Hab. in vinetis ad Arnas (Rhône).

Ad hanc accedunt *R. andropogon* Gdgr. Essai p. 31 (nom. sol.); Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 13, *R. hypochionoea* Gdgr. loc.

cit. p. 13, *R. Vapillonii* Gdgr. loc. cit. p. 13, et *R. persimilis* Gdgr. loc. cit. p. 13, omnes ad gregem *R. platyphyllae* Rau Enum. ros. p. 82, spectantes.

58. *Rosa praecognita* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 302! —

Robusta, valida, ramosissima, ramis inferne denudatis, aculeis robustis falcato-dilatatis; foliolis anguste oblongo-acutis, basi attenuatis, nervosis, subtus totoque griseo-villosis, simpliciter serratis; petiolis eglandulosus, inermibus, pubescentibus; stipulis sat latis, auriculis sat divergentibus; pedunculis 1—4nis, hirtellis; calicis tubo oblongo, glabro; sepalis late copioseque pinnatis, corollam aequantibus, pinnulis foliaceo-dentatis; stylis e disco conico villosis; petalis parvis, subsordide albidis; fructu magno, purpureo, breviter oblongo.

Hab. in sepibus circa pagum Alix (Rhône).

R. persimilis Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 13, huic propior recedit foliolis subangustioribus ad costam parce glandulosus, petalis majoribus, pallide roseis, pedunculis interdum passim glandulosus, etc.

J. Trichophyllae Solstitiales Gdgr. Essai p. 32 (*Canineae pubescentes* Crép. p. p.)

59. *Rosa Peyronii* Gdgr. Essai p. 32. — *R. cinerascens* Cariot! Etude des fl. 4^e éd. II, p. 181 non Dumort., nec Wallr. *R. dumetorum* var. a. *cinerea* Cariot. loc. cit. 5^a éd. II, p. 190! — Frutex gracilescens, ramis tenuibus, flexuosis; aculeis minutis, aduncis, subdilatatis; foliolis parvulis, ovato-obtusis, undique dense cinereo-tomentosis, simpliciter serratis; petiolis tomentosis, eglandulosus, parce aculeatis; stipulis parvis, subtus pubescentibus; pedunculis laevibus, 1—2nis, gracilibus; calicis tubo ovato, glabro; sepalis pinnatis, deciduis, eglandulosus; stylis villosis, disco subplano; petalis parvis, roseis; fructu ovato, glabro, rubro.

Hab. in fruticetis montosis ad Chalmazelle (Loire) — alt. 2500'.

Differt a formis vulgaribus *R. dumetorum* Thuill. cui accedit, habitu graciliori et parvitate omnium partium sed foliolorum praesertim.

60. *Rosa lunata* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 12! —

Modice elata, ramis divaricatis, glaucescentibus; aculeis parvis, valde acutis; foliolis ample oblongis, basi rotundatis, apice attenuatis, utrinque hirsutis, simpliciter serratis, terminali vero basi cordato-emarginato; petiolis tomentosis, parce aculeatis, hinc inde subglandulosis; stipulis apice dilatatis, magnis, subtus pubescentibus, auriculis divergentibus; pedunculis 1—2 nis, laevibus; calicis tubo laevi, sepalis deciduis, late partitis, eglandulosis; stylis e disco plano hirsutis; petalis pallide roseis; fructu parvo, ovato.

Hab. in fruticetis lapidosis collium ad Montmèlas, (Rhône) 1100.'

Huc etiam pertinent species sequentes a meipso conditae *R. campicola* Gdgr. in Bull. soc. Murith. du Valais (1876) p. 33, *R. pachystema* Gdgr. loc. cit. p. 34, *R. hirsutissima* Gdgr. loc. cit., *R. gnaphalodes* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 14, *R. phyllochlora* Gdgr. loc. cit. p. 14, *R. teratophylla* Gdgr. Essai p. 32; Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 14, omnes de grege *R. dumetorum* Thuill., *solstitialis* Bess., et specierum affinium. — *Rosa altera* Gdgr. Essai p. 32 (*R. silvestris* Schult. ex Rehb. fl. excurs. Nr. 3997 non alior.) a *R. phyllochlora* Gdgr. loc. cit. differt foliolis oblongis, utrinque acutis, petiolis glandulosis et aculeatis, pedunculis basi pubescentibus, petalis incarnatis et fructu ovato.

K. Adenophorae Gdgr. Essai p. 32 (*Canineae collinae* et *tomentellae* Crép.)

61. *Rosa conyzoides* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 233!

Cano-virescens; aculeis dilatato-aduncis, ad ramos floriferos 2nis; foliolis latiuscule obovatis, basi breviter rotundatis, superne sensim acutis, 13—15 mill. latis, undique molliter sericootomentosis, serraturis simplicibus; subconvergentibus; petiolis eglandulosis, inermibus, tomentosis; pedunculis 3—4nis, aliis hispidis, aliis laevibus, 10—15 mill. longis; calicis tubo obovato-oblongo, glabro; sepalis purpureis, villosis, deciduis, plerisque dorso glandulosis, integre lateque pinnatipartitis; stylis e disco sat conico villosis; petalis roseis, haud ciliatis; fructu obovato-oblongo, basi depresso, apice abrupte angustaque constricto.

Hab. in sepibus et fruticetis ad Arnas (Rhône).

Affinis est *R. leucographae* Gdgr. Ros. nov. fasc. I. p. 14, et *R. Barba-jovis* Gdgr. loc. cit. p. 15, a quibus fructu obovato-oblongo, apice abrupte strangulato statim distinguitur.

62. *Rosa stictopoda* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 85! —

Ramosissima, arcuata, ramis flexuosis, foliosis; aculeis parvis, sat copiosis, rectiusculis vel subincurvis; foliolis ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice breviter attenuatis, utrinque pilosis, simpliciter apertaeque serratis; petiolis inermibus, villosis, eglandulosis; stipulis latis, subtus villosis, auriculis divergentibus; pedunculis 3—4nis, villosoglandulosis, apice ad maturitatem carnosoturgidis, 12—20 mill. longis; calicis tubo laevi, oblongo; sepalis deciduis, pinnulis sat latis, integris; stylis e disco subconico brevibus, villosis; petalis magnis, pallide roseis; fructu oblongo, basi rotundato, apice attenuato, nitide rubro.

Hab. in dumetis ad Arnas (Rhône).

Recedit a *R. Deseglisei* Bor. et a sequente, praeter alios characteres, petiolis inermibus, nec plus minus aculeatis.

63. *Rosa cryptostylis* Gdgr. mss. — Gdgr. Herb. ros. europ. exsicc. Nr. 335! —

Frutex 4—5 pedalis; aculeis dilatato-inclinatis, ad ramos floriferos sat raris; foliolis parvis, elliptico-acutis, basi rotundatis, subtus minute totoque pubescentibus, simpliciter serratis; petiolis eglandulosis, villosis superioribus solis aculeatis; pedunculis 2—5nis, hispidis, sparse pilosis, 11—13 mill. longis; calicis tubo obovato, glabro; sepalis brevibus, deciduis, glabris; anguste pinnatis; stylis e disco conico raris, pilosulis brevissimis vel haud aut vix exsertis; petalis subalbis, haud ciliatis; fructu parvo, ovoideo, basi rotundato, apice attenuato.

Hab. in dumetis vinetorum prope Arnas (Rhône).

R. Deseglisei Bor. ab hac differt aculeis robustioribus, stylis villosis, ultra discum multo longius exsertis, etc.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Gandoger Michael [Jean Michel, Abbé]

Artikel/Article: [Rosae novae 401-407](#)