

FLORA.

65. Jahrgang.

Nº. 32. Regensburg, 11. November 1882.

Inhalt. Dr. J. Müller: Lichenologische Beiträge. XVI. (Fortsetzung.)
— P. Gabriel Strobl: Flora der Nebroden. (Fortsetzung.) — Literatur.
— Anzeige.

Lichenologische Beiträge von Dr. J. Müller.

XVI.

(Fortsetzung.)

518. *Leptotrema Wightii*; *Thelotrema Wightii* Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 50, *Endocarpon Wightii* Tayl. in Hook. Journ. of Bot. 1847 p. 155, thallo gaudet primum caesio-virente et dein decolorando argillaceo-cinerascente; recens *Leptotrema glaucescens* s. *Thelotrema glaucescens* Nyl. l. c. p. 47 quoad thallum simulat, sed apothecia sunt alia. A proximo *Leptotremate phaeosporo*, s. *Thelotremate phaeosporo* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 38 praesertim sporis minoribus, saepius 15—22 μ longis, magis subglobosis et intus irregulariter divisis differt. E Nova Hollandia orientali prope Toowoomba a cl. Hartmann pulchre lectam cel. Ferd. v. Mueller misit.

519. *Ocelularia cavata*; *Thelotrema cavatum* Ach. Syn. p. 116, non Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled., a proxima *Ocelularia Bonplandiae* Spreng. Syst. 4. 1. p. 242 (fide specim. Fééani sub *Thelotremate Bonplandiae*), cui addendum est *Thelotrema olivaceum* Montg. Cub. p. 165 et Syllog. p. 363, vix nisi in eo differt, quod apothecia demum magis emersa, basi distinctius circum-

scripta v. subinde nonnihil constricta, quae tum ad illa „*Ascidii Cinchonarum* Fée“ accedunt, sed specimina intermedia occurunt, quae tamen in sectione verticali epithecium et marginem proprium firme nigricantem ostendunt, tum in *O. Bonplandiae* epithecium pallidum et anguste fuscidulum adsit. — Haec recenter etiam in Australiae prov. New South Wales a cl. Kirton lecta est.

520. *Thelotrema megalophthalmum* Müll. Arg. Thallus olivaceo-virens, instratus, sat tenuis, minute rugulosus, superficie laevis; apothecia immersa, non depressa; ostiola pro genere amplissima, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ min. lata, orbicularia v. suborbicularia, margine exteriore tenui lacero et cum thallo concolore et interiorie subbreviore albescente fere omnino adhaerente, demum conjunctim subsecendentibus cincta, discus superficiem thalli attingens (non depresso), planus v. madefactus paullo convexus, carneus v. demum decolorando-albescens; lamina undique hyalina; spora in ascis octona, 32—45 μ longae, 11—12 μ latae, utrinque rotundato-obtusae, rectae v. saepius distincte fabaceo-incurvae, hyalinae et pulchre murales, transversim 12—16-septatae, loculi longitrorum 2—3-locellati. — Nulli nisi *T. leucophthalmo* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 39 affine, sed magis platycarpum, thallus aliter coloratus et margo aliis. — Crescit corticola prope Toowoomba in Australia orientali: Hartmann.

521. *Tremotylium australiense* Müll. Arg. Thallus cinereo-albidus, tartareus, crassiusculus, continuus, sublaevis, undique crebre verruciferus, verrucae circ. $\frac{1}{2}$ min. latae, vulgo plures in compositas irregulares confluentes, vertice depresso, circ. 1—4-carpicae, apice thelotremoideo-apertientes et circa discum punctiformi-orbiculari caesio-velatum satis defossum subcaesiopalentes, aperturae cuiusvis verrucae demum subseriatim confluentes et *Graphinam* simulantes aut in discum communem angulosum confluentes; thalamia in sarcothecio pallido thallo late cincto primum distincta, in sectione horizontali orbicularia, aquoso-fuscescentia, sub microscopio pure hyalina, in verticali altiora quam lata, fere 1 mm. alta, superne perithecio spurio fuscescente, caeterum hyalino, parallele filamentoso-cellulari (quasi paraphysibus condensatis et obscuratis, apice non segregatis) limitata; epithecium fuscescens, lamina tenacissima hyalina, hypothecium superne hyalinum, inferne fuscescens, paraphyses parallelae, trabeculatim connexae et cohaerentes; asci 1-spori; spora hyalinae, 100—180 μ longae, 35—50 μ latae, vulgo api-

culatae, creberrime parenchymatosae. — — E structura goni-diorum genus *Graphideis* nec *Lecanoreis* adscribendum est et *Phlyctides* et *Thelotrema* etiam ejusdem loci sunt. *Phlyctis*, *The-lotrema*, *Arthothelium* et *Graphina* dein evadunt inter se proxime affinia. — Corticola in Australiae prov. Queensland prope Too-woomba: Hartmann.

522. *Arthonia gracilenta* Müll. Arg. Thallus albus, cum epi-dermide confusus, obsolete nigro-limitatus; apothecia nigra, madida obsolete fusco-pallentia aut concoloria, erumpenti-innata, convexa, $\frac{8}{100}$ — $\frac{17}{100}$ mm. lata, gracilenta, vulgo pluries longiora quam lata et subrectangulatim pauciramulosa, subindivisa varie fracto-curvata et saepe subtoruloso-inaequalia, novella velata evoluta nuda, opaca, immarginata, intus obscura; lamina et hypothecium subolivaceo-flavificantia, epithecium olivaceo-nigrum; asci pyriformi-subglobosi, 8-spori; spora hyalinae, 21μ longae, 8μ latae, dactylino-obovoideae, saepe incurvæ, utrinque late obtusae, 6-loculares, loculus superior reliquis multo major. — Prope *Arthoniam leptogramma* Müll. Arg. inseranda. — Corticola prope Rockhampton in Australiae prov. Queensland: Mad. Thozet.

523. *Arthonia delicatula* Müll. Arg. Thallus albus, tenuissi-mus, cum epidermide confusus, laevis; apothecia immersa, ju-niora cinereo-velata, demum magis denudata, $\frac{12}{100}$ mm. lata, orbicularia v. saepius grosse irregulariter angulosa v. pro parte 2—3-plo longiora quam lata et tum simplicia aut 1—2-ramulosa, sicca obscure olivacea, madefacta pallentia et olivaceo-aquosa, convexa, semper immarginata et intus obscura; epithecium pal-lide olivaceum, lamina cum hypothecio hyalina; asci obovoidei, 8-spori; spora hyalinae, $18-21\mu$ longae, $6-8\mu$ latae, elongato-ovoideae, aequaliter 3-loculares. — Subafinis est *A. Antil-larum* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon., sed spora majores et apothecia contra pluries minora et longe obscuriora. — Cor-ticala ad Rockhampton in Australiae orient. prov. Queensland: Mad. Thozet.

524. *Arthonia Thozetiana* Müll. Arg. Thallus macula albida effusa indicatus, v. hinc inde lineis hypothallinis nigris parum conspicuis parce decussatus; apothecia linearia, $\frac{13}{100}$ mm. lata, simplicia v. saepius substellatim pauciramosa, leviter emergentia, sicca prima fronte atra, sub lente rufo-nigricantia et mar-gine tenui obscuriore cincta, novella griseo-velata, evoluta nuda et opaca, madefactorum discus pallescens et e nigrescente aquoso-

fumosus et hyalinescens, undique margine tenui multo obscuriore cinctus; epithecium et margo in sectione verticali olivaceo-nigricantes, lamina hyalina v. superne pallide olivacea, tenax, hypothecium hyalinum; asci oblongato-ovoides, 8-spori; sporae hyalinae, 12—13 μ longae, 5 μ latae, oblongato-ovoidae, 4-loculares, septa regulariter aequidistantia. — Prope *Arthoniam novellam* Krplh. Lich. Glaz. p. 74 locanda, caeterum valde distincta disco distinete obscurius marginato. Primo intuitu quasi forma exigua *Phaeographidis inustae* videtur. — Corticola in Queensland prope Rockhampton: Mad. Thozet.

525. *Graphina Hartmanniana* Müll. Arg. Thallus parum distinctus. Apothecia extus magnitudine et forma exacte illa *Graphinae Ruizianae* referentia, sed sporae aliae, multo minores et minus divisae (hyalinae), 19—23 μ longae, 6—8 μ latae, medio subconstrictae, utrinque acutiusculae, transversim 5—7-septatae, loculi semel longitrorum v. oblique divisi. — Nulli cognitarum nisi speciei comparatae accedens. — Corticola in ramulis observata aliis Lichenibus majoribus obtectis et in Queensland prope Toowoomba a cl. Hartmann lectis.

Eodem loco ab eodem etiam *Graphina polyclades*, sc. *Graphis polyclades* Krplh. Beitr. Flecht. Flor. Austral. p. 13 lecta est. Planta saltem cum insufficiente descriptione quadrat, et extus potius *Graphinam fiso-furcalam* quasi laevigatam simulat quam *Graphinam streblocarpam* (*Graphidem streblocarpam* Bél.), sed sporae multo minores, cum iis *Graphinae sophisticae* potius quadrant. Ab affinibus insuper perithecio subtriplice tenuiore (incompleto) differt.

526. *Graphis* (s. *Solenographa*) *propinqua* Müll. Arg. Thallus olivaceo albicans, subtenuis, continuus, laevis, juxta lirellas elato-tumidus; lirellae totae circ. $22/_{100}$ mm. latae, parte visibili fere $10/_{100}$ mm. latae, 1— $2\frac{1}{2}$ mm. longae, in prominentias nanas thalli immersae, lateraliter prominentiis adnato-tectae, gracilenta, divergenter ramulosae; peritheciun basi continuum, fusco-nigrum, epithecium angustum, subrimiforme, nigrum; asci 8-spori; sporae hyalinae, 45—66 μ longae, 10—12 μ latae, 12—16-loculares, halone pellucido ampio involutae. — Prope *Graphidem subdisserpente* Nyl. Andam. p. 16 et *Gr. subassimilem* Müll. Arg. L. B. n. 455 inserenda est. — Corticola in Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

527. *Graphis* (s. *Eugraphis*) *crassilabra* Müll. Arg. (non *Fisurina crassilabra* Montg. et v. d. Bosch., quae non est species

Graphidis). Thallus albidus, effusus, subtenuis, ruguloso-inaequalis; lirellae gracilenta, flexuosae, subramosae, 1–2 mm. longae, intus albae, extus parte nuda $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{10}$ mm. latae, prominentiis thallinis flexuoso-vermiformibus superne albioribus innatae, i. e. extus usque ad apicem late thallino-duplicatae s. crassilabrae, margines proprii nigri, vertice nudi, conniventia; epithecium rimiforme, angustum, albido-pruinatum, dein nudum et atrum, peritheciu basi deficiens; thalamium intus album, hypothecium hyalinum v. inferne fuscescens; asci 4–8-spori; sporae hyalinae, 45–62 μ longae, 10–12 μ latae, 12-loculares. — Habitu et sporis ad *Gr. propinquam* accedit, sed thallus albior, apothecia labiis crassis thallinis valde emergentibus praeditae et peritheciu basi non continuum. — Corticola in Australiae prov. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

528. *Phaeographidis* sect. *Solenothecium* Müll. Arg. Peritheciu nigrum, completum, sc. basi sub hypothecio continuum; discus rimiformis v. angustus. — Sectio analoga *Graphidis* sectioni *Solenographae*.

529. *Phaeographidis* (s. *Solenothecium*) *subcompulsa* Müll. Arg. Thallus flavescenti-albidus, effusus, laevis, dein obsolete ruguloso-inaequalis; lirellae confertae, semiinnatae, gracilenta, acutae, basi utrinque thallino-duplicatae, caeterum parte emersa nuda et atrae, non sulcatae, subastroideo-ramosae v. varie curvatae, breviusculae; peritheciu basi continuum, epithecium rimiforme, dein labiis discretis plano-apertum, demum fere $\frac{1}{5}$ mm. latum, atrum, nudum; lamina flavescenti-hyalina; asci 8-spori; sporae 37–45 μ longae, 8–10 μ latae, 8–9-loculares, mox fuscescentes. — Similis brasiliensi *Graphidi compulsa* Krplh., sed lirellae demum latius apertae, sporae majores et fuscescentes. *Graphis assimilis* Nyl. dein, quae etiam sat similis, gaudet sporis minoribus et hyalinis, et javanica *Graphis subassimilis* Müll. Arg. differt sporis angustioribus, magis divisis et hyalinis. — Corticola in Australia austro-orientali ad Nepear River: Woolls.

530. *Phaeographidis* (s. *Solenothecium*) *cinerascens* Müll. Arg. Thallus cinereo-albidus, effusus, instrato-inaequalis, caeterum laevis; lirellae sparsae, sessiles, basi thallino-duplicatae, circ. $\frac{2}{3}$ – $\frac{5}{4}$ mm. longae, $\frac{2}{3}$ mm. latae, simplices, rectae v. subrectae, obtusae, atrae, nitidulae, haud sulcatae; peritheciu basi continuum, epithecium ob labia arcte conniventia clausum, dein hianti-aperiens et planum; asci 8-spori; sporae fuscescentes, circ. 46 μ longae, 9 μ latae, 7–8-loculares, utrinque subapicu-

lato-acutatae. — Affinis est *Ph. subcompta*, sed thallus cinereus, apothecia emersa, sparsa et duplo latiora, simplicia et obtusa et nitidula. — Corticola ad Nepear River in Australia austro-orientali: Woolls.

531. *Phaeographidis* sect. *Anisothecium* Müll. Arg. Perithecium nigrum, basi deficiens; discus subrimiformis, angustus. — Sectio analoga *Graphidis* sectioni *Eugraphidi*.

532. *Phaeographidis* (s. *Anisothecium*) *inscripta* Müll. Arg. Thallus albidus (nonnihil flavescenti-albidus), tenuis, laevis; lirellae omnino immersae, valde confertae, astroideo-ramulosae, ad latera marginibus thallinis late tumidis superatae, superne tamen mox a thallo solutae, angustae, clausae, nigrae et nudae, aperatae demum $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ mm. latae; perithecium basi deficiens aut interdum rudimentarium et obfuscatum; asci 8-spori; sporae fuscescentes, 44—48 μ longae, 9 μ latae, 10-loculares, utrinque nonnihil apiculato-acuminatae. — Extus prima fronte formam tenellam *Graphidis serpentinae* simulat, sed lirellae depresso-depressae, sporae majores, subapiculatae et fuscescentes. — *Phaeographa computata*, sc. *Graphis computata* Krplh. Lich. Becc. p. 36 e Borneo affinis est, sed (e specim. Becc.) sporis minoribus et lirellis dissimilibus differt. — Etiam chinensis *Phaeographis discurrens*, s. *Graphis discurrens* Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 73, obs., affinis at diversa est. — Corticola crescit ad Nepear River in Australia austro-orient.: Woolls.

533. *Phaeographis* (s. *Anisothecium*) *australiensis* Müll. Arg. Tota similis *Graphidi serpentinae*, sed lirellae magis clausae, basi secus margines thallino-duplicatae et sporae fuscescentes, utrinque apiculato-acuminatae. — Lirellae graciles, 1—2 mm. longae, varie curvatae, et depauperato-astroideo-ramosae, apice angustatae aut obtusae; sporae circ. 34 μ longae et 7 μ latae, 8-loculares. — Corticola prope Paramatta in Australia austro-orientali: Woolls.

534. *Opegrapha* (s. *Lecanactis*) *phurilocularis* Müll. Arg. L. B. n. 439; *Lecidea phurilocularis* Nyl. Syn. Lich. Nov. Caledon. p. 54. — Apothecia in forma genuina speciei atra, novella obsolete virenti-pruinosa. — In Nova Caledonia, et in Novae Hollandiae prov. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

— — v. *pruinosa*; apothecia juniora intense virenti- v. aeruginoso-pruinosa, evoluta subnuda. — In Nova Caledonia, et in Australiae prov. Queensland prope Toowoomba: Hartmann.

— — v. *umbonata*; apothecia parvula, nigra v. leviter aeru-

ginoso-pruinosa, discus e centro prolificando-umbonatus, in centro umbonis plus minusve umbilicatus; thallus magis virens. — In neocaledonica insula Lifu: Vieillard.

— — v. *obfuscata*; omissa ut in forma genuina speciei, sed thallus obfuscatus, ad illum *Op. insignioris* accedens, ubi sporae majores. — Cum praecedentibus corticola prope Toowoomba: Hartmann n. 35.

(Schluss folgt.)

Flora der Nebroden.

Von

Prof. P. Gabriel Srobl.

(Fortsetzung.)

B. *Cynarocephalae* Juss.

Echinops siculus mihi Fl. nebrod. exsicc.! *ruthenicus* Guss.
 * Syn. et Herb.!, Todaro fl. sic. exsicc. 1225!, non MB. Perenn, bis 1 m. hoch, oberwärts sparsam aestig, Blätter oberseits kahl oder etwas spinnwebig, grün, unterseits mitsamt dem Stengel ziemlich dünn weisszottig wollhaarig, die Wurzelblätter gestielt, länglich, bis $1\frac{1}{3}$ m. lang, fiederspaltig mit 2–4 cm. breiter Spindel; Stengelblätter länglich, sitzend, fiederspaltig, Spindel 10–14 mm. breit, Blattzipfeln ungefähr 20–30 mm. lang, buchtig gelappt; die obersten Blätter buchtig gezähnt, länglich linear, die Spitzen der Lappen mit kräftigem, gelben, 3–5 mm. langem Enddorne, dazwischen zahlreiche viel schwächere, gelbe Randdornen; Blüthenstiele kurz, mit 3–4 kleinen Blättern besetzt; Blüthenköpfe kugelig, fast von der Grösse des *Ritro* L.; das Anthodium überragt die zahlreichen, linealborstenförmigen, ästigen Basilarborsten um das 2–3fache, die Anthodialblättchen sind gekielt, kahl, 10–12 mm. lang, 2 mm. breit, lanzettlich, etwas gekörnelt rauh, vom Grunde, meist aber erst von der Mitte an lang gewimpert, die Wimpern der Mitte 2 mm. lang, mit sehr feinen Borsten besetzt; gegen die Spitze hin werden sie kürzer und die dornige Spitze der Anthodialblättchen überragt sie weit; Anthodialblättchen gegen die Spitze hin kornblumenblau, vor der Anthese grün. Die Pflanze der Nebroden ist jedenfalls nicht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [65](#)

Autor(en)/Author(s): Müller J.

Artikel/Article: [Lichenologische Beiträge 499-505](#)