

## Lichenologische Beiträge von Dr. J. Müller.

## XVIII.

(Fortsetzung.)

612. *Arthopyrenia* (Massal. emend.) Müll. Arg. Principes de classific. des Lich. et Lich. de Genève p. 88 (exclus. sect. 2), includens *Arthopyreniam* Mass. Ric. p. 165 (1852), *Acrocordiam* Mass. Gen. p. 17 (1854), et *Leptoraphidem* Körb. Syst. p. 371. Thallus crustaceus, gonidia glomerulose subchroolepoideo-seriata, viridia, pariete distincto praedita; apothecia in thallo absque stromatibus distinctis sita, pyrenocarpica, apice demum poro aperientia v. subaperientia; thalamium pseudoparaphysibus varie connexo-ramosis formatum; sporae hyalinae, varie transversim divisae, loculi ad dissepimenta recte truncati.

Species hucusque notae fere omnes corticolae, nullae epiphyllae, in regionibus praesertim tropicis sat numerosae. Thalli gonidia vulgo elongata, depauperato-concatenata, rarius sat regulariter globosa et tum plus minusve moniliformi-concatenata, primum tamen frequenter in glomerulum conglomerata, cujus elementa postea facile in series breves v. etiam subinde elongatas solvuntur, viridia v. subinde in aurantiacum nonnihil vergentia, semper membrana bene distincta praedita extusque demum saepe gelatinoso-tumentia. Apothecia omnium hucusque cognitarum nigra, magnitudine, situ, forma et structura saepe in eadem naturali sectione insigniter ludentia; nucleus undique hyalinus; paraphyses ob consistentiam firmam, etiamsi tenuissimae, vulgo facillime recognoscuntur, sed in nonnullis speciebus (in sect. *Anisomeridio*) thalamium circa apicem ascorum facile rumpitur et paraphysium ramuli ibidem libenter elongati et tum liberi facile pro paraphysibus liberis sumi possent, at dissectiones perpendiculares (valde tenues) apotheciorum tum ramificationem et nexum copiosum paraphysium clare demonstrant. — Hic connexus paraphysium dein criterium est quo *Arthopyrenia* tota a variis sectionibus *Porinae* distingui potest. — Conf. infra ad observat. post characterem novum generis *Porinae*.

613. *Arthopyreniae* sect. *Euarthopyrenia* Müll. Arg. Lich. de Genève p. 89; genus *Arthopyrenia* Mass. Ric. p. 165 pr. p., Körb. Syst. p. 366 et Par. p. 386. Gonidia globosa v. subglobosa, glomerulosa, dein in series valde depauperatas aut et gonidia solitaria soluta sunt et insuper adsunt melanogonidia longius

serialia; paraphyses molliusculae pro genere crassiusculae et plus minusve superne constricto-subarticulatae, saepe tantum rudimentarie evolutae, nunquam tamen omnino deficientes, minus copiose quam in sectionibus reliquis ramoso-connexae; sporae ambitu clavato-obovoideae, medio mox constricto- et distracto- 1-septatae, loculi, saltem in quodam stadio evolutionis, ad latera utrinque plus minusve lyrato-repandi, integri v. in aliis speciebus iterum iterumve transversim divisi. — Sporae in hac sectione vulgo membrana gelatinaea crassa cinctae sunt sed huic characteri potius physiologico nihil generici inesse videtur, qui in eadem planta inque eodem apothecio caeterum variabilis observari potest.

Hujus loci sunt species europaeae sub *Arthopyrenia* ab auctoribus enumeratae et japonica: *A. Ikounensis* Müll. Arg. Lich. Japon. n. 29.

614. *Arthopyreniae* sect. *Mesopyrenia* Müll. Arg. Omnia ut in sect. *Euarthopyrenia*, sed gonidia vulgo magis oblongata et melanogonidia nulla; paraphyses rigidulo-firmae, at tenellae, magis intricatim ramoso-connexae, non constricto-subarticulatae. — Haec sectio praecedentem et s. *Acrocordiam* optime conjungit.

\* Apothecia dimidiata.

615. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *leucochlora* Müll. Arg. Thal-  
lus ectophloeodes, albido-virens, tenuis, effusus, continuus et laevigatus, mox rimulosus; gonidia depauperato-serialia et subsolitaria, globosa, diametro 8  $\mu$  aequantia, saepius nidulanti-conglomerata, viridia; apothecia circ.  $\frac{2}{10}$  mm. lata, dimidiata, hemisphaerica, nigra, nitidula, apice aequali demum pertusa, inferne crassiuscule thallino-vestita, basi utrinque subincurva; nucleus albus; paraphyses juniores valde intricatim connexo-ramosae, demum laxae connexae, tenellae et firmae; asci late clavati, 8-spori; sporae in ascis irregulariter 2-seriales, hyalinae, aequaliter 2-loculares, juniores angustae, evolutae ovoideo-ellipsoideae, 12  $\mu$  longae et 6  $\mu$  latae. — Species melanogonidiis endophloeodeis caret, thallo toto epiphloeode nec inter cellulas corticis nidulante, sporis pro genere ambitu demum latis et abbreviatis distincta, caeterum e minutie apotheciorum ad *A. atomariam* et *A. Ikounensem* Müll. Arg. accedens, juxta *Arthopyreniam Cinchonae*, s. *Verrucariam Cinchonae* Ach. Syn. p. 90 locanda est. — Corticola in America septentrionali prope New Bedford, unde benevole misit cl. H. Willey.

616. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *convexella* Müll. Arg. Thallus tenuis, mox denudatus, lacteus v. albidus, linea nigra cinctus; gonidia seriata, breviuscula; apothecia  $\frac{3-4}{10}$  mm. lata, dimidiata, primum velata, dein nuda v. inferne irregulariter thallino-vestita, perithecium hemisphaericum, alte convexum, vertice demum minute umbilicatum; nucleus hyalinus; paraphyses intricatim connexae; asci 8-spori; sporae in ascis subbiseriales, hyalinae, circ. 21  $\mu$  longae et 6—8  $\mu$  latae, 2-loculares, loculi lateraliter leviter sed distincte repandi. — Ab affini *A. planorbi*, s. *Verrucaria planorbi* Ach. Syn. p. 92 differt apotheciis minoribus, nudis, non deplanatis et sporis minoribus. — Corticola prope Apiahy in Brasilia: Puiggari n. 1004.

617. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *indusiata* Müll. Arg. Thallus cum epidermide quasi maculam cinereo-albidam effusam formans; gonidia chroolepoidea, pauca; apothecia pro sectione majuscula,  $\frac{3}{4}$ — $\frac{5}{4}$  mm. lata, orbicularia, valde depressa, 3-plo latiora quam alta, dimidiata, nigra, extus velamine thallino tenuissimo subtranslucenti indusiata et nigro-cinerascentia facta; paraphyses copiosae, connexo-ramosae; asci 8-spori; sporae in ascis biseriales, hyalinae, 25—32  $\mu$  longae, cum halone 7—11  $\mu$  latae, 2-loculares, loculi ad latera saepe distincte repandi. — Corticola ad Morro del Oro prope Apiahy in Brasilia: Puiggari n. 1388.

\* \* Apothecia depresso-globosa, basi completa sed plus minusve attenuata.

618. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *Nieteriana* Müll. Arg. Thallus epidermide mox rupta quasi maculam albam subfarinosam nigro-cinctam formans; gonidia serialia breviuscula; apothecia  $\frac{6-8}{10}$  mm. lata, basi tenuiore completa v. basi subinde deficientia et dimidiata, nigra, hemisphaerico-convexa, vertice late pyramidali-acutato foveolata, nonnisi basi rotundato-obtusa thallino-tecta, caeterum undique nuda et pure atra et nitidula; paraphyses copiosae et tenellae at parcius quam vulgo in affnibus connexo-ramosae; sporae octonae in ascis irregulariter biseriales, hyalinae, circ. 22—30  $\mu$  longae, 6—9  $\mu$  latae, 2-loculares, utrinque rotundato-obtusae, loculi lateraliter repandi. — Species in sectione sat speciosa, apothecia majuscula, nigra et solitarie densiuscule in thallo albo dispersa. — Corticola in Ceylonia: Nietner n. 30 (ex hb. Hampeano).

619. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *ceylonensis* Müll. Arg., *Verrucaria ceylonensis* Leight. Lich. Ceyl. n. 174, t. 37. fig. 40. Thallus albus v. albidus, laevis, subfarinosus, nigro-limitatus; gonidia chroolepoidea, cellulae oblongatae; apothecia solitaria et simul 2—3-natum confluentia,  $\frac{4}{10}$  mm. lata, depressiuscula, basi completa sed distincte tenuiora, undique nigra, basi circumcirca extrorsum producta et facile in pseudostromata confluentia, praeter verticem acutiusculum nigrum et nitidum thalino-velata; paraphyses copiosae, intricatim connexo-ramosissimae; asci 8-spori; sporae in ascis imbricatim uniseriales, hyalinae, 2-loculares, circ. 25  $\mu$  longae et 6—8  $\mu$  latae, loculi lateraliter plus minusve distincte repandi. — In insula Ceylonia corticola: Thwaites n. 174.

620. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *truncata* Müll. Arg. Thallus quasi maculam olivaceo-pallidam laevigatam margine linea valida nigra crispula cinctam per epidermidem perspicuam formans; gonidia depauperato-chroolepoidea, irregulariter oblongata; apothecia  $\frac{4}{10}$  mm. lata, integra, sed basi truncato-obtusa tenuiora, undique nigra, circiter pro  $\frac{2}{3}$  altitudinis immersa, pars emersa nuda et nigra, convexa, superne autem latissime truncato-depressa et centro minute foveolata, sat facile 2—3 confluentia; paraphyses laxe trabeculatim et arcuatim connexo-ramosae; asci anguste cylindrici, 8-spori; sporae in ascis apposite uniseriales, hyalinae, 18—21  $\mu$  longae et 8  $\mu$  latae, 2-loculares, loculi lateraliter subrepandi. — Extus e longinquo *Pyrenulam aggregatam* simulat, sed apothecia superne plano-depressa et sporae omnino aliae. Apothecia hinc inde geminatim v. etiam irregulariter seriatim confluentia et gregatim conferta et sparsa in eodem specimine occurrunt. — Corticola prope Apiahy in Brasilia: Puiggari n. 249.

621. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *minuscula* Müll. Arg. Thallus cum cellulis corticis confusus maculam rosello-griseam v. e rosello pallidam effusam simulans; gonidia glomeruloso-chroolepoidea; apothecia  $\frac{1}{5}$  mm. lata et minora, depresso-globosa, duplo latiora quam alta, basi 2—4-plo tenuiora, undique fusconigra, circiter semiimmersa, triente superiore et ultra a thallo nudata, rotundato-obtusa, nitidula; paraphyses tenellae, sat copiose connexo-ramosae; asci cylindrici, 8-spori; sporae in ascis irregulariter biseriales, hyalinae, 12—16  $\mu$  longae et  $3\frac{1}{2}$ —5  $\mu$  latae, 2-loculares et demum 4-loculares. — Corticola prope Apiahy in Brasilia: Puiggari n. 2165.

622. *Arthopyreniae* sect. *Synpyrenia* Müll. Arg. Omnia ut in sect. *Mesopyrenia*, sed apothecia numerosa ex aggregato in stroma spurium confluentia. — Apothecia caeterum in eodem thallo etiam solitaria et geminatim aut subternatim confluentia. — Hujus loci est:

623. *Arthopyrenia* (s. *Synpyrenia*) *accumulata*; *Verrucaria accumulata* Krph. Lich. bras. Glaz. p. 81. Apothecia  $\frac{3}{20}$  mm. lata. Paraphyses superne praesertim arcuatim connexae, modice numerosae. Gonidia chroolepoidea. — Corticola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 5427.

624. *Arthopyreniae* sect. *Anisomeridium* Müll. Arg. Omnia ut in sectione sequente *Acrocordia*, sed sporae inaequaliter 2-loculares, locus inferior superiore distincte aut multo brevior et multo minor.

625. *Arthopyrenia* (s. *Anisomeridium*) *xylogena* Müll. Arg. Thallus late effusus, tenuis, albus, verniceo-laevis; gonidia serialia subellipsoidea; apothecia  $\frac{1}{3}$  mm. lata, globosa, completa, undique nigra, vertice emergentia, caeterum in ligno (emortuos) defossa, parte emersa convexa, nuda v. obscure thalino-velata; sporae in ascis biseriales, hyalinae, circ. 20  $\mu$  longae et 13  $\mu$  latae, ambitu late ovoideae, rectae, 2-loculares, locus superior latior et subduplo longior. — A proxima *A. adnexa* differt apotheciis fere omnino innatis et thalo verniceo. — Lignicola prope Apiahy in Brasilia: Puiggari n. 494.

(Fortsetzung folgt).

---

### Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar.

117. Washington. Annual of Report of the Commission of Agriculture for 1881 and 1882. Washington, 1882.
118. Prag. Verein „Lotos“. Lotos, Jahrbuch für Naturwissenschaft. Neue Folge. 3. und 4. Band. 1883.
119. Prag. Königl. botanische Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzungsberichte, Jahrg. 1881.
120. Prag. Königl. botanische Gesellschaft der Wissenschaften. Abhandlungen der mathem.-naturwiss. Classe 1881/82. VI. Folge. 11. Band. Prag, 1882.

---

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber) in Regensburg.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [66](#)

Autor(en)/Author(s): Müller J.

Artikel/Article: [Lichenologische Beiträge 286-290](#)