

chen eigen ist, *Vitex Agnus castus* (ebenfalls als starker Baum) *Bignonia Catalpa*, *Laurus Benzoin*, *Diospyros Lotus* und *virginiana*, *Platanus orientalis*, *Gleditschia horrida* mit ihrer furchtbaren Verschanzung von fast ellenlangen ästigen Dornen um den Stamm am Anfang der Krone, *Pinus Cedrus*, *Liquidambar Styraciflua* und *imberbe*, *Quercus cocigera*, *Annona triloba* und viele andere wölbten sich zu einem geweihten Haine der Flora zusammen. Auch viele Bignonien und Passifloren halten hier schon im Freyen aus. Die Glashäuser sind freylich mit denen der gröfseren deutschen Gärten nicht zu vergleichen, und haben auch, was bei einem so alten Garten mir auffiel, wenig oder keine großen Exemplare. (Beschluss folgt.)

## II. L e s e f r ü c h t e :

In der von dem Dr. Hoffmann, jetzigen Privatdocenten zu Halle 1823 herausgegebenen Dissertation: *De vallium in Germania boreali principatum directione memorabili congrua*, findet sich Seite 3 in einer Note, eine interessante Auseinandersetzung der geographischen Verhältnisse von *Erica tetralix* und *Ilex aquifolium* welche wir hier mittheilen, da die angeführte Schrift wohl nicht vielen bekannt werden, oder darin solche Bemerkungen nicht gesucht werden dürften: *Extensio hujus plantae (Er. tetralicis) geographica maxime mihi memoratu digna videtur. Plaga in qua multitudo stirpium florum regionis faciem efficit insignem, in Germania finibus coarctatur bene notatis. Lines,*

chen eigen ist, *Vitex Agnus castus* (ebenfalls als starker Baum) *Bignonia Catalpa*, *Laurus Benzoin*, *Diospyros Lotus* und *virginiana*, *Platanus orientalis*, *Gleditschia horrida* mit ihrer furchtbaren Verschanzung von fast ellenlangen ästigen Dornen um den Stamm am Anfang der Krone, *Pinus Cedrus*, *Liquidambar Styraciflua* und *imberbe*, *Quercus cocigera*, *Annona triloba* und viele andere wölbten sich zu einem geweihten Haine der Flora zusammen. Auch viele Bignonien und Passifloren halten hier schon im Freyen aus. Die Glashäuser sind freylich mit denen der gröfseren deutschen Gärten nicht zu vergleichen, und haben auch, was bei einem so alten Garten mir auffiel, wenig oder keine großen Exemplare. (Beschluß folgt.)

## II. L e s e f r ü c h t e :

In der von dem Dr. Hoffmann, jetzigen Privatdocenten zu Halle 1823 herausgegebenen Dissertation: *De vallium in Germania boreali principatum directione memorabili congrua*, findet sich Seite 3 in einer Note, eine interessante Auseinandersetzung der geographischen Verhältnisse von *Erica tetralix* und *Ilex aquifolium* welche wir hier mittheilen, da die angeführte Schrift wohl nicht vielen bekannt werden, oder darin solche Bemerkungen nicht gesucht werden dürften: *Extensio hujus plantae (Er. tetralicis) geographica maxime mihi memoratu digna videtur. Plaga in qua multitudo stirpium florum regionis faciem efficit insignem, in Germania finibus coarctatur bene notatis. Lines,*

quam tangit intrans a maris litoribus in continen-  
 tem, occasum versus incipit in sinu late patenti, ex  
 quo tractu montium sylvae Teutoburgicae et mon-  
 tium schistaceorum Guestphatiensium inclusa pro-  
 fluant flumina Lippe et Ems nominata. Occurrit  
 prorsus divulgata in margine septentrionali mon-  
 tium comitatus Lingensis, Voerdam praeterit et paul-  
 lulum in septentrione Mindanae Visurgin asequi-  
 tur. Hinc lineam fere rectam sequens Hannoverum  
 et Brunsvicum versus progreditur, deflectitur tum  
 statim versus septentrionem et prope oppidum Gif-  
 horn fines ejus orientales attingunt Alleram. Dese-  
 rit hunc fluvium et Brohmae forum praeteriens in-  
 cludit urbem Salzwedel, Albim trajiciens infra op-  
 pidum Lenzen. In terra Megalopolitana brevi ma-  
 ris litoribus approximatur, partem ditioni Sveri-  
 nensi subditam orientalem penitus evitat (Timm)  
 et non amplius reperitur in ditione Strehlizensi, do-  
 nec in Pommerania olim imperio Sueciae subjecta  
 mare asequitur. Planta sic limitibus inclusa an  
 praeterea crescat in Pommerania ulteriori mihi non  
 fuit certe comprobandum, at prope Gedanum non  
 occurrit (Reyger). In Borussia orientali recentis-  
 simis demum temporibus singulo quidem loco pro-  
 pe Regiomontum detecta est, in Floris urbis Petro-  
 politanae frustra quaesivi. In Neomarchia et in  
 campis Silesiae superioris et inferioris arenosis in-  
 dicatam haud reperi, in regione Berolinensi Neo-  
 marchiae vestigia ejus prius deprehensa amisimus.  
 Occurrunt in ripa dextra Albis fluvii prope oppida  
 Lohburg et Moeckern et in septentrione oppidi Gom-

mern ericeta lata, Callunae stirpibus solum vestita  
 et in tesquis locis vastissimis Palaeomarchia spar-  
 sius tantum reperi in margine boreali paludis Droem-  
 ling, eodem modo versus occidentem in regionibus  
 turfosis inter Brunovicum et Helmstadium. In pa-  
 ludibus permagnis inferioris Bavariae hanc *Ericam*  
 non vidi redeantem, attamen passim reperitur in  
 paludibus montium Rhoen dictorum (Schneider) et  
 prope Francofurtum ad Moenum. Climatis ferita-  
 tem latitudine geographica haud mutata simul cum  
 longinquitate maris augeri, planta haec, temperiei  
 praecipue repentinas variationes et gradus remotis-  
 simos frigoris et caloris evitans, probat excellentis-  
 sime. Persequimur enim hanc ex Germania bo-  
 reali in provincias Sueciae meridionales usque ad  
 fines septentrionales Smolandiae, Westgothiae et  
 Bahusiae, totum occupat Daniae regnum cum insu-  
 lis, per episcopatum Christiansandanse divulgata Nor-  
 vegiam petit et in litore hujus regni progrediens  
 haud procul ab urbe Nidrosia gradum attingit la-  
 titudinis sexagesimum quartum (Gunner). Ad aequa-  
 les fere regiones boreales adscendit in Scotia (Light-  
 foot, Hooker). Versus occasum hibernum haec  
*Erica* zonam latam pone litora maris videtur pro-  
 sequi, vulgaris occurrit per Hollandiam totam et  
 Belgiam, frequens reperitur Parisiis, occupat plani-  
 ties vastas Britanniae gallicae (Poiret) et redit in  
 provincia ericetorum (Francogallis Dept. des Lan-  
 des) usque ad montes pyrenaicos. Fines ejus,  
 quam procul a Lutetia progrediuntur versus orien-  
 tem non cognoscere licuit, nascitur haud in Bur-

gundia (Dürand) sed passim occurrit in Lotharingae paludibus nemorosis. Fugit omnino litora maris mediterranei calidiora, prope Canet, versus aquilonem ab oppido Perpignan situm ea tantum assequitur, montium enim hic proximorum influxus temperiem aëris minuit (Picot de Lapeyrouse). Eandem fere per septentrionalem Europæ partem *Ilicis aquifolii* fines directionem sequuntur. Magis ab hiemis frigore, quam ab aestatis calore recedens, haec planta versus meridiem gradus geographici latitudinis borealis quinquagesimi primi, favente soli natura, sponte provenit ubique, dum septentrionem versus litora cingit fascia sensim sensimque magis angustata. Marginem postquam comitavit septentrionalem montium ultimorum stratificationum Germaniae borealis Alleram deserit in regione oppidi Vorsfelde, Palaeomarchiam et terras ejus orientem spectantes non attingit et abit aquilonem versus in insulam Rugiam. Ceterum in Sueciae provinciis meridionalibus haud redit, attamen frequens reperitur in peninsula Daniae. Leop. de Buch invenit *Ilicem* in meridionali parte Norvegiae in vallibus parvulis prope Eids-Heien hand procul ab oppido Mandal, et Gunnerus eum in insula Sundmoer episcopatus Nidrosiensis provenire memorat. —

### III. C u r i o s a.

Pinguicula vulgaris: nectario conico Willd. Spec. 1. 110. nectario subulato Roem. et Schult. syst. veg. 1. 189. nectario cylindrico Roth. germ. 2. 110. nectario acuto Schrad. germ. 1. 52.

gundia (Dürand) sed passim occurrit in Lotharingae paludibus nemorosis. Fugit omnino litora maris mediterranei calidiora, prope Canet, versus aquilonem ab oppido Perpignan situm ea tantum assequitur, montium enim hic proximorum influxus temperiem aëris minuit (Picot de Lapeyrouse). Eandem fere per septentrionalem Europæ partem *Ilicis aquifolii* fines directionem sequuntur. Magis ab hiemis frigore, quam ab aestatis calore recedens, haec planta versus meridiem gradus geographici latitudinis borealis quinquagesimi primi, favente soli natura, sponte provenit ubique, dum septentrionem versus litora cingit fascia sensim sensimque magis angustata. Marginem postquam comitavit septentrionalem montium ultimorum stratificationum Germaniae borealis Alleram deserit in regione oppidi Vorsfelde, Palaeomarchiam et terras ejus orientem spectantes non attingit et abit aquilonem versus in insulam Rugiam. Ceterum in Sueciae provinciis meridionalibus haud redit, attamen frequens reperitur in peninsula Daniae. Leop. de Buch invenit *Ilicem* in meridionali parte Norvegiae in vallibus parvulis prope Eids-Heien hand procul ab oppido Mandal, et Gunnerus eum in insula Sundmoer episcopatus Nidrosiensis provenire memorat. —

### III. C u r i o s a.

Pinguicula vulgaris: nectario conico Willd. Spec. 1. 110. nectario subulato Roem. et Schult. syst. veg. 1. 189. nectario cylindrico Roth. germ. 2. 110. nectario acuto Schrad. germ. 1. 52.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1824

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Lesefrüchte 269-272](#)