

les rubicundi," und so klein sie auch ist, so zeigt sie doch schon am untersten Theil des Stengels einen Ast, der der Willdenowischen Diagnose völlig entspricht. Gegen den Willdenowischen Irrthum, und gegen die Flora Erlangensis, die diese Sturmische Figur für *O. stricta* erklären, muß dennoch diese, wie die allgemein in Deutschlands Gärten als lästiges Unkraut vorkommende Pflanze, es mögen ihre Stengel aufrecht seyn, oder niederliegen, für *O. corniculata* gehalten werden.

Ganz anders ist es mit *Oxalis stricta*. Unsere zahlreichen Exemplare aus Italien sind eines wie das andere vollkommen übereinstimmend über einen Schuh lang, steif aufrecht, vollkommen einfach und durchaus ohne alle Wurzelausläufer. Stengel nur wenig, Blattstiele aber stark feinhaarig, was jedoch im mindern Grade auch bei *O. corniculata* statt findet. Sie wächst in Wäldern.

II. R e c e n s i o n e n .

Scottish cryptogamic Flora by R. K. Greville.
Fortsetzung. (S. Flora Jahrg. VII. p. 89.)

N. XVII. tab. 81. *Leotia Mitrula* Pers., als Synonymon auch dabei *L. pusilla* Clust. — 82. *Sphaeria lignaria* Grev., sphaerulis minutis solitariis vel subcongestis nigris ovatis setoso-rugosis, astomis, sporulis ovalibus in tubis cylindricis. In ligno. — 83. *Peziza sulphurea* Pers. — 84. *Cucurbitaria Berberidis* Grev., erumpens, sphaerulis congestis rotundis nigris astomis rimoso-rugosis, receptaculo sessili; sporulis magnis ovalibus. In truncis et ramis emortuis *Berberidis vulgaris*. Vere. —

85. *Sphaerococcus cristatus* Ag. — 86. *Xylaria gracilis* Grev., Char. gen. Receptaculum carnosum vel suberosum stipite praeditum. Sphaerulae in receptaculo immersae, intus massa gelatinosa sporulifera repletae. X. gracilis, stipite elongato cylindraceo aequali subflexuoso, receptaculo laevi ovato - rotundato fusco; sphaerulis oblongis pallidis. Ad terram in locis valde muscosis. — 87. *Hysterium gramineum* Pers. in Mauz. et Nestl. Pl. exsicc., minutum gregarium oblongo - ellipticum convexum nigrum, tubulis sporuliferis filiformibus, sporulis globosis pellucidis. Vulgatum in culmis foliisque variorum graminum emortuis. Autumno. — 88. *Hysterium melaleucum* Fries. — 89. *Morchella hybrida* Pers. — 90. *Polysiphonia spinulosa* Grev. (Hutchinsia Agh.), atro - rubescens, ramis divaricatis subrigidis, ramulis brevibus strictis subulatis divaricatis; articulis diametro subaequalibus tritubulosis, tuberculis globosis sessilibus minutissimis. Ad littora maris. — 91. *Agaricus pratensis* Pers. — 92. *Bryum demissum* Hook. — 93. *Phacorrhiza filiformis* Grev., *Typhula phacorrhiza* Fries, *Clavaria phac.* Auct. — 94. *Erineum tortuosum* Grev. — 95. *Uredo Fabae* Pers. (Caeoma Leguminosarum Lk.) — 96. *Sphacelaria racemosa* Grev., uncialis caespitosa olivacea subrigida, fronde dichotomo, articulis diametro aequalibus, capsulis ovalibus racemosis pedunculatis. Ad littora maris. — 97. *Aecidium Berberidis* Pers. — 98. *Clavaria uncialis* Grev., alba gregaria clavata teres laevis non fragilis apice obtusa ad basin nuda valde attenuata. In caulibus emortuis plan-

larum majorum in sylvis. Autumno. — 99. *Peziza erumpens* Grev., minuta ceracea glaberrima sessilis cinerea sub cortice Aceris Pseudo-Platani petiolorum subputridorum inclusa, tempestate humida solum erumpens. Autumno. — 100. *Grimmia trichophylla* Grev., caule elongato, foliis lanceolato-subulatis carinatis, margine recurvato, apice pilifero, seta curvato-flexuosa, theca ovato-elliptica sulcata, operculo rostrato. In lapidum aggeribus Scoliae. — 101. *Sclerotium subterraneum* Tode, *Scl. muscorum* Pers. — 102. f. 1. *Fusidium griseum* Lk. f. 2. *Fusidium flavo-virens* Dittm. — 103. *Heterosphaeria Patella* Grev. Char. gen. Receptaculum o. Thecae vel tubulae sporuliferae fixae erectae persistentes, sphaerulis coriaceis vel corneis indehiscen-
tibus inclusae. Synon. *Sphaeria Patella* Pers., *Sph. nigra* Purton. — 104. *Agaricus granulosis* Pers. — 105. *Orthotrichum rupicola* Funck. — 106. *Lycogala argentea* Pers. — 107. *Peziza vesiculosa* Bull. — 108. f. 1. *Sporotrichum minutum* Grev., thallus subrotundus minutus candidus, filis laxè intricatis, sporidiis ovalibus numerosis candidis. In fimo putridisque corporibus. Autumno et hieme; f. 2. *Sporotrichum sulphureum* Grev., thallus caespitosus rotundatus sulphureus, filis laxè intricatis, sporidiis numerosis globosis sulphureis. In fimo, ligno humido, subere humectato in cavis et cellis. — 109. *Neckera pennata* Hedw. — 110. *Stromatosphaeria rubiginosa* Grev. Char. gen. Receptaculum varium sessile liberum vel erumpens. Sphaerulae latentes vel ore exserto; intus massa gelatinosa sporulifera

instructae. *Synon. Sphaeria rubiginosa Pers.* — 111. *Leocarpus vernicosus Lk.* — 112. *Septaria Ulmi Fries.* — 113. *Polyporus sulphureus Fries.* — 114. *Stromatosphaeria elliptica Grev.*, distincta gregaria submagna elliptica erumpens fusco-ferruginea minutissimo pulverulenta interne nigra, sphaerulis omnino latentibus. In truncis ramisque moribundis Betulae albae rara. — 115. *Orthotrichum Drummondii Hook. et Grev.*, foliis oblongo-lanceolatis subcrispatulis, seta elongata; theca clavata sulcata; operculo longe rostrato, peristomio simplici e dentibus 16 reflexis basi liberis sed per paria apicibus plerumque unitis; calyptra valde pilosa. In arborum truncis. — 116. *Dicranum Schreberianum Hedw.* — 117. *Clavaria abietina Pers.* — 118. f. 1. *Xyloma acerinum Pers.*; f. 2. *Xyloma salicinum Pers.* — 119. *Agaricus comatus Pers.* — 120. *Polystigma rubrum Pers.* — Vol. III. 121. *Boletus luridus Schaeff.* — 122. *Diderma globosum Pers.* — 123. *Grimmia unicolor Hook. mss.*, caule elongato, foliis anguste lanceolatis obtusis integris concavis, theca laevi ovata pallida, operculo conico-rostrato, seta breviuscula flexuosa. In rupibus. — 124. f. 1. *Acremonium fuscum Schmidt.* — f. 2. *Acremonium verticillatum Lk.* — 125. *Physarum aureum Pers.* — 126. f. 1. *Botrytis agaricina Lk.*; f. 2. *Botrytis diffusa Alb. et Schw.* — 127. *Didymodon glaucescens Grev.*, *Trichostomum Auct.* — 128. *Agaricus rimosus Bull.* — 129. f. 1. *Hysterium foliicolum β Hederae Fries.*; f. 2. *Hysterium maculare Fries.* — 130. *Arcyria punicea Pers.* — 131. *Nostoc coeruleum*

leum Lyngb. — 132. *Leangium*(?) *Trevelyani* Grev.,
 sporangium sessile, peridio segmentis plurimis linea-
 ribus subregularibus reflexis dehiscenti; columella
 minima, sporulis pedicellatis. In foliis muscorum
 majorum in sylvis. Rarum. Autumno. — 133. *Or-
 thotrichum Ludwigii* Brid. — 134. *Erysiphe Pisti*
DC. — 135. *Cucurbitaria cinnabarina* Grev. *Sphae-
 ria cinnabarina* Tode, *Sph. decolorans* Pers. — 136.
Stromatosphaeria fragiformis Var. *laevis* Grev. *Sph.*
fragiformis Auct. — 137. *Orthotrichum speciosum*
Nees. — 138. *Sphaeria rosella* Alb. et Schw. — 139.
Peziza Wauchii Grev., sessilis gregaria ovato-glo-
 bosa aurea strigosa, ore contracto subiculo amplo
 villosa dilatiori. In lignis emortuis in terra aut
 prope terram. Autumno. — 140. *Myrothecium Car-
 michaelii* Grev., peridio polymorpha candido, spo-
 rulis viridibus nigrescentibus cylindricis. In vege-
 tabilibus accumulatis subputrescentibus. — 141. f. 1.
Erineum griseum Pers.; f. 2. *Erineum clandestinum*
Grev., *Er. Oxyacanthae* Pers. — 142. *Thelephora*
quercina Pers. — 143. *Helvella leucophaea* Pers. —
 144. f. 1. *Sclerotium scutellatum* Alb. et Schw.;
 f. 2. *Sclerotium Semen* Tode. — 145. *Weissia splach-
 noides* Thbg. — 146. f. 1. *Dothidea Robertiani*
Pries; f. 2. *Dothidea alnea* Fries. — 147. *Thele-
 phora Corium* Pers. — 148. f. 1. *Helmisporium*
macrocarpum Grev., fibrae simplices subulatae sub-
 acutae nigerrimae, sporidiis magnis 5 — 8 septatis.
 In cortice rami putrescentis arboris cujusdam. Autum-
 no; f. 2. *Helmisporium velutinum* Lk. — 149. *Weissia*
latifolia Schwaegr. — 150. *Chaetophora elegans* Agh.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1825

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Recensionen 565-569](#)