

- (r) Rechteckige (quadratae).
 - (s) Rechteckig-gewimperte (quadrato-ciliatae).
 - (t) Keilförmige glatte (cuneiformes glabrae).
 - (u) Keilförmige gewimperte (cuneiformes ciliatae).
- (Beschluss folgt.)

II. Correspondenz.

Ich habe Ihnen wohl schon geschrieben, daß ich frische Exemplare des *Alcyonidium diaphanum* in Weingeist aus Holland erhalten habe? Dieses sonderbare Wesen gehört gewiß nicht in unser botanisches Reich, wo es noch in den neuesten algologischen Werken aufgeführt wird; meine Exemplare sind nämlich ganz mit den Polypern der Gattung *Lobularia* bedeckt, wohin Lamouroux auch später die vermeintliche Alge brachte. Ich sah auch im Innern in den weiten Maschen der Peripherie die braunen Körner, die man für die Früchte der Alge hielt. — Am besten würde aber doch dieses Wesen, wie es mir scheint, eine eigene, den *Spongien* verwandte Gattung unter den *Zoophyten* bilden.

Durch die Güte des Hrn. Prof. Dr. Kunth in Paris sehe ich mich jetzt in den Stand gesetzt, eine Abbildung von dem bis jetzt noch so wenig gekannten *Myroxylon peruvianum* in meinen Arzneipflanzen geben zu können. Die erhaltenen Exemplare sind von den im neuesten Berliner Jahrbuch der Pharmacie abgebildeten Pflanzen ganz verschieden etc.

N. v. E. d. J.

III. Botanische Notizen.

Von den niederländischen Blumengesellschaften

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1826

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Nees von Esenbeck Theodor Friedrich
Ludwig

Artikel/Article: [Correspondenz 29](#)