Bericht über vegetationskundliche Begehungen

In der Gemeinde Natternbach.

ausgearbeitet von

Michael Strauch

Juli , 1989

Bericht über zwei vegetationskundliche Begehungen
im Bereich der geplanten Entwässerungsanlage Natternbach,
WG Fronberg, ca. 1 km nord-westlich der Ortschaft Natternbach.

Bearbeiter: Strauch Michael
Eisenwerkstr. 36/4
4020 Linz

Datum der Begehung:
10.7.1989
26.7.1989

Gebietsbeschreibung:

Bei dem zu untersuchenden Gebiet handelt es sich um einen ca. 1 ha großen, im rechtsufrigen Bereich des Natternbaches gelegenen Feuchtwiesen-, Hochstauden-, u. Röhrriechbestand, einerseits, sowie um linksufrig gelegene, in ihrer Lage etwa gleichartige, jedoch intensiv genutzte Feuchtwiesenbestände, andererseits.

Beide, in eine Geländemulde eingebettete Flächen fallen vom Bach weg seicht ab um dann erst (nach ca. 10-30m) in steilere Hanglage überzugehen. Bei einer weiteren in diese Richtung verlaufenden (sofern durch Sedimentationsvorgänge bedingte) Strukturentwicklung ist eine zunehmende Vernässung und damit eine reichhaltigere Vegetationsstruktur zu erwarten.

Überblick über die Vegetationsverhältnisse

1. rechtsufriger Bereich

Entsprechend der oben beschriebenen Situation befindet sich der feuchteste Bereich in etwa 10-15m Entfernung vom Bach, welcher dem Hang zu von z.T. noch nährstoffarmen Feuchtwiesenbeständen, dem Bach zu von ebenfalls höher stockenden Mädesüß- u. Rohrglanzgrasbereichen umgeben ist. Die feuchtesten Bereiche selbst werden von Assoziationen der Großseggenesellschaften (Magnocaricion) eingenommen.

Folgende Gesellschaften konnten festgestellt werden:

Klasse: Phragmitetea Tx. et Prsg. 42

Ordnung: Phragmitetalia W. Koch 26

Verband: Phragmition W. Koch 26

Ass.: Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 26 em. Philippi 73

Verband: Magnocaricion W. Koch 26

Ges.: *Carex rostrata*

Ass.: *Caricetum vesicariae* Br.-Bl. et Denis 26

Ass.: *Phalaridetum arundinaceae*(W.Koch 26 n.n.)Libbert 31

Klasse: Molinio - Arrhenatheretea Tx.37(em.Tx.et Prsg.51)

Ordnung: Molinietaalia caeruleae W.Koch 26

Verband: Filipendulion ulmariae Segal 66

Ges.: *Filipendula ulmaria*

Verband: *Juncion acutiflori* Br.-Bl.47

Ass.: *Juncetum acutiflori* Br.-Bl.15

Verband: *Molinion caeruleae* W.Koch 26

Ass.: *Molinetum caeruleae* W.Koch 26

1.Ass.: *Glycerio-Sparganietum neglecti* - Assoziationsfragment

Fläche: ca.20m²

An einer in der Umgebung der Großseggenrieder gelegenen Stelle breitet sich auf offener, mäßig fließender bis stehender Wasserfläche kleinflächig eine Gesellschaft aus, die durch die Dominanz von *Sparganium erectum* ssp. *neglectum* charakterisiert ist. Ihr fehlen jedoch weitere Kenn- u. Trennarten, so daß nur von einer fragmentarischen Ausbildung gesprochen werden kann.

Das Vorkommen von *S. erectum* ssp. *neglectum* an sich ist aber bereits als Besonderheit zu werten und hervorzuheben.

Das Igelkolben-Röhricht stockt stets unter der Mittelwasserlinie, so daß es bei einer Grundwasserabsenkung vernichtet werden würde.

Folgende Artzusammensetzung wurde festgestellt:

<i>Sparganium erectum</i> ssp. <i>neglectum</i>	3	100%
<i>Lemna minor</i>	2	
<i>Lythrum salicaria</i>	1	
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>tetragonum</i>	+	
<i>Myosotis palustris</i> agg.	+	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	+	
<i>Juncus acutiflorus</i>	+	
<i>Galium elongatum</i>	r	
<i>Cardamine amara</i>	r	

2.Ges.: *Carex rostrata*

Fläche: ca.60m²

Dieser Gesellschaft gilt es, besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da sie vornehmlich nährstoffärmere Standorte besiedelt, was ja mittlerweile schon etwas besonderes ist. Ein Teilbereich zeichnet

sich besonders durch das Vorkommen von *Potentilla palustris* (Sumpfb-
Blutauge) aus.

(Da die bisher belegten Bestände mit *C. rostrata* durchwegs Arten
der Moore enthalten (*Eriophorum angustifolium*, *Carex lasiocarpa*, ..),
und diesen Aufnahmen gleichzeitig Arten der Großröhrichte fehlen,
können die hiesigen Bestände nur als Gesellschaft aufgefaßt werden.
Das eigentliche "Caricetum rostratae" stellt eine Assoziation
des Scheuchzerio-Caricetea dar.)

Zwei Aufnahmen zeigten folgende Zusammensetzung:

	1	2
<i>Carex rostrata</i>	4	4
<i>Galium uliginosum</i>	+	+
<i>Scutellaria galericulata</i>	+	r
<i>Carex gracilis</i>	+	2
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	+
<i>Potentilla palustris</i>	3	r
<i>Juncus effusus</i>	2	+
<i>Agrostis stolonifera</i>	r	+
<i>Carex nigra</i>	+	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	r	
<i>Filipendula ulmaria</i>	r	
<i>Epilobium palustre</i>		1
<i>Lythrum salicaria</i>		+
<i>Juncus acutiflorus</i>		+

3. Ass.: Caricetum vesicariae, Subass. von *Carex rostrata*

Fläche: ca. 200m²

Die Gesellschaft wächst auf "flach überschwemmten Stellen, über
nährstoffreichem, oft kalkhaltigem Grund" (Obd. 77). Die Subassozi-
ation von *Carex rostrata* zeigt allerdings nährstoffärmere Standorte an
und leitet (in diesem Fall) zur Ges.: *Carex rostrata* über.

In landwirtschaftlich genutzten Bereichen ist das Caricetum vesicariae
kaum noch anzutreffen, da es, ebenso wie die *C. rostrata*-Gesellschaft
sehr empfindlich auf Entwässerungsmaßnahmen reagiert.

<i>Carex vesicaria</i>	4
<i>Carex rostrata</i>	2
<i>Galium elongatum</i>	+
<i>Galium uliginosum</i>	+
<i>Scutellaria galericulata</i>	+

<i>Lycopus europaeus</i>	r
<i>Myosotis palustris</i>	+
<i>Filipendula ulmaria</i>	+
<i>Lythrum salicaria</i>	r
<i>Polygonum amphibium</i>	r
<i>Juncus effusus</i>	+
<i>Scirpus sylvaticus</i>	+
<i>Juncus acutiflorus</i>	+
<i>Poa palustris</i>	r
<i>Agrostis stolonifera</i>	r
<i>Jucus conglomeratus</i>	r
<i>Potentilla palustris</i>	+

4. Ass.: Phalaridetum arundinaceae

Das Phalaridetum nimmt im Gebiet, v.a. im unmittelbaren Bachbereich, eine relativ große Fläche ein (ca. 20% d. Ges.-Fläche). Es steht mit den Großseggenriedern und besonders mit den Mädesüß-Fluren in engem Kontakt und bildet so gesamtgesehen ein wichtiges Verzahnungselement. Die Gesellschaft ist noch weiter verbreitet, da sie auch (zumindest nicht hart) regulierte Bäche wieder zu besiedeln vermag und dort, wegen der oft hohen Strömungsgeschwindigkeit, konkurrenzstärker ist als andere hochwüchsige Gesellschaften.

Gemeinsam mit der *Filipendula ulmaria*-Gesellschaft hat sie im Gebiet ob ihrer Hochwüchsigkeit einen wesentlichen Anteil an der Prägung des Landschaftsbildes.

Folgende Arten wurden festgestellt:

<i>Phalaris arundinaceae</i>	5
<i>Galium elongatum</i>	+
<i>Scutellaria galericulata</i>	+
<i>Carex vesicaria</i>	r
<i>Lycopus europaeus</i>	+
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+
<i>Phragmites communis</i>	+
<i>Urtica dioica</i>	2
<i>Filipendula ulmaria</i>	+
<i>Lysimachia nummularia</i>	+

5. Ges.: *Filipendula ulmaria*

Diese bei uns noch rel. weit verbreitete (aber in diesem Ausmaß keineswegs häufig anzutreffende) Gesellschaft des Echten Mädesüß, besiedelt zumeist die Bereiche aufgelassener Naßwiesen in der Umgebung Bächen und Flüssen (Obd. 83). Da ihr im Gebiet eigene Kenn-

arten fehlen (lediglich *Filipendula ulmaria* als dominante Verbandscharakterart), kann hier nur von einem *Filipendula ulmaria*-Stadium gesprochen werden.

Die Gesellschaft stockt im allgemeinen über der Mittelwasserlinie, ist aber im Gebiet den Assoziationen des *Magnocaricion* vorgelagert, da sich das Gelände zum Bach hin wieder erhöht.

Teilweise im unmittelbaren Uferbereich wachsend und an das ebenfalls ufernahe *Phalaridetum* grenzend, prägt es wegen seiner großen Ausdehnung (etwa 70% der gesamten ungenutzten Fläche) das Landschaftsbild in besonderem Maße.

Die Gesamtfläche enthält Arten in folgender Zusammensetzung:

<i>Filipendula ulmaria</i>	5	2216
<i>Urtica dioica</i>	2	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	2	
<i>Galium elongatum</i>	+	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	+	
<i>Myosotis palustris</i> agg.	+	
<i>Juncus effusus</i>	+	
<i>Angelica sylvestris</i>	r	
<i>Cirsium oleraceum</i>	r	
<i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>caerulea</i>	r	
<i>Lythrum salicaria</i>	r	
<i>Impatiens noli-tangere</i>	r	
<i>Scutellaria galericulata</i>	r	
<i>Iris pseudacorus</i>	r	
<i>Mentha aquatica</i>	r	
<i>Juncus acutiflorus</i>	r	
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>tetragonum</i>	r	
<i>Stachys sylvatica</i>	r	
<i>Deschampsia caespitosa</i> agg.	r	
<i>Cirsium palustre</i>	r	

6. Ass.: *Juncetum acutiflori*

Der Übergangsbereich zwischen den am Hang gelegenen Wirtschaftswiesen und den flachen Uferpartien zeichnet sich durch ein Mosaik von ineinander verzahnten Gesellschaften aus. Ein Teil davon (ca. 100m²) wird von *Juncus acutiflorus* dominiert, einer auffälligen und in ÖÖ durchaus seltenen Binsen-Art. Die folgende Aufnahme (1) entspricht in ihrer Zusammensetzung weitgehend dem, was Braun-Blanquet als "*Juncetum acutiflori*" beschrieb.

Innerhalb der z.T. in andere Gesellschaften übergreifenden *Juncus acutiflorus*-Bestände befinden sich kleine Flecke, welche sich durch Basenarmut und gute Durchfeuchtung auszeichnen. An diesen Stellen deuten sich anmoorige Bereiche an. Wegen der deutlichen Dominanz der Molinion- u. Juncion-Arten wird aber von einer Zuordnung abgesehen. Da deutliche Verbindungen v.a. zum Juncetum *acutiflori* bestehen, wird die Aufnahme an dieser Stelle angeführt(2).

	1	2
<i>Juncus acutiflorus</i>	4	3
<i>Juncus conglomeratus</i>	3	+
<i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>caerulea</i>	+	2
<i>Succisa pratensis</i>	r	+
<i>Galium uliginosum</i>	+	+
<i>Cirsium palustre</i>	+	+
<i>Filipendula ulmaria</i>	r	+
<i>Lysimachia vulgaris</i>	r	1
<i>Holcus lanatus</i>	+	2
<i>Potentilla erecta</i>	+	+
<i>Carex nigra</i>	r	+
<i>Angelica sylvestris</i>	+	r
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	r	
<i>Carex panicea</i>	r	
<i>Juncus articulatus</i>	r	
<i>Shagnum palustre</i>		+
<i>Viola palustris</i>		+
<i>Carex pallescens</i>		r
<i>Danthonia decumbens</i>		r
<i>Agrostis canina</i>		r
<i>Holcus mollis</i>		+
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>tetragonum</i>		r
<i>Briza media</i>		+
<i>Scirpus sylvestris</i>		r
<i>Agrostis stolonifera</i>		r
<i>Lythrum salicaria</i>		r
<i>Anthoxanthum odoratum</i>		2

7. Ass.: Molinietum *caeruleae* - Assoziationsfragment

Diese bei uns mittlerweile sehr selten gewordene Pflanzengesellschaft bevorzugt gut durchlüftete, neutrale bis schwach basische, nährstoffarme Standorte. Pfeifengras-Wiesen werden als ungedüngte Feucht-

wiesen genutzt, doch heutzutage entweder in Intensivgrünland umgewandelt oder einfach aufgelassen.

Die Fläche enthält mehrere Arten anderer Assoziationen, zudem fehlen ihr, bis auf *Molinia caerulea* und *Sucissa pratensis* als Ordnungscharakterarten, geeignete Kenn- u. Trennarten, so daß nur von einem Assoziationsfragment gesprochen werden kann.

Die Fläche setzt sich folgendermaßen zusammen:

<i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>caerulea</i>	4	2219
<i>Molinia caerulea</i> ssp. <i>altissima</i>	r	
<i>Sucissa pratensis</i>	+	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	1	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	
<i>Agrostis stolonifera</i>	2	
<i>Achillea millefolium</i>	+	
<i>Potentilla erecta</i>	+	
<i>Stellaria graminea</i>	+	
<i>Dactylis glomerata</i>	r	
<i>Juncus articulatus</i>	+	
<i>Lechnis flos-cuculi</i>	r	
<i>Briza media</i>	r	
<i>Carex gracilis</i>	r	
<i>Carex pallescens</i>	r	
<i>Juncus acutiflorus</i>	+	
<i>Cirsium palustre</i>	r	
<i>Hypericum maculatum</i>	r	
<i>Carex brizoides</i>	+	
<i>Campanula patula</i>	r	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	r	
<i>Polygala amara</i>	r	
<i>Hieracium umbellatum</i>	+	

Gehölz-Vegetation

Entlang des rechten Ufers im Bereich der Feuchtwiesen-Bestände wird das Gesamtbild von Weiden- u. Schwarzerlen-Gebüsch mitgeprägt. Diese sind allerdings z.T. nur wenig entwickelt, so daß eine Zuordnung unterbleibt. Anklänge finden sich einerseits an das *Salicetum cinerea* Zol. 31 (Grauweiden-Gebüsch), andererseits an die von Dunzendorfer aus dem Böhmerwald beschriebene Assoziation: "*Salici fragilis-Alnetum glutinosae* Dunz. 71" (Submontane Bruchweiden-Schwarzerlen-Uferae). D. beschreibt die Gesellschaft als

"bachbegleitende Durchdringungsgesellschaft...inmitten von Wiesenflächen und Ackerfluren". Sie scheint bei uns (zumindest nördlich der Donau) weiter verbreitet zu sein und ist wohl als das Produkt einengender menschlicher Nutzung zu betrachten. Durch ihren Galeriewald-Charakter erlangt sie jedoch einen besonderen landschaftsprägenden Wert und ist außerdem als Vernetzungselement von großer Bedeutung.

Dominiert wurden die Gebüschke von:

<i>Salix cinerea</i>	3
<i>Salix fragilis</i>	2
<i>Alnus glutinosa</i>	2
<i>Deschampsia cespitosa</i>	2
<i>Urtica dioica</i>	+
<i>Alopecurus pratensis</i>	+
<i>Calystegia sepium</i>	+
<i>Poa trivialis</i>	+
<i>Rubus idaeus</i>	+
u.a.	

2. linksufriger Bereich

Da die im Einflußbereich des Natternbaches stehenden Wiesen zum Zeitpunkt der Begehungen bereits gemäht waren, kann eine Charakterisierung nur in kleinem Rahmen erfolgen.

Die Bestände werden, je nach Vernässungsgrad und Nutzungsintensität von verschiedenen Arten dominiert, woraus sich folgende Aussagen ableiten lassen:

1. Bestände mit *Juncus filiformis*

Diese sind im Gebiet an staunassen, vergleyten, intensiv genutzten Stellen um die Mittelwasserlinie anzutreffen. Da *J. filiformis* an derartigen Stellen rasch zur dominanten Art werden kann liegt eine Zuordnung zur Ass.: *Juncetum filiformis* nahe. Bei Wirtschaftsextensivierung stellt die Gesellschaft einen potentiellen Standort für Arten wie *Menyanthes trifoliata*, *Potentilla palustris* und *Dactylorhiza majalis* dar.

Eine Grundwasserabsenkung würde wohl zur Entwicklung einer Glatthafer- oder Rispengras-Goldhafer-Wiese führen, welche im Gebiet häufig anzutreffen sind.

2. Wiesenknöterich-Bestände

Etwas höher als das *Juncetum filiformis*, aber immer noch an feuchten

bis nassen Stellen, siedelt sich im intensiv genutzten Feuchtgrünland die *Polygonum bistorta*-Gesellschaft an. Sie besitzt offenbar eine größere Amplitude als das *Juncetum filiformis*, so daß die Gesellschaft zumindest regional noch weiter verbreitet ist.

3. Vorkommen von *Molinia caerulea*: s. 7. Ass.

4. Die sickerfeuchten Hangbereiche

Die regional weit verbreiteten und für den Landwirt hohe Erträge bringenden Wiesen der mäßig feuchten Hanglagen werden durchwegs von *Alopecurus pratensis* (Wiesen-Fuchsschwanz) dominiert. Je nach dem Vorkommen bzw. Fehlen von *Arrhenatherum elatius* und *Trisetum flavescens* müssen sie entweder den feuchten Glatthaferwiesen oder den Rispengras-Goldhafer-Wiesen zugeordnet werden. Beide Gesellschaften können regional als die verbreitetsten Gesellschaften des feuchten Wirtschaftsgrünlandes angesehen werden.

5. Fieber-Klee Vorkommen

Bemerkenswert ist im linksufrigen Wiesenbereich das Vorkommen von *Menyanthes trifoliata* an einer parallel zum Natternbach verlaufenden alten Drainage auf einer Länge von ca. 20 m. Die Gesellschaft dürfte ihre Existenz u. a. auch der Mahd verdanken, da sich *M. trifoliata* in aufgelassenen Wiesen, welche sich rasch zu Hochstaudenfluren entwickeln, kaum durchzusetzen vermag.

Günstig wäre jedoch eine Extensivierung der Mahd, damit sich *M. trifoliata* öfters bis zur Fruchtreife entwickeln kann.

Da es sich weiträumig um den einzigen Standort von *M. trifoliata* handeln dürfte, wäre die Art regional als stark gefährdet einzustufen.

Schutzaspekte

Aus vegetationskundlicher und floristischer Sicht wären folgende Maßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Vegetation notwendig:

- a) Keine Bachverlegung bzw. -begradigung.
- b) Weitere, aber extensivere Nutzung der linksufrigen Wiesenbereiche zur Erhaltung dieser als Teil des Gesamtmosaik.
- c) Einschürige (herbstliche) Mahd der Pfeifengras- u. Waldbinsen-Bestände unter gleichzeitigem Düngeverzicht.
- d) Schaffung einer offenen Wasserfläche im linksufrigen Wiesenbereich für Arten der Teichröhrichte.
- e) Schaffung von Vernetzungs- u. Trittsteinbiotopen im unter- u. oberhalb gelegenen Bereich des Natternbaches, d. h. Rückbau von Bach-

- f) Erhaltung des Fieberklee-Vorkommens durch zeitweises und teilweises Ausräumen der Drainage.

Die Vernichtung v.a. der sich im Überflutungsbereich befindlichen Pflanzengesellschaften, muß bei einer Grundwasserabsenkung befürchtet werden, ist aber zugleich von der Bodenstruktur abhängig (locker humos - vergleyt). Besonders bedroht wären aber alle Gesellschaften, die zumindest zeitweise unter Wasser stehen und niemals trocken fallen (Großseggenrieder, Igelkolben-Röhricht, Fadenbinsen-Wiesen). Zu erwarten wäre bei diesen Gesellschaften vorerst eine Entwicklung in Richtung der Mädesüß-Fluren, sofern eine gleichzeitig einsetzende Nutzungsintensivierung dem nicht entgegen wirkt. Alle in Hanglage befindlichen (guten) Gesellschaften werden vom Überflutungsgeschehen nicht beeinflußt. Die Notwendigkeit erhaltender Pflegemaßnahmen ergibt sich aber aus der teilweise herrschenden Nährstoffarmut (Juncus acutiflorus-u. Molinia caerulea-Bestände). Die Existenz dieser Gesellschaften ist von einer herbstlichen Mahd und Düngerverzicht abhängig.

Folgende, im Gebiet nachgewiesene Pflanzenarten stehen in OÖ unter Naturschutz bzw. auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs.

Schutzstatus: g = geschützt

t = teilweise geschützt

regional selten = R

Symbole für die Gefährdung entstammen der Roten Liste

<i>Agrostis canina</i>	R -r
<i>Alnus glutinosa</i>	-r
<i>Caltha palustris</i>	-r
<i>Carex gracilis</i>	-r
<i>Carex nigra</i>	-r
<i>Carex rostrata</i>	R -r
<i>Carex vesicaria</i>	R -r
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp.tetr.	3
<i>Galium elongatum</i>	-r
<i>Glyceria fluitans</i>	-r
<i>Iris pseudacorus</i>	g -r
<i>Juncus acutiflorus</i>	R 3r!
<i>Juncus conglomeratus</i>	R 3
<i>Menyanthes trifoliata</i>	g R 3
<i>Poa palustris</i>	-r
<i>Potentilla palustris</i>	R 3r!
<i>Salix cinerea</i>	t
<i>Salix fragilis</i>	t
<i>Scutellaria galericulata</i>	-r
<i>Sparganium erectum</i> ssp.neglect.	g R
<i>Spergula arvensis</i>	-r
<i>Viola palustris</i>	R -r

Literatur

- Dunzendorfer W., (1974): Pflanzensozioökologie der Wälder und Moore des o.ö. Böhmerwaldes. Amt d. o.ö. Landesregierung (Hrsg.). Linz.
- Ehrendorfer F., (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. G. Fischer. Stuttgart.
- Oberdorfer E., (1977): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil 1. G. Fischer. Stuttgart.
- Oberdorfer E., (1983): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil 3. G. Fischer. Jena.
- Rothmaler W., (1986): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR u. BRD. Bd. 4. Volk und Wissen. Berlin.
- Schwabe A., (1987): Fluß- u. Bachbegleitende Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe im Schwarzwald. - Dissertationes Botanicae, Bd. 102. J. Cramer. Berlin.
- Niklfeld et al., (1986): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. Grüne Reihe, Bd. 5, BM f. Ges. u. Umw. (Hrsg.). Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [0126](#)

Autor(en)/Author(s): Strauch Michael

Artikel/Article: [Bericht über vegetationskundliche Begehungen in der Gemeinde Natternbach. - Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung 1-15](#)