

## Funde von selteneren Noctuidae (Lepidoptera) aus Regensburg und Umgebung

(Fortsetzung und Schluß\*)

Ludwig Neumayr und Andreas Segerer

- |   |  |    |      |     |
|---|--|----|------|-----|
| <b><i>Chortodes fluxa</i> Hb.</b>   | 2621   | N  | 3    |     |
| M&S: Art nicht aufgeführt, auch keine Angaben aus früheren Faunenverzeichnissen. Die bei HERRICH-SCHÄFFER (1863) verzeichnete Art <i>Oria fluxa</i> Hb. ist auf die Form <i>fluxa</i> Tr. von <i>C. pygmina</i> Hw. zu beziehen, da der Autor die echte <i>C. fluxa</i> Hb. als <i>Oria helmanni</i> Ev. verzeichnet hat (aber nicht für Regensburg). <i>Nonagria fluxa</i> (ohne Autor) bei HERRICH-SCHÄFFER (1840) ist in gleicher Weise zu deuten, da die Art in der Folgearbeit von HOFMANN & HERRICH-SCHÄFFER (1854) als <i>Leucania fulva</i> Hb. (= <i>C. pygmina</i> Hw.) genannt wird. |  |    |      |     |
| 6:  | Mattinger Hänge 17.7.92 (N), 24.7.92 (SCH), 16.7.93 (S).   |    |      |     |
| 20:   | bei Taimering 28.7.78 (H), 24.7.89 iA (SCH), 23.7.92 (N), Mooshof b. Roith 20.7.92 (N).  |    |      |     |
| 21:   | bei Oberhinkofen 7.7.81 iA (H), 13.8.87, 23.7.89 (SCH).  |    |      |     |
|   |  |    |      |     |
| <b><i>Chortodes pygmina</i> Hw.</b>   | 2622   |    |      |     |
| M&S: Keine aktuellen Angaben, bemerken lediglich, daß die Art seit der Zeit von SCHMID (1885-87) im Regensburger Gebiet nicht mehr beobachtet wurde.  |  |    |      |     |
| 19:   | Thanhausen 12.9.91 (N), Utzenzell b. Wiesenfelden 12.9.91 iA, 21.9.93 iA (N), Brandmoos b. Wiesenfelden 14.8.93 iA, 23.9.93 iA (N).  |    |      |     |
|   |  |    |      |     |
| <u><i>Hadeninae</i></u>   |  |    |      |     |
| <b><i>Discestra microdon</i> Gn.</b>  | 2389   | 4R | 3    | 3   |
| (= <i>D. marmorosa</i> Bkh.)  |  |    |      |     |
| M&S: E VI - VII, sehr selten.<br>An den bei M&S angegebenen Fundorten Regensburg-Keilstein, Winzer und Tegernheimer Berge bisher nicht mehr nachgewiesen.   |  |    |      |     |
| 6:  | Mattinger Hänge 6.8.61, 28.5.75 (H), Ebenwies b. Etterzhausen '80 (H), Laaber 3.8.71 Kö (H), Oberndorf/D. 7.8.93 (S), Kelheim Auf der Brandt 23.7.91, 24.7.92 (N&S).   |    |      |     |
|   |  |    |      |     |
| <b><i>Lacanobia aliena</i> Hb.</b>  | 2407   | 3  | 4R/2 | 3 3 |
| M&S: VI - VII, nirgends zahlreich.  |  |    |      |     |
| 6:  | Mattinger Hänge 15.6.74, 18.5.76, 28.6.76 (H), 2.7.91 (S), Undorf 16.6.92 (H), Undorf/Pollenried 21.6.92 (SA&SCH), 29.6.92, 19.6.93 (SCH), Girnitz 3.7.87 (N), Traidendorf b. Kallmünz 4.5.92 (SCH), Premberg b. Teublitz 17.6.77 (SCH), Kelheim Auf der Brandt 24.7.92 (N&S). |    |      |     |

\* ) Teil 1 in: Galathea 9/4 (1993), S. 142-163.

- Hecatera dysodea* D. & S.** 2410 2
- M&S: VI - VII, nicht selten.  
Mittlerweile sehr selten und seit langer Zeit erstmals wieder nachgewiesen.
- 6: Regensburg-Keilstein 16.5.92 (N&S), Pettendorf 14.6.92, 27.6.92, 8.7.92, 19.7.93, 17.8.93, in allen Fällen frisch geschlüpfte Imagines an einer Hausmauer (SCH), Mattinger Hänge 12.7.63, 18.5.76 (H), Laaber '61 (STURM).
- 19: Thanhausen 8.7.91, 21.7.91 (N).
- Hadena bicruris* Hfn.** 2418
- M&S: V - VI, VII - VIII, ohne Häufigkeitsangaben, verschiedene Fundorte.  
Heute im Gebiet sehr selten und nur in drei Einzelfunden nachgewiesen.
- 6: Mattinger Hänge 2.7.68 (H), Duggendorf 5.6.80 (SA), Waldetzenberg 14.7.90 (S).
- Hadena compta* D. & S.** 2415 4R N/3
- M&S: VI - VII, überall im Gebiet, nicht selten.  
Die Bestandsdichte ist offenbar stärkeren jährlichen Schwankungen unterworfen.
- 6: Niederwinzer 14.6.90 (N), Grünthal 22.6.87, 13.7.87 (N), Pettendorf 13.7.90, 1.7.91 (SCH), Undorf/Pollenried 21.6.92 (SCH), Kallmünz 22.8.78 (HE 1979), Leonberg E V - E VI 73 und 74 iA (SCH). Nach '70 auch bekannt von Duggendorf.
- 19: Thanhausen alljährlich und nicht selten, jahrweise iA von M VI - E VII (N), bei Wörth/D. 16.6.88 (N&S), 6.7.88 (N&S).
- 20: bei Taimering 24.6.67 (H).
- Hadena albimacula* Bkh.** 2417 4R 3 1
- M&S: "Falter sehr selten beobachtet", V - VI, "an vielen Orten im Faunengebiet", Raupe "manchmal durchaus nicht selten"
- 6: Mattinger Hänge 17.5.71, 14.5.72, 28.5.75 (H), 31.5.92 (SCH), Duggendorf 11.6.77, 14.6.78 (SA), Laaber 2.6.84 (H).
- Hadena filograna* Esp.** 2420 4R 3 2
- M&S: Geben nur zwei Funde (Regensburg-Bahnhofsbereich 27.6.1903 und Regensburg-Keilstein 4.6.1921) an.  
Offensichtlich sehr selten.
- 6: Waldetzenberg 14.7.78 (S), Traidendorf b. Kallmünz 25.5.92 (SCH), Laaber zwischen E V - A VII 55-62 mehrmals von STURM nachgewiesen, letzte uns bekannte Funde 10.6.61, 12.7.62 (STURM).
- 19: Thanhausen, 19.6.86 (N).
- 20: bei Taimering 11.6.66 (H).
- Hadena perplexa* D. & S.** 2412
- M&S: Nirgends selten, V - VII.  
Aus der neueren Zeit nur wenige Funde, heute eine seltene Art.
- 6: Regensburg-Keilstein 16.6.80 (H), Mattinger Hänge 5.7.80, 28.6.81 (H), 2.7.91 (N), 22.5.92 (SCH), Endorf '82 (SA).
- 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.6.92 (N), Wörth/D. 16.6.88 (N).
- 19/20: Zinzendorf 17.6.90, 28.6.90 (S).
- Sideridis albicolon* Hb.** 2396 2 3
- M&S: VI, selten.

- 6: Grünthal 10.6.87 (N), Waldetzenberg 14.7.78 (S), Duggendorf 5.6.79 (TEICHMANN), Laaber 30.5.56, 28.6.59 (STURM), Leonberg 31.5.74 (SCH). Von TEICHMANN aus den Jahren 1954-58 von M V - E VI in mehreren Stücken für Regensburg-Eisbuckel belegt, Regensburg-Kumpfmühl '77 und '78 (S).  
 19: Thanhausen 10.5.86 (N&S).

***Heliophobus kitti* Schaw. 2398 1 2**

- M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.  
 Bisher nur ein Einzelfund, Bodenständigkeit zweifelhaft.  
 6: Mattinger Hänge 25.6.71 (PRECHTNER, det. S).

***Papestra biren* Gz. 2408 N 3**

- M&S: Führen nur einen einzelnen Falter an, der nach SCHMID (1885-87) durch Zucht M V 1882 aus einer E VIII 1881 eingetragenen Raupe aus Alling gezogen wurde.  
 6: Regensburg-Kumpfmühl 15.5.86 (S).  
 19: Thanhausen 19.5.86 (N&S), 21.5.90 (N).

***Leucania obsoleta* Hb. 2449**

- M&S: VI - VII, vereinzelt.  
 In Ergänzung zu den bei SEGERER & NEUMAYR (1989) aufgeführten Funden von Thanhausen 5.7.86 (N&S) und 20.7.87 (N) mittlerweile von mehreren Fundorten belegt. Nach HALX (1956) M VIII bei Wörth/D. vereinzelt.  
 6: Regensburg-Kumpfmühl 25.5.65 (leg. TEICHMANN in coll. SA), Mattinger Hänge 31.5.92, 3.7.92 (SCH), 27.6.92 (N), Undorf/Pollenried 29.6.92 (SCH), Sippenauer Moor b. Saal/D. 4.7.89 (SCH), bei Eining/D. 2.7.93 (S), Deusmauer Moor 8.7.91(N).  
 19: Thanhausen 20.7.87, 17.6.89 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 27.6.92 iA (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 5.6.90, 7.6.90 (S).  
 20: bei Taimering 10.7.79, 15.5.81 (SA), 2.6.81 (H&SA), 9.6.81 (H), 26.5.89 (SCH), Mooshof b. Roith 30.6.92 (N), bei Wörth/D. 17.8.76 Kö (H).  
 21: bei Oberhinkofen 23.8.82 Kö (H).

***Mythimna vitellina* Hb. 2441 I M**

- M&S: "Von M. Säzl mehrmals am elektrischen Licht des Bahnhofs gefangen"  
 6: Regensburg-Eisbuckel LF 29.9.53 (TEICHMANN), Asenberg b. Zeitlam 5.10.91 Kö (K).  
 20: Kreuzhof b. Barbing 19.9.87 Kö (H).

***Mythimna pudorina* D. & S. 2442**

- M&S: Art nicht aufgeführt, fehlt auch in früheren Regensburger Faunenlisten.  
 Erstmals von HALX (1956) für unser Gebiet aus der Umgebung von Wörth/D. (6.7.53) gemeldet.  
 6: Regensburg-Keilstein 12.7.77 (H), Niederwinzer 12.7.90 (N), Mattinger Hänge 9.7.70 (leg. BREITSCHAFTER in coll. S), Regensburg-Lappersdorf 23.6.90 (N), Sippenauer Moor b. Saal/D. 4.7.89 (SCH), Deusmauer Moor 8.7.91 (N).  
 19: Thanhausen 5.7.86, 13.7.87 (SEGERER & NEUMAYR 1989), in mehreren Exemplaren E VI - E VII 88, 24.6.89, 26.6.90, 11.7.91, 13.7.91 (N), Wenzelbach 3.7.87 (N), Mittelberg b. Tegernheim 10.6.88, 11.7.88, 12.7.91 (N), Utzenzell b. Wiesenfeiden 4.7.89 (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 14.7.90 (S).

- 20: bei Taimering 26.6.74 (H), 6.7.91, 30.6.92 (SCH).  
 21: bei Hohengebraching 7.7.67 (N in SEGERER & NEUMAYR 1989), Biburg b. Abens-  
 berg 22.6.74, 30.6.74 (N).

***Mythimna straminea* Tr.** 2443 4R -/3 3

- M&S: Geben nur zwei Funde (el 18.5.1918, 2.7.1920) aus dem Raum Regensburg an.  
 6: Mattinger Hänge 21.7.91 (N&S).  
 20: bei Taimering 8.7.64 (H).

***Mythimna l-album* L.** 2446 4R

- M&S: VI - VII und IX, nicht selten.  
 Auch nach HALX (1956) in der Umgebung von Wörth/D. "häufig!"  
 6: Regensburg-Kumpfmühl 1.10.84 (SCH), Regensburg-Keilstein 25.9.72 Kö (H),  
 8.8.92 Kö (K), Niederwinzer 16.9.91 (N), Pettendorf 17.9.91 Kö (SCH), Mattinger  
 Hänge 4.9.74 (SA), 4.10.91 Kö iA (N), Schönhofen 25.9.89 Kö (SCH), Duggendorf  
 21.9.79 Kö, 27.8.82 Kö (SA), Kallmünz 23.8.82 Kö, 1.9.82 Kö (SA), Asenberg b.  
 Zeitlarn M IX - A X 91 mehrmals am Kö (K), Poikam A IX 92, A IX 93 Kö (SA), Kel-  
 heim Auf der Brandt 21.9.91 Kö (K), Deusmauer Moor 9.7.91 (N).  
 19: Thanhausen regelmäßig und nicht selten von E VI - A VII und E VIII - A X (N),  
 Wenzelbach 18.9.87 (N), Mittelberg b. Tegernheim 12.7.89, 9.9.89, 26.9.89,  
 15.9.91 iA (N), Donaustauf 9.9.89 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 21.5.89,  
 21.9.89, 28.6.92, 22.9.92 (N).  
 20: Kreuzhof b. Barbing 20.8.89 iA Kö (SCH).  
 21: bei Hohengebraching 10.8.68 Kö (H), bei Oberhinkofen 10.8.91 Kö (SCH).

***Mythimna sicula* ssp. *bavarica* Hörh.** 2447 3

- M&S: Die Art wird von HERRICH-SCHÄFFER (1863) ohne Fundort für die Regensburger  
 Fauna angegeben, SCHMID (1885-86) bezweifelt das Vorkommen der Art. M&S  
 nennen schließlich Kelheim und Matting als damals neu entdeckte Fundorte.  
 Im Gebiet wohl weiter verbreitet und lokal nicht selten.  
 6: Regensburg-Keilstein 8.7.91, 16.5.92 (N&S), Regensburg-Brandlberg 18.5.93  
 (N&S), Regensburg-Kumpfmühl M VI 86 (S), Mattinger Hänge 9.7.70 (leg. BREIT-  
 SCHAFFER in coll. S), 4.6.80, 5.7.80 (H), 4.6.83 (SA), 2.7.91, 27.7.91 (N&S), E V -  
 A VII 91 u. 92 iA (SCH), Etterzhausen A VI 83 (SCH), Kallmünz 13.7.78 (HE  
 1979), Laaber 12.6.83 iA, 4.7.85 (H), Leonberg 2.6.91 (SCH). Nach '70 auch be-  
 kannt von Undorf/Pollenried (H).  
 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 21.5.89, 27.5.89, 13.6.89, 17.5.92 iA, 27.5.92 iA,  
 28.6.92 (N).

***Mythimna scirpi* Dup.** 2448

- M&S: Von SCHMID (1892) am Keilstein gefangen. Keine weiteren Funddaten.  
 6: Regensburg-Keilstein 8.7.91 (S), Preßgrund b. Regenstauf 8.7.91 (N&MAHRER),  
 Leonberg 2.6.91 (SCH).  
 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 27.5.89, 17.5.92, 27.5.92 (N).

***Pseudaletia unipuncta* Hw.** I M

- M&S: Keine Angaben, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht  
 enthalten.  
 6: Bad Abbach M X - E X 78 zahlreich am Kö (H)  
 19: Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 21.9.89 (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 20.9.91 (S).

***Orthosia miniosa* D. & S.**                      2429                      3                      4R/-

- M&S: Endhälfte III, nicht häufig.  
 In Ergänzung zu den bei SEGERER & NEUMAYR (1989) aufgeführten Funden von Regensburg-Keilstein wurden noch folgende Funde bekannt:  
 6: Regensburg-Keilstein E III 89 mehrmals iA (SCH).  
 20: bei Taimering el 17.2.81 (SA), 13.4.81 iA (H).  
 21: bei Hohengebraching 12.4.67 (H).

***Orthosia opima* Hb.**                      2430                      4R                      -/N                      3                      3

- M&S: E III - A V, gelegentlich auch früher, selten. Angabe von nur zwei Fundorten (Regensburg-Schwabelweis 1901, bei Kelheim Einzelfund 1920).  
 6: Regensburg-Keilstein 30.3.89 (SCH), Duggendorf 25.4.79 (SA), Leonberg 4.5.73, 5.5.73 (SCH), Sippenauer Moor b. Saal/D. 4.5.92 (SCH).  
 21: bei Oberhinkofen 30.4.69 (SA).

***Egira conspicularis* L.**                      2427                      4R                      N/3                      3

- M&S: Vereinzelt im April.  
 Im Gebiet vereinzelt, lokal und jährweise iA. HALX (1956) führt aus der Umgebung von Wörth/D. nur einen Einzelfund (3.5.53) an.  
 6: Regensburg-Kumpfmühl 8.4.79 (S), Regensburg-Keilstein 15.5.88 (SCH), 16.5.92 (N), Regensburg-Brandlberg 18.5.93 (N&S), Grünthal 5.5.88 (N), Oberwinzer 23.4.93 (N), Winzerer Höhen 19.4.93 iA (SCH), Pettendorf 21.5.91, 25.4.92 (SCH), Etterzhausen/Nittendorf 16.5.93 (N&S), Mattinger Hänge 9.5.72, 19.5.72 (H), 15.5.92 (N&S), Duggendorf 3.5.75, 15.5.79 iA, 21.5.79 (SA), Girnitz 25.4.87 (N&S), Traidendorf b. Kallmünz 1.5.92 (SCH), Zeitberg b. Zeitlarn 27.5.89 (N), Preßgrund b. Regenstau 14.5.90 (N&MAHRER), Leonberg A V 73 u. 74 iA (SCH).  
 Nach '70 auch von Alling bekannt.  
 6/19: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 30.4.87 (N).  
 19: Thanhausen alljährlich E IV - M V, Schnaitterhof Gem. Wenzelbach 1.5.87 (N&S), Mittelberg b. Tegernheim 5.5.89, 14.5.90, 6.5.92 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 26.4.93 (N).  
 21: bei Oberhinkofen 29.4.63 (H), 10.5.64 (leg. FENZL in coll. H).

***Cerapteryx graminis* L.**                      2423

- M&S: "Am 20. August 1890 zum erstenmal für hier beobachtet M. SÄLZL fing diesen Falter des öftern auf den Wiesen im Granitgebiet der Umgebung"  
 Heute im Gebiet verbreitet, im allgemeinen aber selten; nur im Bereich des Vorderen Bayerischen Waldes häufiger.  
 6: Niederwinzer 10.8.90 (N), Mattinger Hänge 2.8.80 (leg. H in coll. SCH), Penkertal 13.8.85 (H), Duggendorf 14.8.80 (leg. SA in coll. SCH), Waldetzenberg 4.8.78 (S), Preßgrund b. Regenstau E VIII 90 (N&MAHRER).  
 19: Thanhausen E VII - E VIII jedes Jahr in einigen Stücken (N), bei Grünthal 20.8.87 (SCH), Mittelberg b. Tegernheim 18.8.93 (N), Donaustauf 14.8.89 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 9.8.93 (N), Utzenzell b. Wiesenfeiden 4.7.89, 27.7.91, 22.8.91 (N), Brandmoos b. Wiesenfeiden 14.8.93 iA (N), 13.9.93 (N&HALX), Kreuth b. Grafenwinn 30.7.82 (S).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 14.7.90 (S).  
 20: bei Wörth/D. 16.8.76 Kö (H).

***Lasionycta proxima* Hb.** 2421 N 3 3

M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.

20: bei Taimering 10.7.81 (H).

Noctuinae

***Diarsia florida* F.Schmidt** 2367 4R

M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.

Aus dem Regensburger Raum bisher nur von den beiden folgenden Fundorten in je einem Exemplar bekannt:

6: Sippenauer Moor b. Saal/D. 4.7.89 (SCH), Leonberg 30.6.73 (SCH).

***Noctua orbona* Hfn.** 2346 3 -/2

M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen nicht enthalten.

6: Alling 26.7.92 Kö (H), Duggendorf 24.7.81 (SA), Kallmünz wiederholt IX 78 (HE 1979), Eich b. Kallmünz 29.8.80 Kö (H), Preßgrund b. Regenstauf 25.8.90 (N&MAHRER), Kelheim Auf der Brandt 15.9.91 (K&S). Nach H auch bei den Mattinger Hängen nicht selten am Köder.

19: Thanhausen 26.8.89, 10.9.91 (N), Mittelberg b. Tegernheim 22.7.90 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 22.9.92 (N).

20: bei Taimering 21.8.93 (N&S).

***Noctua interposita* Hb.** 2347 2 3

M&S: Als Form *interposita* Hb. von *N. comes* von Winzer und Matting angegeben. Die Art ist anscheinend sehr selten, wird aber wohl auch gerne verkannt.

6: Regensburg-Keilstein 4.9.92 (S), Regensburg Max-Schultze-Steig 20.8.93 (N), Asenberg b. Zeitlarn 14.9.91 Kö (K), Duggendorf '70 (H), Kallmünz Stadelberg 1.8.92 (S), Premberg b. Teublitz 25.8.73 (SCH).

***Noctua janthina* D.& S.** 2350

M&S: Keine brauchbaren Angaben, da die Art damals nicht von *N. janthe* Bkh. unterschieden wurde.

Interessant ist aber, daß *N. janthina* einschließlich der damals noch nicht unterschiedenen *N. janthe* bei M&S als sehr selten bezeichnet werden. Es werden bei M&S insgesamt nur zwei Funde genannt. Heute im Gebiet weit verbreitet und zumindest lokal nicht selten.

6: Regensburg-Keilstein 8.8.92 (K), Grünthal 7.8.87 (N), Niederwinzer 16.7.90, 12.8.93 (N), Oberwinzer 12.8.93 (N), Regensburg Max-Schultze-Steig 16.8.93, 20.8.93 (N), Mattinger Hänge 17.7.92 (S), Oberndorfer Hänge 7.8.93 (N&S), Bad Abbach 18.8.88 (SCH), Alling 24.9.89 (SCH), Pettendorf 11.8.91, 13.8.91 (SCH), Duggendorf 18.7.79, 29.7.80, 31.7.80, 14.8.80 (SA), Eich b. Kallmünz 24.8.90 (SCH), Regenauer b. Zeitlarn 27.7.92 Kö (K), Preßgrund b. Regenstauf 20.7.90 (N&MAHRER), Kelheim Auf der Brandt 24.7.92 (N&S), Deusmauer Moor 30.7.92 (N).

19: Wenzelbach 14.8.87 (N), Mittelberg b. Tegernheim 5.8.89, 18.8.93 iA (N), Scheuchenberg bei Sulzbach/D. 27.6.92, 19.7.92, 9.8.93 (N), bei Wiesenfelden M VIII 81 (S).

20: Kreuzhof b. Barbing 20.8.89 iA (SCH), bei Taimering 26.8.91, 21.8.93 (N&S), Mooshof b. Roith 20.7.92 (N).

21: bei Oberhinkofen 20.9.80 Kö (H).

**Noctua janthe** Bkh.

M&S: Vergleiche die Anmerkungen zu obiger Art.

Nach den bisherigen Beobachtungen seltener als *N. janthina*.

- 6: Regensburg-Keilstein 8.8.92 Kö/Lf (K), Regensburg Max-Schultze-Steig 20.8.93 (N), Mattinger Hänge 17.7.92 (N&S), 24.7.92 (SCH), Waltenhofen b. Etterzhausen 15.8.93 (K), Kallmünz '92 (S), Stadelberg b. Kallmünz 1.8.92 Kö/Lf (K).  
 19: Mittelberg b. Tegernheim 18.8.93 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 19.7.92 (N).  
 20: bei Taimering 28.7.80 (SA).

**Noctua interjecta** ssp. *caliginosa* Schaw. 2351

M&S: Keine Angaben in den Regensburger Faunenverzeichnissen.

Die Art wurde erst in den letzten Jahren im Gebiet nachgewiesen, Arealerweiterer.

- 6: Regensburg-Stadt 7.8.92 Kö (H), Regensburg-Keilstein 8.8.92 (K), Niederwinzer 16.7.90, 23.7.91 (N), Mattinger Hänge 17.7.92 (N&S), 24.7.92 (SCH), Alling 30.7.92, 31.7.92 (H), Heitzenhofen 13.8.89 Kö (SA), 6.8.92 (SA), Kelheim Auf der Brandt 24.7.92 (N&S).

**Epilecta linogrisea** D. & S. 2352 3 -/0 3

M&S: "Selten. Von A. SCHMID wird das Vorkommen angezweifelt. Am 23.4.1914 fand ich (METSCHL) gelegentlich einer Nachtexkursion am Südhang des Keilstein nächst dem Kalkwerk (FUNK) an einem dünnen Grashalm eine dreiviertel erwachsene Raupe In den folgenden Jahren nicht mehr gefunden"

- 6: Regensburg-Keilstein 30.7.86 (H), der einzige uns bekannte Nachweis seit M&S.

**Lycophotia porphyrea** D. & S. 2361

M&S: "Falter im Juli sehr vereinzelt"

- 6: Undorf/Pollenried 21.6.92 (SCH), Duggendorf 27.7.79, 24.7.80, 3.8.80 (SA), Leonberg 31.7.73, 8.7.75 (SCH), Preßgrund b. Regenstau 25.7.90 (N&MAHRER). Nach '70 außerdem bekannt von Schönhofen und Heitzenhofen.  
 6/19: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 31.7.87 (N),  
 19: Thanhausen 17.7.87, 30.7.90, 31.7.90, 12.7.91 (N), Mittelberg b. Tegernheim 12.7.91 (N), Oberhof b. Karlstein 29.7.92 (K), Bodenstein b. Nittenau 26.7.74 (N).  
 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. E VII 90 (S).  
 20: bei Taimering 6.7.89, 1.8.90 (SCH), 13.7.91 (N).  
 21: bei Hohengebraching 7.7.67 (N), bei Oberhinkofen 28.6.87, 26.6.92 (SCH).

**Chersotis multangula** Hb. 2342 4R 2

M&S: VI - VII, nicht allzu selten.

Im Vergleich zu früher lokal und deutlich seltener.

- 6: Regensburg-Keilstein 5.7.72 ia (H), 30.7.91 (K&S), Mattinger Hänge 20.7.79 (H), 5.7.80 (H) 2.7.91 (N&S), 5.7.91 (SCH), 21.7.91, 20.6.92, 17.7.92, 16.7.93 (N&S), Duggendorf 25.7.78 (SA), Kallmünz 13.7.78, 22.8.78 (HE 1979), Laaber 26.6.61 (STURM), auch nach '70 von dort noch bekannt.  
 19: Thanhausen 25.8.91 (N), Mittelberg b. Tegernheim 18.8.93 (N).

**Chersotis margaritacea** Vill. 2343 3 3 3

M&S: Selten, VII. Aus dem Regensburger Gebiet werden nur zwei Funde (Keilstein 12.7.1913 und Kelheim 3.9.1921) aufgeführt.

- 6: Kelheim Auf der Brandt 15.9.91 (S), Eich b. Kallmünz 19.8.66, 3 Falter Kö (H).  
 Letzter uns bekannter Nachweis aus Laaber 10.8.56 (STURM).

***Chersotis cuprea* D.& S.                      2344                      4R                      (2)**

M&S: Im Untersuchungsgebiet seit 1903 bekannt und von vier Fundorten in wenigen  
 Stücken aufgeführt.

- 6: Duggendorf 18.8.73 (H), Kallmünz 21.8.76 Kö (SA), Emhof 19.8.85 (SA), nach H  
 früher auch bei Alling gefunden. Aus Laaber sind uns im Zeitraum von A VIII - M  
 IX 1949-1961 durch STURM mehrere Funde bekannt, jüngster Fund 10.8.61.

***Rhyacia simulans* Hfn.                      2340                      4R**

M&S: Nur eine Fundortangabe: "M. SÄLZL erhielt den Falter öfter von den Bogenlampen  
 am Bahnhof" SCHMID (1885-87) bezeichnet die Art als "ziemlich selten, im Spät-  
 sommer"

- 6: Regensburg südöstl. Stadtgebiet 10.7.66 (N), Mattinger Hänge 7.7.61 (H), Alling  
 26.7.92 (H), Goldberg b. Etterzhausen 29.9.91 (SCH), Pettendorf 29.9.91 (SCH),  
 Zeitlarn 23.8.92 (K).

***Rhyacia lucipeta* D.& S.                      2341                      4R                      -/N                      3                      3**

M&S: "Zum erstenmal 1890 hier beobachtet. Wir fingen diese schöne *Agrotis* in der Zeit  
 von 1909-1914 alljährlich im Juli auf dem Keilstein"  
 Über Falterfunde nach 1914 machen M&S keine Angaben. Ein Belegstück von  
 "Regensburg" 13.6.1920 (M. SÄLZL) befindet sich in coll. N. Die Art wurde nach  
 unseren Kenntnissen im Raum Regensburg seit über 20 Jahren nicht mehr beob-  
 achtet.

- 6: Regensburg südöstl. Stadtgebiet 26.7.60 (H), Regensburg-Kumpfmühl 8.8.70  
 (TEICHMANN), Laaber '72 (H).

***Paradiarsia glareosa* Esp.                      2358**

M&S: "Selten, im August. Die Raupe auf *Rumex acetosella*, Tegernheimer Berge  
 schreibt ANTON SCHMID. Wir konnten diese Art hier nicht wieder finden."  
 Heute im Gebiet verbreitet und zumindest lokal nicht selten.

- 6: Regensburg-Keilstein 4.9.91 (K&S), Grünthal 11.9.87, 16.9.87 (N), Niederwinzer  
 16.9.91 iA (N), Mattinger Hänge 22.9.91 (N), Schönhofen 25.9.89 (SCH), Pettend-  
 dorf IX 91, IX 93 (SCH), Goldberg b. Etterzhausen 12.9.92 (SCH), Duggendorf und  
 Heitzenhofen A IX 77 mehrmals am Kö (H), Kallmünz 8.9.80 Kö (H), 20.9.92 (N),  
 Stadelberg b. Kallmünz 21.9.92 (K), Beratzhausen 8.9.91 (STADTHERR), Asenberg  
 b. Zeitlarn M IX 91 - A X 91 mehrmals am Kö (K), Preßgrund b. Regenstauf M IX -  
 A X 90 iA (N&MAHRER), Premberg b. Teublitz 25.8.73 (SCH), Kelheim Auf der  
 Brandt 21.9.91 Kö, 13.9.92 (K).
- 19: Thanhausen A IX - A X nicht selten, oft iA (N), Wenzelbach 7.9.87, 13.9.87,  
 18.9.87 (N), Mittelberg b. Tegernheim 9.9.81, 15.9.91 iA (N), Scheuchenberg b.  
 Sulzbach/D. 21.9.89 (N), Linglhof b. Regenstauf 15.9.92 Kö (K), Bodenstein b.  
 Nittenau 13.9.74 (N).
- 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. M IX 90, M IX 91 (S).

***Eurois occulta* L.                      2381                      N                      3**

M&S: VI - VII, selten, nur ein Fundort (Kleinprüfening, 1892, M IX, R iA ) angegeben.  
 Ebenso wie *L. solidaginis* in den Heidelbeerwäldern der Oberpfalz verbreitet und  
 wahrscheinlich von dort in unser Gebiet ausstrahlend.

- 6: Mattinger Hänge 21.7.91 (N), Alling M VIII 91 (H), Duggendorf 20.7.79, 29.7.81 (SA), Girnitz 6.7.91 (N), Laaber 2.8.82 Kö (SA), Preßgrund b. Regenstauf 25.7.90 (N&MAHRER), Steinsberg b. Eitlbrunn el 15.6.79 (N).  
 19: Thanhausen 13.7.91 (N), Mittelberg b. Tegernheim 12.7.91 (N), Scheuchenberg b. Sulzbach/D. 28.6.92 (N), Wörth/D. 22.7.91 (S), Utzenzell b. Wiesenfeiden 14.6.88 (N).  
 20: bei Taimering 22.6.78 (SA), 4.7.91, 13.7.91 (N).

***Spaelotis ravida* D.& S.** 2353 2 2 2

M&S: VII, sehr selten, nur Angabe von Funden, die auf SCHMID (1885-86) zurückgehen. Von M&S offensichtlich nicht selbst nachgewiesen.

Aus den letzten Jahrzehnten sind uns nur die folgenden Funde bekannt:

- 6: Regensburg-Kumpfmühl A IX 77 (S), Laaber 16.7.49 (STURM).

***Eugnorisma depuncta* L.** 2337

M&S: VII - VIII, selten, nur wenige Fundortangaben.

- 6: Regensburg-Kumpfmühl 2.9.54 (TEICHMANN), Regensburg-Keilstein 18.8.62 Kö (H), Niederwinzer 16.9.91 (N), Alling 6.8.92 Kö, 24.8.92 Kö (H), Duggendorf 7.9.74, 15.9.76, 8.9.78, 27.8.82 (SA), 10.8.89 (leg. H in coll. SCH), Kallmünz 10.8.75 (SA), 22.8.78, 24.9.78 (HE 1979). Nach '70 auch bekannt von Mattinger Hänge, Schönhofen.

- 19: Utzenzell b. Wiesenfeiden 22.8.91 (N).

- 20: bei Wörth/D. 2.9.53 Einzelfund (HALX 1956), 16.8.76 Kö (H).

- 21: bei Oberhinkofen 20.9.87 Kö (H).

***Xestia castanea* Esp.** 2376 3 2/- 1 1

M&S: Nach dem Wortlaut bei M&S wahrscheinlich seit der Zeit von SCHMID (1885-87) nicht mehr beobachtet, der die Art als sehr selten bezeichnet, Flugzeit VIII.

- 6: Eich bei Kallmünz 30.8.80 Kö (H), Laaber 19.7.55 (STURM).

- 19: bei Grünthal VIII 80 (H).

***Xestia sexstrigata* Hw.** 2378

M&S: Art nicht aufgeführt, auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen keine Angaben.

- 6: Regensburg-Keilstein 24.8.87 Kö (H), Niederwinzer 12.8.93 (N), Regensburg Max-Schultze-Steig 16.8.93, 20.8.93 (N), Pettendorf 11.8.91 (SCH), Alling A VIII - M VIII 92 relativ häufig (H, SA), Schönhofen 24.8.90 Kö (leg. SCH in coll. S), 12.8.91, 3.8.92 (SCH), Duggendorf 9.8.82 Kö (SA), 10.8.89 iA Kö (H), Heitzenhofen 13.8.89 Kö, 6.8.92 Kö (SA), Beratzhausen '92 (STADTHERR).

- 19/20: Zinzendorf b. Wörth/D. 23.8.90 (S).

- 20: bei Wörth/D. 15.8.83 Kö (H), nach '70 auch bei Kreuzhof b. Barbing (H).

- 21: bei Oberhinkofen 13.8.87, 17.8.87 (SCH).

***Eugraphe sigma* D.& S.** 2356 4R 3

M&S: VI - VII, nicht selten.

In der jüngeren Zeit nur ganz vereinzelte Nachweise.

- 6: Regensburg-Keilstein 31.7.87 (S), Mattinger Hänge 9.7.70, 29.6.73 (beide leg. BREITSCHAFTER in coll. S.), 28.7.73 (H), 26.6.92, 17.7.92 (N), Girnitz 6.7.91 (N), Endorf 7.7.80 Kö (SA), bei Parsberg '91 (STADTHERR).

- 6/19: Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 31.7.87 (N&S).

- 19: Mittelberg b. Tegernheim 24.7.89 (N), Bodenstein b. Nittenau 13.7.74 (N).

**Cerastis leucographa** D. & S. 2384

- M&S: Keine Angaben, fehlt auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen.  
Nach unserer Ansicht im Gebiet verbreitet aber selten.
- 6: Oberwinzer 23.4.93 (N), Mattinger Hänge 19.4.79 iA (H), 26.4.92 (SCH), Etterhausen/Nittendorf 1.4.90 (SCH), Duggendorf 1.4.81 (SA), Girnitz 25.4.87 (N).
- 6/19: Keilberg/Grünthal 17.4.87 (N&S), Keilberg oberhalb der Tegernheimer Schlucht 30.4.87 (N).
- 19: Thanhausen alljährlich A IV - A V (- E V) (N), Utzenzell bei Wiesenfeiden 7.5.88, 4.5.90 (N), Wörth/D. 22.4.93 (N&HALX).
- 19/20: Donaustauf 10.4.89 (N).
- 21: bei Oberhinkofen 22.4.87, 30.4.87 iA, 1.5.88 (SA), Hohengebraching 30.4.73 (H).

**Naenia typica** L. 2380 4R -/3

- M&S: "Im Mai, Juni stellenweise häufig am Köder und am Licht"  
in den letzten 20 Jahren nur bekannt von:
- 6: Alling 28.7.92 iA Kö (H), Pettendorf 13.8.91 (SCH), Weichseldorf '90 (SA), Regenerufer b. Zeitlarn 27.7.92 Kö (K). Nach '70 außerdem bekannt von Poikam (SA), Duggendorf (SA).

**Protolampra sobrina** Dup. 2357 3 2 2

- M&S: Keine Angaben, fehlt auch in den älteren Regensburger Faunenverzeichnissen.
- 6: Duggendorf 9.8.77 Kö, 13.8.77 Kö (H), Laaber 21.8.60 (STURM).
- 19: Oberhof b. Karlstein 29.7.92 (K).

**Euxoa recussa** Hb. 2322 4R -/N 2 (1)

- M&S: Selten, VII - VIII.
- 6: Duggendorf 10.8.77 Kö, 15.8.77 Kö (H), Laaber 6.9.76, 22.9.76 (H).
- 20: bei Taimering 1.8.80 (TEICHMANN).

**Euxoa nigricans** L. 2319

- M&S: "Nicht selten, im Juli und August überall verbreitet."  
In den letzten Jahren nur ganz vereinzelt nachgewiesen.
- 6: Mattinger Hänge 1.8.68 (H), Pettendorf 13.8.91 Kö, 17.8.91 Kö (SCH), Duggendorf 9.8.77 Kö, 15.8.77 Kö (H), Kallmünz 7.8.80 Kö, 28.8.80 Kö (H), Waldetzenberg 14.7.78, 25.9.78 (S), Leonberg 29.7.73 (SCH), Beratzhausen '92 (STADTHERR). Nach '70 außerdem bekannt von Laaber und Endorf.
- 19: Mittelberg b. Tegernheim 11.7.88 (N).

**Euxoa obeisca** D. & S. 2316 4R

- M&S: "Eine für die Fauna fast seltene Art, die im Juli und August an nur wenigen Orten hier gefangen wurde"  
HALX (1956) beobachtete die Art in der Umgebung von Wörth/D. im VIII 1953 mehrfach am Licht. Sie ist im Bestand offensichtlich noch weiter zurückgegangen und heute sehr selten.
- 6: Regensburg-Keilstein 4.9.91 (S), Mattinger Hänge 1.8.63 Kö (H), Schönhofen 26.8.91 (SCH), Penkertal 16.8.74 Kö (H), Duggendorf 29.8.77 Kö, 6.9.77 Kö, 8.9.77 Kö (H), Kallmünz 22.8.78 (HE 1979), Pettendorf 15.8.91 Kö, 17.8.91 Kö, 17.8.92 Kö (SCH), Leonberg 22.8.73 (SCH).
- 19: Mittelberg b. Tegernheim 18.8.93 (N).



- HALX, G. (1956): Interessante Macrolepidopterenfunde aus der nahen Umgebung von Wörth/Don. (Nordbayern - Donautal). - Nachr.- bl. Bayer. Ent. 5: 33-35, 44-47, 50-52, München.
- HEINICKE, W. (1993): Vorläufige Synopsis der in Deutschland beobachteten Eulenfalterarten mit Vorschlag für eine aktualisierte Eingruppierung in die Kategorien der "Roten Liste" (Lepidoptera, Noctuidae). - Ent. Nachr. u. Ber. 37(2): 73-121, Dresden.
- HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W. (1840): Animalia articulata, Classis I. Insecta. Ordo II Lepidoptera L. - In: A.E.FÜRNROHR (Hrsg.), Naturhistorische Topographie von Regensburg, Bd. 3: 149-206, Regensburg.
- HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W. (1857): Sammlungen des Vereins. 5. Insecten. - Korresp.- Bl. zool.- mineralog. Ver. Regensburg 12: 177-185, Regensburg.
- HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W. (1863): Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge von Europa. - 28 S., 3. Auflage, Regensburg.
- HEUBERGER, E. (1979): Zur Schmetterlingsfauna um Kallmünz. - Unveröff. Zulassungsarbeit für die erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen, 134 Seiten, Regensburg.
- HOFMANN, O. & HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W. (1854-55): Die Lepidopteren-Fauna der Regensburger Umgegend. - Korresp.- Bl. zool.- mineralog. Ver. Regensburg 8 (1854): 101-109, 113-114, 167-190; 9 (1855): 57-88, 133-149, 182; Regensburg.
- METSCHL, C. & SÄLZL, M. (1932-1935): Die Schmetterlinge der Regensburger Umgebung. - Dt. Ent. Ztschr. Iris 46 (1932): 144-152; 47 (1933): 41-59, 167-187; 48 (1934): 78-104, 161-183; 49 (1935): 58-161, Dresden.
- NEUMAYR, L. (1991): *Oligia versicolor* Bkh. im Raum Regensburg (Lepidoptera, Noctuidae). Galathea 7/1: 22-32, Nürnberg.
- NEUMAYR, L. & MAHRER, H. (1993): Nachtaktive Großschmetterlinge im Gebiet von Preßgrund bei Regenstauf (Südliche Oberpfalz). - Galathea 9/1: 18-23, Nürnberg.
- NEUMAYR, L. & SEGERER, A. (1987): Nachträge zur "Makrolepidopteren" - Fauna der Stadt Regensburg. - Galathea 3/4: 109-110, Nürnberg.
- NEUMAYR, L. & SEGERER, A. (1989): *Mesapamea secalella* Remm (Lep., Noctuidae), ein neues Faunenelement für Regensburg. - Galathea 5/3: 125-128, Nürnberg.
- SCHMID, A. (1885-87): Die Lepidopterenfauna der Regensburger Umgegend mit Kelheim und Wörth. - Corresp.- Bl. naturwiss. Ver. Regensburg 39 (1885): 21-46, 75-95, 97-135, 151-201; 40 (1886, erschienen 1887): 19-58, 83-98, 101-224; Regensburg.
- SEGERER, A. & NEUMAYR, L. (1988): Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Regensburg (1): "Groß-Schmetterlinge" im Stadtgebiet von Regensburg. - Acta Albertina Ratisbonensia 45: 197-216, Regensburg.
- SEGERER, A. & NEUMAYR, L. (1989): Interessante "Makrolepidopteren" - Funde aus Regensburg und Umgebung (3). - Galathea 5/2: 53-65, Nürnberg.
- WOLF, W. (1992): Rote Liste gefährdeter Nachfalter Bayerns. - Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz 111: 214-236, München.

#### Anschriften der Verfasser

Dr. Ludwig Neumayr, Ziegelstraße 5, 93173 Wenzenbach  
Dr. Andreas Segerer, Hofgasse 5, 83278 Traunstein

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Neumayr Ludwig, Segerer Andreas H.

Artikel/Article: [Funde von selteneren Noctuidae \(Lepidoptera\) aus Regensburg und Umgebung \(Fortsetzung und Schluß\\*\) 1-12](#)