©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Kursorische Vogelbestandserhebungen im Ampermoos 1976/77

von Helmut Ranftl

Im Zuge des Baues der Bundesautobahn A 96 wird nördlich des Ammersees eine Trassenführung diskutiert, die das Ampermoos nördlich Eching quert. Zur Überprüfung der Schutzwürdigkeit des Ampermooses aus ornithologischer Sicht wurden 1976/77 kursorische Vogelbestandsaufnahmen durchgeführt und die Ergebnisse nach bekannten Bewertungskriterien (BERNDT, HECKENROTH & WINKEL 1975, BEZZEL 1976) beurteilt. Eine Zusammenfassung der Daten wird veröffentlicht (RANFTL im Druck). Der Vergleich des Erhebungsmaterials 1976/77 mit älteren Daten (LAUBMANN 1938, DIESSELHORST & LAUBMANN 194o) ist interessant, aber auch deprimierend. Die Abnahme der Brutvogelarten der "Roten Liste" beträgt etwa 5o %. Die meisten Arten, die das Ampermoos ornithologisch so berühmt gemacht haben, konnten entweder nicht mehr (z.B. Birkhuhn, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Uferschnepfe, Rotschenkel) oder nicht mehr brütend (z.B. Großer Brachvogel) nachgewiesen werden. Einige der Neunachweise für das Ampermoos (im Vergleich zu den Daten von LAUBMANN 1938, DIESSELHORST & LAUBMANN 194o) sind als Zooflüchtlinge oder besonders stark vom Menschen gefördert zu betrachten: Höckerschwan, Graugans (Fluchtdistanz 3o m), Kanadagans und "Hochbrutflugente".

Trotz dieser negativen Bilanz ist das Ampermoos auch heute noch schützenswert, und zwar in seiner Gesamtheit mit den landwirtschaftlichen Nutzflächen am Rande als Pufferzone. Besondere Bedeutung hat das Areal als Brutgebiet der Bekassine.

Im Vergleich zu den Beschreibungen des Gebietes von WÜST (193o) und LAUBMANN (1938) ist das Ampermoos heute wesentlich trockener. Dies kann auch an der Änderung des Artenspektrums abgelesen werden und an der Verteilung der Brutvogelarten über die Untersuchungsfläche. Während früher z.B. die Lachmöwe im Ampermoos gebrütet hat, sich Brutvorkommen des Baumpiepers und des Fasans auf die Randgebiete beschränkten und der Feldschwirl nur gelegentlich angetroffen wurde, ist heute die Lachmöwe als Brutvogel verschwunden und Baumpieper, Fasan und Feldschwirl sind im ganzen Gebiet zu beobachten. Während der Drosselrohrsänger heute ganz fehlt, ist der Teichrohrsänger, früher "zahlreicher Brutvogel im ganzen Moos", heute auf wenige Stellen beschränkt. Überall, auch an Bachufern und Gräben mit Hochstaudenflur

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

der landwirtschaftlichen Nutzflächen konnte 1976/77 der Sumpfrohrsänger nachgewiesen werden.

Das Ergebnis der kursorischen Bestandserhebung 1976/77 ist in der Tabelle den Daten der älteren Literatur (LAUBMANN 1938, DIESSELHORST & LAUBMANN 194o) gegenübergestellt.

Liste der im Ampermoos beobachteten Vogelarten:

x = Sichtbeobachtung, B = Brutvogel, (B) = Brut möglich oder sehr lange zurückliegend, + = Arten der "Roten Liste" der in Bayern gefährdeten Vogelarten

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (194o)
Zwergtaucher Podiceps ruficollis	x	x
Graureiher + Ardea cinerea	x	x
Nachtreiher+ Nycticorax nycticorax		x
Zwergdommel+ Ixobrychus minutus		x
Rohrdommel+ Botaurus stellaris		(B)
Weißstorch+ Ciconia ciconia		x
Höckerschwan Cygnus olor	x	
Singschwan+ Cygnus cygnus		x
Graugans Anser anser	x	
Kanadagans Branta canadensis	B	
Schnatterente+ Anas strepera	x	

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Krickente+ Anas crecca	x	B
Stockente Anas platyrhynchos	B	B
"Hochbrutflugente"	x	
Spießente+ Anas acuta		x
Knäkente+ Anas querquedula	x	B
Löffelente+ Anas clypeata		x
Tafelente Aythya ferina	x	
Moorente+ Aythya nyroca		x
Reiherente Aythya fuligula	x	x
Schellente Bucephala clangula	x	x
Mäusebussard Buteo buteo	B	B
Sperber+ Accipiter nisus	x	
Habicht+ Accipiter gentilis	x	(B)
Wespenbussard+ Pernis apivorus		x
Rohrweihe+ Circus aeruginosus	x	x
Kornweihe+ Circus cyaneus	x	x
Wiesenweihe+ Circus pygargus		x

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Fischadler+ Pandion haliaetus		x
Baumfalke+ Falco subbuteo	x	(B)
Wanderfalke+ Falco peregrinus		x
Rotfußfalke Falco vespertinus		x
Turmfalke Falco tinnunculus	B	B
Birkhuhn+ Lyrurus tetrix		B
Rebhuhn Perdix perdix	B	x
Wachtel+ Coturnix coturnix	B	B
Fasan Phasianus colchicus	B	B
Tüpfelsumpfhuhn+ Porzana porzana		(B)
Wachtelkönig+ Crex crex		B
Teichhuhn Gallinula chloropus	B	B
Bläßhuhn Fulica atra	x	x
Kiebitz Vanellus vanellus	B	B
Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola		x
Bekassine + Gallinago gallinago	B	B

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Doppelschnepfe Gallinago media		x
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus		x
Großer Brachvogel+ Numenius arquata	x	B
Uferschnepfe+ Limosa limosa		B
Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus		x
Rotschenkel+ Tringa totanus		B
Grünschenkel Tringa nebularia		x
Waldwasserläufer Tringa ochropus	x	x
Bruchwasserläufer Tringa glareola		x
Flußuferläufer+ Tringa hypoleucos	x	x
Alpenstrandläufer Calidris alpina		x
Kampfläufer Philomachus pugnax		(B)
Lachmöwe Larus ridibundus	x	(B)
Trauerseeschwalbe+ Chlidonias niger		x
Weißflügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus		x
Flußseeschwalbe+ Sterna hirundo		x

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (194o)
Hohltaube+ Columba oenas		B
Ringeltaube Columba palumbus	B	B
Turteltaube+ Streptopelia turtur	B	x
Türkentaube Streptopelia decaocto	B	
Kuckuck Cuculus canorus	B	x
Waldkauz Strix aluco		x
Waldohreule Asio otus	B	B
Sumpfohreule+ Asio flammeus		x
Mauersegler Apus apus	x	x
Eisvogel+ Alcedo atthis		x
Grünspecht Picus viridis		B
Grauspecht Picus canus	B	B
Buntspecht Dendrocopos major	B	B
Mittelspecht+ Dendrocopos medius	(B)	
Kleinspecht Dendrocopos minor		x
Wendehals+ Jynx torquilla		x

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Feldlerche Alauda arvensis	B	B
Uferschwalbe+ Riparia riparia	x	x
Rauchschwalbe Hirundo rustica	x	x
Mehlschwalbe Delichon urbica	x	x
Schafstelze Motacilla flava	B	B
Gebirgsstelze Motacilla cinerea	B	
Bachstelze Motacilla alba	B	B
Baumpieper Anthus trivialis	B	B
Wiesenpieper+ Anthus pratensis	B	B
Wasserpieper+ Anthus spinoletta	x	x
Neuntöter+ Lanius collurio	B	B
Raubwürger+ Lanius excubitor	B	B
Wasseramsel Cinclus cinclus	B	
Zaunkönig Troglodytes troglodytes	B	B
Heckenbraunelle Prunella modularis	B	B
Rohrschwirl+ Locustella luscinioides	B	

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Feldschwirl Locustella naevia	B	B
Schilfrohrsänger+ Acrocephalus schoenobaenus	B	B
Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola		x
Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris	B	
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus	B	B
Drosselrohrsänger+ Acrocephalus arundinaceus		B
Gelbspötter Hippolais icterina	B	B
Gartengrasmücke Sylvia borin	B	B
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla	B	B
Klappergrasmücke Sylvia curruca	B	B
Dorngrasmücke+ Sylvia communis	B	B
Zilpzalp Phylloscopus collybita	B	B
Fitis Phylloscopus trochilus	B	B
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix	B	B
Wintergoldhähnchen Regulus regulus	B	B
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus	B	B

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Grauschnäpper Muscicapa striata	B	B
Blaukehlchen+ Cyanosylvia svecica		(B)
Rotkehlchen Erithacus rubecula	B	B
Gartenrotschwanz+ Phoenicurus phoenicurus	B	B
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros	B	B
Braunkehlchen+ Saxicola rubetra	B	B
Steinschmätzer+ Oenanthe oenanthe	x	
Misteldrossel Turdus viscivorus	B	B
Wacholderdrossel Turdus pilaris	B	B
Amsel Turdus merula	B	B
Singdrossel Turdus philomelos	B	B
Schwanzmeise Aegithalos caudatus	B	B
Haubenmeise Parus cristatus	B	B
Sumpfmeise Parus palustris	B	B
Weidenmeise Parus montanus	B	
Blaumeise Parus caeruleus	B	B

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (1940)
Kohlmeise Parus major	B	B
Tannenmeise Parus ater	B	B
Kleiber Sitta europaea	B	B
Waldbaumläufer Certhia familiaris	B	
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla	B	B
Goldammer Emberiza citrinella	B	B
Rohrammer Emberiza schoeniclus	B	B
Buchfink Fringilla coelebs	B	B
Bergfink Fringilla montifringilla	x	x
Girlitz Serinus serinus	B	
Grünling Carduelis chloris	B	B
Stieglitz Carduelis carduelis	B	B
Zeisig Carduelis spinus		x
Hänfling Acanthis cannabina	B	B
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra		(B)
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes	B	(B)

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

	1976/77	LAUBMANN (1938), DIESSELHORST & LAUBMANN (194o)
Gimpel Pyrrhula pyrrhula	(B)	(B)
Haussperling Passer domesticus	B	B
Feldsperling Passer montanus	B	B
Star Sturnus vulgaris	B	B
Pirol+ Oriolus oriolus	B	B
Eichelhäher Garrulus glandarius	B	B
Elster Pica pica		B
Dohle Corvus monedula	x	B
Saatkrähe+ Corvus frugilegus		x
Rabenkrähe Corvus corone	B	B

Literatur:

BERNDT, R., H. HECKENROTH & W. WINKEL (1975): Vorschlag zur Einstufung regional wertvoller Vogelbrutgebiete. Vogelwelt 96: 224-226

BEZZEL, E. (1976): Vögel als Bewertungskriterien für Schutzgebiete - einige einfache Beispiele aus der Planungspraxis. Natur und Landschaft 51: 73-78

DIESSELHORST, G. & A. LAUBMANN (194o): "Das Ampermoos und seine Vogelwelt". Erster Nachtrag für die Jahre 1938 und 1939. Anz.orn.Ges.Bayern 3: 78-86

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

LAUBMANN, A. (1938): Das Ampermoos und seine Vogelwelt. Verh. orn.Ges.Bayern 21: 259-297

RANFTL, H. (1977): Beitrag zur Avifauna des Ampermooses. Anz. orn.Ges.Bayern 17 (im Druck)

WÜST, W. (193o): Ornithologische Beobachtungen im Ampermoos. Anz.orn.Ges.Bayern 2: 1o1-1o7

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Beobachtungen an Kohlmeisen (Parus major) als Schlafgäste in Nistkästen

von Einhard Bezzel

Untersuchungsgebiet und Methodik

Von 1968/69 bis 1976/77 wurden in monatlichen Abständen von Oktober bis März 36 Nistkästen auf dem Grundstück des Instituts für Vogelkunde nach Einbruch der Dunkelheit kontrolliert. Zu diesen 54 regelmäßigen Kontrollen in 9 Wintern kommen noch einige Aprilkontrollen sowie 7 Kontrollen aus den Wintern 1966/67 und 1967/68. Alle angetroffenen Schlafgäste wurden beringt. Der größte Teil bestand jedoch aus bereits beringten Vögeln, da auf dem Grundstück seit 1966 alle Nestlinge und viele Fänglinge, in den vorausgegangenen Jahren (seit mindestens 1962) die Nestlinge beringt wurden. So ist auch das Schicksal vieler Schlafgäste aus zahlreichen Kontrollen außerhalb des Winterhalbjahres bekannt.

Das Untersuchungsgebiet liegt 81o m über NN und umfaßt etwa 1,5 ha. Es liegt am Oberrand des besiedelten Talbodens und leitet zu den Montanwäldern über. Die 36 Kästen, alles Holzbetonkästen der Firma Schwegler, sind in Baum- und Gebüschgruppen sowie an einigen Gebäuden angebracht und hängen alle in Augenhöhe. Während der insgesamt 11jährigen Beobachtungszeit wurde die Verteilung der Kästen nicht verändert. Ebenso ist die Fang- und Beringungsaktivität in unmittelbarer Umgebung nicht verändert worden.

Die Winter sind im Talbereich des Werdenfelser Landes lang und vor allem schneereich. Allerdings liegt das Untersuchungsgebiet am Südhang, so daß bei anhaltendem sonnigen Wetter auch im Mittwinter schneefreie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Garmischer Vogelkundliche Berichte

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Ranftl Helmut

Artikel/Article: Kursorische Vogelbestandserhebungen im Ampermoos 1976/1977 35-46