

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur  
und Pflanzenbau

Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980

von Einhard Bezzel und Franz Lechner

Allgemeine Ergebnisse

Zur Brutzeit 1980 wurden 244 der insgesamt 1440 Planquadrate von je 1 km<sup>2</sup> wenigstens einmal begangen. 200 Arten wurden registriert, also mehr als in den Vorjahren. Als neue Art kommt der Steinwälzer dazu; somit sind bis 31.12.1980 260 Arten nachgewiesen. Keine Beobachtungen liegen u.a. für Zwergdommel, Fischadler, Wachtel (!), Tüpfelsumpfhuhn, Turteltaube, Grauammer und Schneefink vor. Seit 2 Jahren gelangen wieder Brutzeitfeststellungen der Dorngrasmücke (Brutvogel in wenigen Paaren im Vorland) und Felsenschwalbe (Brut jedoch fraglich). Ob die Heidelerche derzeit im Gebiet brütet, muß fraglich bleiben. Trotz der Überschwemmung des Walchensees mit Bade- und Bootsbetrieb konnte sich der Gänsesäger bis jetzt dort halten. Wieder gelang ein Brutnachweis der Schellente (mind. 2 Paare), die jetzt mind. 3 Jahre regelmäßig im Gebiet brütet. Der andere Neueinwanderer der jüngsten Zeit, der Karmingimpel, tritt mit zunehmender Häufigkeit auf; Brutnachweise fehlen jedoch. Die Beobachtungsplätze sind meist nur kurzfristig besetzt. Die bisher erst einmal als Brutvogel nachgewiesene Schafstelze scheint weitere Ansiedlungsversuche unternommen zu haben.

Mitarbeiter

Frau Dr. H. Auzinger, W. Berndt (= Be), E. Bezzel (= Bz), G. Burk, A. Burnhauser (= Bu), Farner, L. Feuerlein, H. Greither, Hinterholzer, F. Kötter, F. Lechner (= Le), H. Maier, T. Mangold, R. Michael, H. Pelchen, S. Pöll, F. Reinhard, W. Schindler, H. Seemann, K. Stiel, K. Storp, G. Stöbel, J. Wittenberg, W. Ziegler (= Zie).

Liste der wichtigsten Beobachtungen

Prachtaucher (*Gavia arctica*): 14.1. 2, 16.12. 1 Ex. Walchensee (Le); 2.11. 1 Ex. Kochensee (Zie)

Sternaucher (*Gavia stellata*): 18.11. 1 Ex. Staffelsee (Le)

- Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Brutbestand maximal 45 BP; nur je 1 erfolgreiche Brut am Barmsee und Froschhauser See; Ende Juli am Staffelsee 61, Riegsee 10 und Kochelsee 14 ad. ohne Jungen.
- Rothalstaucher (*P. griseigena*): Quersumme Wasservogelzählung Walchensee 49 Ex. (entspricht den Vorjahren); 9./10.8. je 1 ad. Staffelsee (Bz)
- Ohrentaucher (*P. auritus*): 15.10. bis mind. 14.4. 1 Ex., am 14.2. 2 Ex. Walchensee (Le)
- Schwarzhalstaucher (*P. nigricollis*): Quersumme 1979/80 der Wasservogelzählung 246 Ex., was gegenüber den Vorjahren eine leichte Zunahme andeutet. Eine Überwinterungstradition scheint sich am Walchensee anzubahnen; 23.8. 11 Ex. Staffelsee (Bz)
- Zwergtaucher (*P. ruficollis*): Quersummen der Wasservogelzählung 1977/78 604, 1978/79 332, 1979/80 413 Ex.; 11.8. 1 ad.1juv. Kochelsee, 7.8. 2 juv. Weidmoos (Maier). Sonst sind keine Bruthinweise bekannt geworden.
- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): 27.9. überfliegen 16 Ex. das Kocheler Moos (Auzinger), 1.11. 12 Ex. Kochelsee (Strobel)
- Graureiher (*Ardea cinerea*): nach Strobel ein Einzelhorst bei der Glentleiten (Großweil). Bruterfolg?
- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Nachtrag 1979: 4. u. 13.5. je 1 ruf. ♂ Kocheler Moos (Burk); 1980: 23./25.5. und 1.6. je 1 ruf. ♂ Rohrsee (Burk)
- Weißstorch (*Ciconia ciconia*): 7. u. 8.3. je 1 Ex. bei Schwaiganger (Be); 10.7. 1 Ex. am Haarsee (Farner); 17.-20.9. 3 diesj. Tegernau bei Garmisch (Bu)
- Höckerschwan (*Cygnus olor*): Sommerbestand ca. 9 Paare + mind. 14 nichtbrütende ad. Von den sicheren Brutpaaren führten 5 insgesamt 18 Junge. Quersumme Wasservogelzählung 1979/80 265 Ex. (also 31 weniger als 1978/79 und 69 weniger als 1977/78)
- Schnatterente (*Anas strepera*): Erneute Zunahme; Quersumme 1979/80 398 Ex. (1978/79 239, 1977/78 186). Kochelsee Maxima: 10.10. 82 Ex. (Zie), 15.10. 68 ♂ 64 ♀ = 132 (Bu, Le)
- Krickente (*A. crecca*): Im Murnauer Moos 2 führende ♀ und an 2 weiteren Plätzen brutverdächtig. Quersumme Wasservogelzählung 1979/80 1432 (bisher höchster Wert)

- Stockente** (*A. platyrhynchos*): Brutnachweise Kochelsee (wohl insgesamt über 10 führende ♀), Isarstausee Krün (3 führende ♀). Am 26.5. Gelege mit 3 Eiern am N-Hang Signalkopf bei ca. 1400 m (Pöll). Quersumme 1979/80 niedriger als in den Vorjahren
- Knäkente** (*A. querquedula*): Letzte Frühjahrsbeobachtung 11.5. ♀ im Murnauer Moos (Maier)
- Löffelente** (*A. clypeata*): 15.6. ♂♀ Kochelsee (Maier); 15.10. 56 Ex. Kochelsee (neues Maximum; Bu, Le); 13.11. 7 Ex. Walchensee
- Tafelente** (*Aythya ferina*): Neues Tagesmaximum: 17.11. 497 Ex. Kochelsee; Quersumme Wasservogelzählung 1979/80 2525 Ex. (etwa wie Vorjahr)
- Moorente** (*A. nyroca*): 13.11. ♂ Kochelsee (Maier)
- Reiherente** (*A. fuligula*): 25.7. nur 2 führende ♀ am Kochelsee, 15.7. 125 Ex. 25.7. 232 ebenda (Le). Quersumme Wasservogelzählungen: 1977/78 8328, 1978/79 7730, 1979/80 6469 Ex.
- Bergente** (*A. marila*): 14.1. bis mind. 14.4. ♀ Sachensee (Le)
- Eiderente** (*Somateria mollissima*): Auffallender Herbsteinflug: 2.10. ♂ diesj. unverletzt gegriffen in Grainau; 3.10. 1 Ex., 2.11. 1 immat. ♂ sowie 1.11. 15 Ex. am Kochelsee (Zie, Strobel)
- Eisente** (*Clangula hyemalis*): 11. u. 13.11. je 5 Ex. Kochelsee (Maier); 14.1., 13.11., 16. und 30.12. je 1 ♀ Walchensee (Storp, Le)
- Samtente** (*Melanitta fusca*): 23.1. bis mind. 12.3. 7, bis mind. 16.3. 6, 18.3. 4, bis mind. 15.4. 2 Ex. und wieder 2.11. 2 Ex. Kochelsee (Zie, Maier, Strobel, IfV)
- Schellente** (*Bucephala clangula*): Die Neuansiedlung in Südbayern hat sich nun im 3. Jahr gehalten; mind. 2 ♀ brüteten am Walchensee erfolgreich (7 bzw. 1 pull; Storp). Ferner am 8. und 17.2, 2 "♀" am Kochelsee (Zie). Quersumme der Wasservogelzählungen: 1977/78 674, 1978/79 630, 1979/80 567 Ex.
- Zwergsäger** (*Mergus albellus*): 22.1. 1 "♀" Kochelsee (Le); im Werdenfelser Land sehr selten
- Gänsesäger** (*Mergus merganser*): Ende Juni je 1 ♀ mit 7, 6 und 2 pulli auf dem Walchensee. Offenbar dort Mangel an ruhigen Nistplätzen, denn am 17.6. entdeckten Greither und Zintl im Kamin der Hütte auf der Insel Sassau ein Vollgelege, aus dem 6 Junge schlüpften. Das ♀ mußte durch die senkrechte Kaminöffnung etwa 2 m tief zum Gelege gelangen! Ein weiteres ♀ brütete auf 9 Eiern im Klohäuschen bei der Hütte. Ein Doppelgelege (kalt) wurde in einem anderen alten Klohäuschen der Insel

entdeckt. Weitere Sommerdaten: 19.7. ♀ mit 5 pull. Obere Ammer (Maier); 8. und 16.8. je 24 Ex., 23.9. 34 Ex. Barmsee (Storp). Winterhalbjahr: 23.11. 182 Ex. Karpfsee, 15.12. 227 Ex. Kochelsee (Bu, Le). Quersummen 1979/80 Krün und Walchensee 78, Kochelsee 195 (hier anhaltender Rückgang).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Juli/Aug. Brut bei Barmsee (Stiel); Brutverdacht Murnauer Moos; 15.8. 1 Paar nahe Partnachalm (Wittenberg)

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): Da Beobachtungen über Bruterfolg und -vorkommen von Privatornithologen geheimgehalten werden, ist über die Situation der Art nichts bekannt.

Rotmilan (*Milvus milvus*): 20.7. 2 Ex. Kochelsee (Maier)

Schwarzmilan (*M. migrans*): Erstbeobachtung 30.3.; Brutverdacht eines Paares wieder im Gebiet des Kochelsees; möglicherweise einzelne Paare auch an anderen Stellen

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Kochelsee Jan. bis 19.3. mind. 1 immat. und 1 ad.; 3.3. auch ein ad. am Staffelsee (Reinhard)

Kornweihe (*Circus cyaneus*): 13.1. ein ♂ in ca. 1400 m NN Griesen überfliegend; bei Weichs 1 ♀ vom 13.1.-25.4. (Zie); 29.8.-6.12. 1 ♀ Kocheler Moos; 5.6. ♀ und 30.10. ♂ Murnauer Moos

Wiesenweihe (*C. pygargus*): 17./19.4. je ♂ Murnauer Moos; 24.4. ♂ bei Sindelsdorf; 20.9. 1 Ex. Kochelsee (Storp, Maier, Zie)

Rohrweihe (*C. aeruginosus*): Kocheler Moos: ab 2.4. (♂♀); am 1.5. 2 ♀, 10.5. 1 ♀, 29.6. 2 ♀, 16.8. ♂ (Zie). Murnauer Moos: 23.5. u. 25.5. ♀, 1.6. 2 ♀, 15.8. 1 (Maier, Le). Keine Hinweise auf Brut. Am 8.9. fliegen 3 Ex. hoch über dem Kreuzjoch nach S (Schindler)

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Sicher Brutvogel im Murnauer Moos (bis zu 7 Ex. gleichzeitig)

Wanderfalke (*F. peregrinus*): Horstgebiet 3 2 flügge juv.

Merlin (*F. columbarius*): 18.10. 1 Ex. Kochelsee (Zie)

Rotfußfalke (*F. vespertinus*): nur am 7.5. ♀ Kocheler Moos (Strobel)

Alpensneehuhn (*Lagopus mutus*): Karwendelgrube ein Gesperre; Anfang Sept. dort 30-40 Ex.; ferner ad. mit juv. Achterköpfl-Viererspitze (Stiel)

- Birkhuhn** (*Lyrurus tetrix*): Trotz Suche keine Nachweise mehr aus den beiden großen Mooregebieten des Vorlandes
- Wasserralle** (*Rallus aquaticus*): 5.1. bis mind. 4.2. 1-2 Ex. am N-Rand von Mittenwald (Storp); 29.11., 17. und 20.12. je 2 Ex. Klostergraben Schlehdorf (Maier, Bu, Le)
- Kleines Sumpfhuhn** (*Porzana parva*): Ende April 1 Ex. frisch tot gefunden im Eschenloher Teil des Murnauer Moooses (Mangol<sup>nd</sup>)
- Teichhuhn** (*Gallinula chloropus*): Brutnachweise Karpfsee und N-Bucht Riegsee
- Bläßhuhn** (*Fulica atra*): Neues Maximum am Walchensee 672 Ex. (bisher 393) am 13.11. (Folge der Eutrophierung?). Am 13.11. 882 auf dem Staffelsee. Die Gesamtzahlen scheinen aber abzunehmen, vor allem am Kochelsee. Quersumme 1979/80 20 796 (rund 6500 weniger als im Vorjahr).
- Kiebitz** (*Vanellus vanellus*): 2.11. 420 Ex. Kocheler Moos; 20 BP im Murnauer, mind. 10 BP im Kocheler Moos
- Flußregenpfeifer** (*Charadrius dubius*): 1 erfolgreiche Brut Loisach-einlauf Kochelsee (Strobel, Zie); 1 BP auf einer Kiesfläche an der Loisach bei Hechendorf (Le, Bz)
- Steinwälzer** (*Arenaria interpres*): 6.5. 1 Ex. Kochelsee (Erstnachweis für Werdenfels; Zie, Strobel)
- Bekassine** (*Capella gallinago*): u.a. ca. 2 BP am Barmsee (Storp). Dez. 1-2 Klostergraben Schlehdorf
- Zwergschnepfe** (*Limnocyptes minimus*): 14.1. 1 Ex. Klostergraben Schlehdorf, 29.11. u. 12.12. 1 Ex. ebenda
- Brachvogel** (*Numenius arquata*): Brutbestand Murnauer Moos 7-8 BP; 28.9. 70 Ex. über den Kochelsee ziehend (Maier)
- Dunkler Wasserläufer** (*Tringa erythropus*): Maximum 40 Ex. (27.4.) im Hühnermoos/Kochelsee (Zie)
- Grünschenkel** (*T. nebularia*): Maximum 19 Ex. (27.4.) Kochelsee (Zie)
- Waldwasserläufer** (*T. ochropus*): Wieder mehrere Beobachtungen, u.a. 1 Ex. 12.-24.12. Schlehdorf (Maier u.a.)
- Bruchwasserläufer** (*T. glareola*): Einzelne Mai, Aug. Sept.
- Flußuferläufer** (*Actitis hypoleucos*): Je mind. 1 BP Loisach bei Griesen, unterhalb Garmisch und am Kochelsee-Einlauf; ferner Neidernach bei Griesen; wohl 2 P Isar N Mittenwald

- Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): 16. u. 23.5. je 1 Ex. Isarstausee Krün (Storp); 29.8.-26.9. öfters 1 Ex. Kochelsee (Zie)
- Alpenstrandläufer (*C. alpina*): 6.5. 1 Ex., 26.9.-5.10. bis 2 Ex. Kochelsee (Zie, Strobel)
- Sichelstrandläufer (*C. ferruginea*): 21.-25.5. bis 3 Ex. Kochelsee (Zie, Strobel)
- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Frühjahr bis 5 Ex., 2.11. 3 Ex. Kocheler Moos (Zie)
- Silbermöwe (*Larus argentatus*): 26.1. 1 juv. Kochelsee (Zie)
- Sturmmöwe (*L. canus*): im Winter bis 10 Ex. Kochelsee
- Lachmöwe (*L. ridibundus*): Brutkolonie am Riegsee (z.B. 22.7. 180-200 ad., max. 100 diesj.); Kochelsee-Rohrsee offenbar keine Bruten
- Zwergmöwe (*L. minutus*): 22.5. 2 Ex. Kochelsee (Zie)
- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): max. bis 2 Ex.
- Hohltaube (*Columba palumbus*): Offenbar je einzelne BP Langer Köchel und Weghausköchel im Murnauer Moos sowie am Schwaiger Berg
- Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): u.a. 16.4. 1 Ex. Griesen (Hagen)
- Uhu (*Bubo bubo*): Von 2 BP im westl. Karwendel 1 erfolgreich (2 Junge); ein drittes BP wird vermutet in der weiteren Umgebung. Im Nov. wieder 1 Ex. am IfV rufend; im März 1 Ex. in den Ammergauern
- Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*): Nur ein Nachweis vom Kranzberg
- Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*): Rufnachweis im Karwendel (Fereinsalm)
- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): 31.8. 1 Ex. Moosberg (Maier)
- Mauersegler (*Apus apus*): 25.4. (neues Erstdatum) 2 Ex. Loisach/Triftkanal (Zie)
- Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*): 17.6. 2 Paare, 14.9. 1 Ex. und 15.9. 2 Ex. Falkenwand (Maier, Zie)
- Schafstelze (*Motacilla flava*): Weitere Hinweise auf Brutvorkommen: 8. und 14.6. je 2 sing. ♂ am Schmalensee (Storp); 9.6. 1 warnend W Ramsachkirche Murnauer Moos (Le)

- Bachstelze (*Motacilla flava*): 28.12. 1 Ex. Partenkirchen (Bz)
- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): 17.5. ♂ balzfliegend am Hirzeneck bei 1100 m (Storp); 18.5. und 8.6. je 1 sing. Barmsee, 30.6. Nest mit 6 Eiern Buckelwiesen bei Tonihof in knapp 1000 m NN (Stiel). Bisher höchstgelegener und isolierter Brutplatz bei 890 m am Barmsee
- Raubwürger (*Lanius excubitor*): 20.5. BP mit 3 eben flüggen Jungen Murnauer Moos (Le)
- Alpenbraunelle (*Prunella collaris*): 5.1. 2 Ex., 4.4. 1 Ex. bei Raut am Kochelsee (etwas über 600 m NN; Zie)
- Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): je 1 BP bei Hechendorf und bei Aschau; nach wie vor sehr seltener Brutvogel
- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): 1.6. 1 sing. und 23.7. 1 dj. bei Altjoch/Kochelsee (Storp, Le); 9.-12.8. 1 dj. Ex. am IfV; 13.6. ♂ bei Burgrain (Maier)
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): wieder mind. 1 BP im Murnauer Moos (Maier, Le, Stiel)
- Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): 18.5. am Barmsee noch 5 BP; 28.6. 1 BP fütternd am Kreiskrankenhaus; 23.6. 1 sing. Isartal 3,5 km W Vorderriß (Le). In den genannten Talbezirken nur noch einzelne Restvorkommen. 9.11. 1 ♀ bei Mittenwald (spätestes Datum)
- Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): 20./21.6. 1 BP fütternd Luttensee, ca. 1060 m NN (Storp)
- Hausrotschwanz (*Ph. ochruros*): 2.1. 1 Ex. Griesen (Hagen)
- Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 3.5. 1 sing. Murnauer Moos (Bz)
- Blaukehlchen (*L. svecica*): 6.5. 1 Ex., 23.5. mind. 1 ♂ sing. Murnauer Moos Nordteil (Le)
- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): 20.4. 1 Ex. Stausee Krün (Storp)
- Zaunammer (*Emberiza cirulus*): 16./17.7. 1 sing. ♂ am IfV
- Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Die Ausbreitung der Art im Talbereich und im Vorland ist unverkennbar und sollte weiter verfolgt werden; 16.9. ad. + bettelnde flügge juv. im Ortsbereich Mittenwald (Schindler, Stiel)
- Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*): 25.10. 20 Ex. IfV

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): 9., 13. und 16.6. an 3 verschiedenen Stellen im Murnauer Moos je 1 sing. ♂ (Le, Stiel); 25.6. 1 sing. ♂ Weidmoos bei Ettal (Le); 22.6. 1 ♂ am IfV; 27.7. 1 Ex. Sportplatz Schlehdorf (Maier)

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): 9.7. füttert am Ortsrand von Burgrain 1 ad. 3 juv. (Maier)

### Zooflüchtlinge

Schwarzer Schwan (*Cygnus atratus*): 22.9. 2 Ex. Staffelsee (seit 1 Woche da; telefon. Mitt.)

Kanadagans (*Branta canadensis*): 27.2. 3, 28.2. 2, 1. u. 9.5. je 2, 22.5. 3 Ex., 18.11. 3 Ex. Riegsee (Strobel, Le)

Graugans (*Anser anser*): 15.3. 2 Ex. Kochelsee (Zie)

Rostgans (*Tadorna ferruginea*): 13.-19.5. und 18.6. ♀ Kochelsee (Zie, Strobel), 17.7. 1 Ex. Stau Krün (Le)

Chilpfeifente (*Anas sibilatrix*): 15.10. 3 ♀ Kochelsee (Burnhauser, Le)

### Literatur:

(Weiterführung des Verzeichnisses der Literatur mit Bezug auf das Werdenfeler Land)

BEZZEL, E. (1980): Vogelarten der Roten Liste - ein kritischer Situationsbericht. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspflege 12: 187-196

-- (1980): Beobachtungen zur Nutzung von Kleinstrukturen durch Vögel. Ber. Akad. Naturschutz u. Landschaftspflege 4: 119-125

-- & F. LECHNER (1980): Zur Vogelwelt des Werdenfeler Landes: Jahresbericht 1979. Garmischer vogelkdl. Ber. 8: 7-13

-- & F. LECHNER (1980): Imitation des Gesanges vom Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) durch Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*). Garmischer vogelkdl. Ber. 8: 54

-- & F. LECHNER (1980): Zur Höhenverbreitung des Grauspechts (*Picus canus*). Garmischer vogelkdl. Ber. 8: 55

FRANCK, E. (1981): Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* und Buntspecht *Dendrocopos major* im selben Brutbaum. Anz.orn.Ges.Bayern 20: 86-87

RANFTL, H. (1980): Der Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) in Bayern. Schriftenr. Naturschutz u. Landschaftspflege 12: 159-170



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Lechner Franz

Artikel/Article: [Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980  
41-48](#)