

Rote Liste der in Österreich gefährdeten Käferarten (Coleoptera) — Hauptteil

Von Herbert Franz, Mödling

Ergänzt von A. Kofler, Lienz

(die Käfergruppen Dytiscidae, Cerambycidae und Scolytidae

sowie ausgewählte Gruppen xylobionter Käfer werden auch gesondert besprochen;

siehe nachfolgende Beiträge von C. Wewalka, C. Holzschuh, H. Schönmann und R. Geiser)

Ein hoher Prozentsatz der Coleopteren besitzt ein beschränktes, ja sogar sehr geringes Wandervermögen. Das bedeutet, daß von solchen Arten einmal verlassene Standorte von ihnen nicht mehr oder nur in langen Zeiträumen wiederbesiedelt werden. Wenn wir daher feststellen, daß die Käferfauna Österreichs einer fortschreitenden Verarmung ihrer Artenmannigfaltigkeit unterliegt und daß dieser Vorgang in den letzten Jahrzehnten eine starke Beschleunigung erfahren hat, dann ist das ein an der Lebensdauer des Menschen gemessen irreversibler Prozeß. Dieser ist teils durch die völlige Zerstörung oder weitgehende Veränderung der Lebensräume der Arten, teils durch den Einsatz chemischer Mittel, vor allem von Insektiziden und Herbiziden, bedingt.

Der Einsatz von Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln hat zu einer großflächigen radikalen Verarmung der Insektenpopulationen des landwirtschaftlichen Kulturlandes geführt, da von den Bekämpfungsmaßnahmen nicht bloß die Schädlinge, sondern auch die Nützlinge und indifferenten Arten betroffen wurden. Der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln vernichtete mit den „Unkräutern“ die Futterpflanzen vieler phytophager Insektenarten, und dies nicht bloß auf den Ackerflächen, sondern auch auf Rainen, Wegrändern und Ruderalflächen, die bei der großflächigen Unkrautbekämpfung nicht ausgenommen werden können. Das landwirtschaftliche Kulturland wird aber nicht nur durch den Einsatz von Chemikalien, sondern auch durch andere Eingriffe wie Ent- und Bewässerung, Rodung von Hecken, Umpflügen von Rainen und durch die fortschreitende Verminderung der Mannigfaltigkeit der angebauten Kulturpflanzen als Lebensraum so tiefgreifend verändert, daß es die Eignung als Lebensraum für viele „kulturfolgende“ Pflanzen- und Tierarten verliert.

Nicht ganz so tiefgreifend sind die durch Pflege- und Nutzungsmaßnahmen bedingten Veränderungen der forstlichen Standorte. Kahlschlag, Aufforstung von Monokulturen, vor allem solchen mit standortfremden Holzarten, Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Feuer und nicht zuletzt die Nutzung als Erholungsraum für den Tourismus verändern viele Waldbestände in solchem Ausmaß, daß sie für viele Pflanzen- und Tierarten, denen sie früher als Lebensraum dienten, nicht mehr als solcher geeignet sind.

In der Vergangenheit war das Kulturland allenthalben mit Flächen durchsetzt, die nicht oder nur extensiv genutzt wurden, so mit Trockenrasen und Ex-

tensivweiden auf seichtgründigen Böden, mit Sumpfland und den Uferbereichen stehender und fließender Gewässer, mit extensiv oder überhaupt nicht genutzten Wäldern, mit Heideland, Hecken und Buschwerk aller Art. Solche Standorte waren Refugien der ursprünglichen Flora und Fauna und zugleich Zentren für ihre Wiederausbreitung. Dem Bestreben, alle Naturreserven zu nutzen, fielen sie in den letzten Jahrzehnten größtenteils zum Opfer. Vier Standortstypen weisen besonders starke Flächenverluste auf:

1. Fließende und stehende Gewässer sowie Sümpfe, Moore und Uferlandschaften durch Regulierung, Aufstau oder Trockenlegung einschließlich der radikalen Trockenlegung von Feuchtstandorten.
2. Trockenrasen, Extensivweiden und Felsenheiden durch Umpflügen, Auflassung der Weidenutzung, Aufforstung oder Verbauung.
3. Naturwaldreste durch Schlägern der alten und anbrüchigen Bäume, Ausräumen des Fallholzes, Bestandesumwandlung oder völlige Rodung.

Demgemäß unterlagen die Biozönosen der Gewässer- und Feuchtbiopten, der Trockenrasen und Felsenheiden sowie der Naturwälder (Urwaldreste) neben denen des landwirtschaftlichen Kulturlandes in besonderem Maße der Zerstörung.

Um das in der nachstehenden Artenliste möglichst deutlich in Erscheinung treten zu lassen, wurde bei denjenigen Arten, die eine starke Biotopbindung zeigen, der Biotoptypus vermerkt. Außerdem wurden 4 Gefährdungsgrade unterschieden:

A. 1: ausgestorbene Arten (A. 1.2 aussterbende Arten)

A. 2: stark gefährdete Arten

A. 4: potentiell gefährdete Arten

Um die Zahl der Arten in der 4. Kategorie nicht allzugroß werden zu lassen, wurden hier nur Arten angeführt, die bei Anhalten des derzeitigen Trends in absehbarer Zeit gefährdet sein werden.

Das rasche Fortschreiten der Artenverarmung würde für die exakte Ermittlung der derzeit gefährdeten Arten jüngste Feldbeobachtungen erforderlich machen, die mit einer genauen Bestandesaufnahme der Fauna vor einigen Jahrzehnten zu vergleichen wären. Nun liegen weiträumige Aufnahmen der Fauna aus jüngster Zeit nicht vor, so daß die Gefährdung nur aus der in jüngerer Zeit abnehmenden Zahl von Fundortnachweisen erschlossen werden kann. Die wichtigste Grundlage für den Vergleich mit dem Bestand vor einigen Jahrzehnten lieferte die Arbeit von H. FRANZ, „Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt“ Bd. 3 und 4, Innsbruck 1970 und 1974. Für die westlichen und südlichen Bundesländer wurden A. WÖRNDLE (1950; für Tirol), J. MÜLLER (1912) und J. MOOSBRUGGER (für Vorarlberg) sowie K. HOLDHAUS & PROSSEN (1900–1904) und E. HÖZEL (1936, 1940) für Kärnten verwendet.

Als Ergänzung zur vorliegenden Gesamtbeurteilung werden in nachfolgenden Beiträgen einige Familien detailliert beurteilt.

Für die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Kärnten hat in dankenswerter Weise Herr Direktor Prof. Dr. Alois Kofler (Lienz, Osttirol) die Artnachweise eingetragen; als Grundlage dazu dienten die erwähnten Literaturzitate und die private Kartei von Direktor Kofler. Die lateinischen Namen wurden vor der Satzlegung von Herrn stud. phil. K. Adlbauer (Graz) durchgesehen. (Anm. d. Red.).

● Käfer

Familie CICINDELIDAE, Sandlaufkäfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Cicindela fischeri</i> ADAMS	A. 1	NW	-	-	-	-	-	-	-
- <i>silvatica</i> L.	A. 2	NW	-	O	-	-	-	T	-
- <i>soluta pannonica</i>									
MANDL	A. 1. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-
- <i>germanica</i> L.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V

Familie CARABIDAE, Laufkäfer

<i>Carabus (Goniocarabus)</i>									
<i>cancellatus</i> ILL. (bes.									
einige ssp. wie <i>tatricus</i>									
KOLBE, <i>ziegleri</i> KR.,									
<i>tibiscinus</i> CSIKI)	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V (Kulturland)
- (<i>Procerus</i>) <i>gigas</i> CREUTZ.	A. 1. 2	-	-	-	-	St	K	-	-
- (<i>Pachystus</i>)									
<i>hungaricus</i> F.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	(Trockenrasen und Kulturland)
- (s. str.) <i>menetriesi</i>									
<i>pacholei</i> SOK.	A. 1. 2	NW	-	O	-	-	-	-	(Moore)
- (<i>Hemicarabus</i>) <i>nitens</i> L.	A. 1. 2	NW	-	O	-	St	-	T	(Feuchtgebiete)
- (s. str.) <i>clathratus</i> L.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>Hygrocarabus</i>) <i>variolo-</i>									
<i>sus nodulosus</i> CREUTZ.	A. 2	NW	B	O	S	St	K	T	(Sumpfland)
- (<i>Trachycarabus</i>)									
<i>scabriusculus</i> OL.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	-	(Kulturland)
- (<i>Eucarabus</i>) <i>ulrichi</i>									
GERM.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	-	(Kulturland)
- (<i>Eucarabus</i>) <i>scheidleri</i>									
PANZ. (bes. einige ssp.									
wie <i>floriani</i> Pen.,									
<i>baderlei</i> MANDL,									
<i>maderianus</i> MDL.)	A. 4	NW	B	O	S	St	K	-	-
<i>Calosoma (Calistriga)</i>									
<i>auropunctatum</i> HBST.	A. 4	NW	B	O	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>Chrysostigma</i>)									
<i>reticulatum</i> F.	A. 1. 2	NW	B	O	-	-	-	-	(Kulturland)
- (s. str.) <i>sycophantha</i> L.	A. 2	NW	-	O	S	St	K	T	V
<i>Leistus (Oreobius)</i>									
<i>austriacus</i> SCHAUB.	A. 1. 2	-	-	O	-	-	-	-	(Sengsengebirge)
- (s. str.) <i>rufescens</i> F.	A. 4	-	-	O	S	St	K	T	(Sumpfland)
<i>Nebria</i> (s. str.) <i>livida</i> L.	A. 2	NW	B	O	-	-	-	-	V (Flußufer)
<i>Notiophilus laticollis</i>									
CHAUD.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
<i>Blethisa multipunctata</i> L.	A. 1. 2	NW	B	-	-	St	-	-	(Sumpfland)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Elaphrus (Elaphrotus)</i>									
<i>aureus</i> MÜLL.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V (Sumpfland)
– (s. str.) <i>cupreus</i>									
DUFTSCHM.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V (Sumpfland)
– (s. str.) <i>uliginosus</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Sumpfland)
– (<i>Elaphroterus</i>) <i>ulrichi</i>									
REDTB.	A. 2	NW	B	O	S	St	K	T	V (Bachufer)
<i>Clivina ypsilon</i> DEJ.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
<i>Dyschirius</i> (s. str.)									
<i>angustatus</i> f. typ. u. ssp.									
<i>uliginosus</i> PUTZ.	A. 1.2	NW	–	O	S	St	K	T	– (Flußufer)
– <i>bonellii</i> PUTZ.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>chalceus</i> ER.	A. 2	N	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– <i>gibbifrons</i> APFB.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– <i>digitatus</i> DEJ.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Flußufer)
– <i>extensus</i> PUTZ.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– <i>intermedius</i> PUTZ.	A. 4	NW	–	O	S	St	K	T	– (Flußufer)
– <i>laevisculus</i> PUTZ.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V (Flußufer u. Lehmgruben)
– <i>lafertei</i> PUTZ.	A. 2	N	–	–	–	St	–	T	V (Flußufer)
– <i>lucidus obenbergeri</i>									
MARAN	A. 4	NW	–	O	–	St	–	T	– (Flußufer)
– <i>ludersi</i> WAGN.	A. 2	N	B	–	–	St	–	–	– (Sumpfland)
– (s. str.) <i>politus</i> DEJ.	A. 2	–	B	O	–	?	–	–	– (Steyr) (Flußufer)
– (s. str.) <i>pusillus</i> DEJ.	A. 2	N	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– (s. str.) <i>ruficornis</i> PUTZ.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	–	– (Fluß- u. Seeufer)
– (s. str.) <i>rufipes</i> DEJ.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
– (s. str.) <i>similis</i> PETRI	A. 4	–	–	O	–	St	–	T?	–
– (s. str.) <i>strumosus</i> ER.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– (s. str.) <i>substriatus</i>									
DUFT.	A. 4	N	–	O	–	St	K	T	– (Flußufer)
<i>Miscodera arctica</i> PAYK.	A. 1.2	–	–	–	–	–	–	T	– (Relikt)
<i>Bembidion (Bracteon)</i>									
<i>argenteolum</i> AHR.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Fluß- u. Seeufer)
– (<i>Talanes</i>) <i>aspericolle</i>									
GERM.	A. 1	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– (<i>Peryphus</i>) <i>dalmatinum</i>									
DEJ.	A. 2	NW	–	–	–	St	K	–	–
– (<i>Peryphus</i>)									
<i>distinguendum</i> DUV.	A. 2	–	–	O	–	St	K	T	V
– (<i>Synechostictus</i>)									
<i>elongatum</i> DEJ. f. typ.	A. 1.2	NW	B	O	S	St	K	T	V (Enns)
– ssp. <i>tarsicum</i> PEYRON	A. 1.2	N	B	–	–	St	–	–	–
– (<i>Euperyphus</i>) <i>eques</i>									
STRM.	A. 1.2	–	–	O	S	St	K	T	V (Flußufer)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Bembidion (Hirmoplataphus)</i>										
<i>friebi</i> NET.	A. 2	–	–	O	S	St	–	–	–	(Flußufer)
– (<i>Euperyphus</i>) <i>fulvipes</i>										
STURM	A. 4	NW	–	O	–	St	K	T	V	(Flußufer)
– (<i>Semicampa</i>) <i>gilvipes</i>										
STURM	A. 4	NW	B	O	–	–	–	–	–	(Flußufer, Sumpfland)
– (<i>Lopha</i>) <i>humerales</i>										
STURM	A. 2	NW	–	O	S	St	–	T	–	(Moore u. Sümpfe)
– (<i>Pogonidium</i>) <i>laticolle</i>										
DUFT.	A. 4	NW	B	O	–	–	–	T	V	(Donauufer)
– (<i>Emphanes</i>) <i>latiplaga</i>										
CHAUD.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	
– (<i>Litoreobracteion</i>)										
<i>litorale</i> OL.	A. 4	NW	–	O	S	St	K	–	–	(Flußufer)
– (<i>Peryphus</i>) <i>saxatile</i>										
GYLL.	A. 2	–	–	–	S	–	–	–	–	
– (<i>Chlorodium</i>)										
<i>splendidum</i> STURM	A. 4	NW	–	O	–	–	–	–	–	(Flußufer)
– (<i>Bracteion</i>) <i>striatum</i> F.	A. 4	NW	–	O	–	St	K	T	–	(Flußufer)
– (<i>Chrysobracteion</i>)										
<i>velox</i> L.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Donauufer)
<i>Limnastis galilaeus</i>										
BRULLÉ	A. 2	–	–	–	–	–	–	T	–	(Reutte) (Sumpfland)
<i>Callistus lunatus</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	V	
<i>Chlaenius</i> (s. str.)										
<i>festivus</i> F.	A. 2	N	B	O	–	–	–	–	–	(Sumpfland)
– (<i>Agostenus</i>)										
<i>sulcicollis</i> PAYK.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	T	–	
– (<i>Chlaeniellus</i>) <i>tristis</i>										
SCHALL.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	T	V	(Sumpfland)
<i>Badister (Baudia)</i>										
<i>gladiator</i> APFB.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	–	(Auwälder a. d. March)
<i>Licinus cassideus</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	–	–	(Trockenrasen)
<i>Amblystomus metallescens</i>										
DEJ.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Sumpfland)
<i>Harpalus</i> (s. str.)										
<i>albanicus</i> REITT.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (s. str.) <i>anxius</i> DUFTSCH.	A. 4	NW	B	O	–	St	–	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Pardileus</i>) <i>calceatus</i>										
DUFT.	A. 2	NW	B	O	S	St	K	T	–	(Trockenrasen und Kulturland)

● Käfer

NW B O S St K T V

Harpalus (Cephalophonus)

<i>cephalotes</i> FAIRM.	A. 1.2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
- (<i>Metophonus</i>)										
<i>cribricollis</i> DEJ.	A. 4	NW	B	-	-	St	-	-	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>cupreus</i> DEJ.	A. 2	-	B	-	-	St	-	-	-	(Neusiedlersee)
- (<i>Ophonus</i>) <i>diffinis</i> DEJ.	A. 2	NW	B	O	-	St	-	-	V	(Sumpfland)
- (s. str.) <i>dimidiatus</i> ROSSI	A. 4	-	B	O	-	St	K	-	-	(Trockenrasen und Kulturland)
- (<i>Haploharpalus</i>)										
<i>frölichi</i> STURM	A. 2	NW	B	-	-	-	K?	T	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>fuscipalpis</i>										
STURM	A. 1.2	NW	-	-	-	-	K	-	-	
- (<i>Ophonus</i>) <i>gammeli</i>										
SCHAUB.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- (<i>Haploharpalus</i>)										
<i>hirtipes</i> PANZ.	A. 2	NW	B	-	-	St	-	-	-	(Trockenrasen und Kulturland)
- (<i>Harpalophonus</i>) <i>hospes</i>										
STURM	A. 2	NW	B	-	-	-	K	-	-	(Kulturland)
- (s. str.) <i>melancholicus</i>										
DEJ.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	-	-	
- (<i>Metophonus</i>) <i>melleti</i>										
HEER	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>modestus</i> DEJ.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	
- (<i>Ophonus</i>) <i>obscurus</i> F.	A. 2	NW	B	O	-	St	K	T	V	(Kulturland)
- (s. str.) <i>picipennis</i> DUFT.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>politus</i>										
DEJ.	A. 1.2	NW	B	-	-	St	K?	-	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>pygmaeus</i> DEJ.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
- (<i>Metophonus</i>) <i>rupicola</i>										
STURM	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Kulturland)
- (<i>Ophonus</i>) <i>sabulicola</i>										
PANZ.	A. 4	NW	B	O	S	-	-	-	V	(Kulturland)
- (s. str.) <i>saxicola</i> DEJ.	A. 1.2	NW	B	O	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
- (<i>Microderes</i>) <i>scaritides</i>	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
- (s. str.) <i>servus</i> DUFT.	A. 2	NW	B	O	-	St	K	-	-	
- (<i>Ophonus</i>) <i>ardosiacus</i>										
LUTSHN.	A. 2	NW	B	O	-	St	-	-	-	
- (s. str.) <i>taciturnus</i> DEJ.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	K	-	-	(Donauauen)
- (s. str.) <i>vernalis</i> DUFT.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	(Trockenrasen und Kulturland)
- (<i>Haploharpalus</i>)										
<i>zabroides</i> DEJ.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen und Kulturland)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Parophonus dejeani</i>									
CZIKI	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	–
– <i>maculicornis</i> DUFT.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	–
<i>Stenolophus discophorus</i>									
FISCH.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	– (Sumpfland)
– <i>skrimshiranus</i> STEPH.	A. 2	N	B	–	–	St	–	–	– (Sumpfland)
<i>Acupalpus suturalis</i>									
DEJ.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Sumpfland)
<i>Anthracus longicornis</i>									
SCHAUM	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	– (Flußufer)
<i>Acupalpus (Ancylostria)</i>									
<i>interstitialis</i> RETT.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
<i>Amara (Zezea) chaudierei</i>									
ssp. <i>incognita</i> FASS.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–
– (s. str.) <i>famelica</i> ZIMM.	A. 4	N	B	O	–	St	K	–	–
– (<i>Zezea</i>) <i>fulvipes</i> SERV.	A. 2	–	B	–	–	St	–	–	–
– (s. str.) <i>littorea</i> THOMS.	A. 4	NW	B?	–	–	–	–	–	–
– (<i>Bradytus</i>) <i>majuscula</i>									
CHAUD.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	–
– (<i>Celia</i>) <i>sabulosa</i> SERV.	A. 2	NW	B	–	–	–	K?	–	–
– (s. str.) <i>saphyrea</i> DEJ.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– (<i>Zezea</i>) <i>tricuspidata</i>									
DEJ.	A. 4	NW	B	O	–	St	–	–	–
<i>Zabrus (Pelor) spinipes</i> F.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Kulturland)
<i>Pterostichus (Lianoë) justus</i>									
REDTB.	A. 2	–	–	–	–	St	K	–	– (Endenit)
– (<i>Lyperosomus</i>)									
<i>aterrimus</i> HBST.	A. 1.2	N	B	–	–	–	K	–	– (Sumpfland)
– (<i>Steropus</i>) <i>cylindricus</i>									
HBST.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen und Kulturland)
– (<i>Lyperosomus</i>) <i>elongatus</i>									
DUFTSCHM.	A. 4	NW	B	–	–	–	K	–	–
– (<i>Pedilus</i>) <i>longicollis</i>									
DUFT.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–
– (<i>Pedilus</i>) <i>inquinatus</i>									
STURM	A. 4	NW	B	–	–	–	K?	–	–
– (<i>Lagarus</i>) <i>leonisi</i> APFB.	A. 4	NW	B	–	–	–	K	–	–
– (<i>Ancholeus</i>) <i>puncticollis</i>									
DEJ.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–
– (<i>Poecilus</i>) <i>punctulatus</i>									
SCHALL.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	V?
– (<i>Poecilus</i>) <i>striato-</i>									
<i>punctatus</i> DUFT.	A. 2	NW	–	–	–	St	K	–	–

● Käfer

NW B O S St K T V

<i>Pterostichus (Argutor)</i>										
<i>trasalis</i> APFB.	A. 4	-	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>Cosciniopterus</i>)										
<i>variolatus</i> DEJ.	A. 1.2	-	-	-	-	St	K	-	-	(Relikt)
<i>Antisphodrus schreibersi</i>										
ssp. <i>styriacus</i> SCHMID	A. 4	-	-	-	-	St	-	-	-	(Höhlenbewohner)
<i>Dolichus halensis</i> SCHALL.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	(Kulturland)
<i>Pristonychus janthinus</i>										
DUFT.	A. 4	N	-	-	S	-	K	T	-	
<i>Platyderus rufus</i> DUFT.	A. 4	NW	B	-	-	St	K	-	-	(Trockenrasen)
<i>Olistophus rotundatus</i>										
PAYK.	A. 1.2	NW B?	-	-	-	-	T	V		(Trockenrasen)
<i>Agonum (s. str.)</i>										
<i>angustatum</i> DEJ.	A. 2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>s. str.</i>) <i>atratum</i> DUFT.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>s. str.</i>) <i>holdhausi</i> APFB.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
- (<i>s. str.</i>) <i>viridicupreum</i>										
GZE.	A. 2	NW	B	O	-	St	K	-	V	(Sumpfland)
<i>Masoreus wetterhali</i> GYLL.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
<i>Cymindis angularis</i> GYLL.	A. 2	NW	B	-	-	-	K	T	-	(Trockenrasen)
- <i>coadunata</i> DEJ.	A. 4	NW	-	O	-	St	K	-	-	(Trockenrasen, Felsenheiden)
- <i>scapularis</i> SCHAUM	A. 1.2	NW	B	-	-	St	-	-	-	(Trockenrasen)
- <i>axillaris</i> F.	A. 4	NW	B	-	-	-	K	T	V	(Trockenrasen)
- <i>variolosa</i> F.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
<i>Drypta dentata</i> ROSSI	A. 2	NW	B	-	-	St	K	-	-	(Augehölze)
<i>Zuphium olens</i> ROSSI	A. 1.2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
<i>Polystichus connexus</i>										
FOURCR.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
<i>Brachynus ganglbaueri</i>										
<i>advena</i> SCHAUB.	A. 2	N	B	-	-	St K?	-	-	-	(Neusiedlersee)
<i>Lebia humeralis</i> DEJ.	A. 2	NW	B	-	-	St	-	-	-	
- <i>marginata</i> FOURCR.	A. 2	N	B	O	-	St	-	-	V	
- <i>scapularis</i> FOURCR.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Demetrias (Aetophorus)</i>										
<i>imperialis</i> GERM.		NW	B	-	-	St	-	T	-	(Sumpfland)

Familie DYTISCIDAE, Schwimmkäfer

<i>Hydrovatus cuspidatus</i>										
KZE.	A. 2	NW	B	O	-	St	-	-	-	
<i>Hyphydrus aubei</i> GGLB.	A. 1.2	NW	B	-	-	St	-	-	-	
<i>Deronectes latus</i> STEPH.	A. 2	NW	B	O	S	St	-	T	-	
- <i>platynotus</i> GERM.	A. 2	NW	-	O	-	St	K	T	-	
<i>Oreodytes rivalis</i> GYLL.	A. 2	NW	-	O	S	St	K	T	V	

● Käfer

NW B O S St K T V

Oveodytes septentrionalis

GYLL.	A. 2	NW	–	O	S	St	K	–	V
<i>Laccornis kocai</i> GGLB.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–
<i>Dytiscus latissimus</i> L.	A. 1	NW	–	O	–	–	–	T	–

Familie RHYSODIDAE, Runzelkäfer*Rhysodes americanus*

LEPORTE	A. 1	NW	–	–	–	–	–	–	–
---------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Familie SPERCHEIDAE*Spercheus emarginatus*

SCHALL.	A. 1.2	NW	B	O	S	–	–	–	– (Sumpfland)
---------	--------	----	---	---	---	---	---	---	---------------

Familie SILPHIDAE, Aaskäfer*Xylodrepa*

<i>quadripunctata</i> L.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V
--------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---

Pteroloma forstroemi

GYLL.	A. 1.2	–	–	–	S	St	K	–	– (Fluß- u. Bachufer)
-------	--------	---	---	---	---	----	---	---	-----------------------

Familie CATOPIDAE, Nestkäfer*Attaephilus arenarius*

HPE.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	K	–	– (Trockenrasen)
– <i>molitori</i> SCHPTZ.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–

Familie SCYDMAENIDAE, Ameisenkäfer*Euthiconus conicicollis*

FAIRM.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
--------	------	----	---	---	---	---	---	---	------------------

Neuraphes (Pararaphes)

<i>indigena</i> HÖLZEL	A. 1.2	–	–	–	–	–	K	–	– (Urwaldrelikt)
------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	------------------

Stenichnus (Cyrtoscydmus)

<i>foveola</i> REY	A. 4	NW	–	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
--------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	------------------

– (Cyrtoscydmus) pelliceus

HOLDH.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
--------	------	----	---	---	---	---	---	---	------------------

Familie SPHAERIIDAE, Kugelkäfer*Sphaerius acaroides*

WALTL	A. 4	NW	B	–	S	St	K	T	V (Sümpfe, Naßstellen)
-------	------	----	---	---	---	----	---	---	---------------------------

Familie STAPHYLINIDAE, Kurzflügler*Thoracophorus corticinus*

MOTSCH.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	–	– (Urwaldrelikt)
---------	------	----	---	---	---	----	---	---	------------------

<i>Olophrum florae</i> SCHPTZ.	A. 1	–	–	–	S	–	–	T	– (Relikt)
--------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------

NW B O S St K T V

<i>Arpedium salisburgense</i> SCHPTZ.	A. 1	- - - S - - - -	(Relikt, ob. Stubach- tal, heute Stausee)
<i>Coryphium gredleri</i> KR.	A. 2	- - - S - K T V	
<i>Thinobius franzi</i> SCHPTZ.	A. 1	- - - S - K - -	(Relikt, Umg. Glocknerhaus, überstaut)
<i>Bledius (Blediodes)</i> <i>dehnerti</i> KORGE	A. 1.2	- B - - - - -	(Trockenrasen)
- (<i>Blediodes</i>) <i>roubali</i> SCHPTZ.	A. 1	NW - - - - -	
<i>Austriacotyphlus piffli</i> SCHPTZ.	A. 1.2	NW - - - - -	(Leopoldsberg)
<i>Platystethus</i> (s. str.) <i>luzei</i> BERNH.	A. 1.2	- B - - - - -	(Neusiedlersee)
<i>Lathrobium (Tetartopeus)</i> <i>gracile</i> HPE.	A. 1.2	NW - O - - K T -	(Tyrphobiont)
<i>Scimbalium anale</i> NORDM.	A. 1.2	N B - - - - -	(Neusiedlersee)
<i>Hesperus rufipennis</i> GRAV.	A. 2	NW B O - St K - -	(Urwaldrelikt)
<i>Philonthus</i> (s. str.) <i>scribae</i> FAUV.	A. 4	NW B - - St - - -	(in Zieselbauen)
- (s. str.) <i>spermophili</i> GGLB.	A. 4	NW B - - - - T -	(in Kleinsäuger- bauen)
<i>Emus hirtus</i> L.	A. 4	NW B O S St K T V	(auf Düngerstätten)
<i>Astrapaeus ulmi</i> ROSSI	A. 4	NW B O - St K T -	
<i>Quedius (Raphirus)</i> <i>boopoides</i> MUNSTER	A. 4	N B - - - - -	(Sumpfland)
<i>Acylophorus</i> <i>wagenschieberi</i> KSW.	A. 4	- - O - - - T -	(Tyrphobiont)
<i>Geostibacarinthiaca</i> SCHPTZ.	A. 4	- - - - St K - -	(Urwaldrelikt)
<i>Hygropetrophila scheer- peltzi</i> BERNH.	A. 2	- - - S - K - -	(an sehr nassen Felsen)

Familie PSELAPHIDAE, Palpenkäfer

<i>Dimerus staphylinoides</i>	FIORI	A. 1.2	- - O - St - - - (Flußufer)
<i>Saulcyella schmidtii</i>	MÄRKEL	A. 1.2	NW - - - St - - - (Urwaldrelikt)
<i>Bibloporus ultimus</i>	GUILLEB.	A. 1.2	NW - - - - - - - (Urwaldrelikt)
<i>Batrisodes hubenthali</i>	REITT.	A. 1.2	NW - - - - - - - (Urwaldrelikt)

● Käfer

NW B O S St K T V

Batrissodes slovenicus

MACHULKA A. 1.2 NW - - - St - - - (? Urwaldrelikt)

Bryaxis femoratus AUBÉ A. 2 NW B O - St K - - (Trockenrasen u. -gebüsche)*Bryaxis sofidus* RTT. A. 1.2 - - - - St K - - (Urwaldrelikt)- *cateniger* KARAMAN A. 1.2 N - - - St K T -*Tychobythinus pauper* KSW. A. 1.2 - B - - - - - (Neusiedlersee)*Centrotoma lucifuga*

HEYDEN A. 1.2 NW - - - - - T - (Trockenrasen)

*Chennium biturberculatum**steigerwaldi* RTT. A. 1.2 NW B - - - - - (Trockenrasen)*Ctenistes palpalis* RCHB. A. 4 NW B O - St K T - (Trockenrasen)**Familie HISTERIDAE, Stutzkäfer***Hololepta plana* SULZER A. 4 NW B O S St - - V*Eubrachium pusillum*

ROSSI A. 1.2 - B - - - - - (Urwaldrelikt)

Acritis hopffgarteni REITT. A. 2 NW B - - - - - (Urwaldrelikt)*Hypocacculus rufipes* PAYK. A. 2 NW B - - - - - (Trockenrasen)*Calcionellus amoenus* ER. A. 2 NW B - - - - - (Trockenrasen)*Satrapes sartorii* REDTB. A. 1.2 NW B - - - K - - (Trockenrasen)**Familie MALACHIIDAE, Zipfelkäfer***Malachius scutellaris* ER. A. 1.2 NW - - - St - - -- *spinipennis* GERM. A. 2 NW B - - - - -- *rubidus* ER. A. 4 NW B O - St K T -*Cerapheles terminatus*

MÉN. NW B - - - - - (Sumpfland),

Colotes hampei REDTB. A. 1.2 NW B - - - - -**Familie CANTHARIDAE, Weichkäfer***Armidia signata* GERM. A. 2 - - - - St K T -**Familie MELYRIDAE (= Dasytidae) Haarkäfer***Henicopus hirtus* L. A. 4 NW B - - - - - (Trockenrasen)**Familie CLERIDAE, Buntkäfer***Tilus elongatus* L. A. 4 NW B O S St K T V- *unifasciatus* F. A. 4 NW B - - St K T -*Opilo pallidus* OL A. 4 NW B - - St - - -*Pseudoclerops**mutillarius* F. A. 4 NW B O - St K - -**Familie ELATERIDAE, Schnellkäfer***Adelocera quercea* HBST. A. 2 NW B - - St K - - (Urwaldrelikt)

● Käfer

NW B O S St K T V

Ampedus cardinalis

SCHIÖDTE	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	(Urwaldrelikt)
- <i>quadrisignatus</i> GYLL.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Urwaldrelikt)
- <i>elegantulus</i> SCHÖNH.	A. 4	NW	B	O	-	St	-	T	-	
- <i>hjorti</i> RYE	A. 2	-	-	-	S	St	-	T	-	
- <i>tristis</i> L.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	V?	(in Reliktföhrenwäldern)
- <i>megerlei</i> LAC.	A. 2	NW	-	O	-	St	-	T	-	(Urwaldrelikt)

Ischnodes sanguinicollis

PANZ.	A. 4	NW	B	-	-	St	K	T	-	(Urwaldrelikt)
-------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	----------------

Megapenthes lugens

REDTB.	A. 2	NW	B	O	-	St	-	-	-	(Urwaldrelikt)
--------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	----------------

Elatér (Ludius)

<i>ferrugineus</i> L.	A. 4	NW	B	O	S?	St	K?	-	-	
-----------------------	------	----	---	---	----	----	----	---	---	--

Agriotes modestus KSW.

- <i>sordidus hispanicus</i>	A. 1	NW	B	-	-	-	-	-	-	
------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

DESB.	A. 2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen, Salzböden)
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------

Limoniscus violaceus

MÜLL.	A. 1	N	-	-	-	St	-	T	-	(Urwaldrelikt)
-------	------	---	---	---	---	----	---	---	---	----------------

Betarmon ferrugineus

SCOP.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	V	
-------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	--

Ctenicera heyeri SAXESEN

- <i>globicollis</i> GERM.	A. 4	NW	-	O	-	St	K	T	-	
----------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	--

- <i>melancholicus</i> F.	A. 4	NW	-	O	S	St	K	T	-	(Alpine Grasheiden)
---------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	---------------------

Syn. Athous villosus

FOURER	A. 4	NW	-	O	-	St	K	T	-	
--------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	--

Familie CEROPHYTIDAE, Höckerkäfer

Cerophytum elateroides

LATR.	A. 4	NW	B?	-	-	-	K?	-	-	
-------	------	----	----	---	---	---	----	---	---	--

Familie EUCNEMIDAE, Dornhalskäfer

<i>Melasis buprestoides</i> L.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	
--------------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	--

<i>Dirhagus attenuatus</i> MÄKL.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
----------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

<i>Xylobius testaceus</i> HBST.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	-	-	
---------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

- <i>corticalis</i> PAYK.	A. 2	NW	-	-	-	St	K	T	-	
---------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---	--

<i>Hylocharis dubius</i> PILLER	A. 1	NW	-	-	-	-	-	-	-	
---------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	--

<i>Nematodes filum</i> F.	A. 1.2	NW	-	-	-	St?	-	-	-	
---------------------------	--------	----	---	---	---	-----	---	---	---	--

Hypocoelus procerulus

MANNH.	A. 2	N	-	O	-	-	K	T	V	
--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

● Käfer

NW B O S St K T V

Familie BUPRESTIDAE, Prachtkäfer

<i>Acmaeodera degener</i> SCOP.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	-	
- <i>flavofasciata</i> PILL.										
et MITT.	A. 2	NW	B	-	-	St	-	-	-	
<i>Ptosima undecimmaculata</i>										
HBST.	A. 4	NW	B	-	-	St	-	-	-	
<i>Capnodis tenebrionis</i> OL.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
<i>Perotis lugubris</i> F.	A. 2	NW	B	O	-	St	-	-	-	
<i>Sphenoptera antiqua</i> ILLIG.	A. 1.2	NW	B	-	-	St	-	-	-	(Trockenrasen)
- <i>laportei</i> SAUND.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen u. gebüsche)
- <i>barbarica</i> GMEL.	A. 1	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Dicerca</i> (s. str.) <i>acuminata</i>										
PALL.	A. 1.2	NW	-	-	-	St	K	-	-	
- (s. str.) <i>aenea</i> L.	A. 1.2	NW	-	-	-	St	-	-	-	
- (<i>Argante</i>) <i>herbsti</i> Ksw.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Poecilnota variolosa</i>										
PAYK.	A. 2	NW	B	O	-	-	K	T	-	
<i>Eurythyrea austriaca</i> L.	A. 1	NW	-	-	-	St	K	T	-	
- <i>quercus</i> HBST.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	-	(Urwaldrelikt)
<i>Euprestis splendens</i> F.	A. 1	NW	-	-	-	St	K	-	-	(Urwaldrelikt)
<i>Palmar festiva</i> L.	A. 2	-	-	-	-	-	K	T	-	
<i>Phaenops knoteki</i> REITT.	A. 1.2	NW	-	-	-	St	-	-	-	
- <i>formaneki</i> JAKOBS	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Anthaxia</i> (s. str.) <i>candens</i>										
PANZ.	A. 4	NW	B	O	-	St	-	T	V	
- (s. str.) <i>deaurata</i> GMEL.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	-	
- (<i>Cratomerus</i>) <i>hungarica</i>										
SCOP.	A. 2	NW	B	-	-	St	-	-	-	
- (<i>Haplanthaxia</i>) <i>inculta</i>										
GERM.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- (s. str.) <i>istriana</i> ROSH.	A. 2	NW	-	-	-	-	K	-	-	
- (s. str.) <i>olympica</i> KSW.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
- (s. str.) <i>semicuprea</i>										
KÜST.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- (s. str.) <i>türki</i> GGLB.	A. 1	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Coraebus florentinus</i> HBST.	A. 2	-	B	-	-	-	-	-	-	
- <i>undatus</i> F. F.	A. 4	NW	-	O	-	St	K	-	-	
- <i>sinuatus</i> CREUTZ.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	-	-	
<i>Meliboeus fulgidicollis</i>										
LUC.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
<i>Agrilus acutangulus</i> THÉRY	A. 4	-	B	-	-	-	K?T?	-	-	
- <i>albogularis</i> GORY	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
- <i>cinctus</i> OL.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	-	

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Agrilus convexifrons</i> KSW.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	–
– <i>croaticus</i> AB	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
– <i>curtii</i> OBENB.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
– <i>guerini</i> LAC.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	–
– <i>hastulifer</i> RATZEB.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	–
– <i>pseudocyaneus</i> KSW.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
<i>Paracylindromorphus</i> <i>subuliformis</i> MANNH.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Cylindromorphus bifrons</i> REY	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>filum</i> GYLL.	A. 4	NW	B	O	–	–	K	–	–
<i>Aphanisticus elongatus</i> VILLA	A. 4	NW	B	O	–	St	–	T	– (Sumpfland)
<i>Habroloma nana</i> PAYK.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Trachys problematicus</i> OBENB.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>pygmaea</i> F.	A. 2	NW	–	–	–	–	K	T	–

Familie DASCILLIDAE, Wiesenkäfer

Eubria palustris GERM. A. 4 NW B O S St K T V (Sumpfland)

Familien: HELODIDAE, DRYOPIDAE, HETEROCERIDAE

Wahrscheinlich ist die Mehrzahl der Arten aus den Genera *Helodes*, *Cyphon*, *Dryops* und *Heterocerus* durch die fortschreitende Ableitung und Verbauung der Flüsse heute gefährdet, es fehlt aber an entsprechenden Untersuchungen.

Familie DRYOPIDAE, Hakenkäfer

<i>Potamophilus</i> <i>acuminatus</i> F.	A. 4	NW	B	–	–	St	–	–	– (in Bächen u. Flüssen)
<i>Stenelmis canaliculatus</i> GYLL.	A. 4	NW	–	O	–	–	–	–	(in Flüssen)
<i>Elmis obscura</i> MÜLL.	A. 1.2	N	–	–	–	St	–	–	V mündl. Mitt. M. JÄCH
<i>Limnius muelleri</i> ER.	A. 1.2	NW	–	O	–	–	K	–	–
<i>Riolus apfelbecki</i> GGLB.	A. 1	NW	–	–	–	–	–	–	(Fischauer Therme)
<i>Normandia nitens</i> MÜLL.	A. 2	NW	–	–	–	St	K	–	–

Familie GEORYSSIDAE, Grabkäfer

<i>Georyssus laeiscollis</i> GERM.	A. 4	NW	–	–	–	St	K	T	V (Flußufer)
– <i>substriatus</i> HEER	A. 4	N	B	O	–	St	K	T	– (sandige Flußufer)

● Käfer

NW B O S St K T V

Familie DERMESTIDAE, Speckkäfer*Phradonoma villosulum*

DUFT.

A. 2

NW - - - St K - - (Trockenrasen)

Familie BYRRHIDAE, Pillenkäfer*Lamprobyrrhulus nitidus*

SCHALL.

A. 2

NW B O S St K T V (auf Sandböden)

Familie OSTOMIDAE, Flachkäfer*Temnochila coerulea* OL.

A. 1.2

NW - - - St K - - (Reliktföhrenwälder)

Calitys scabra THUNB.

A. 4

NW - O - St K T -

Zimioma grossum L.

A. 4

NW - O - St K T -

Familie NITTIDULIDAE, Glanzkäfer*Meligethes discoideus* ER.

A. 1.2

NW - - - - - - - (Türkenschanze)

Familie CUCUJIDAE, Plattkäfer*Cucujus cinnaberinus*

SCOP.

A. 2

NW - O - St - - - (Urwaldrelikt in Auwäldern)

Pediacus depressus HBST.

A. 1.2

NW - - - - - - - (Urwaldrelikt)

- *dermestoides* F.

A. 1.2

NW - - - - K - - (Urwaldrelikt)

Laemophloeus (Cryptolestes) corticinus ER.

A. 2

NW - - - St - T - (Reliktföhrenwälder)

- *(Leptophloeus) hypobori*

PERRIS

A. 2

NW - - - - - - - (an *Lorantus*)*Lathropus sepicola* MÜLL.

A. 2

NW B - - - - - - (Urwaldrelikt)

Prostomis mandibularis F.

A. 1.2

NW - O S St K T - (Urwaldrelikt)

Familie EROTYLIDAE, Faulholzkäfer*Tritoma subbasalis* REITT.

A. 1.2

- - O S St - - -

Triplax (s. str.) russica L.

A. 4

NW B O ? St K T ?

- *(s. str.) elongata* LAC.

A. 1.2

NW - - - St - - - (Marburg)

(Platichna) scutellaris

CHARP.

A. 4

NW B O - St K - - (Marburg)

- *(s. str.) lacordairei*

CROTCH

A. 2

NW B - - - - - -

- *(s. str.) pygmaea* KRAATZ

A. 1.2

- B - - - - - -

- *(Platichna) rufipes* F.

A. 4

NW B - - St K T -

● Käfer

NW B O S St K T V

*Triplax (Platichna)**collaris* SCHALL. A. 2 NW B O – St – – –*Dacne notata* GMEL. A. 1.2 NW – O – St – – –– *pontica* BED. A. 1.2 – – – – – K – –*Combocerus glaber*

SCHALL. A. 4 NW B O – St K T –

Diphyllus lunatus F. A. 1.2 NW – – – St K – – (Urwaldrelikt)**Familie CRYPTOPHAGIDAE, Schimmelkäfer***Telmatophilus brevicollis*

AUBÉ A. 4 NW B – – – – – (Sumpfland)

– *caricis* OL. A. 4 NW ? ? ? St K T V (Sumpfland)– *schoenherrii* GYLL. A. 4 NW – – – St K – – (Sumpfland)*Macrophagus robustus*MOTSCH. A. 1.2 NW – – – – – – (Bisamberg,
Trockenrasen)*Cryptophagus schmidtii*

STRM. A. 4 NW B O – St K – –

*Atomaria (Anchicera)**berolinensis* KR. A. 2 NW B – – – K T –– (*Anchicera*)*slavonica* JOHNS. A. 2 NW B – – – – – (Urwaldrelikt)– (s. str.) *norica* GGLB. A. 2 NW – – S – – T –**Familie LATHRIDIIDAE, Moderkäfer***Holoparamesus caularum*AUB. A. 4 NW – – – – – – (in Österreich
Urwaldrelikt)*Enicmus brevicollis*

THOMS. A. 2 NW – – – St K – – (Urwaldrelikt)

– *brevicornis* MANNH. A. 4 NW – – – St – T – (Urwaldrelikt)– *fungicola* THOMS. A. 2 NW – – – – – T – (Urwaldrelikt)*Corticaria lapponica* ZETT. A. 2 NW – – – – – – (Urwaldrelikt)*Melanophthalma austriaca*

FRANZ A. 2 NW B – – St – – – (Urwaldrelikt)

Familie PHALACRIDAE, Glattkäfer*Phalacrus championi*

GUILLEB. A. 2 – B – – – K – – (Sumpfland)

Familie MYCETOPHAGIDAE, Baumschwammkäfer*Pseudotriphyllus**suturalis* F. A. 2 NW – – – St K – – (Urwaldrelikt)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Mycetophagus ater</i> REITT.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–

Familie COLYDIIDAE, Rindenkäfer

<i>Colydium elongatum</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	–
– <i>filiforme</i> F.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Pycnomerus terebrans</i> OL.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Rhopalocerus rondanii</i> VILLA	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Orthocerus crassicornis</i> ER.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Endophloeus</i> <i>markovicianus</i> PILL.	A. 1.2	NW	–	–	–	St	K	–	–
<i>Aulonium trisulcum</i> GEOFFR.	A. 2	NW	–	O	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Colobicus marginatus</i> LATR.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	T	– (Urwaldrelikt)
<i>Synchita mediolanensis</i> VILLA	A. 1.2	NW	–	–	–	St	K	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Teredus opacus</i> HABERM.	A. 1	–	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Oxylaemus cylindricus</i> PANZ.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
– <i>variolosus</i> DUF.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Bothrideres contractus</i> F.	A. 1.2	NW	B	O	–	St	–	T	– (Urwaldrelikt)
<i>Cerylon evanescens</i> REITT.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)

Familie ENDOMYCHIDAE, Pilzkäfer

<i>Symbiotes gibberosus</i> LUC.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
– <i>latus</i> REDTB.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Clemmus troglodytes</i> HAMPE	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Mychophilus minutus</i> FRIV.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Dapsa denticollis</i> GERM.	A. 2	NW	–	–	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Lycoperdina bovistae</i> F.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
– <i>succincta</i> L.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	–	–

Familie SPHINDIDAE, Pilzbohrer

<i>Sphindus dubius</i> GYLL.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	T	–
------------------------------	------	----	---	---	---	----	---	---	---

Familie CISIDAE, Schwammfresser

<i>Xylographus bostrychoides</i> DUF.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
--	------	----	---	---	---	----	---	---	------------------

● Käfer

NW B O S St K T V

Rhopalodontus baudueri

BED.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	–	(Urwaldrelikt)
<i>Sulcacis bicornis</i> MELL.	A. 4	NW	–	–	–	St	–	T	–	

Familie BOSTRYCHIDAE, Bohrkäfer*Psoa viennensis* HBST.

A. 2 NW B – – St – – –

Lichenophanes varius

ILLIG. A. 2 NW B – – – – – – (Urwaldrelikt)

*Hendecatomus**reticulatus* HBST. A. 2 NW B O – St – T – (Urwaldrelikt)**Familie COCCINELLIDAE, Marienkäfer***Lithophilus**connatus* PANZ. A. 2 NW B – – St – – – (Trockenrasen)*Hyperaspis subconcolor*GÜNTHER
(syn. zu *veppensis*
nach FÖRSCH 1977 A. 2 – – – – St – – (Rödschitzer Moor
b. Mitterndorf)**Familie LYCTIDAE, Rindenbohrer***Trogoxylon impressum*

COMOLLI A. 2 NW – – – – – – –

Familie ANOBIIDAE, Pochkäfer*Dorcatoma robusta*

STRAND A. 2 NW B – – – – – – (Urwaldrelikt)

– *chrysolina* STRM. A. 2 NW – S – – – T – (Urwaldrelikt)*Anitys rubens* HOFFM. A. 1.2 NW – – – – – – – (Urwaldrelikt)*Xestobium austriacum*

REITT. A. 2 N – – – – – – –

Ochina latreillei BON. A. 1.2 NW – – – St K T – (Urwaldrelikt)*Lasioderma obscurum*

SOLSKY A. 2 NW – – – – – – – (Trockenrasen)

– *redtenbacheri* BACH A. 4 NW B – – – – – – (Trockenrasen)*Caenocara affinis* STRM. A. 2 NW B – – St K T –**Familie PYTHIDAE, Scheinrüssler***Salpingus ater* PAYK.

A. 1.2 NW – – – St K – –

Familie OEDEMERIDAE, Schenkelkäfer*Ditylus laevis* F.A. 1.2 NW – O – – – – – (Böhm. Masse,
Sumpfland)

● Käfer

NW B O S St K T V

<i>Ischnomera (asclera)</i> <i>cinerascens</i> PAND.	A. 4	NW	–	O	–	St	K	T	–
<i>Opsimea quadrinervosa</i> REICHE	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	–

Familie MORDELLIDAE, Stachelkäfer

<i>Variimorda mendax</i> MÉQU.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–
<i>Mordellistena</i> <i>austriacensis</i> ERM.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>bicoloripilosa</i> ERM.	A. 2	NW	–	–	–	–	K	–	–
– <i>kraatzi</i> EMERY	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>reitteri</i> SCHLS.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>tarsata</i> MULS.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	T	– (Trockenrasen)
– <i>thuringiaca</i> ERM.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>wankai</i> ERM.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	(Neusiedlersee)
<i>Anaspis pulicaria</i> COSTA	A. 2	NW	–	–	–	–	–	T	– (Trockenrasen)
– <i>subtilis</i> HAMPE	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)

Familie ANTHICIDAE, Blumenkäfer

<i>Anthicus unicolor</i> SCHMIDT	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
----------------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	------------------

Familie MELOIDAE, Ölkäfer

<i>Alosimus syriacus</i> <i>austriacus</i> SCHRK.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Raine)
<i>Cerocoma mühlfeldi</i> GYLL.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>schaefferi</i> L.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Raine)
– <i>schreberi</i> F.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Raine)
<i>Mylabris pannonica</i> KASZAB	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)
– <i>tenera</i> GERM.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Raine)
– <i>variabilis</i> PALL.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	– (Trockenrasen)
<i>Epicauta rufidorsum</i> GZE.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Kulturland)
<i>Lytta vesicatoria</i> L.	A. 4	NW	B	O	?	St	K	T	?
<i>Meloe autumnalis</i>	A. 2	NW	B	–	–	St	K	T	– (Kulturland, Raine)
– <i>cicatricosus</i> LEACH	A. 2	–	B	–	–	St	K	–	–
– <i>coriarius</i> BRANDT	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–
– <i>hungarus</i> SCHRK.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>tuccicus</i> ROSSI	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Meloe variegatus</i> DONOV.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Apalus bimaculatus</i> L.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	
– <i>bipunctatus</i> GERM.	A. 1.2	–	B	–	–	St	K	–	–
<i>Sitaris muralis</i> FORST.	A. 1.2	NW	B	–	–	St	–	–	–
<i>Euzonitis fulvipennis</i> F.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–
– <i>quadripunctata</i> PALL.	A. 1.2	–	B	–	–	St	K	–	–
– <i>praeusta</i> F.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–
<i>Zonitis immaculata</i> OL.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	K	–	–

Familie RHIPIPHORIDAE, Fächerkäfer

<i>Pelecotoma fennica</i> PAYK.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–
<i>Macrosiagon</i>									
– <i>tricuspidatum</i> LEPECH.	A. 1	N	–	O	–	St	K?	–	–
<i>Rhipidius pectinicornis</i>									
– THUNB.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–

Familie SERROPALPIDAE, Düsterkäfer

<i>Mycetoma suturale</i> PANZ.	A. 2	–	–	–	S	St	K	–	–
<i>Orchesia acicularis</i> REITT.	A. 1.2	NW	–	–	–	St	K	T	–
<i>Hypulus quercinus</i> QUENS.	A. 2	NW	–	O	–	St	K	–	–
– <i>bifasciatus</i> F.	A. 2	NW	–	O	–	St	K	–	–
<i>Dircaea australis</i> FAIRM.	A. 2	NW	–	O	–	St	K	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Phloeotrya subtilis</i> REITT.	A. 2	NW	–	–	–	–	K	–	–
– <i>rufipes</i> GYLL.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	T	–
– <i>vaudoueri</i> MULS.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Xylita livida</i> C. R. SAHLB.	A. 4	NW	–	O	S	St	K	T	–
<i>Melandrya barbata</i> F.	A. 2	NW	–	O	–	St	K	–	–
– <i>caraboides</i> L.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	–
– <i>dubia</i> SCHALL	A. 2	N	–	O	–	St	–	T	–
<i>Zilora sericea</i> STURM	A. 2	NW	–	–	–	St	–	T	–
<i>Phryganophilus auritus</i>									
– MOTSCH.	A. 1	NW	–	–	–	–	–	–	– (Schneeberg, Urwaldrelikt)
– <i>ruficollis</i> F.	A. 2	NW	–	O	–	St	K	T	V
<i>Conopalpus testaceus</i> OL.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	T	–

Familie ALLECULIDAE, Pflanzenkäfer

<i>Allecula (Upinella)</i>									
– <i>aterrima</i> RSH.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	T	–
– (s. str.) <i>rhenana</i> BACH	A. 2	NW	–	–	–	–	–	T	–
<i>Hymenorus</i>									
– <i>doublieri</i> MULS.	A. 1.2	–	–	–	–	–	K	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Mycetochara</i>									
– <i>thoracica</i> GREDL.	A. 2	–	–	–	–	–	K	–	–

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Mycetochara humeralis</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	?
– <i>pygmaea</i> REDTB.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	–
<i>Omophlus (Odontomophlus) lepturoides</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	–	K	–	–
– (s. str.) <i>lividipes</i> MULS.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
– (s. str.) <i>longicornis</i> BERTOL.	A. 2	–	B	–	–	–	K	–	–
– (s. str.) <i>proteus</i> KIRSCH	A. 4	NW	B	O	–	–	–	–	–
– (s. str.) <i>rugosicollis</i> BRULLÉ	A. 2	N	B	–	–	–	–	–	– (Kulturland, Trockenrasen)
– (s. str.) <i>rufitarsis</i> LESKE	A. 2	N	B	–	–	St	–	–	– (Kulturland, Trockengebüsche)
– (s. str.) <i>picipes</i> F.	A. 2	–	–	–	–	–	K	–	–
<i>Cteniopos sulphuripes</i> GERM.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–

Familie TENEBRIONIDAE, Schwarzkäfer

<i>Blaps abbreviata</i> MÉN.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>halophila</i> FISCH.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–
– <i>lethifera</i> var. <i>milleri</i> SEIDL.	A. 4	NW	B	?	?	?	K	T	?
<i>Oodescelis polita</i> STURM	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	– (Felsenheiderelikt)
<i>Pedinus femoralis</i> L.	A. 4	NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Melanimon tibialis</i> F.	A. 4	NW	B	–	–	St	–	–	– (auf Sandboden)
<i>Gonocephalum pussillum</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	–	–	–	– (Trockenrasen, Kulturland)
– <i>pygmaeum</i> F.	A. 2	–	B	–	–	–	K	–	– (Trockenrasen)
<i>Leichenum pictum</i> F.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	– (Neusiedlersee auf Sand)
<i>Boletophagus interruptus</i> ILL.	A. 2	NW	–	–	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Eledonoprius armatus</i> PANZ.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)
<i>Hoplocephala haemorrhoidalis</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Urwaldrelikt)
<i>Platydemia violaceum</i> F.	A. 4	NW	B	?	?	St	K	T	?
– <i>dejeani</i> LAP. et BRULLÉ	A. 1.2	NW	–	O	–	St	–	–	– (Mödling, Garten)
<i>Pentaphyllus chrysomeloides</i> ROSSI	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–
– <i>testaceus</i> HELLW.	A. 4	NW	B	–	–	St	–	–	– (in alten Bäumen)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Diaclina fagi</i> PANZ.	A. 4	NW	–	O	–	–	–	–	–
– <i>testudinea</i> PILL.	A. 2	NW	–	–	–	St	–	–	–
<i>Hypophloeus pini</i> PANZ.	A. 4	NW	–	O	–	St	K	T	– (Reliktföhrenwälder)
<i>Bius thoracicus</i> F.	A. 1	–	–	O	–	–	K	T	–
<i>Menephris cylindricus</i> HBST.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	–
<i>Tenebrio opacus</i> DUFT.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Urwaldrelikt)

Familie SCARABAEIDAE, Blatthornkäfer

<i>Scarabaeus piceus</i> ILLIG.	A. 1	NW	–	–	–	–	–	–	– (Bisamberg)
<i>Gymnopleurus geoffroyi</i> FUESSL.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Extensivhutweiden)
– <i>mopsus</i> PALL.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Extensivhutweiden)
<i>Sisyphus schaefferi</i> L.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	–
<i>Copris lunaris</i> L.	A. 2								
	(A. 1.2)	NW	B	O	S	St	?	T	?
<i>Oniticellus fulvus</i> GZW.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Extensivhutweiden)
<i>Chironitis hungaricus</i> HBST.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Extensivhutweiden)
<i>Caccobius schreberi</i> L.	A. 4	NW	B	O	–	–	K	T	– (Extensivhutweiden)
<i>Onthophagus amyntas</i>									
– <i>alces</i> F.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Extensivweiden)
– <i>furcatus</i> F.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Extensivweiden)
– <i>gibbulus</i> PALL.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Extensivhutweiden)
– <i>lemur</i> F.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	T	– (Extensivweiden)
– <i>ruficapillus</i> BRULLÉ	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Extensivweiden)
– <i>taurus</i> SCHREBER	A. 2	NW	B	O	–	St	?	T	–
– <i>vacca</i> L.	A. 2	NW	B	–	–	St	?	–	– (Extensivweiden)
– <i>verticicornis</i> LAICH.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	– (Extensivweiden)
– <i>vitulus</i> F.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	– (Extensivweiden)
<i>Bolbelasmus unicornis</i> SCHRK.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	–
<i>Geotrupes mutator</i> MARSH.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Extensivweiden)
– <i>spiniger</i> MARSH.	A. 4	NW	B	O	–	St	K	T	– (Extensivweiden)
<i>Lethrus apterus</i> LAXM.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Weingärten)
<i>Aphodius (Nimbus) affinis</i> PANZ.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Extensivweiden)

<i>Aphodius (Emadus) biguttatus</i> GERM.	A. 2	NW B - - - K T - (Extensivweiden)
- (<i>Emadus</i>) <i>citellorum</i> SEM.	A. 2	NW B - - - - - (Extensivweiden)
- (<i>Melinopterus</i>) <i>circumcinctus</i> W. SCHM.	A. 2	NW B - - - - - (Extensivweiden)
- (s. str.) <i>conjugatus</i> PANZ.	A. 1	NW - O - - - - -
- (s. str.) <i>foetens</i> F.	A. 2	NW B O S St K T V
- (<i>Alocoderus</i>) <i>hydrochoeris</i> F.	A. 2	NW B - - - - - (Extensivweiden)
- (<i>Bodilus</i>) <i>immundus</i> CREUTZ.	A. 4	NW B O - St K - -
- (<i>Nialus</i>) <i>kraatzi</i> HAROLD	A. 1.2	- B - - - - - (Neusiedlersee)
- (<i>Nialus</i>) <i>lividus</i> OL.	A. 2	NW B O - St - - - (Extensivhutweiden)
- (<i>Bodilus</i>) <i>lugens</i> CREUTZ.		NW B O - - K - - (Extensivhutweiden)
- (<i>Nialus</i>) <i>niger</i> PANZ.	A. 2	NW B O S ? K? - - (Sumpfwiesen)
- (<i>Volinus</i>) <i>pictus</i> STURM	A. 2	NW B - - - - - (Extensivhutweiden)
- (<i>Emadus</i>) <i>quadriguttatus</i> HBST.	A. 2	NW B O - St K - - (Extensivhutweiden)
- (<i>Nobius</i>) <i>serotinus</i> PANZ.	A. 1.2	NW - - - St - - -
- (<i>Nialus</i>) <i>sturmi</i> HAROLD	A. 1.2	NW B - - - - - (Extensivhutweiden)
- (<i>Loraphodius</i>) <i>suarius</i> FALD.	A. 1.2	- B - - - - - (Neusiedlersee)
- (s. str.) <i>sulcatus</i> F.	A. 2	N B - - - K - - (Neusiedlersee)
- (<i>Amidorus</i>) <i>thermicola</i> STURM	A. 2	NW B O - - - - - (Extensivhutweiden)
<i>Heptaulacus</i>		
- <i>porcellus</i> FRIV.	A. 2	NW B - - - - -
- <i>sus</i> HBST.	A. 2	NW B O - - - - -
- <i>villosus</i> GYLL.	A. 2	NW B O - St K T -
<i>Aegialia (Psammoporus)</i>		
- <i>sabuleti</i> PAYK.	A. 2	- - - S St - - - (Flußufer)
<i>Cadocera ferruginea</i> ESCH.	A. 2	NW B - - - - -
<i>Glaresis rufa</i> ER.	A. 1	- B - - - - - (Neusiedlersee)

NW B O S St K T V

<i>Rhizotrogus</i> <i>cicatricosus</i> MULS.	A. 2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
<i>Miltotrogus pilicollis</i> GYLL.	A. 1.2	NW?	-	-	-	St	-	-	-	
<i>Anoxia pilosa</i> F.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
- <i>villosa</i> F.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	K?	-	-	
<i>Polyphylla fullo</i> L.	A. 2	NW	B	O	S	St	K	T	-	
<i>Anomala vitis</i> F.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	T	-	
<i>Mimela aurata</i> F.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	T	-	
<i>Anisoplia agricola</i> PODA	A. 2	NW	B	O	-	St	K	-	-	(Getreidefelder, Trockenrasen)
- <i>austriaca</i> HBST.	A. 1.2	NW	B	O	-	St	-	-	-	(Getreidefelder)
- <i>bromicola</i> GERM.	A. 1	NW	B	-	-	-	-	-	-	
- <i>lata</i> ER.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Getreidefelder)
- <i>villosa</i> GZE.	A. 1.2	NW	B	O	-	St	-	-	-	
<i>Hoplia graminicola</i> F.	A. 2	N	B	O	-	St	-	-	-	
- <i>hungarica</i> BURM.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- <i>subnuda</i> REITT.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
<i>Pentodon idiota</i> HBST.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
<i>Oryctes nasicornis</i> L.	A. 2	NW	B	O	-	St	K	-	-	
<i>Osmoderma eremita</i> SCOP.	A. 1.2	NW	B	O	S	St	K	T	V	(Urwaldrelikt)
<i>Gnorimus octopunctatus</i> F.	A. 2	NW	B	O	?	?	-	-	-	
<i>Trichius sexualis</i> BED.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	T	V	
<i>Liocola lugubris</i> HBST.	A. 4	NW	B	O	?	St	K	T	?	
<i>Potosia (Cetonischema)</i> <i>aeruginosa</i> DRURY	A. 2	NW	B	O	-	St?	K	-	-	(Urwaldrelikt)
- (<i>Eupotosia</i>) <i>affinis</i> ANDERSCH	A. 2	NW	-	O	-	St?	K?	-	-	
- <i>feiberi</i> KRAATZ	A. 2	NW	-	O	-	St	K	-	V	
- <i>hungarica</i> HBST.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)

Familie LUCANIDAE, Hirschkäfer

<i>Ceruchus chrysomelinus</i>				
HOCHW.	A. 2	NW	- O -	St K T - (Urwaldrelikt)
<i>Aesalus scarabaeoides</i>				
PANZ.	A. 1.2	NW	B O -	St K - - (Urwaldrelikt)

Familie CHRYSOMELIDAE, Blattkäfer

<i>Haemonia appendiculata</i> PANZ.	A. 1	NW B - - - - - (submers in Flüssen und Seen)
<i>Donacia antiqua</i> KUNZE	A. 1.2	NW ? ? ? ? K - - (Feuchtbiootope)
- <i>appendiculata</i> AHR.	A. 1	- - - - St K - - (Feuchtbiootope)

<i>Donacia brevicornis</i>	AHR.	A. 1.2	- - - - St K T -	(Feuchtbiotope)
- <i>tomentosa</i> AHR.		A. 1	- - O - St - - -	(Feuchtbiotope)
<i>Lema tristis</i> HBST.		A. 4	- B O - - K T -	(Trockenrasen)
- <i>rufocyanea</i> SUFFR.		A. 4	NW B O - - - T -	(Trockenrasen)
<i>Crioceris quinquepunctata</i>	SCOP.	A. 4	NW B - - St - - -	
- <i>quatuordecimpunctata</i>	SCOP.	A. 4	NW B - - St - - -	
<i>Labidostomis lucida</i> ssp.				
- <i>axillaris</i> LAC.		A. 4	NW B - - - K T -	(Trockenrasen)
- <i>pallidipennis</i> GEBL.			NW B - - St K - -	(Trockenrasen- bewohner)
<i>Antipa macropus</i> ILLIG.		A. 1.2	NW B - - - - - -	(Trockenrasen)
<i>Clytra appendicina</i> LAC.		A. 2	NW B - - - K - -	(Trockenrasen u. -gebüsche)
<i>Chilotoma musciformis</i>	GZE.	A. 2	NW B - - St - - -	(Trockenrasen)
<i>Coptocephala chalybaea</i>	GERM.		NW B - - - - - -	(Trockenrasen)
<i>Pachybrachys fimbriolatus</i>	SUFFR.	A. 2	NW B - - St K - -	(Trockenrasen)
<i>Cryptocephalus apicalis</i>	GEBL.	A. 1	- B - - - - - -	(Trockenrasen)
- <i>bohemicus</i> DRAP.		A. 1	NW B - - St - - -	
- <i>decemmaculatus</i> L.		A. 2	NW B - - St K - V	(Moore u. Sumpfland)
- <i>elegantulus</i> GRAV.		A. 4	NW B - S St K T -	(Trockenrasen)
- <i>exiguus</i> SCHNEID.		A. 2	NW - - - St K - V	
- <i>janthinus</i> GERM.		A. 2	NW B O - St K - -	(Sumpfland)
- <i>laetus</i> F.		A. 1.2	NW - - - St - - -	(Trockenrasen)
- <i>laevicollis</i> GEBL.		A. 2	NW B - - - - - V?	(Trockengebüsch)
- <i>macellus</i> SUFFR.		A. 1	N - - - - - - -	
- <i>octacosmus</i> BED.		A. 2	NW B - S - - - -	(Sumpfland)
- <i>octomaculatus</i> ROSSI		A. 2	NW B - S St - T -	
- <i>planifrons</i> WSE.		A. 2	NW B - - St K - -	
- <i>populi</i> SUFFR.		A. 4	NW B - - St K T -	
- <i>quatuordecimmaculatus</i>	SCHNEID.	A. 2	NW B - - St - - -	(Trockenrasen)
- <i>pygmaeus</i> F.		A. 2	NW B ? ? St K T ?	
- <i>scapularis</i> SUFFR.		A. 1.2	NW - - - - - - -	
- <i>schaefferi</i> SCHRK.		A. 4	NW B - - St K T -	(Trockenrasen u. -gebüsche)

● Käfer

NW B O S St K T V

Cryptocephalus strigosus

GERM.	A. 4	NW B O – St K – –	(Trockenrasen u. -gebüsch)
– <i>villosulus</i> SUFFR.	A. 2	NW B – – St – – –	(Trockengebüsch)
– <i>virens</i> SUFFR.	A. 4	NW B O – St K – –	(Trockenrasen)

Chrysochus asclepiadeus

PALL.	A. 4	NW B O – St K T –	(Trockengebüsch, Felsenheiden)
-------	------	-------------------	--------------------------------

Chrysomela carnifex F.

A. 1.2	N B – – St K – –	(Trockenrasen)
--------	------------------	----------------

– *cerealis alternans* PANZ.

A. 1.2	NW B – – – – –	(Trockenrasen)
--------	----------------	----------------

– *chalcites* GERM.

A. 1.2	N B – – – – –	
--------	---------------	--

– *fimbrialis* KÜST.

A. 1.2	NW B – – St – – –	(Trockenrasen)
--------	-------------------	----------------

– *gypsophilae* KÜST.

A. 1.2	N – O – – – – –	
--------	-----------------	--

– *latecincta holdhausi*

FRANZ	A. 2	– – – – St – – –	(hochalpin)
-------	------	------------------	-------------

– *latecincta rhaertica*

FRANZ	A. 1.2	– – – – – T –	(hochalpin)
-------	--------	---------------	-------------

– *graminis* L.

A. 2	NW B ? ? ? K T ?	(Uferbereiche mit Trockenrasen)
------	------------------	---------------------------------

– *küsteri* HELLIES.

A. 1.2	NW B O ? St K T ?	
--------	-------------------	--

– *limbata* F.

A. 4	NW B O – St K T –	(Trockenrasen)
------	-------------------	----------------

– *perplexa* BREIT

A. 1	N – – – – – –	(Donauinsel)
------	---------------	--------------

*Chrysochloa (Protorina)**plagiata commutata*

SUFFR.	A. 1.2	NW – O S St K T ? –	
--------	--------	---------------------	--

– *(Allorina) rugulosa*

SUFFR.	A. 1	– – – S – – – –	(Schafbergalm)
--------	------	-----------------	----------------

Colaphellus sophiae

SCHALL.	A. 2	N B – – – – –	(Kulturland, Weggraine)
---------	------	---------------	-------------------------

Timarcha tenebricosa F.

A. 1.2	N B O – St – – V	
--------	------------------	--

Entomoscelis adonidis

PALL.	A. 1.2	NW B – – St – – –	(Trockenrasen)
-------	--------	-------------------	----------------

– *sacra* L.

A. 2	NW B – – – – –	(Trockenrasen)
------	----------------	----------------

*Galeruca (Haptoscelis)**melanocephala* PONZA

A. 2	NW B – – St – – –	
------	-------------------	--

– *(Emarhopa) rufa* GERM.

A. 1.2	NW B – – St K – –	
--------	-------------------	--

– (s. str.) *interrupta*

<i>circumdata</i> DUFT.	A. 1.2	NW – – S – K – –	
-------------------------	--------	------------------	--

– (s. str.) *dahli* JOANN.

A. 2	NW B – – – – –	
------	----------------	--

Phyllobrotica adusta

CREUTZ.	A. 2	NW B – – – – –	
---------	------	----------------	--

Euluperus xanthopus

DUFT.	A. 1	NW – – – – –	
-------	------	--------------	--

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Phyllotreta austriaca</i>										
HKTG.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- <i>ganglbaueri</i> HKTG.	A. 1.2	NW	-	O	-	St	-	-	-	(Felsenheiden, Schutthalden)
<i>Aphthona flava</i> GUILL.	A. 2	-	-	-	-	St	K	-	-	
- <i>franzi</i> HKTG.	A. 1.2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen, loc. typ. umgeackert)
- <i>czwalinai</i> WEISE	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- <i>lacertosa</i> RSH.	A. 4	NW	B	-	-	St	-	-	-	
- <i>placida</i> KUTSCH.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Longitarsus foudrasi</i>										
WEISE	A. 4	NW	B	O	-	-	-	-	-	
- <i>fuscoaeus</i> REDTB.	A. 2	NW	-	-	-	-	K	-	-	(Kulturland)
- <i>medvedevi</i> SHAPIRO	A. 1.2	-	B	-	-	-	-	-	-	(Leithagebirge, Zeilerberg)
- <i>nigerrimus</i> GYLL.	A. 1.2	NW	-	O	S	St	K	T	V	(in Hochmooren)
<i>Altica impressicollis</i> RCHE.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
<i>Argopus ahrensi</i> GERM.	A. 4	NW	-	O	-	St	K	-	-	
<i>Dibolia femoralis</i> REDTB.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	-	-	(Trockenrasen)
- <i>rugulosa</i> REDTB.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	?	(Trockenrasen)
- <i>shillingi</i> LETZTEN.	A. 4	NW	B	O	-	-	-	-	-	
<i>Psylliodes aerea austriaca</i>										
HKTG.	A. 2	NW	-	-	-	St	-	-	-	(Felsenheiden)
- (<i>Semicnema</i>) <i>reitteri</i>										
WSE.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Neusiedlersee)
- <i>thlaspis</i> FOUDR.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	T	-	(Trockenrasen)
- <i>tölgi</i> HKTG.	A. 2	NW	B	O	-	-	-	T	-	(Trockenrasen)
<i>Pilemostoma fastuosa</i>										
SCHALL.	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfland)
<i>Cassida canaliculata</i>										
LAICH.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	T?	-	(Trockenrasen)
- <i>azurea</i> F.	A. 1.2	NW	B	-	-	St	-	-	V	(Trockenrasen auf Kalkboden)
- <i>berolinensis</i> SUFFR.	A. 2	NW	B	-	-	St	-	-	-	(in Feuchtbiotopen)
- <i>pannonica</i> SUFFR.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	

Familie BRUCHIDAE, Samenkäfer

Urodon pygmaeus GYLL. A. 2 NW B - - - - -

Familie CURCULIONIDAE, Rüsselkäfer

Ulorhinus bilineatus
GERM. A. 2 NW B - - St K - -
Opanthribus tessellatus
BOH. A. 4 NW B - - - - -

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Nemonyx lepturoides</i> F.	A. 1.2	NW	B	O	–	St	K	–	–	(Trockenrasen, Kulturland)
<i>Auletobius sanguisorbae</i> SCHRK.	A. 1.2	N	B	O	S	St	K	–	V	(Sumpfland)
<i>Lasiorrhynchites praeustus</i> BOH.	A. 2	NW	B	–	–	–	K	–	–	(Trockengebüsch)
<i>Rhynchites (Merhynchites) aethiops</i> BACH	A. 4	NW	B	–	–	–	K	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Involvulus</i>) <i>hungaricus</i> HBST.	A. 1.2	NW	B	–	–	St	–	–	–	(Trockengebüsch)
– (s. str.) <i>giganteus</i> KRYN.	A. 2	N	B	–	–	St	–	–	–	
<i>Apion (Leptapion) aeneomicans</i> WENCK.	A. 2	NW	B	O	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Eutrichapion</i>) <i>alcyoneum</i> GERM.	A. 1.2	NW	–	O	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Loborrhynchapion</i>) <i>amethystinum</i> MILL.	A. 4	NW	B	–	–	St	–	–	–	
– (<i>Ceratapion</i>) <i>austriacum</i> WAGN.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Omphalapion</i>) <i>buddebergi</i> BED.	A. 1.2	–	–	–	–	St	–	–	–	(Sumpfland)
– (<i>Metatrichapion</i>) <i>lanigerum</i> GERM.	A. 1.2	–	–	O	S	–	–	T	–	(Felsenheiden)
– (<i>Eutrichapion</i>) <i>melancholicum</i> WENCK.	A. 4	NW	–	–	S	St	–	T	–	
– (<i>Catapion</i>) <i>ononiphagum</i> SCHATZM.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	
– (<i>Catapion</i>) <i>orientale</i> GERST.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	
– (<i>Pirapion</i>) <i>redemptum</i> SCHATZM.	A. 2	–	–	–	–	St	–	–	–	
– (<i>Phrissostrictum</i>) <i>rugicollis</i> GRM.	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Felsenheiden, Trockenrasen)
– (<i>Taphrotopium</i>) <i>sulcifrons</i> HBST.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	K	–	–	
– (<i>Pseudostenapion</i>) <i>velatum</i> GERST.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	T	–	
<i>Brachycerus foveicollis</i> GERM.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen, Raine)
<i>Otiorrhynchus (Arammichnus) anthracinus</i> SCOP.	A. 2	–	–	–	S	St	K	T	V	(Trockenrasen d. inneralp. Täler)

● Käfer

			NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Otiorrhynchus (Dorymerus)</i>											
<i>apfelbecki</i> STIERL.	A. 2		–	–	–	–	St	–	–	–	
– (<i>Arammichnus</i>)											
<i>conspersus</i> GERM.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (<i>Arammichnus</i>) <i>jacqueti</i>											
STIERL.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (s. str.) <i>lasius</i> GERM.	A. 1.2	–	–	–	–	St	K	–	–	–	
– (<i>Dorymerus</i>) <i>lutosus</i>											
STIERL.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	–	–	(Neusiedlersee)
– (s. str.) <i>mandibularis</i>											
REDTB.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– (s. str.) <i>nocturnus</i> REITT.	A. 2	–	–	O	S	St	–	–	–	–	(Felsenheiden)
– (<i>Arammichnus</i>)											
<i>orbicularis</i> HBST.	A. 2	N	B	O	–	St	–	–	–	–	(Trockenrasen, Kulturland)
– (s. str.) <i>raucus</i> F.	A. 4	NW	B	O	S	St	K	T	V	–	(Trockenrasen, Kulturland)
– (<i>Arammichnus</i>)											
<i>turbator</i> SOLARI	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	–	–	
– (<i>Satnalistus</i>)											
<i>stenorostris</i> APFB.	A. 4	NW	–	–	–	St	K	–	–	–	
– (<i>Arammichnus</i>)											
<i>velutinus</i> GERM.	A. 1.2	NW	B	–	–	St	K	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Stomodes gyrosicollis</i> BOH.	A. 4	NW	B	O	–	St	–	–	–	–	(Trockenwälder)
<i>Peritelus leucogrammus</i>											
GERM.	A. 4	NW	B	O	–	St	–	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Trachyphloeus inermis</i>											
BOH.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>parallelus</i> SEIDL.	A. 1.2	NW	–	O	–	–	–	–	–	–	
– <i>ventricosus</i> GERM.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Argoptochus vindobonensis</i>											
FORM.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	
<i>Mylacus seminulum</i> F.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Omius latirostris</i> PEN.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	–	(? Sumpfland)
<i>Phyllobius</i>											
(<i>Pseudomylocerus</i>)											
<i>cinerascens</i> F.	A. 4	–	B	–	–	St	K	T	–	–	
– (<i>Udanellus</i>) <i>pseudo-</i>											
<i>nothus bratislavensis</i>											
ROUB.	A. 2	NW	–	–	–	St	–	–	–	–	
– (<i>Ustavenus</i>) <i>scutellaris</i>											
REDT.	A. 2	N	B	–	–	–	–	–	–	–	
– (<i>Ustavenus</i>) <i>seladonius</i>											
BRULLÉ	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	–	

● Käfer

			NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Phyllobius (Pseudomylloderus) sinuatus</i> F.	A. 2		NW	B	–	–	St	–	–	–
<i>Polydrusus (Tyloderus) viridicinctus</i> GYL.	A. 2		NW	B	–	–	–	K	–	– (Trockenwald)
<i>Sciaphobus scitulus</i> GERM.	A. 2		NW	–	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Eusomus beckeri</i> TOURN.	A. 2		NW	B	O	–	St	K	–	– (Trockenrasen)
<i>Paophilus afflatus</i> BOH.	A. 1.2		–	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Foucartia ptochoides</i> BACH	A. 2		NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>squamulata</i> HBST.	A. 4		NW	B	O	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Psalidium maxillosum</i> F.	A. 2		NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen, Feldwege)
<i>Thylacites pilosus</i> F.	A. 4		NW	B	O	–	St	K	–	– (Trockenrasen)
<i>Larinus</i> (s. str.) <i>carinirostris</i> GYLL.	A. 1		NW	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lachnaeus crinitus</i> BOH.	A. 1.2		NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Bangasternus orientalis</i> CAP.	A. 2		NW	–	–	–	St	–	–	–
<i>Rhinocyllus conicus</i> FROEL.	A. 4		NW	B	–	S	St	K	T	–
<i>Lixus (Dilixellus) bardanae</i> F.	A. 2		N	B	–	–	–	–	–	–
– (<i>Dilixellus</i>) <i>flavescens</i> BOH.	A. 2		NW	B	–	–	–	–	–	–
– (<i>Dilixellus</i>) <i>vilis</i> ROSSI	A. 2		N	B	–	–	St	–	–	–
<i>Conioleonus excoriatus</i> GYLL.	A. 1.2		NW	–	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
– <i>nigrosuturatus</i> GZE.	A. 2		NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Chromoderus fasciatus</i> MÜLL.	A. 4		NW	B	O	–	St	K	T	–
<i>Leucosomus pedestris</i> PODA	A. 4		N	B	O	–	St	–	–	V (Kulturland, Feldwege)
<i>Pachycerus madidus</i> OL.	A. 2		N	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Rabdorrhynchus varius</i> HBST.	A. 2		N	B	O	–	St	K	T	–
<i>Mecaspis alternans</i> HBST.	A. 4		NW	B	O	–	St	K	T	V
– <i>caesus</i> GYLL.	A. 2		NW	–	O	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
<i>Pseudocleonus cinereus</i> SCHRK.	A. 4		NW	B	O	–	St	K	T	– (Trockenrasen, Kulturland)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Cyphocleonus morbillosus</i>										
F.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
- <i>tigrinus</i> PANZ.	A. 4	NW	B	O	-	St	K	T	-	(Trockenrasen, Kulturland)
<i>Adosomus roridus</i> PALL.	A. 2	-	B	-	-	St	-	T	-	(Trockenrasen)
<i>Donus elegans</i> BOH.	A. 1.2	-	-	-	-	St	K	-	-	
- <i>kraatzi</i> CAP.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen, Gumpoldskirchen)
<i>Hypera egregius</i> CAP.	A. 2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
- <i>striatus</i> BOH.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
<i>Limnobius borealis</i>										
PAYK.	A. 2	NW	-	-	-	St	K	-	-	
<i>Liparus dirus</i> HBST.	A. 4	NW	B	-	-	-	-	-	V	
<i>Minyops carinatus</i> L.	A. 2	NW	B	O	-	St	K	-	-	(Kulturland)
<i>Plinthus megerlei</i> PANZ.	A. 2	-	-	-	S	St	K	T	-	(Rev. nec.!) (Trockenrasen)
<i>Neoplinthus porcatus</i>										
PANZ.	A. 2	NW	B	-	-	St	K	-	-	
<i>Liosoma kirschi</i> GREDL.	A. 2	NW	-	-	S	St	K	T	-	
<i>Myorrhinus albolineatus</i> F.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Trockenrasen)
<i>Allomorphus franzi</i> FOLW.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	(Leithagebirge, nur Holotypus bekannt!)
<i>Rhyncolus gracilis</i> ROSENH.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	
Bagous- und Notaris-Arten. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl der heimischen Vertreter dieser Genera mehr oder weniger gefährdet. Das mir vorliegende Material ermöglicht mir aber keine fundierten Aussagen.										
<i>Icaris sparganii</i> GYLL.	A. 2	NW	B	-	-	-	-	-	-	(Sumpfbiotope)
<i>Lignyodes muerlei</i>										
FERRARI	A. 1.2	NW	B	-	-	-	-	-	-	
- <i>suturatus</i> FAIRM.	A. 1.2	NW	-	-	-	-	-	-	-	(nur bei Nikolsburg nachgewiesen)
<i>Elleschidium maderi</i>										
PEN.	A. 1	NW	-	-	-	-	-	-	-	(Hainburg loc. typ.)
<i>Aoromius quinquepunctatus</i> L.	A. 4	NW	B	O	-	St	-	T	-	(Trockenrasenbewohner)
<i>Tychius aureolus femoralis</i>										
BRIS.	A. 4	NW	B	O	-	St	-	-	-	(Trockenrasenbewohner)
- <i>crassirostris</i>										
KIRSCH	A. 4	NW	-	O	S	St	-	T	-	(Trockenrasenbewohner)
<i>Tychius flavicollis</i> STEPH.	A. 4	NW	B	O	-	-	K	-	V	(Trockenrasenbewohner)

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V	
<i>Baris carbonaria</i> BOH.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>chlorizans</i> GERM.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	–	
– <i>fallax</i> BRIS.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	
– <i>gudenusi</i> SCHULTZE	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>kaufmanni</i> REITT.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	
– <i>laticollis</i> MARSH.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	V	
– <i>scolopacea</i> GERM.	A. 1.2	NW	–	–	–	St	–	–	–	
– <i>spitzyi</i> HOCHH.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
– <i>steppensis</i> ROUBAL	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	–	(Trockenrasen und Trockenwald)
<i>Coryssomerus capucinus</i> BECK.	A. 2	NW	B	O	–	–	–	–	–	(Trockenrasen)
<i>Mononychus punctum</i> <i>album</i> HBST.	A. 4	NW	–	O	–	St	K	–	V	(Sumpfland)
<i>Eubrychius velutus</i> BECK.	A. 2	NW	–	–	–	St	–	T	V	(Sumpfland)
<i>Litodactylus leucogaster</i>	A. 4	NW	B	O	S	St	–	T	V	(Sumpfland)
<i>Phytobius comari</i> HBST.	A. 4	NW	B	O	S	St	?	T	?	(Sumpfland)
<i>Phytobius hygrophilus</i> HUST.	A. 1.2	–	–	–	S	–	–	–	–	(Ufer der Fuscher Ache)
<i>Heterophytobius muricatus</i> BRIS.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	–	(Neusiedlersee)
<i>Rhinoncus albicinctus</i> GYLL.	A. 2	NW	–	–	–	St	K	–	V	(Sumpfland)
– <i>bosnicus</i> SCHULTZE	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	–	(Sumpfland)
– <i>henningsi</i> WAGN.	A. 1.2	–	–	O	–	–	–	T	–	(Hallstättersee)
<i>Marmaropus besseri</i> GYLL.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	–	(Feuchtbiotope)
<i>Oreorhynchaenus alpicola</i> OTTO	A. 2	NW	–	–	–	St	–	–	–	(Felsenheiden und alp. Grasheide)
<i>Rhytidossoma globulus</i> HBST.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	–	–	(Feuchtbiotope)
<i>Scleropterus serratus</i> GERM.	A. 1.2	NW	–	–	–	St	K	–	–	(Feuchtbiotope)
<i>Amalorrhynchus</i> <i>melanarius</i> STEPH.	A. 2	NW	–	–	–	–	–	T	V	(Feuchtbiotope)
<i>Poophagus sisymbrii</i> F.	A. 4	NW	B	O	–	–	K	T	–	(Feuchtbiotope)
<i>Tapinotus sellatus</i> F.	A. 4	NW	B	O	S	–	–	–	V	(Feuchtbiotope)
<i>Coeliodes nigratarsis</i> HARTM.	A. 2	–	–	–	S	St	–	–	–	(Moore)
– <i>proximus</i> SCHULTZE	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	–	(Trockengebüsche)
– <i>zonatus</i> GERM.	A. 2	NW	–	–	–	St	K	–	–	
<i>Thamiocolus kraatzi</i> BRIS.	A. 1.2	–	–	–	–	St	K	–	V	

● Käfer

		NW	B	O	S	St	K	T	V
<i>Thamioecolus pubicollis</i>	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	V
– <i>viduatus</i> GYLL.	A. 2	NW	B	O	–	–	K	T	V
– <i>virgatus</i> GYLL.	A. 1.2	–	B	–	–	–	–	–	(Trockenwald)
<i>Zaenadus exiguus</i> OL.	A. 2	NW	B	O	S	St	–	–	V
<i>Phrydiuchus topiarius</i> (s. str.) GERM.	A. 2	NW	B	O	–	St	K	T	– (Trockenrasen)
<i>Ceuthorrhynchus</i> <i>aeneicollis</i> GERM.		NW	–	O	–	–	–	–	–
– (<i>Boraginobius</i>) <i>albosignatus</i> GYLL.	A. 2	NW	B	O	–	St	–	–	–
– (<i>Neoglocianus</i>) <i>albovittatus</i> GERM.	A. 1.2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Kulturland)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>amplipennis</i> GYLL.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenwald)
– (s. str.) <i>angustus</i> SMRECZ.	A. 2	NW	B	–	–	St	–	–	– (Trockenrasen)
– (s. str.) <i>arator</i> GYLL.	A. 1.2	NW	–	–	–	–	–	–	– (<i>an Crambe tataria</i>)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>austriacus</i> BRIS.	A. 2	NW	B	–	S	–	K	–	– (Trockenrasen und Raine)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>boraginis</i> F.	A. 2	NW	B	–	–	St	K	–	–
– (s. str.) <i>canaliculatus</i> BRIS.	A. 2	–	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– (s. str.) <i>coarctatus</i> GYLL.	A. 4	NW	B	–	–	–	T	–	– (Trockenrasen und Raine)
– (s. str.) <i>chlorophanus</i> ROUGET	A. 4	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen und Raine)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>crucifer</i> OL.	A. 4	NW	B	–	–	St	K	–	– (Trockenrasen und Raine)
– (<i>Crethelcus</i>) <i>denticulatus</i> SCHRK.	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Kulturland)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>dimidiatus</i> FRIV.	A. 1.2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Trockenrasen)
– (<i>Microplontus</i>) <i>edentulus</i> SCHULTZE	A. 2	NW	B	–	–	–	–	–	– (Kulturland und Raine)
– (<i>Boraginobius</i>) <i>euphorbiae</i> BRIS.	A. 2	N	–	O	S	St	–	T	– (Feuchtbiootope)

● Käfer

NW B O S St K T V

*Ceuthorrhynchus**(Ranunculiphilus)**faeculentus* GYLL.

A. 2

NW B - - - - V?

- (s. str.) *franzi* DIECKM.

A. 1.2

- - - - St - - - (Dolomitschutthalden)

- (*Boraginobius*)*hungaricus* BRIS.

A. 1.2

- B - - - - - (Ruderalflächen)

- (s. str.) *ignitus* GERM.

A. 2

NW B - - St - T - (Felsenheiden, Raine)

- (s. str.) *interjectus*

SCHULTZE

NW B - - St - - - (Ruderalflächen)

- (*Boraginobius*) *javeti*

BRIS.

A. 4

NW B - S St - T - (Trockenrasen, Raine)

- (s. str.) *leprieuri* BRIS.

A. 2

- - - - St - - - (Trockenrasen)

- (s. str.) *levantinus*

SCHULTZE

A. 1.2

NW - - - - - - -

- (s. str.) *lukesi* TYL

A. 2

NW - - - - - - - (Felsenheiden, Trockenrasen)

- (*Neoglocianus*) *macula-**alba* HBST.

A. 2

NW B - - St K - - (Raine und Trockenrasen)

- (s. str.) *nigritulus*

SCHULTZE

A. 2

NW B - - - - - (Trockenrasen)

- (*Boraginobius*) *ornatus*

GYLL.

A. 1.2

NW B O - - - - - (Trockenrasen und Raine)

- (*Ethelcus*) *obsoletus*

GERM.

A. 1.2

NW - - - - - - -

- (*Datonychus*)*paszlavskyi* KUTHY

A. 2

NW B - - St - - - (Trockenrasen)

- (*Glocianus*) *pilosellus*

GYLL.

A. 2

NW - - - - - - - (Trockenrasen)

- (*Parthelcus*)*pollinarius* FORST.

A. 2

NW - O - St - T -

- (s. str.) *puncticollis* BOH.

A. 2

NW B - - St - T - (Trockenrasen, Raine)

- (*Mogulones*) *radula*

GERM.

A. 2

NW - - - St - - - (Trockenrasen)

- (*Glocianus*) *ragusae*

BRIS.

A. 2

NW - - - St - - -

- (s. str.) *scapularis* GYLL.

A. 2

NW - - - - - - -

- (*Boraginobius*) *T-album*

GYLL.

A. 2

NW - - - St K - -

● Käfer

NW B O S St K T V

<i>Ceuthorrhynchus</i> (<i>Microplontus</i>) <i>triangulum</i> BOH.		NW – O S St – T V (Raine, Kulturland)
– (s. str.) <i>wagneri</i> SMRECZ.	A. 2	NW – – – – – –
<i>Neosirocalus</i> (<i>Heterosirocalus</i>) <i>hampei</i> BRIS.	A. 2	NW B – – – – – (Trockenrasen, Raine)
– (<i>Persirocalus</i>) <i>moraviensis</i> DIECKM.	A. 2	NW B – – – – –
– (<i>Persirocalus</i>) <i>vindobonensis</i> DIECKM.	A. 2	NW B – – – – –
<i>Ceuthorrhynchidius</i> <i>horridus</i> PANZ.	A. 2	NW B O S St K T –
<i>Stenocarus cardui</i> HBST.	A. 4	NW B O ? ? K T ? (Raine, Kulturland)
– <i>fuliginosus</i> MARSH.	A. 4	NW B O ? ? K T ? (Raine, Kulturland)
<i>Orobitis nigrinus</i> REITTER	A. 1.2	– – – – St – – –
<i>Nanophyes brevis</i> BOH.	A. 4	NW B – – St K – – (Feuchtbiotope)
– <i>circumscriptus</i> AUBÉ	A. 4	NW – – – St – – V (Feuchtbiotope)
– <i>globiformis</i> KSW.	A. 4	NW – – – – – – (Feuchtbiotope)
– <i>helveticus</i> TOURN.	A. 2	NW – – – St – – – (Feuchtbiotope)
– <i>nitidulus</i> GYLL.	A. 4	NW B – – St – – – (Feuchtbiotope)
<i>Mecinus heydeni</i> WENCK.	A. 1.2	NW – – – – – –
– <i>janthinus</i> GERM.	A. 1.2	– – – – St – – – (Trockenrasen)
<i>Gymnetron bipustulatum</i> ROSSI	A. 2	NW – – – St K – –
– <i>herbarum</i> BRIS.	A. 2	NW – – – – – –
– <i>ictericum</i> GYLL.	A. 1.2	NW – – – – – –
– <i>labile</i> HBST.	A. 4	NW B O ? ? ? ? ?
– <i>melanarium</i> GERM.	A. 4	NW B O – – – – –
– <i>melas</i> BOH.	A. 4	NW B – – St – – –
– <i>pirazzolii</i> STRL.	A. 1.2	NW – – – – – –
– <i>rostellum</i> HBST.	A. 2	NW B – S St K T –
– <i>thapsicola</i> GERM.	A. 2	NW – – – – – –
– <i>villosulum</i> GYLL.	A. 2	NW B – S – – T –
<i>Miarus distinctus</i> BOH.	A. 1.2	NW – – – St – – –
– <i>salsolae</i> BRIS.	A. 1.2	– B – – – – –
<i>Cionus clairvillei</i> BOH.	A. 4	NW – – S St K T –
– <i>styriacus</i> FRANZ	A. 2	NW – – – St – – –
<i>Orchestes ermishi</i> DIECKM.	A. 4	NW B – – St – – – (Trockenrasen)
– <i>cinereus</i> FAHRS.	A. 2	NW B – – – – – – (Trockenrasen)
– <i>horioni</i> DIECKM.	A. 2	NW – – – – – – (Trockenrasen)
– <i>hungaricus</i> HAJOSS	A. 2	NW B – – – – – – (Trockenwälder)
– <i>sparsus</i> FAHRS.	A. 2	NW B – – – – – – (Trockenwälder)

● Käfer

NW B O S St K T V

Orchestes subfasciatus

GYLL.

A. 2 NW? B - - St - - - (Trockenwälder)

Rhampus oxyacanthae

MARSH.

A. 4 NW - - - - - - -

Übersicht der Artenzahlen der Käferfamilien Österreichs

(als Vergleichsgrundlage zusammengestellt von C. Holzschuh, Wien)

Cicindelidae	9	Korynetidae	7	Coccinellidae	80
Carabidae	660	Derodontidae	2	Sphindidae	1
Hygrobiidae	1	Lymexylonidae	2	Aspidiphoridae	2
Halipidae	19	Elateridae	160	Cisidae	45
Dytiscidae	127	Cerophytidae	1	Lyctidae	3
Gyrinidae	10	Eucnemidae	18	Bostrychidae	8
Rhysodidae	1	Throscidae	7	Anobiidae	80
Hydraenidae	60	Buprestidae	120	Ptinidae	26
Spercheidae	1	Dascillidae	2	Oedemeridae	35
Hydrophilidae	100	Helodidae	30	Pythidae	16
Silphidae	28	Eucinetidae	1	Pyrochroidae	3
Leptinidae	3	Dryopidae	35	Scraptiidae	2
Catopidae	60	Georyssidae	4	Aderidae	7
Colonidae	20	Heteroceridae	15	Anthicidae	30
Leiodidae	80	Dermestidae	40	Meloidae	35
Clambidae	11	Nosodendridae	1	Rhipiphoridae	5
Scydmaenidae	75	Byrrhidae	40	Mordellidae	80
Orthoperidae	20	Sphaeritidae	1	Serropalpidae	40
Sphaeriidae	1	Ostomidae	9	Lagriidae	3
Ptiliidae	70	Byturidae	2	Alleculidae	35
Scaphidiidae	10	Nitidulidae	150	Tenebrionidae	70
Staphylinidae	1700	Rhizophagidae	13	Scarabaeidae	210
Pselaphidae	120	Cucujidae	45	Lucanidae	7
Histeridae	100	Erotylidae	20	Cerambycidae	212
Lycidae	11	Cryptophagidae	130	Chrysomelidae	550
Cantharidae	100	Phalacridae	25	Bruchidae	35
Drilidae	1	Lathridiidae	75	Anthribidae	21
Malachiidae	50	Mycetophagidae	14	Curculionidae	1100
Dasytidae	35	Colydiidae	40	Scolytidae	112
Cleridae	13	Endomychidae	20	Platypodidae	1
				Artensumme:	7379

Die Aufzählung der Familien erfolgte nach dem Verzeichnis von HORION 1951 und ist zum Teil veraltet; bei den Staphyliniden sind auch die Varietäten enthalten, daher ist hier die Artenzahl wohl etwas zu hoch (nach dem Catalogus Faunae Austriae v. SCHEERPELTZ); ansonsten wurden keine Subspezies berücksichtigt. Die Artenzahlen wurden bei wenig erforschten Familien aufgerundet!

● Käfer

Quellennachweis

- FRANZ, H.: *Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit*. Zoogeographica 3, 1936, 159–320.
- FRANZ, H.: *Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern, ein Beitrag zur tiergeographischen und -soziologischen Erforschung der Alpen*. Denkschr. Öst. Akad. Wiss. 107, 1943, 1–552, 11 Karten, 14 Taf.
- FRANZ, H.: *Beiträge zur Käferfauna des Burgenlandes*. Wiss. Arb. a. d. Burgenland H 31, 1964, 34–155.
- FRANZ, H.: *Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt Bd. 3 u. 4. Coleoptera*. 1970 u. 1974.
- HORION, A.: *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer*. 12 Bd. 1941–1974.
- REDTENBACHER, L.: *Fauna Austriaca. Die Käfer*. 3 Aufl. Wien 1874, Bd. 1 CLIII u. 564 S. 2 Taf., Bd. 2 571 S.
- Dazu kommen die Arbeiten von GREDLER und WÖRNDLE, PECHLANER und HEISS für Tirol, von MÜLLER für Vorarlberg sowie HOLDHAUS und PROSSEN, PROSSEN und HÖLZEL für Kärnten:*
- GREDLER: *Die Käfer von Tirol, Bozen* 1863, 1. Nachlese in Kol. Hefte (Harold) 3, 2868, 2. Nachlese, *ibid.* 6, 1870, 3. Nachlese, *ibid.* 11, 1873, 4. Nachlese, *ibid.* 15, 1876, 5. Nachlese, in *Ferdinandeumsztschr.* 1878, 6. Nachlese *ibid.* 1882 und Schluß in *Ber. nat. med. Ver. Innsbruck* 23, 1896.
- HOLDHAUS, K., PROSSEN: *Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer*. Mitt. nat. hist. Landesmuseum Kärntens 1900–1904.
- HÖLZEL, E.: 2. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. *Carinthia* 2, Jg. 126, 1936, 47–56.
- HÖLZEL, E.: 3. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer, nebst teilweiser Revision der Kärntner Staphyliniden-Sammlung. *Carinthia* 2, 130, 1940, 97–121.
- MÜLLER, J.: *Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs*. Bregenz 1912.
- MÜLLER, J.: *Nachtrag z. Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs von Dr. A. Julius Müller, Bregenz* 1926.
- PROSSEN: 1. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer. *Carinthia* II, 1910, Nr. 3–6.
- WÖRNDLE, A.: *Die Käfer von Nordtirol*. Schlern-Schriften 64. Innsbruck 1950, 1–388.

Anschrift des Verfassers:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Herbert FRANZ

Jakob-Thoma-Straße 3 B, 2340 Mödling

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Grüne Reihe des Lebensministeriums](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [AS_2](#)

Autor(en)/Author(s): Franz Herbert

Artikel/Article: [Rote Liste der in Österreich gefährdeten Käferarten \(Coleoptera\) — Hauptteil 85-122](#)