Lycaides idas (Linnaeus,1761)	Idas-Bläuling
Melanargia galathea (Linnaeus,1758)	Damenbrett
Melitae phoebe (Denis & Schiffermüller,1775)	Flockenblumenscheckenfalter
Mellicta aurelia (Nickerl,1850)	Ehrenpreisscheckenfalter
Pararge aegeria (Linnaeus,1758)	Waldbrettspiel
Pieris napi (Linnaeus,1758)	Grünaderweißling
Pieris rapae (Linnaeus,1758)	Kleiner Kohlweißling
Satyrium acaciae (Fabricius,1787)	Akazienzipfelfalter
Sphinx ligustri (Linnaeus,1758)	Ligusterschwärmer
Syntomis phlegea (Linnaeus,1758)	Weißfleckwidderchen
Thyris fenestrella (Scopoli,1763)	Fensterschwärmchen
Zygaena angelice (Ochsenheimer,1808)	Ungeringtes Kronwicken-Rotwidderchen
Zygaena ephialtes f. trigonillae (Linnaeus,1767)	Veränderliches Widderchen
Zygaena filipendula (Linnaeus,1758)	Gewöhnliches Sechsfleck-Rotwidderchen

Ameisen (Formicidae) in der Umgebung von Fertörákos (05.07. bis 10.07.1998)

von Matthias HELLNER

Die ökologische Grobeinschätzung der einzelnen gefundenen Arten wurde SEIFERT (1996) entnommen.

Camponotus vagus	-	offene Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Waldsäumen; offene Landschaft, Trockenhabitate; thermophil
Messor structor	-	offene Landschaft, Trockenhabitate; thermophil
Myrmica gallienii	-	offene Landschaft, Feuchthabitate; hygrophill
Myrmica specioides	-	offene Landschaft, Trockenhabitate; thermophil
Plagiolepis vindibonensis	-	offene Landschaft, Trockenhabitate; thermophil

Literatur:

SEIFERT, B. (1996): Ameisen: beobachten, bestimmen. – Naturbuch-Verlag, Augsburg.

Käfer-Fundlisten (Coleoptera) von einigen Örtlichkeiten am Neusiedler See

von Wolfgang CIUPA, Wolfgang GRUSCHWITZ, Torsten PIETSCH & Sebastian SCHORNACK

Auf den Salzstellen sahen wir etliche Käfer, die uns aus dem heimischen ‘Salzland‘ bekannt waren, fanden aber auch den halophilen Laufkäfer *Pogonus persicus*, der in Mitteleuropa nur am Neusiedler See und in Mähren vorkommt. Von den vielen Käfern, die wir bis dato noch nicht im Freiland beobachten konnten, seien nur einige genannt, wie der Pflanzenkäfer *Podonta nigrita*, die Bockkäfer *Dorcadion aethiops* und *Plagionotus floralis* oder der Spitzmaulrüßler *Catapion jaffense*.

Alle nachgewiesenen Arten sind nachstehend innerhalb der Familien alphabetisch aufgelistet. In Klammern sind der oder die Finder mit Namenskurzzeichen angegeben. Dabei bedeuten: Ba=Bank, Ci=CIUPA, Gr=GRUSCHWITZ, Pi=PIETSCH, Sc=SCHORNACK. Um Fertörákos wurden einige Bodenfallen aufgestellt, wodurch bei den Carabiden einige zusätzliche Funde gelangen. Die Habitate der Fallenstandorte sind bei den zutreffenden Arten ebenfalls in den Klammern mit aufgeführt.

Fertörákos und Umgebung – 05.07. - 10.07.1998

Carabidae (Laufkäfer): *Abax parallelepipedes* (Pi; Laubwald), *Abax parallelus* (Pi; Laubwald), *Anisodactylus binotatus* (Pi), *Aptinus bombarda* (Pi,Sc; Laubwald), *Bembidion articulatum* (Pi), *Bembidion deletum* (Pi), *Bembidion lampros* (Pi), *Bembidion minimum* (Pi), *Bembidion properans* (Pi; Getreide), *Bembidion quadrimaculatum* (Pi), *Bembidion semipunctatum* (Pi), *Bembidion tenellum* (Pi), *Bembidion varium* (Pi), *Brachinus crepitans* (Pi), *Calathus melanocephalus* (Pi), *Carabus coriaceus* (Pi,Sc; Laubwald), *Carabus scheidleri* (Sc), *Carabus ulrichii* (Ci,Sc), *Chlaenius vestitus* (Pi,Sc), *Cicindela germanica* (Sc), *Cylindera germanica* (Pi; Getreide), *Elaphrus aureus* (Pi; Sumpf/Schilf), *Harpalus affinis* (Pi; Getreide), *Harpalus dimidiatus* (Sc), *Harpalus griseus* (Pi), *Harpalus honestus* (Pi; Getreide), *Harpalus rubripes* (Pi), *Licinus depressus* (Pi), *Lionychus quadrillum* (Pi), *Loricera pilicornis* (Pi; Sumpf/Schilf), *Oodes helopioides* (Sc), *Ophonus azureus* (Pi; Getreide), *Poecilus cupreus* (Pi,Sc; Getreide), *Poecilus sericeus* (Pi,Sc; Getreide), *Pterostichus nigrita* (Pi; Sumpf/Schilf), *Zabrus tenebrioides* (Pi; Getreide)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Halophila - Mitteilungsblatt

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 38_1999

Autor(en)/Author(s): Hellner Matthias

Artikel/Article: Ameisen (Formicidae) in der Umgebung von Fertörákos (05.07. bis 10.07.1998) 6