Laufkäfer-Funde (Col., Carabidae) am Elbe-Ufer in Sachsen-Anhalt (Deutschland)

von Wolfgang CIUPA

Von April 1997 bis Juni 1999 wurden von mir in unregelmäßigen Abständen folgende Elbuferbereiche besucht und besammelt: Aken, Steckby, Löderitzer Forst, Tochheim, Barby, Schönebeck-Ranies, Magdeburg Westerhüsen, Magdeburg Fermersleben, Magdeburg Herrenkrug-Wiesenpark sowie Rogätz. Diese Elbuferbereiche wurden wenn möglich links- und rechtsseitig besammelt. Alle Carabiden wurden in unmittelbarer Wassernähe erbeutet. Es konnten 59 Arten Carabiden aus 25 Gattungen nachgewiesen werden.

In der nachstehenden Auflistung sind die nachgewiesenen Arten alphabetisch geordnet. In der Nomenklatur folge ich KÖHLER & KLAUSNITZER (1998). Die gefährdeten Arten nach der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt (=RLLSA) (SCHNITTER et al. 1993 und SCHNITTER & TROST 1996) sind unterstrichen.

Nachgewiesene Arten:

Acupalpus exiguus, Acupalpus maculatus, Acupalpus meridianus, Agonum dolens, Agonum marginatum, Agonum micans, Agonum muelleri, Amara aenea, Amara aulica, Amara familiaris, Amara fulva, Amara ovata, Amara plebeja, Amara similata, Amara spreta, Amara strenua, Anisodactylus binotatus, Bembidion argenteolum, Bembidion biguttatum, Bembidion dentellum, Bembidion femoratum, Bembidion gilvipes, Bembidion lampros, Bembidion properans, Bembidion punctulatum, Bembidion quadrimaculatum, Bembidion semipunctatum, Bembidion tetracolum, Bembidion varium, Bembidion velox, Brachinus explodens, Calathus fuscipes, Chlaenius nigricornis, Chlaenius nigricornis f. melanocornis, Clivina fossor, Dyschirius arenosus, Dyschirius luedersi, Elaphrus riparius, Harpalus anxius, Harpalus luteicornis, Lionychus quadrillum, Loricera pilicornis, Nebria brevicollis, Notiophilus palustris, Panagaeus bipustulatus, Platynus albipes, Platynus assimilis, Platynus obscurus, Poecilus versicolor, Pterostichus anthracinus, Pterostichus gracilis, Pterostichus melanarius, Pterostichus nigrita, Pterostichus strenuus, Pterostichus vernalis, Stenolophus mixtus, Stomis pumicatus, Syntomus truncatellus, Trechus quadristriatus, Zabrus tenebrioides.

Bemerkenswerte Arten:

***Acupalpus maculatus* (SCHAUM, 1860)** – RLLSA: 2
Eine für Sachsen-Anhalt (=LSA) seltene halophile Art. Es liegen nur wenige Funddaten aus LSA vor, meist von Binnensalzstellen. Bei meinem Fund handelt es sich wahrscheinlich um ein angedriftetes Tier aus dem Oberlauf der Elbe. Ranies, 16.06.1997.

***Agonum dolens* (SAHLB., 1827)** – RLLSA: 2
Eine überall in Deutschland recht seltene Art. Nur im Gebiet der großen Ströme wie Weser, Elbe und Oder gelegentlich etwas häufiger. Herrenkrug-Wiesenpark, 18.06.1997, im Sommerhochwassergenist.

***Amara strenua* (ZIMM., 1832)** – RLLSA: 1
Eine in Mitteleuropa seltene bis sehr seltene Art und vor allem entlang der großen Flüsse und ihrer Zuflüsse – Oder, Elbe, Rhein, Mosel, Main, Weichsel und Rhone – auftretende Art. Wird aber in den letzten Jahren häufiger gefunden (F. HIEKE in litt.). Löderitzer Forst, 29.07.1998, Elbufer unter Genist.

***Bembidion argenteolum* AHR., 1812 und *Bembidion velox* (L., 1761)** – beide RLLSA: 2
Bei Sonnenschein sind beide Arten sehr flüchtig und nur mit einem Ketscher zu erbeuten. Die beiden Bembidion-Arten können im Untersuchungsgebiet als häufig bis sehr häufig bezeichnet werden, in der Literatur werden sie für Mitteleuropa eher als selten angegeben.

***Bembidion modestum* (F., 1801)**
Eine in Mitteleuropa, dem Balkan und in den Pyrenäen montane Art an Flüssen; bei Hochwasser in die Ebene geschwemmt. Im Süden und Osten häufiger, im Westen nur vereinzelt. Nach meinen Funden an der Elbe nicht häufig, eher selten. Barby, 18.08.1997 und Löderitzer Forst, 28.06.1999.

Für die freundliche Unterstützung bedanke ich mich herzlich bei Dr. Fritz HIEKE (Berlin), D. W. WRASE (Berlin), Prof. Dr. Gerd MÜLLER-MOTZFELD (Greifswald) sowie Dr. H. Peer SCHNITTER (Halle).

Literatur:

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Ent. Nachr. Ber. (Dresden) Beiheft 4: 1-185.

SCHNITTER, P. et al. (1993): Rote Liste der Laufkäfer des Landes Sachsen-Anhalt. – Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle 9: 29-34.

SCHNITTER, P. & M. TROST (1996): Zur Fortschreibung der Roten Liste der Laufkäfer Sachsen-Anhalts – Probleme und neue Ansätze. – Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle 21: 80-88.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Halophila - Mitteilungsblatt

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: 40_2000

Autor(en)/Author(s): Ciupa Wolfgang

Artikel/Article: Laufkäfer-Funde (Col., Carabidae) am Elbe-Ufer in Sachsen-Anhalt (Deutschland) 7