

Inhalt

Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt: Ornithologischer Jahresbericht 2007 für die Naturräume um Aschersleben und Staßfurt (ehemaliger Landkreis Aschersleben-Staßfurt).....	1
ADLER, J.: Aus meinem ornithologischen Tagebuch 2007.....	8
LOTZING, K.: Weißstorcherefassung 2007 im Altkreis Aschersleben-Staßfurt.....	9
TAPPENBECK, L.: Der Wilslebener See – eine Perle des Vorharzer Landes.....	9
GRUSCHWITZ, W.: Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) – 5. Nachtrag.....	12
GRUSCHWITZ, W.: Auflistung der um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) gefundenen Knochen-, Mist-, Blatthorn- und Hirschkäfer (Insecta, Scarabaeoidea).....	14
BANK, C.: Neubürger werden häufiger - Ein neuer Pflanzenfund bei Staßfurt – der Armenische Beifuss (<i>Artemisia tournefortiana</i> REICHENB.).....	17
TAPPENBECK, L.: <i>Planorbella scalare</i> (JAY, 1839) – eine amerikanische Posthornschncke neu in Deutschland.....	19
Anschriften der Autoren, Bibliographie, Fachgruppeninterna.....	20

Ornithologischer Jahresbericht 2007 für den Naturräume um Aschersleben und Staßfurt (ehemaliger Landkreis Aschersleben–Staßfurt) FG FAUNISTIK UND ÖKOLOGIE Staßfurt

Mit etwas Verspätung liegt nun der 6. Jahresbericht für das Beobachtungsgebiet vor. Grund für die Verzögerung war auch die gestiegene Anzahl der Daten. Es wurden fast 3800 Datensätze in unsere Datenbank eingearbeitet, so dass wir jetzt bereits über 17500 Einzelbeobachtungen zur Auswertung nutzen können. Der folgende Bericht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird wieder versucht, Interessantes, Seltenheiten, neue Erkenntnisse, Tendenzen, Anregungen und Hinweise aus dem vergangenen Jahr und für die Arbeit in der Zukunft den Mitarbeitern und Lesern vorzulegen. Hervorzuheben sind 2007 die großen Überschwemmungsflächen in den Seeländereien bei Frose und in der Bodeniederung um Athensleben im Herbst. Insbesondere Limikolen fanden hier beste Rastbedingungen vor. Bei meldepflichtigen Beobachtungen ist jeder Beobachter für die Einreichung bei der Avifaunistischen Landeskommission Sachsen-Anhalt (ALK) eigenverantwortlich! Des Weiteren bitten wir um Berücksichtigung der Hinweise aus den vergangenen Jahren bezüglich der Geschlechtsangaben, Alter, Mischschwärme bei Gänsen usw. Die Daten in unserer Datenbank stehen jedem Mitarbeiter für spezielle Auswertungen zur Verfügung. Anregungen, Kritik oder Änderungen zur Form und Verbesserung der nächsten Jahresberichte werden dankend entgegen genommen.

Allen Meldern und Lesern schöne Beobachtungen 2008.

Bei häufig verwendeten Beobachternamen, Orts- und sonstigen Angaben wurde das Abkürzungssystem der vergangenen Jahre übernommen und teilweise erweitert. Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

Beobachter: **AT** - ANDREAS TIMM (Hettstedt); **DG** - DETLEV GRUBER (Uetze-Hänigsen); **FG** - Fachgruppe Faunistik & Ökologie Staßfurt; **FK** - FREDDY KUCHE (Staßfurt); **FW** - FRANK WEIHE (Halberstadt); **HL** - JOHANN LANG (Rathmannsdorf); **JA** - JÜRGEN ADLER (Neundorf); **JL** - JOACHIM LOTZING (Unseburg); **KL** - KLAUS LOTZING (Unseburg); **MÜ** - Dr. JOACHIM MÜLLER (Magdeburg); **RS** - ROSMARIE STEGLICH (Magdeburg); **RW** - RAINER WESEMANN (Hecklingen); **UN** - UWE NIELITZ (Aschersleben); **WB** - WILHELM BÖHM (Aschersleben); **WH** - WOLFGANG HAHN (Förderstedt).

Orte: **ATTEI** - Athenslebener Teiche (MTB 4135-1); **ATU** - Alter Angelteich Unseburg (MTB 4035-3); **COSEE** - Concordiassee Nachterstedt (MTB 4134-3); **LÖTEI** - Löderburger Teiche (MTB 4135-1); **MATEI** - Marbeteich östlich Löderburg OT Lust (MTB 4135-1); **TBKÖ** - Tagebau Königsau (MTB 4134-3); **TBLÖ** - Tagebau Löderburg (MTB 4135-1).
ASL - Aschersleben; **HBS** - Halberstadt; **SFT** - Staßfurt; **LK** - Landkreis.

Sonstiges: **M** - Männchen; **W** - Weibchen; **sM** - singendes Männchen; **BP** - Brutpaar(e); **dj** - diesjährig; **vj** - vorjährig; **Ex** - Exemplar(e); **fl** - flügge; **Ri** - Richtung + E,S,W bzw. N als Flugrichtung; **PK** - Prachtkleid; **SK** - Schlichtkleid; **pull** - Dunenjunge

In der Nomenklatur und der Reihung der Familien und der Arten wird DORNBUSCH (2001) gefolgt.

Entenvögel (Anseriformes)

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Jahresvogel. Die bekannten Brutplätze waren in der Regel wieder besetzt. Hohe Winter- oder Nichtbrüterkonzentrationen wie in vergangenen Jahren wurden nicht festgestellt. Max.: 06.04. ATTEI 52Ex. JA.

Singschwan (*Cygnus cygnus*): 25.03. ATTEI 4ad.Ex. rastend HL, und vom 08.11.–24.11. erst 1ad.Ex., später 2ad.Ex. in der Nähe vom Schachtsee bei Wolmirsleben äsend JL,MÜ,RS.

Saatgans (*Anser fabalis*): Bis zum 21.03. und ab 05.10. im Gebiet anwesend. Die Rastbestände betragen in der Bodeniederung max. ca. 10000Ex. am 04.02. am Schlafplatz TBLÖ WH. Im Herbst max. ca. 1300Ex. am 30.12. am Schlafplatz COSEE. Der Schlafplatz im TBKÖ wird nur noch selten angefliegen. Grund sind offenbar die verstärkt auftretenden Bootsangler. Eine am 15.04. an den ATTEI beobachtete Saatgans gehörte der bei uns sehr seltenen Unterart „fabalis“ (Waldsaatgans) an. Das Verhalten des Tieres ließ jedoch auf eine Verletzung schließen FW,UN.

Blässgans (*Anser albifrons*): Bis 11.02. und ab 04.10. im Gebiet. Max: 14.01. ca. 500Ex. am Schlafplatz TBLÖ WH und im Herbst ca. 1400Ex. am 06.12. in den Seeländereien bei Aschersleben WB. In der Zukunft bitte auf getrennte Artangaben bei Mischschwärmen achten! Nur so ist eine Erfassung und Auswertung in der Datenbank möglich!

Graugans (*Anser anser*): Ganzjährig im Gebiet. Erfolgreiche Bruten fanden am COSEE, im NSG „Wilslebener See“ und am ATU statt. 2007 war jedoch von einem schlechten Bruterfolg gekennzeichnet. WH fand am 19.05. sieben Nester mit erkalteten Eiern am ATU! An mehreren Gewässern wurden brutverdächtige Paare beobachtet, die auf eine weitere Ausbreitung in der Zukunft schließen lassen. Max.: 23.12. COSEE ca. 130Ex. AT.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Das Brutgebiet „Untere Bodeniederung“ wurde bereits am 03.01. besetzt. 1Ex. am ATU MÜ. Die Art war bis zum 28.07. und ab 16.11. im Gebiet anwesend. Der Brutbestand dürfte bei knapp unter 10BP liegen, aber der Bruterfolg war 2007 sehr mäßig. Es wurden nur am MATEI 3flüggeJuv. beobachtet UN,WH. Max.: 20Ex. 06.04. ATTEI JA.

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*): Ist jetzt häufiger als die Brandgans. Ganzjährig im Gebiet anwesend. Mindestens acht erfolgreiche Bruten mit bis zu 8 flüggen Gösseln wurden gemeldet. Dabei werden auch Kleinstgewässer in Kiesgruben genutzt. Max.: 28Ex. am 20.10. ATTEI WH.

Mandarinente (*Aix galericulata*): Jeweils 1M hielt sich vom Jan.–April im Gebiet der ATTEI FG und am 08.04. am auf dem Gondelteich in ASL WB auf. Im Dezember wurden an den ATTEI sogar 1Paar mehrfach beobachtet AT,UN,WH.

Schnatterente (*Anas strepera*): Jahresvogel, man bedenke, vor 30 Jahren waren Winternachweise dieser Art Ausnahmen! In den Monaten Jan., Feb. und Dez. insg. 17 Daten mit max. 25Ex. 17.12. TBKÖ UN. Jahresmax.: 16.11. TBKÖ 43M,42W UN. Bruten: 23.06. ATU 1W mit 12Juv. MÜ,RS und ebenfalls dort am 12.08. 2W mit jeweils 5Juv. WH.

Pfeifente (*Anas penelope*): Bis 10.04. und ab 23.09. im Gebiet anwesend. Bei einem M am 04.05. am ATU MÜ dürfte es sich um einen verspäteten Durchzügler gehandelt haben. 2007 wurde verstärkter Herbstzug registriert. Max.: 16.11. ca. 55M,65W am TBKÖ UN.

Stockente (*Anas platyrhynchos*): Max.: ca. 1200Ex. am 16.12. TBLÖ WH.

Löffelente (*Anas clypeata*): Auf Grund der Witterung auch Daten im Jan. und Feb. mit max. 12Ex. 13.01., 14.01. und 21.01. am ATTEI AT,FK,WH. Durchzug im Frühjahr bis 22.04., max. 39Ex. 06.04. ATTEI WH. Herbstzug beginnt am 09.09. und endet erst am 22.12., max. ca. 70Ex. am 14.09. ATTEI FK. Einige Daten im Mai, Juni und August lassen auf unentdeckte Brutvorkommen an den ATTEI und ATU hoffen. Verstärkt auf diese Art zur Brutzeit achten! Es brüten mit Sicherheit auch noch andere Schwimmentenarten in diesen Teichgebieten!

Spießente (*Anas acuta*): Regelmäßiger Durchzügler bis 10.04. und ab 06.10. Max.: 11.03. 20Ex. ATTEI FK.

Knäkente (*Anas querquedula*): 7 Heimzugdaten zwischen 31.03.–13.05. mit max. 8Ex. am 31.03. bei Athensleben WH. Vom Wegzug ein Datum: 10.09. 3M,2W im Seegelände bei ASL UN.

Krickente (*Anas crecca*): Möglicherweise erfolgte in diesem Jahr am ATU eine Brut. Am 05.08. 5Ex., wobei es sich um ein W mit 4 flüggen dj. gehandelt haben dürfte UN. JL vermutet am 24.08. unter 8Ex. am ATU dj.Ex. Starker Durchzug Mitte–Ende Nov.: 16.11. TBKÖ ca. 155Ex. UN, 17.11. ca. 300Ex. ATTEI FK,WH und 23.11. TBKÖ 238Ex. AT.

Kolbenente (*Netta rufina*): Zur Brutzeit Nachweise vom ATU im Juni MÜ,RS,UN und von der Kiesgrube „Froser Str.“ NW von ASL im April/Mai UN,WB. Max.: 14.09. 4M,3W TBLÖ UN.

Tafelente (*Aythya ferina*): Jahresvogel. Nur ein Brutnachweis: 07.08. 1W + 1fast flügge Juv. JL. Max.: 04.02.2008 ATU ca. 120Ex. JL,WH.

Reiherente (*Aythya fuligula*): Jahresvogel. Brutnachweise gelangen an der Bode bei Unseburg, den ATTEI und am ATU. Insg. wurden 5 führende W gemeldet FK,UN,WH.

Bergente (*Aythya marila*): 27.03. TBKÖ 1W UN.

Eiderente (*Somateria mollissima*): Das bereits im Vorbericht gemeldete W wurde von verschiedenen Beobachtern auch noch bis zum 14.01. an den ATTEI (Jakobsgrube) gemeldet. Erstaunlicherweise tauchte offenbar das selbe Tier nochmals am 29.04. auf diesem Gewässer auf FW.

Trauerente (*Melanitta nigra*): 24.04. COSEE 2M K2 und 15.11. COSEE 1W UN.

Samtente (*Melanitta fusca*): 15.01. COSEE 3M K2 UN.

Schellente (*Bucephala clangula*): Im Winterhalbjahr auf fast allen Gewässern in wenigen Ex. beobachtet. Max.: 24.02. Westerwiese 5M,5W JL. Bis zum 15.05. Einzelbeobachtungen an der Westerwiese und am ATU von mehreren Beobachtern, lassen auch 2007 an einen Brutverdacht denken.

Zwergsäger (*Mergellus albellus*): 6 Daten bis zum 27.03. und 4 Daten ab 16.11. liegen über der Anzahl der letzten Jahre. Max.: 30.12. COSEE 1M,6W AT,UN.

Gänsesäger (*Mergus merganser*): regelmäßig bis zum 24.03. und ab 29.11. ungewöhnlich waren am 24.04. 4M,6W am COSEE UN. Max.: 06.02. ATTEI 14M,8W FK.

Spechtvögel (Piciformes)

Wendehals (*Jynx torquilla*): 1. Rufer am 03.04. bei Unseburg JL.

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*): Wiederum in der Westerwiese am 22.04. 2Ex. JL. Unbedingt in der Zukunft auf diese Art dort achten, Brutnachweis wünschenswert.

Grauspecht (*Picus canus*): 15.12. 1Ex. in Unseburg an Äpfeln fressend JL.

Hopfe (Upupiformes)

Wiedehopf (*Upupa epops*): 02.08. Feldflur Unseburg 1Ex. rastend WH.

Rackenvögel (Coraciiformes)

Eisvogel (*Alcedo atthis*): Bestand hat sich wieder erholt. Viele Beobachtungen von fast allen Gewässern. 2 Brutnachweise: 15.05. Schwanenteich SFT 1BP füttert Juv. F.CONRAD(SFT) und 31.07. Bode bei Unseburg 1Ex. mit Futter JL.

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Monitoring-Programm auch 2007 weitergeführt. Osmarsleben 12BP, Schackenthal 9BP, Kiesgrube bei ASL 2BP, Kiesgrube am Flugplatz Cochstedt 2BP. Weiterhin mehrere Brutversuche. Im Gebiet vom 12.05. bis 19.09. anwesend. Mitte Sept. stellte HL über Rathmannsdorf morgens und abends Flugbewegung größerer Trupps (bis ca. 45Ex.) fest. Dies deutet auf einen Schlafplatz in der dortigen Gegend hin. Größere Trupps auch abseits der Brutgebiete, so am 10.09. ca. 50 Ex. am östl. Stadtrand von ASL WB.

Kuckucksvögel (Cuculiformes)

Kuckuck (*Cuculus canorus*): 1. Rufer 27.04. Westdorf WB. Der Kuckuck ist Vogel des Jahres 2008. Da wir sehr wenig über den Bestandsrückgang der letzten Jahre wissen, bitte mal alle Daten melden. Interessant wären insbesondere Bestände aus größeren Gebieten.

Segler (Apodiformes)

Mauersegler (*Apus apus*): 1. Beobachtung am 22.04. 4Ex. und 6Ex. über ASL WB, O.STROHKORB(ASL). Die Hauptmasse zog in der Zeit vom 02./03.08. wieder in Richtung Süden ab. WB. Letzte Beobachtung: 04.09. 1Ex. über ASL UN.

Eulen- und Schwalmvögel (Stringiformes)

Schleiereule (*Tyto alba*): 26.09. in Neundorf JA und 17.02. in Schneidlingen und 19.02. in Hecklingen RW sind die einzigen Daten. Diese Art kommt jedoch mit Sicherheit häufiger vor. Um den Wissenstand zu erhöhen, bitte mal 2008 mit Pfarrern (Kirchen) und Landwirten (Scheunen) Kontakt aufnehmen und nachfragen!

Uhu (*Bubo bubo*): Der Brutplatz bei SFT wurde im März wieder bestätigt und bereits am 11.04. waren 2pulli in der Höhle zu erkennen. Ein Jungvogel wurde flügge und noch im Juli als Ästling bestätigt FK,MÜ,WH.

Waldkauz (*Strix aluco*): Nachdem 2006 kein Nachweis erfolgte, wurde in diesem Jahr mehr auf diese Art mit Erfolg geachtet. Meist rufend wurde die Art zur Frühjahrs- und Herbstbalz in Löderburg, Schneidlingen, Hecklingen (2Stellen), Unseburg (2Stellen) und ASL festgestellt.

Waldohreule (*Asio otus*): Brut: RW beobachtet am 15.03. in Hecklingen eine Paarung und die Besetzung eines alten Elsternestes. Brutzeitbeobachtungen auch in Unseburg und Neundorf. Der Schlafplatz in Neundorf war bis zum 06.03. mit bis zu 4Ex. besetzt JA. Im Herbst wurden 3 Schlafplätze gefunden und kontrolliert. Neundorf bis 9Ex. JA, Friedhof in ASL bis 8Ex. WB und Güsten mit bis zu 9Ex. K.BAUMGART(Güsten).

Taubenvögel (Columbiformes)

Hohltaube (*Columba oenas*): Winter: 25.02. 1Ex. in der Westerwiese Unseburg JL und einen Tag später rasten 91Ex. in den Pappeln, später in Ri.S abfliegend MÜ. Hier balzen im April-Mai auch 2Paar JL,MÜ,WH. Weiterhin zur Brutzeit nur einmal im Tierpark SFT 1Ex. am 13.04. rufend WH.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): 1. Ex. am 03.05. im Seegelände ASL WB.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): Nach dem Aufruf im letzten Bericht wurden folgende Brutbestände gemeldet: Tierpark SFT 5BP MÜ,WH. Borne: im Ort ca. 8-10BP am 07.06. JL.

Kranichvögel (Gruiformes)

Kranich (*Grus grus*): Für diese Art haben wir dank der vielen Meldungen einen immer besseren Überblick über das jährliche Zugeschehen. Der Heimzug begann am 11.02. mit dem Höhepunkt in den ersten Märztagen und endete am 14.03. Auch zur Brutzeit gelangen wieder Beobachtungen, so sah JL am 30.04. über Unseburg 3Ex. in Ri.N ziehend. Mag es sich hierbei noch um Nachzügler gehandelt haben, so lassen 2Ex. auf einer Überschwemmungsfläche am 19.06. bei Frose auf eine Ansiedlung in der Zukunft hoffen UN. Der Herbstzug begann am 06.10. und endete(?) erst am 31.12. Starker Durchzug herrschte an folgenden Tagen, 06./07.10.; 13./14.10.; 19./20.10. und 04.11. Insgesamt wurden im Frühjahr ca. 2000Ex. in 43 Keilen gemeldet. Im Herbst wurden 325 Formationen mit ca. 34000(!)Ex. beobachtet. Diese Summe beinhaltet garantiert Doppelzählungen. Aber mit Sicherheit sind im Herbst 2007 wieder über 20000 Kraniche zwischen Hoym und Rathmannsdorf hinweg gezogen. Um Doppelzählungen zu erkennen, ist es sehr wichtig, die minutengenaue Meldung mit möglichst genauer Richtungsangabe zu notieren. Nur so ist es möglich, Doppelzählungen zu erkennen! Dank allen Meldern. Besonderen Dank an H.&J.LANG, die alle Hinweise beachteten und eine Vielzahl Meldungen einreichten.

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Brutzeit: NSG „WilslebenerSee“ 17.03. 2Rufer WB, Seegelände bei ASL 30.06. 2Rufer UN, ATTEI 04.05. 1Rufer am Undank UN und 15.04. 2Rufer an der Jakobsgrube FW, UN, ATU 22.06. 1Rufer UN, weiterhin ein Revier an einer Feuchtstelle im Einetal bei Westdorf von April–Okt. besetzt WB.

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): 30.04. ASL Kiesgrube „Froser Str.“ 3BP UN, WB.

Blässhuhn (*Fulica atra*): Ganzjährig im Gebiet. Brutvogel an allen geeigneten Gewässern, aber mit geringem Bruterfolg. JL meldet von den Gewässern um Unseburg folgende Bestände: Kamplake 11BP, Westerwiese 10BP, Angelteich bei Wolmirsleben 6BP. Weiterhin Kiesgrube Froser Str. bei ASL 8BP UN, WB. Die Rastbestände ähnlich 2006. Es wurde jedoch festgestellt, dass Bestände innerhalb von 24 h um 100% schwanken. Hierbei sind möglicherweise Schätzfehler unterschiedlicher Beobachter verantwortlich. Bitte bei der Erfassung möglichst genaue Zahlen erfassen (reine Übungssache, gilt auch für andere Arten!). Max.: 24.08. ca. 800Ex. ATU JL.

Storchenvögel (Ciconiiformes)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): Herbstzug: 07.10. 1Ex. Weinbergsgrund FG; 27.10. 1Ex. an der Eine bei ASL UN; 31.10. 1Ex. bei Westdorf und 18.11. 1Ex. im Seegelände bei ASL WB.

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Nur Durchzügler. Der Frühjahrszug wurde nur zwischen 14.04. und 22.04. in der Bodeniederung um Athensleben mit wenigen (max. 3Ex.) Tieren registriert. Auf Grund starker Vernässungen im Bereich des Seegeländes zw. ASL und Frose, sowie der Bodeniederung um Athensleben wurde verstärkter Durchzug im Herbst festgestellt (Dies gilt für alle Limikolenarten!) 37(!) Daten zwischen 19.07. und 28.10. belegen den Herbstzug, wenn geeignete Rasthabitats bestehen. Max.: 06.10. ca. 85Ex. bei Frose UN und 16.10. ca. 90Ex. in der Rötheniederung bei Athensleben WH. Winter: 22.12. 1Ex. am Goldbach ATTEI UN.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 15.04. ATTEI 1Ex. überfliegend FW, UN; 28.07. MATEI 1Ex. WH.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Ab Mitte Juli rasten wieder, beginnend mit Einzeltieren, Brachvögel in der Bodeniederung. Am MATEI und den Sodahalden bildet sich wieder eine Schlafplatzgemeinschaft von bis zu 115(!)Ex. am 10.10. WH. Letztmalig wurden dort 10Ex. am 24.11. beobachtet WH. Ein weiterer größerer Rasttrupp hielt sich im Seegelände bei Frose zw. 29.08. bis 20.10. auf, max. 16Ex. am 04.09. UN.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Heimzug: 29.04. ATTEI 6Ex. FW. Der Wegzug begann zeitig, bereits am 22.06. ATTEI 2Ex. im BK UN. Bis zum 28.10. folgten weitere 17 Beobachtungen mit max. 12Ex. am 17.10. bei Athensleben UN.

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Heimzug: 14.04. und 12.05. je 1Ex. Wegzug: 18.08.–16.10. 11 weitere Beobachtungen mit max. 5Ex. in der Rötheniederung am 16.10. WH.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Heimzug vom 10.04.–13.05. 13 Daten, max. 6Ex. 14.04. Löderburg-Lust WH, MÜ, RS. Wegzug vom 19.06.–17.10. 15 Daten, max. 12Ex. 17.07. MATEI FK.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): 3 Winternachweise: 14.01. 3Ex. Unseburg Westerwiese JL, 05.02. ATTEI 1Ex. AT, 16.02. ATTEI 2Ex. FK. Heimzug: 11.03.–22.04. 15 Daten, max. 2Ex. Wegzug: 13.07.–04.10. 14 Daten mit max. 6Ex. am 27.08. ATTEI und 02.09. MATEI.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Heimzug: 29.04. 13Ex. ATTEI FW. Wegzug: 19.07.–27.08. 5 Daten mit max. 2Ex. auf den Überschwemmungsflächen in Frose und Athensleben. An letzterer Stelle tauchten zw. 10.10. und 14.10. nochmals 2Ex. auf (sehr später Durchzug für diese Art) DG, WH.

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Heimzug: 11.04.–13.05. 5 Daten von bis zu 2Ex. Wegzug: 17.07.–02.09. 19 Daten. Max.: 05.08. mind. 15Ex. MATEI UN.

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): 27.08. MATEI 1dj.Ex. rastend UN.

Knutt (*Calidris canutus*): Zw. 15.10.–26.10. hielten sich 2Ex. in der Rötheniederung und den angrenzenden Überschwemmungsflächen auf FK, MÜ, UN, WH.

- Sanderling** (*Calidris alba*): Heimzug: 13.05. MATEI 1Ex. im PK *FW,WH*. Wegzug: 22.09.–26.09. MATEI 1Ex. rastend *WH,UN*, 03.10.–09.10. Seegelände bei Frose 2Ex. im SK *UN*, 04.10. Rötheniederung 1Ex. im SK *UN*, 16.10. Rötheniederung 1Ex. *WH*.
- Zwergstrandläufer** (*Calidris minuta*): Wegzug: 18.08.–26.10. 30(!) Beobachtungen am MATEI, ATTEI und den beiden Überschwemmungsgebieten. Max.: 04.10. ca. 15Ex. bei Frose *UN*.
- Temminckstrandläufer** (*Calidris temminckii*): 13.05. 4Ex. (2x PK, 2x ÜK) rasten am MATEI *FW,WH*.
- Alpenstrandläufer** (*Calidris alpina*): Heimzug: keine Meldung. Herbstzug: 59(!) Daten, bedingt durch die Überschwemmungsflächen bei Athensleben und Frose. 01.10. bis zwischen 12.08.–15.12.; max.: 95Ex. am 04.10. bei Frose *UN* und ca. 150(!)Ex. am 13.10. bei Athensleben *WH*.
- Sichelstrandläufer** (*Calidris ferruginea*): 19.07.–10.10. 7 Daten vom ATTEI, MATEI und Seegelände bei Frose. Max. 6dj.Ex. am 24.09. MATEI *WH*.
- Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*): Heimzug: 31.03.–29.04. 4 Daten mit max. 4Ex. 31.03. Rötheniederung *WH*. Wegzug: 17.07.–27.11. 30 Daten. Max.: 13.10. ca. 20Ex. in der Rötheniederung *WH*.
- Odinshühnchen** (*Phalaropus lobatus*): 30.09.–04.10. MATEI 1dj.Ex. rastend *FW,UN,WH*.
- Säbelschnäbler** (*Recurvirostra avosetta*): 22.06. ATU 2Ex. rastend *UN*.
- Goldregenpfeifer** (*Pluvialis apricaria*): Heimzug: 26.02. Seegelände bei ASL 46Ex. in Ri.W ziehend *UN*. Wegzug: Bedingt durch die Wasserflächen in der Bodeniederung starker Durchzug. Vom 01.10.–28.10. 25 Daten mit max. ca. 300Ex. in der Rötheniederung am 13.10. *WH*.
- Kiebitzregenpfeifer** (*Pluvialis squatarola*): Heimzug : 13.05. MATEI 1Ex. rastend *FW,WH*. Wegzug: Bedingt durch die Überschwemmungen bei Athensleben und Frose wurde für unser Gebiet extremer Durchzug registriert! Vom 03.10.–15.11. 40 Daten mit max. ca. 250Ex. am 06.10. auf überschwemmten Ackerflächen bei Athensleben *WH*.
- Sandregenpfeifer** (*Charadrius hiaticula*): Heimzug:10.03. 2Ex. ATTEI *FK,MÜ,RS,WH*. Wegzug: 23 Daten zwischen 25.07.–17.10. Max.: je ca. 15Ex. an den Überschwemmungsflächen bei Frose und Athensleben am 04.10. *UN*.
- Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*): Erstbeobachtung am 31.03. ATTEI 2Ex. *WH*. Bruten oder Reviere wurden vom MATEI, ATTEI, ATU, Seegelände bei ASL und Frose, und 2 Kiesgruben an der B6n gemeldet. Max.: 7Ex. am 19.07. bei Frose *UN*.
- Kiebitz** (*Vanellus vanellus*): Winter: 31.01. ATTEI 1Ex. *UN*. Heimzug: Die Masse zieht bereits um den 22.02. ein, ATTEI ca. 400Ex. *FK*. Brutzeit: 2BP bei Frose und etwa gleiche Anzahl bei Athensleben. Der Herbstzug beginnt am 15.07. und geht bis zum 15.12. In der überschwemmten Rötheniederung rasten dann im Oktober mehrmals etwa 4000Ex. *WH*.
- Sturmmöwe** (*Larus canus*): Jahresvogel. Bruten: MATEI 1BP, Westerwiese 2BP, ATU 4BP *FK,JL,MÜ,WH*, NSG „Wilslebener See“ 1BP *WB*. Nov./Dez. Schlafplatz am COSEE, max. ca. 84Ex. am 30.12. *AT*. Wie hoch der Anteil dieser Art am Möwenschlafplatz Sodahalde war, konnte leider nicht abgeschätzt werden. Max.: ca. 180Ex. 04.01. TBLÖ *UN*.
- Mantelmöwe** (*Larus marinus*): 04.10. Athensleben 1dj.Ex. unter anderen Möwen *UN*.
- Silbermöwe** (*Larus argentatus*): Die 550 abends einfallende Großmöwen am Schlafplatz COSEE waren am 15.12. soweit erkennbar alles Silbermöwen *UN*.
- Steppenmöwe** (*Larus cachinnans*): Vier mal wurde diese Art unter den Silbermöwen erkannt. Max.: 7immat. bei Athensleben am 03.10. *MÜ*.
- Mittelmeermöwe** (*Larus michahellis*): Zw. 11.07. und 28.10. sieben mal beobachtet, max.: 10immat.Ex. 08.09. ATU *MÜ*.
- Heringsmöwe** (*Larus fuscus*): Zw. 08.09. und 05.10. halten sich um Athensleben bis zu 3ad.Ex. auf *FW,MÜ,UN,WH*. Am 20.10. 3Ex. (1dj.+2ad.) unter zum Schlafen einfallende Großmöwen am COSEE *UN*.
- Lachmöwe** (*Larus ridibundus*): Jahresvogel im Gebiet. Im Oktober findet *WH* auf der Sodahalde bei Löderburg-Lust einen Möwenschlafplatz. Am 10.10. fallen hier abends ca. 10000(!)Ex. zum Schlafen in der Dämmerung ein. Soweit erkannt, handelte es sich zum größten Teil um Lachmöwen.
- Schwarzkopfmöwe** (*Larus melanocephalus*): Unter den rastenden Möwen auf den Überschwemmungsflächen bei Athensleben entdeckte *FW* am 03.10. 1dj.Ex., welches am 04.10. nochmals bestätigt wurde *UN*.
- Zwergmöwe** (*Larus minutus*): 14.04. COSEE 5ad.Ex. rastend *UN*, 24.04. 6Ex. (4ad.,1K2,1K3) TBKÖ rastend *UN*, 03.10. ca. 25Ex. ATTEI überfliegend *MÜ*.
- Weißbart-Seeschwalbe** (*Chlidonias hybridus*): 20.05. ATTEI 8Ex. rastend *FK*.
- Trauerseeschwalbe** (*Chlidonias niger*): 24.04. TBKÖ 18Ex. *UN*, 30.09. ATU 2dj. *MÜ,WH*.
- Fischadler** (*Pandion haliaetus*): Ungewöhnlich ist ein Ex. am 15.05. am ATTEI *FW*. Im Herbst zw. 18.08. und 05.10. fünf Beobachtungen von Einzelvögeln im Bereich Athensleben/Unseburg *AT,JL,MÜ,WH*.
- Roter Milan** (*Milvus milvus*): Winter: Max. 10Ex. 13.01. an der Bode zw. SFT und Hohenerleben *HL*.
- Schwarzer Milan** (*Milvus migrans*): Je 3BP an der Westerwiese melden *JL,MÜ* und im Bereich der MATEI *WH*. Dafür war der langjährig besetzte Horst im NSG „Schierstedter Busch“ verwaist *WB*.

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Alle Daten: 14.01. TBKÖ 1Ex. (K4) UN; 24.01. 1ad.Ex. bei Güsten in Ri.W überfliegend DG; 27.01. TBLÖ 1ad.Ex. WH; 04.02. 1Ex. (K2/3) JL,WH; 25.02. Westerwiese 2immat.Ex. JL; 26.02. Westerwiese 1ad.Ex. MÜ; 11.03. Westerwiese 1Ex. immat. WH; 25.03. Westerwiese 1Ex. (K2/3) JL; 03.11. ATTEI 1ad.Ex. kröpft Beute in der Feldflur B.SEIDEL; 04.11. COSEE 1Ex. (K1/2) UN; 02.12. ATU 1Ex. immat. JL.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Die Brutplätze waren in der Regel wie im Vorjahr besetzt. Schlafplatz: 03.09. Seegelände bei ASL ca. 20Ex. fallen abends im Schilf ein UN.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Heimzug: 15.04. ATTEI 1ad.M in Ri.N FW,UN. Zwei Daten lassen auf unentdeckte Bruten schließen: 13.05. Förderstedt 1W WH, 20.07. Schackenthal 1M UN.

Sperber (*Accipiter nisus*): Brutplätze bei ASL wieder besetzt, im Einetal fliegen Anfang Juli mind. 3Juv. aus WB. JL vermutet ein Revier im Bereich der Westerwiese.

Habicht (*Accipiter gentilis*): Je ein Revier bei Frose und Neu-Königsau UN,WB. Letzterer findet am 06.06. einen Horst mit 1Juv. in den „Westerberge“ bei ASL.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*): 5 Daten (je 1Ex.) im Winterhalbjahr.

Schreiadler (*Aquila pomarina*): 16.04. Hakel bei Heteborn 1M balzend DG, 04.06. Hakel bei Hakeborn 1Ex. DG.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): 30.05. Hecklingen Weinbergsgrund 2BP in den Kalksteinwänden MÜ,RS.

Merlin (*Falco columbarius*): 07.10. Athensleben 1Ex. AT, 14.10. 1w-farbigesEx. begleitet auf ca. 1,5 km eine weibliche Kornweihe, um von dieser aufgescheuchte Kleinvögel zu erbeuten. Mehrere Jagdflüge waren erfolglos, es sah aber eher wie „Training“ aus UN.

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Brutzeit: 11.06. bei Tarthun 2Ex. JL, 02.08. Osmarsleben 1Ex. UN, 10.08. Seegelände bei ASL 1Ex. UN. Brut: 14.09. zwischen Hecklingen und ASL 2ad.Ex. und 2dj.Ex., welche von den Altvögeln noch mit Libellen gefüttert werden UN.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): An den Überschwemmungsflächen Frose und Athensleben stellten sich auf Grund des Nahrungsreichtum auch diese Falken ein. In Frose ein dj. unberingtes W und bei Athensleben ein sehr altes W. Am 29.11. war dort auch noch ein ad. M anwesend. Ebenfalls bei Athensleben bemerkte DG, wie das alte W einen noch größeren bräunlichen Falken attackierte. Leider war eine Bestimmung auf Grund der Lichtverhältnisse nicht möglich.

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Brutbestand wie im Vorjahr. Max.: 02.09. ATU 32Ex. WH.

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*): 04.05. ATU 1Ex. MÜ.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Brutplätze ähnlich wie im Vorjahr besetzt. Höchster Brutbestand am TBKÖ mit etwa 15BP UN. Max.: 23.12. 34Ex. COSEE rastend AT.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Am ATU, MATEI und LÖTEI zur Brutzeit bis 3Ex. anwesend, es kam aber zu keiner Brut.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Jahresvogel. Kolonie im TBKÖ wuchs auf ca. 38BP. Es wurden 12Juv. beringt UN. Bei der Beringung in der Kolonie wurden sehr viele tote Juv. im Wasser gefunden, Ursache? Max.: 02.01. ca. 130Ex. am Schlafplatz TBKÖ UN.

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): Brutzeitbeobachtung! 29.06. beobachtet WB 2Ex. in der Kiesgrube „Froser Str.“, davon mind. 1M. Nachsuche in den Folgetagen leider erfolglos.

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Zur Brutzeit regelmäßig im NSG „Wilslebener See“ UN,WB. Weiterhin am 18.08. ein Ex. am ATU rufend MÜ,WH.

Graureiher (*Ardea cinerea*): Bruten: Wasserwerk SFT mind. 3Horste am 13.04. besetzt MÜ, TBKÖ mind. 10Horste am 07.04., Osmarsleben ca. 20 besetzte Horste in einem Feldgehölz UN. Jahresvogel mit max. ca. 60Ex. am 19.09. bei Frose auf einer Rapsbrache Mäuse jagend UN.

Silberreiher (*Casmerodius albus*): Beobachtungen nehmen weiter zu. 107(!!!) Meldungen aus allen Monaten belegen das gehäufte Vorkommen in Deutschland auch für unseren LK. Max. 29Ex. (neues Gebietsmaxima!!) zählte AT am 29.09. in der Feldflur bei Athensleben.

Schwarzstorch (*Ciconia niger*): 08.10. 1Ex. bei Frose rastend A.WESTERMANN(Ballenstedt).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*): 1. Beobachtung am 17.03. bei Egelu 1Ex. UN. Artbetreuer KL meldet 11flüggeJuv. aus den 5 bekannten Orten. Zw. 03.11. und 08.11. noch 2Ex. bei Egelu MÜ, und ein weiteres Ex. schläft im Nov. auf einer Straßenlaterne in Nachterstedt UN.

Sternaucher (*Gavia stellata*): Alle Daten COSEE UN: 24.04. 1vj.Ex., 17.12. je ein Ex. im SK auf dem TBKÖ und dem COSEE.

Eistaucher (*Gavia immer*): Der bereits seit 06.12.2006 auf dem TBKÖ anwesende Eistaucher wurde noch bis zum 19.03. von verschiedenen Beobachtern bestätigt.

Seetaucher (spec.): Am 23.12. und 30.12. meldet AT zwei unbestimmbare Seetaucher am COSEE. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um die im Jan./Feb. 2008 dort ständig zu beobachtenden Sterntaucher.

Sperlingsvögel (Passeriformes)

Neuntöter (*Lanius collurio*): Weinbergsgrund Hecklingen 30.05. insg. 5BP MÜ,RS.

- Dohle** (*Corvus monedula*): Bruten: 1-2BP am Wasserturm Groß Börnecke UN, 02.03. 1Paar am Gymnasium in Egel JL, 11.06. 4Ex. an der Kirche in Egel JL.
- Saatkrähe** (*Corvus frugilegus*): Brutbestände: 04.05. Winnigen ca. 100 besetzte Nester WB,UN, 22.04. Schneidlingen ca. 212 Nester gezählt JL, 31.03.–15.04. wird bei Wolmirsleben an bis zu 17 Nestern gebaut, es kommt jedoch zu keiner Koloniebildung MÜ. Bruten aus Borne wurden nicht gemeldet.
- Pirol** (*Oriolus oriolus*): 1. Rufer am 28.04. Unseburg Westerwiese JL.
- Wasseramsel** (*Cinclus cinclus*): Das Brutpaar an der Eine im NSG „Schierstedter Busch“. brütete wieder erfolgreich WB. Winter: 1Ex. am 25.12. an der Eine oberhalb von ASL UN.
- Ringdrossel** (*Turdus torquatus*): 09.04. ASL Kiesgrube „Froser Str“ 1M rastend WB.
- Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*): Keine Brutzeitmeldungen. In den Sanddornbereichen am COSEE max. nur ca. 800Ex. am 25.11.
- Singdrossel** (*Turdus philomelos*): 1. singende bereits am 16.02. COSEE UN.
- Grauschnäpper** (*Muscicapa striata*): 1. Beobachtung am 04.05. ATTEI 1Ex. UN.
- Nachtigall** (*Luscinia megarhynchos*): 1. sM bei ASL 22.04. WB.
- Blaukehlchen** (*Luscinia svecica cyanecula*): Am 30.06. 1dj.Ex. im Seegelände bei ASL gefangen. Offenbar wieder erfolgreich gebrütet UN.
- Hausrotschwanz** (*Phoenicurus ochruros*): Winter: 01.01. in ASL 1Ex. WB. MÜ meldet 2BP in den Kalkfelsen im Weinberggrund bei Hecklingen am 24.05.
- Gartenrotschwanz** (*Phoenicurus phoenicurus*): 1. sM am 10.04. in ASL WB.
- Braunkehlchen** (*Saxiola rubetra*): Am MATEI 3Paar im Mai/Juni WH.
- Schwarzkehlchen** (*Saxicola rubicola*): Brutbestand stabil. Die bekannten Brutplätze waren in der Regel wieder besetzt.
- Steinschmätzer** (*Oenanthe oenanthe*): 1. Beobachtung am 31.03. bei ASL WB. Brutbestände: MATEI 3BP an der Rohrtrasse WH, ATU 2BP WH, Kiesgrube „Froser Str.“ ASL 3BP WB, zwei Kiesgruben an der B6n 4BP WB, Tongrube Winnigen 4BP UN.
- Star** (*Sturnus vulgaris*): Schlafplatz im Schilf Seegelände ASL. Max.: ca. 9000Ex. am 30.08. morgens abfliegend UN. Schlafplatz ATTEI (T3) im Schilf, max. ca. 10000Ex. am 17.10., darunter auch 2 Teilalbinos DG,UN.
- Beutelmeise** (*Remiz pendulinus*): 04.05. ATTEI drei Reviere UN.
- Tannenmeise** (*Parus ater*): Später Durchzug: 15.04. ATU 5Ex. in Ri.NE ziehend FW,UN,WH.
- Schwanzmeise** (*Aegithalos caudatus*): Am 10.05. fliegen aus einem Nest bei Westdorf 10Juv. aus UN.
- Uferschwalbe** (*Riparia riparia*): Brutbestand im LK stabil. Größte Kolonien: Kiesgrube Atzendorf 03.06. ca. 300BP in mehreren Teilkolonien WH, Kiesgrube „Froser Str.“ ASL zwei Kolonien mit je ca. 120 Röhren UN,WB, Tongrube Winnigen ca. 40BP UN.
- Rauchschwalbe** (*Hirundo rustica*): 1. Beobachtung am 19.03. 1Ex. über Unseburg JL.
- Mehlschwalbe** (*Delichon urbica*): 1. Beobachtung am 21.04. NSG „Schierstedter Busch“ 2Ex. WB. In Unseburg zählten JL,MÜ,RS zahlreiche tote Juv. nach einer Schlechtwetterperiode unter den Nestern. An einem Werksgebäude in ASL wird während der Brutzeit die Fassade mit ca. 120 Nestern verkleidet. Nach Absprache mit der UNB wird der Bauablauf so gestaltet, dass möglichst viele Jungschwalben noch ausfliegen können. Der Betrieb muß als Ausgleichsmaßnahme 4 Schwalbentürme mit je 48 Nester für die Brutzeit 2008 aufstellen.
- Feldschwirl** (*Locustella naevia*): 1. sM am 17.04. TBKÖ UN.
- Schlagschwirl** (*Locustella fluviatilis*): 2sM am 22.05. im Einetal bei Westdorf UN, 1sM am 06.06. im NSG „Schierstedter Busch“ WB.
- Rohrschwirl** (*Locustella luscinioides*): Im Bereich Seegelände ASL - NSG „Wilslebener See“ wieder 2sM zur Brutzeit UN,WB.
- Seggenrohrsänger** (*Acrocephalus paludicola*): Je ein dj. Ex. fingen und beringten WB und UN am 18.08. und 12.09. im Seegelände bei ASL.
- Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scirpaceus*): 1. sM 30.04. NSG „Schierstedter Busch“ WB.
- Drosselrohrsänger** (*Acrocephalus arundinaceus*): 1. sM am 13.05. ATU WH. Brutbestände: Kiesgrube Froser Str. ASL 2sM am 21.05. UN, ATU 2sM 22.06. und ATTEI (T3) 29.06. 3sM UN.
- Gelbspötter** (*Hippolais icterina*): 1. sM 03.05. bei ASL WB.
- Fitis** (*Phylloscopus trochilus*): 07.04. 2sM TBKÖ UN.
- Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*): 1. sM am 10.03. Unseburg Westerwiese JL. Am 26.04. im Einetal ein sM mit untypischem Gesang, teilweise mit Strophen des Iberischen Zilpzalps. Gesang wird im Laufe der Zeit bis Ende Mai immer typischer für einen Zilpzalp. Fang und Vermessung bestätigten Artdiagnose „Zilpzalp“ DG,UN.
- Waldlaubsänger** (*Phylloscopus sibilatrix*): 1. sM am 22.04. TBKÖ WB.
- Grünlaubsänger** (*Phylloscopus trochiloides*): Ein Ex. dieses seltenen Laubsängers fingen und beringten MÜ und WH am 18.08. bei Förderstedt.

- Bartmeise** (*Panurus biarmicus*): Zur Brutzeit mehrfach an den LÖTEI, ATU, ATTEI und im Seegelände bei ASL.
- Mönchsgrasmücke** (*Sylvia atricapilla*): 1. sM am 31.03. Seegelände bei ASL *WB*.
- Gartengrasmücke** (*Sylvia borin*): 1. sM am 27.04. TBKÖ *WB*.
- Sperbergrasmücke** (*Sylvia nisoria*): Alle Daten: 04.06. Seegelände ASL 1sM *WB*, 04.06. Sanddorngebüsche bei Heteborn zwei Reviere *DG*, 26.07. Schackenthal 1dj.Ex. gefangen und beringt, sowie ein weiteres ad. Ex. warnend *UN*.
- Klappergrasmücke** (*Sylvia curruca*): 1. sM 14.04. 3Ex. ASL *WB*.
- Dorngrasmücke** (*Sylvia communis*): 1. sM am 22.04. MATEI *MÜ,RS,WH*.
- Haubenlerche** (*Galerida cristata*): In ASL an 5 Stellen zur Brutzeit anwesend *UN,WB*. Sonst nur noch aus SFT-Nord am 07.06. 1Ex. Futter suchend *JL*.
- Heidelerche** (*Lullula arborea*): März und April COSEE ca. 10 Reviere (sM) im Böschungsbereich *UN*.
- Feldlerche** (*Alauda arvensis*): Winter. 30.01. Seegelände bei ASL 1Ex. *UN*.
- Haussperling** (*Passer domesticus*): Exotische Aussehen hatte ein Ex. am 04.10. in Egel, da cremefarbig mit weißen Handschwingen *JL*.
- Feldsperling** (*Passer montanus*): 14.03. und 24.05. ca. 10BP Hecklingen Weinbergsgrund in Kalksteinwand brütend *MÜ*, 07.04. MATEI noch ca. 50Ex. im Trupp *WH*.
- Bachstelze** (*Motacilla alba*): Winter: 01.01. 1Ex. im NSG „Wilslebener See“ *WB*, 20.02. ASL 1Ex. überfliegend *WB*, 17.12. 8Ex. suchen bei Frose auf einer Eisfläche nach Nahrung *UN*. Ihre 3. Jahresbrut füttert am 13.08. in Unseburg ein BP *JL*.
- Schafstelze** (*Motacilla flava*): Sehr früh: 10.03. ATTEI 1Ex. *FK,MÜ,RS,WH*.
- Gebirgsstelze** (*Motacilla cinerea*): Brutzeitdaten von der Eine und Wipper. 09.06. Bodwehr Rotheförde 1M *FG*.
- Baumpieper** (*Anthus trivialis*): 1. sM am 15.04. COSEE 5Ex. *UN*.
- Wiesenpieper** (*Anthus pratensis*): Winter: 10.01. ca. 30Ex. auf einem Rapsfeld bei ASL *WB*.
- Bergpieper** (*Anthus spinoletta*): 16.12. ATU 6Ex. rastend *JL*.
- Bergfink** (*Fringilla montifringilla*): 1. Beobachtung im Herbst am 14.10. bei Frose 1Ex. *WB*.
- Berghänfling** (*Carduelis flavirostris*): Nur 10.01. bei ASL 9Ex. *WB*.
- Bluthänfling** (*Carduelis cannabina*): 10.01. bei ASL ca.100Ex. im Trupp *WB*.
- Gimpel** (*Pyrrhula pyrrhula*): Brutzeit: 23.06. Einetal bei ASL 1Paar *UN*. *WB* hörte am 31.10. neben „Normal-rufern“ auch zwei „Tröter“.
- Grünfink** (*Chloris chloris*): Jahresvogel. Im Winter Trupps bis max. ca. 150Ex. am 18.11. Seegelände bei ASL *WB*.
- Rohrhammer** (*Emberiza schoeniclus*): Anfang Oktober rasteten am MATEI >100Ex. in den Salzaster/Melde-Beständen *MÜ,UN,WH*.
- Grauhammer** (*Miliaria calandra*): Im Seegelände ASL bildete sich eine Schlafgemeinschaft im Schilf (Jan./Feb.), max.: 30.01. ca. 35Ex. einfallend *UN*. Brutbestände: 05.05. 9sM COSEE *WB*.

Literatur:

DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. – APUS 11, Sonderheft: 1-46.

Aus meinem ornithologischen Tagebuch 2007

von JÜRGEN ADLER

Rückblickend fanden sich in meinem ornithologischen Tagebuch für das Jahr 2007 einige interessante Eintragungen, die nachstehend wiedergegeben werden sollen:

Waldohreule: In meinem Heimatort Neundorf befinden sich in einer Entfernung von ca. 200 m zwei regelmäßig besetzte Schlafplätze. Diese kontrollierte ich wöchentlich. Der Schlafplatz an der ehemaligen Kinderkrippe war am Jahresanfang überwiegend von vier bis sechs Exemplaren und der an der Wilhelmstraße von weniger Vögeln besetzt. Ab Herbst 2007 waren die Schlafplätze wieder besetzt. Am 16.11.07 zählte ich an der alten Kinderkrippe neun Vögel und in der Wilhelmstraße sieben Vögel.

Silberreiher: Nach Information meines Sohnes Frank beobachtete dieser am 27.01.07 vier Silberreiher an der Mühlwipper bei Warmsdorf. Ich selber hatte das Glück, fünf Silberreiher am 04.02.07 an den Athenslebener Teichen zu beobachten.

Goldammer: Am 29.01.07 in den Wiesen zwischen Neundorf und Hecklingen 40 Goldammern.

Bienenfresser: Die Bienenfresser der kleinen Kolonie bei Osmarsleben beobachtete mein Sohn Frank regelmäßig ab dem 21.05.07. An diesem Tag flogen sechs Exemplare über den Ort, einen Tag später sah er vier. Am 13.08.07 zählte ich 16 Bienenfresser, welche über ein abgeerntetes Rapsfeld flogen bzw. auf einem Birnbaum ruhten.

Waldwasserläufer: Am 25.07.07 sah ich erstmalig einen Waldwasserläufer an der Liethe bei Rathmannsdorf.

Kranich: Der herbstliche Kranichzug setzte offensichtlich am 06.10.07 ein. Nachmittags sah ich erstmals vier Formationen mit insgesamt 380 Vögeln, welche aus Richtung Nord in Richtung Südwest flogen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [52_2008](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Ornithologischer Jahresbericht 2007 für den Naturräume um Aschersleben und Staßfurt \(ehemaliger Landkreis Aschersleben-Staßfurt\) 1-8](#)