

5) *Calosphaeria* Tul. mit 14 Arten, darunter neu:
C. corylina, *C. villosa*, *C. myriospora*, *C. jungens*, *C. annexa*
(= *C. biformis* Tul. Carp. ex p.)

Fam. III. *Valseae* Nitschk.

Pyrenomycetes stromatici, compositi, stromate diatypeo vel valseo, spermatiis in spermogoniis gerenatis. — *Mycelium byssinum, intracorticale vel superficiale, in plerisque aegre perspicuum.* Stromata utriusque indolis ligno vel cortici immersa, mox libera vel erumpentia ac nigricantia mox peridermio tecta et a matricis substantia parum vel vix mutata formata eique concoloria vel fere oblitterata, parte immersa nigro-limitata vel immarginata. *Stroma diatypeum plerumque late effusum, indeterminatum, pilisconidiferis in nonnullis villosum, nunc plus minus emersum, crustaeforme, nunc cum substrato omnino coalitum;* stroma valseum conicum, depresso vel truncatum. *Spermogonia depresse conica vel subglobosa, uni-vel multilocularia, locellis radiatim vel sine ordine dispositis, intus hymenio spermatifero undique vestitis, poro vel rimula unica vel pluribus dehiscentia, immersa, tecta ac erumpentia, rarissime exserta.* Spermatia cylindrica vel ovata, minima, curvula vel recta, hyalina vel dilute varieque colorata, adglutinata, saepissime in cirrhos vel glebas tandem eructata. *Perithecia nigricantia, globosa, ovata vel oblonga, collis brevissimis vel plus minus elongatis ostiolisque obtusis vel incrassatis, liberis vel conjunctis, exstantibus instructa, in stromate diatypeo concentrica, sparsa vel dense congregata, monosticha, rarius polysticha;* in valseo symmetrica, nunc sine ordine stipata vel monosticha, nunc in orbem instructa, circinantia. Asci clavati vel cylindrici, sessiles vel pedicellati, octo-rarius tetra-vel polyspori, in nonnullis paraphysibus obvallati. Sporae monostichae, distichae vel conglobatae, cylindricae, ovoideae vel fusiformes, rectae vel curvatae, unicellulares, transversim septatae vel muriformi-multicellulares, hyalinae, dilute fuscescentes vel nigricantes.

Der wesentliche Charakter dieser Familie besteht in dem Vorkommen von Spermogonienfrüchten neben den Perithecien bei allen hierher gehörenden Formen. Sie ist zugleich eine der formenreichsten unter den Kernpilzen.

(Schluss folgt.)

Die Diatomeen der ostfriesischen Inseln und Küsten. Gesammelt, präparirt und herausgegeben von C. E. Eiben. Erste Dec. Aurich, 1870. Preis 1½ Thlr.

Inhalt: 1) *Melosira nummuloides* Ag. 2) *Surirella Gemma* Ehrb. und *Pleurosigma angulatum* Sm. 3) Diatomeen-Aufsammlung, bestehend aus *Epithemia ventricosa* Kg.,

Synedra Smithii Ralfs, *Syn. tabulata Kg.*, *Nitzschia hungarica Grun.*, *Cyclotella Meneghiniana Kg.* 4) *Epithemia constricta Bréb.* 5) *Achnanthes longipes Ag.* 6) *Nitzschia Sigma Sm.* 7) Diatomeen-Aufsammlung, bestehend aus *Navicula salinarum Grun.*, *Nav. protracta Grun.*, *Nav. sclervicensis Grun.*, *Surirella ovata Kg.*, *Nitzschia hungarica Grun.*, *Amphiprora duplex Donk.* 8) Diatomeen-Aufsammlung, bestehend aus *Navicula amphisbaena var. β Sm.*, *Nav. sclervicensis Grun.*, *Surirella ovata Kg.*, *Amphiprora duplex Donk.*, *Nitzschia Sigmatella Greg.*, *Pleurosigma Fasciola Sm.*, *Tryblionella apiculata Greg.* 9) Diatomeen-Aufsammlung, bestehend aus *Mastogloia exigua Lewis*, *Synedra Smithii Ralfs*, *Syn. affinis Kg.*, *Navicula peregrina (Ehrb.?) Sm. var.*, *Nitzschia hungarica Grun.* 10) *Podosphenia Pappeana Grun.*

Die Präparate sind äusserst sauber, stehen den Eulensteinschen würdig zur Seite, mit denen sie das Format und rundes Deckglas gemein haben, die Aufbewahrung ist jedoch eine andere. Sie liegen nämlich je 5 auf einem sehr starken, schwarz überzogenem Pappdeckel, sind unter sich durch Querleisten von Pappe getrennt und werden durch ein breites, straff angezogenes Band festgehalten, so dass die beiden Deckel wie ein Buch zusammengeschlagen werden können.

Wir wünschen dem geehrten Herausgeber eine genügende Theilnahme, Gesundheit und Ausdauer, um die Sammlung dem erwünschten Ziele so nahe als möglich zu führen.

L. R.

Die Brack- und Salzwasseralgen der ostfriesischen Inseln und Küsten. Gesammelt und herausgegeben von C. E. Eiben. Erste Decade. Aurich, 1870. Preis 1 Thaler Preuss. Cour.

Inhalt: *Lyngbya aeruginosa Ag.*, *Ectocarpus gracillimus Kg.*, *Corticularia brachiata Kg.*, *Enteromorpha compressa Grev. var. capillacea Kg.*, *Phycophila fucorum Kg.*, *Himanthalia lorea Lyngb.*, *Callithamnion Grevillei Harv.*, *Porphyra vulgaris Ag.*, *Polysiphonia fastigiata Grev.*, *Polys. nigrescens Harv.* — Die Exemplare in dem uns vorliegenden Hefte sind durchaus tadellos.

L. R.

Berichtigung.

Hedwigia 1870 Nr. 12 Seite 180 Zeile 7 v. o. lies statt „männliche Blüthe“ eine zweite weibliche Blüthe.

Redaction:

L. Rabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag

von C. Heinrich in Dresden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [10_1871](#)

Autor(en)/Author(s): Eiben Christian Eberhard

Artikel/Article: [Die Diatomeen der ostfriesischen Inseln und Küsten. 15-16](#)