

unter *Sarcoscyphus adustus*, *sphacelatus*, *densifolius*, *Scapania subalpina*, *tyrolensis* und *Jg. Hübeneriana* versteht.

Aufgeführt sind in dieser Schrift: von *Sarcoscyphus* 6 Arten, von *Alicularia* 2, *Plagiochila* 2, *Scapania* 11, *Jungermannia* 54, *Sphagnoecetis* 1, *Lophocolea* 4, *Harpanthus* 1, *Chiloscyphus* 3, *Geocalyx* 1, *Calypogeia* 1, *Lepidozia* 1, *Mastigobryum* 2, *Trichocolea* 1, *Sendtnera* 1, *Ptilidium* 1, *Radula* 1, *Madotheca* 3, *Frullania* 3, *Lejeunia* 3, *Fossombronia* 1, *Mörckia* 1, *Pellia* 2, *Blasia* 1, *Aneura* 4, *Metzgeria* 2, *Marchantia* 1, *Preissia* 1, *Sauteria* 2, *Fegatella* 1, *Reboulia* 1, *Grimaldia* 1, *Duvalia* 1, *Fimbriaria* 1, *Anthoceros* 2, *Riccia* 3.

Von Seite 29—37 sind die Familien, Gattungen und Arten der Lebermoosflora tabellarisch zusammengestellt.

Die vielen Druckfehler sind nicht gerade sinnstörend, verletzen aber doch das Auge.

Dr. Gottsche.

C. A. J. A. Oudemans, *Beredeneerde Catalogus van de eerste toalf Afleveringen van het „Herbarium van Nederlandsche Planten“*.

Unter diesem Titel hat Herr Dr. Oudemans ein Verzeichniss derjenigen Niederländischen Pflanzen (Phanerogamen und Kryptogamen) publicirt, welche er seit 1867 in Lieferungen von 50 Nrn. herausgegeben hat. Von Kryptogamen finden sich unter den bisher erschienenen 600 Nummern 183 Species, nämlich *Lycopodiaceen* 1, *Equisetaceen* 4, *Filices* 9, *Musci* 39. Hierunter zumal für jenes Florengebiet bemerkenswerth: *Barbula marginata* Br. E., *Hypnum elodes* Spruce.

Hepaticae 5. Darunter *Reboulia hemisphaerica* und *Targiouia Micheli* Corda von grossem Interesse.

Fungi 101. *Lichenes* 17. *Algen* 4.

Den seltneren Arten ist der Fundort beigegeben.

L. R.

Arbeiten über Sporenpflanzen im XX. Bande (1870) der Abhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft zu Wien. (Fortsetzung.)

Pilobolus microsporus Klein n. sp. Die Fruchträger-Anlagen bilden sich im Verlaufe der Hauptäste und werden im fertigen Zustande in der Regel von zwei obkonischen Mycelium-Erweiterungen getragen. Stiel des Trägers nach oben nicht allmähig in die Anschwellung übergehend, sondern von derselben in einem Winkel abgesondert; meist setzt sich der Stiel auch unten an die Anlage in einem Winkel an. *Columella* niedrig, ziemlich flach ge-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [10_1871](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [C. A. J. A. Oudcmans, Beredeneerde Catalogus van de eerste toaalf Afleveringen van het "Herbarium van Nederlandsche Planten" 185](#)