

antheridiis 1—2-cellularibus in ramulis propriis sub setis terminalibus sitis, antherozoidis binis.

Crassit. cell. veget. 12—14 μ ; altit. par ad $\frac{1}{3}$ major;
 „ oogon. 20—24 „ „ 33—36 μ ;
 „ cell. anther. 8—9 „ „ 6—9 „.

L. Rabenhorst, Lichenes europaei exsiccati. Die Flechten Europa's unter Mitwirkung mehrerer Freunde der Botanik gesammelt und herausgegeben. Fasc. 34 No. 901 bis 925. Dresden, 1872.

Enthält: *Lecanora Hageni* Ach. var. *sarcopis* Schaer. exs. (excl. caet. synonym.) *Parmelia fuliginosa* Fr. *Physcia villosa* Dub. *Physcia decipiens* Arn. exs. *Biatora cinnabarina* (Smrf.) Fries. *Biatorina diluta* (Pers.) Th. Fr. Lich. Arct. (Syn. *Peziza diluta* Pers. Syn. Lichen. pineti Schrad. Achar. *Biatorina pineti* Massal.) *Parmelia caesia* (Hoffm.) Ach. var. β . *albinea* Ach. *Parmelia speciosa* Ach. Univ. *Synechoblastus* (*Lethagrium*) *conglomeratus* (Hoffm.). Exs. Hepp. no. 650, Zw. 167. Malbranche Lich. Norm. 52. Minime = *Lethag. conglomeratum* exs. Anzi lich. it. rar. 5. Massal. 112. Hepp. 476. Rabenh. 254, cujus syn. *Collema verruculosum* Hepp. in Müller. princ. p. 86. Cfr. Arnold in Flora 1867 p. 135.) *Parmelia tribacia* Ach. Univ. (sub *Lecanora*.) *Sticta sylvatica* (L.) Ach. *Nephroma expallidum* Nyl. *Peltigera scabrosa* Th. Fries. *Parmelia* (*Imbricaria*) *perlata* (L.). *Blastenia sinapisperma* DC. *Placodium* (*Amphiloma*) *muro-rum* (Hoffm.) Nyl. * *tegulare* Ehrh. *Lecanora intumescens* (Reb.) Rab. *Scoliciosporum lecideoides* Hazsl. *Bryopogon Fremontii* Tuckerm. Suppl. *Cetraria hiascens* (Fr.) Th. Fries. *Aspicilia cinerea* (L.). *Pyrenodesmia fulva* (Anzi) Rehm. *Parmelia alpicola* Th. Fr. *Acarospora chlorophana* (Wahlbg.) *Acarospora badiofusca* (Nyl.) Th. Fr.

Gesammelt wurden diese 25 Nummern von den Herren Fr. Arnold, J. Barth, Carestia, Hellbom, Marcucci, Poetsch, Rehm und Stizenberger.

Thümen, F. von, Fungi austriaci exsicc. Cent. III. Teplitz, 1872.

Diese Centurie der interessanten Sammlung enthält an seltneren Sachen ausser einigen weniger häufigen *Agaricis*, *Clavaria fusiformis* Sow., *Corticium flocculentum* Fr., *Hydnum fasciculare* Fr., *Hypoderma nervisequum* DeC., *Melasmia Berberidis* Thm. et Wint., ein Pilz, über dessen systematische Stellung ich noch zweifelhaft bin, weshalb der Name nur für einstweilen gelten möge; der Bau, der Habitus und die Wachstumsweise der Perithechien scheint mir zu *Melasmia*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [11_1872](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [L. Kabenborst, Lichenes europaci exsiccati. Die Flechten Europa's unter Mitwirkung mehrerer Freunde der Botanik gesammelt und herausgegeben. Fasc. 34 No. 901 bis 925. Dresden, 1872. 91](#)