

chum stramineum Hornsch., O. pulchellum Sm., O. leiocarpum Br. et Sch., Splachnum ampullaceum L., Webera nutans var. longiseta Sch., W. annotina Sch., Bryum erythrocarpum Sch., Mnium affine Bl., Mn. insigne Mitt., Mn. hornum L., Polytichum strictum, Leskea polycarpa Ehrh., Eurhynchium Vaucheri var. fagineum H. Müll., E. Stokesii Sch., Rhynchostegium Teesdalii Sch., Rh. murale Sch., Plagiothecium Schimperii var. nanum Mild., Amblystegium radicale Sch., Hypnum chrysophyllum Brid., H. stellatum Schreb., H. fluitans var. stenophyllum Sch., H. cupressiforme var. filiforme Sch., H. arcuatum Lindb.

Fasc. IV. No. 151—200.

Ephemerum serratum Hpe., Ephemerella recurvifolia, Sch., Dicranella Schreberi Sch., D. cerviculata var. pusilla Sch., Fissidens taxifolius Hedw., Seligeria recurvata Br. et Sch., Eucladium verticillatum Br. et Sch., Distichium capillaceum Br. et Sch., Leptotrichum flexicaule var. densum Br. et Sch., Trichostomum mutabile Br., Barbula recurvifolia Sch., B. inclinata Sch., Sch., B. sinuosa Wils., B. muralis Hedw., B. intermedia Brid., B. intermedia var. calva Dur., Cinclidotus fontinaloides P. B., Grimmia apocarpa var. rivularis Br. et Sch., Gr., Schulzii Brid., Gr. commutata Hüb., Rhacomitrium protensum A. Br., R. heterostichum var. alopecurum Br. et Sch., Zygodon viridissimus Brid., Orthotrichum anomalum Hedw., O. obtusifolium Schrad., R. affine Schrad., O. speciosum Nees., Schistostega osmundacea W. et M., Funaria hibernica Hook., Webera albicans Sch., Bryum pallescens Sch., Mnium punctatum Hedw., Philonotis fontana Brid. Polytichum juniperinum Hedw., Neckera complanata Br. et Sch., Thuidium delicatulum Sch., T. abietinum Sch., Cyandrothecium concinnum Sch., Camptothecium lutescens Sch., C. nitens Sch., Eurhynchium striatulum Sch., E. crassinervium Sch., Rhynchostegium tenellum, Thamnum alopecorum Sch., Hypnum uncinatum Hedw., H. commutatum Hedw., H. molluscum var. gracile Boul., H. purum L., H. stramineum Dicks., Andreaea petrophila var. homomalla Sch.

### Zur Verbreitung der Puccinia Malvacearum.

Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Vito Beltrani-Pisani in Rom an die Redaktion der Hedwigia ist die Malven-Puccinia seit einem Jahre auch in Italien eingewandert. Sämmtliche Malven in der Umgegend von Rom sind davon befallen. Die sehr reichlich eingesandten Exemplare sind an der Via Appia gesammelt und werden in der 20. Centurie zur Vertheilung kommen. L. R.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [13 1874](#)

Autor(en)/Author(s): R. L.

Artikel/Article: [Zur Verbreitung der Puccinia Malvacearum. 191](#)