

Pilz zu suchen ist. Er erhielt den Namen *Harposporium Anguillulae* Lohde und dürfte im System in der Nähe von *Fusisporium* seinen Platz finden.

Bayreuth.

Baron Thümen.

Synopsis Helvellaceorum Pileatorum

auct. M. C. Cooke. M. A. etc.

Ord. **Helvellacei**. Fries S. V. S. p. 346.

Sect. **Pileati**.

Receptaculum pileatum clavatum capitatum vel inflatum.

Gen. I. **Morchella** (Dill) Fr. S. M. ii. 5.

A. Adnati.

- Sp. 1. *M. esculenta* Pers. Syn. 618.
var α *rotunda*. Pers. l. c.
" β *vulgaris*. Pers. l. c.
" γ *fulva* Fr. S. M. ii. 7.
" δ *conica* Fr. (*M. conica*. Pers.)
" 2. *M. foraminulosa* Schwz. Amer. Bor. No. 730.
" 3. *M. dubia* Mont. Can. Crypt. t. 4. f. 4.
" 4. *M. deliciosa* Fr. S. M. ii. 8.
" 5. *M. elata* Fr. l. c.
" 6. *M. pubescens* Pers. M. E. 1. 207.
" 7. *M. procerosa* Krombh. Schw. t. 19. f. 8.
" 8. *M. hiemalis* Balb Misc. t. 11. f. 4.
" 9. *M. crassipes* Pers. Syn. p. 621.
" 10. *M. tremelloides* Dl. Fl. fr. ii. 215.

B. Liberi.

- Sp. 11. *M. patula* Pers. syn. p. 619.
" 12. *M. semilibera* DC. Fl. fr. ii. 212.
" 13. *M. gigaspora* Coche Trans. Bol. Soc. Edin.
x. 442.
" 14. *M. bohémica* Kromb. Schw. t. 15. f. 1.
" 15. *M. gigas* Pers. Syn. p. 619.
" 16. *M. rimosipes* DC. Fl. fr. ii. 214.
" 17. *M. undosa* Pers. Syn. p. 620.

Gen. II. **Gyromitra**. Fr. S. V. S. p. 346.

- Sp. 1. *G. esculenta*. Fr. l. c.
" 2. *G. curtipes*. Fr. Atl. o. gift. Svamp. t. IV.
" 3. *G. suspecta* (Kromb.) Fr. l. c.
" 4. *G. labyrinthica*. Fr. in Vet. Ak. Forh. 1871.
173.
" 5. *G. caroliniana*. Fr. (*Morch. Caroliniana*. Bosc.)

Gen. III. **Helvella** (L.) Fr. S. M. ii. 13.

A. **Mitrae**.

- Sp. 1. *H. crispa* Fr. l. c.
" 2. *H. lacunosa* Afz. in V. A. H. 1873. p. 503.
" 3. *H. sulcata* Afz. in V. A. H. 1785. p. 305.
var. *pallescent* Schaeff. Jcon. t. 322.
" 4. *H. fastigiata* Kromb. Schw. t. 21. f. 9.
" 5. *H. inflata* Cum. in Act. Taur. 1805. 250.
" 6. *H. gigas* Kromb. Schw. t. 20. f. 1.
" 7. *H. infula* Fr. S. M. ii. 17.
" 8. *H. monachella* Fr. S. M. ii. 18.
" 9. *H. albipes* Fckl. Sym. Myc. 334.
" 10. *H. rhodopoda* Kromb. Schw. t. 19. f. 11.
" 11. *H. tremellosa* Kromb. Schw. t. 21. f. 7.
" 12. *H. tabacina* Mont. Fl. Chil. VII. 396.

B. **Pezizoidae**.

- Sp. 13. *H. costata* Schwz. Car. Fung. p. 88.
" 14. *H. Ludovicae* Kick. Fl. Fland. i. 502.
" 15. *H. atra* König ap. Fries. l. c.
" 16. *H. pulla* Holms. Ot. ii. t. 26.
" 17. *H. elastica* Bull. t. 242.
" 18. *H. ephippium* Lev. Ann. Sc. Nat. 1841. t. 15. f. 7.
" 19. *H. klotschiana* Corda in Sturm. t. 57.
" 20. *H. fistulosa* A. & S. Consp. 299.
" 21. *H. venosa* Fr. S. M. ii. 24.

C. **Biverpae**.

- Sp. 22. *H. verpoides* Fr. s. v. v. p. 346.

Gen. IV. **Verpa** (Siv.) Fr. S. M. ii. 23.

- " 1. *V. atro-alba*. Fr. l. c.
" 2. *V. digitaliformis*. Pers. M. E. p. 202.
" 3. *V. Krombholzii*. Corda. Anl. 98.
" 4. *V. conica* (Sw.) Fr. l. c.
" 5. *V. grisea*. Corda in Sturm iii. t. 6.
" 6. *V. agaricoides*. Pers. M. E. i. 203.
" 7. *V. patula*. Fr. S. M. ii. p. 25.

Gen. V. **Cidaris**. Fr. S. V. S. p. 347.

- Sp. 1. *C. Caroliniana*. Fr. l. c.

Gen. VI. **Spathularia**. Pers. (Fr. S. V. S. 347).

- Sp. 1. *S. flavida*. Pers. Comm. p. 34.
var α *rufa*. Nees. Syst. f. 156.

Gen. VII. **Mitrula**. Fr. Epicr. p. 583.

- Sp. 1. *M. cucullata*. Fr. El. p. 233.
" 2. *M. fusispora*. Pr. in Linn. 1851. p. 147.
" 3. *M. paludosa*. Fr. S. M. 491.
" 4. *M. lutescens*. Berk. in litt.

Flavida, subviscosa, stipite solido squamoso ($1\frac{1}{2}$ —2 unc.) sporidiis oblongis, leniter curvulis, nucleatis (0,35 mm.) — ad terram. — Carolina, Amer. Bor.

- Sp. 5. *M. globosa*. Fr. Epicr. p. 584.
" 6. *M. alba*. Sm. in Grevillea i. 136.
" 7. *M. inflata*. Fr. El. p. 234.
" 8. *M. crispata*. (Spathulea. Fr. S. V. S. 347.)
" 9. *M. exigua*. Fr. Epicr. p. 584.
" 10. *M. lutea*. Mont. Ann. Sc. Nat. 1855. 91.
" 11. *M. vinosa*. Berk. Flor. Tasm. ii. 273.
" 12. *M. elegans*. Berk.

Clavula parva, obovata; stipite longissimo. (3. unc.) Ascis clavatis. Sporidiis oblongis — ad terram. — Amer. Bor.

- Sp. 13. *M. Berterii*. Mont. Fl. Chil. 397, t. 8.

Gen. VIII. **Leotia**. (Hill.). Fr. S. M. ii. 25.

- " 1. *L. amara*. Fr. S. M. ii. 27.
" 2. *L. circinans*. Pers. Comm. p. 51.
" 3. *L. lubrica*. Pers. Syn. p. 613.
" 4. *L. marcida*. Pers. Syn. p. 613.
" 5. *L. lutea*. (Vibrissea lutea. Peck. l. c.)
" 6. *L. chlorocephala*. Schwz. Fung. Car. 33.
" 7. *L. viscosa*. Fr. S. M. ii. 30.
" 8. *L. atro-virens*. Pers. M. E. p. 202.
" 9. *L. atra*. Weinm. Syll. ii. 109.
" 10. *L. brunneola*. Berk. Ceylon Fungi. No. 918.
" 11. *L. infundibuliformis*. Schwz Amer. Bor. No. 742.

Gen. IX. **Geoglossum**. (Pers.). Fr. Epic. 582.

A. Sporidiis hyalinis.

- Sp. 1. *G. atropurpureum*. Pers. Obs. t. 3. f. 5.
" 2. *G. viride*. (Pers.). Fr. Epicr. 582.
" 3. *G. olivaceum*. Pers. obs. t. 5. f. 7.
" 4. *G. Hookeri* n. s. (*G. glabrum*. in Herb. Hook.)

Glabrum, siccum, nigrum ($1\frac{1}{2}$ unc.). Clavula compressa. Ascis clavatis. Sporidiis linearibus obtusis, hyalinis (0,25 mm.)

Paraphysibus aliis linearibus hyalinis aliis latis ascis magnitudinis, superne brunneis. — Hab. ignotis.

- Sp. 5. *G. microsporum*. C. et P. — Peck. l. c.
 „ 6. *G. luteum* Peck. in 24th. Report. N. Y. Mus.

B. Sporidiis coloratis.

- Sp. 7. *G. glutinosum*, (Pers.) Fr. Ep. p. 582.
 „ 8. *G. Peckianum* n. s. (*G. glutinosum*. Peck.
 in 25th. Report. N. Y. Mus.) Sporidiis
 15-septatis ($\frac{1}{2}$ mm.).
 „ 9. *G. glabrum*. Pers. Obs. t. 3. f. 4.
 „ 10. *G. australe* n. s.

Glabrum, siccum, brunneo-nigrescens; clavula compressa stipite distincto, subsquamuloso: Sporidiis linearibus 3—7 septatis, brunneis ($\frac{1}{2}$ mm.) inter Muscos. Tasmania.

- Sp. 11. *G. hirsutum*. (P.) Fr. Epicr. p. 583.
 „ 12. *G. simile*. Peck. in 25th. Report. N. Y. Mus.
 „ 13. *G. Mülleri*. Berk. in litt.

Glabrum, subviscosum, nigrescens: clavula compressa distincta. Sporidiis 3 (raro 7) septatis, brunneis (06—07 mm.) paraphysibus numerosis, leniter septatis, superne fuscescens: tubis adglutinatis — in pratis graminosis. — Australia.

- Sp. 14. *G. difforme*. Fr. Epicr. p. 583.
 „ 15. *G. viscosum*. (P.) Fr. Epicr. p. 583.

C. Sporidiis incertis.

- Sp. 16. *G. farinaceum*. Schwz. Car. No. 1116.
 „ 17. *G. rufum*. Schwz. Amer. Bor. No. 1011.
 „ 18. *G. rugosum*. Lasch. in Kl. Hb. Myc. 816.
 London, November 1874.

Repertorium.

C. Kalchbrenner, Icones selectae Hymenomycetum Hungariae. Fasc. II. No. 22—50. Tab. XI—XX. Buda pestini, 1874.

Ogleich E. Fries zu der Editio altera s. Epicrisis das Manuscript dieses Heftes benutzt und die neuen Arten bereits dort ihre Aufnahme fanden, so will ich doch nicht unterlassen, den Inhalt dieses Heftes hier zu verzeichnen und zugleich einige Irrthümer die im Manuscript vielleicht durch Schreibfehler entstanden, in Fr. Epicr. ed. altera übergegangen sind, berichtigen.

No. 22. *Ag. Plutens drepanophyllus* Schulzer. Die Diagnose fehlt in Fries, weil ihm die Abbildung erst später

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [14_1875](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Synopsis Helvellaceorum Pileatorum 7-10](#)