

pulver bedeckt. Es ist mir leider nicht gelungen, dies Exemplar genauer zu untersuchen, und ich bin gar nicht im Stande zu urtheilen, zu welcher Art oder Gattung, der Parasit, der sie getödtet, gehört haben mag.

Es wird mir also wohl erlaubt sein, die bis jetzt bekannten Gattungen der Entomophthora in folgende Gruppen zu vertheilen:

A. Astromaticae.

a. Ohne Stroma.

I. Ohne Haftorgane.

- 1) Ent. Muscae.
- 2) Ent. Aphidis. (Ent. Planchoniana Cornu).
- 3) Ent. Aulicae (?)*)

II. Mit Haftorganen.

- 4) Ent. radicata.

B. Stromaticae.

b. Mit Stroma.

I. Ohne Haftorgane.

- 5) Ent. conglomerata. Soror.

II. Mit Haftorganen.

- 6) Ent. rimosa. Soror.

N. Sorokin.

Lichenes Mexicani,

quos legit 1875 R. Rabenhorst.

- 1) Graphis Afzelii Ach.
- 2) Trypetelium cruentum Mont. Syll. — (Bisher nur aus franz. Guyana bekannt.)
- 3) Parmelia steril, nicht mit Sicherheit zu bestimmen.
- 4) Pyxine soorediata Fr.
- 5) Nihil!
- 6) Pyrine cocoös (Sw.)
- 7) Pertusaria porinella Nyl.
- 8) Steril. Wahrscheinlich Verrucaria aurantiaca Fée.
- 9) Verrucaria fetivica Krphb. sp. n. Thallus pallide olivaceus, tenuissimus, laevis, continuus, irregulariter ut videtur-dilatatus; apothecia atra, minuta (lat. circ. 0,07—08 mm.), numerosa, solitaria vel non raro 2—3 confluentia plano-convexa aut depressiuscula semi-immersa et parum prominula, ostiolo minutissimo, subtilissime papillato, perithecio integro; sporae 8nae, ellipsoideae, 4-locales, olivaceae, tandem obscurifuscae, long. 0,019—022, crass. 0,010—011 mm.; para-

*) Nur aus Just Jahresbericht. I. 5. 51. bekannt.

physes grumosae, indistinctae. Corticola. Affinis Verucariae approximanti Krphb. e Brasilia, sed haec non-nihil major et sporis citrifirmibus differt.

- 10) *Lethagrium nigrescens* Mass. (Dabei ein steriles *Lep-
togium*.)
- 11) *Lecanora subfusca* Ach. form.
- 12) *Callopisma luteo-album*.
- 13) *Thelotrema Wightii* (Tayl.) Nyl.
- 14) *Collema byssinum* Ach.
- 15) *Coccocarpia molybdea* Pers.
- 16) *Physcidia*, die Art nicht mit Sicherheit zu bestimmen
- 17) *Sphinctrina vel Calicium*. Non satis evolutum!
- 18) *Porina marginata* Fée.
- 19) *Pyxines eocöes* (Sv.).
- 20) a. *Gyrostomum scyphuliferum*, b. *Graphis leiogram-
modes* Krph., c. *Graphis intricans* Nyl., d. *Glyphis
eicatricosa* Ach.
- 21) a. *Graphis leiogrammodes* Krph., b. *Graphis patellula*
Fée, c. *Graphis intricans* Nyl., d. *Trypethelium scoria*
Fée.
- 22) *Trypethelium Sprengelii* Ach.
- 23) *Ramalina rigida* Ach.

Dr. v. Krempelhuber.

Unter den auf der Insel Carmen (im Golf von Mexico)
gesammelten Moosen fand Dr. Hampe folgende nennens-
werthe:

- 1) *Calymperes Richardi* C. M.
- 2) *Syrrhopodon Hobsoni* Hook. et Grev.
- 3) *Octoblepharum albidum* Hedw.
- 4) *Leskea longirostris* Brid.
- 5) *Hypnum planum* Brid.
- 6) „ *radiculosum* C. M.
- 7) *Frullania hians* L. et Lindbg.
- 8) *Lejeunea Magnoliae* Gottsche.

Notabene. Die zahlreichen Moosalgen und Pilze konnten
bis jetzt noch nicht alle mit Sicherheit bestimmt werden.

R. R.

Mycologisches von Dr. Sauter.

- 1) *Peziza verpioides* Saut. sp. n.

*P. pileo disciformi, rotundo, flavido, 2''' lato, margine
integro, revoluta, disco siceo rugoso, subtus laevi, pallido;
stipite pollicari, dilatato, flexuose contorto, nudo, fusco, 1'''
crasso.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [15_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Krempelhuber August von

Artikel/Article: [Lichenes Mexicani 148-149](#)