

N^o 12.

HEDWIGIA.

1880.

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Monat December.

Inhalt: v. Thümen, Reliquae Libertianae. — Richter, Zur Frage über die möglichen genetischen Verwandtschaftsverhältnisse einiger einzelligen Phycochromaceen. (Forts. und Schluss.) — Repertorium: Cohn, Beiträge zur Biologie der Pflanzen. III. Bd. 2. Heft. — Eingegangene neue Literatur und Sammlungen. — Anzeige.

Reliquae Libertianae.

Von F. von Thümen.

Durch die Liebenswürdigkeit und Liberalität des Herrn Professor Dr. Crépin, Director des botanischen Gartens zu Brüssel, bin ich in Besitz des weitaus grössten Theiles des mykologischen Nachlasses der berühmten Botanikerin Mademoiselle M. A. Libert gelangt. Es besteht dieser Nachlass aus einer sehr ansehnlichen Reihe von Species, welche in grosser Anzahl gesammelt wurden mit der Absicht, sie in den „Plantae cryptogamicae“ zu ediren, und weiter in einer bedeutenden Menge von Arten, welche nur in wenigen Exemplaren vorliegen. Die ersterwähnten Formen gelangen nach und nach in der von mir herausgegebenen „Mycotheca universalis“ zur Vertheilung.

Die Bestimmungen der, theils von der Sammlerin benannten, theils ohne Namen vorliegenden Pilze sollen in dieser Zeitschrift publicirt werden, theils aus Pietät gegen die hochverdienstliche, leider zu früh verstorbene Gelehrte, theils des allgemeinen Interesses wegen und endlich auch um dadurch wenigstens zum Theil die Schuld der Dankbarkeit für das sumtuose Geschenk des Belgischen Staats-Institutes abzutragen.

Ich beginne die Publikation heute mit dem ersten Hundert Species und werde, je nachdem die Bearbeitung fortschreitet, weitere solche Centurien folgen lassen.

Agaricus Lepiota Meleagris Sow. Brit. Fungi Tab. 171. — Fr. Hym. eur. p. 31.

Inter corticem coriarium. Aut. — Supl. No. 826.¹⁾

Obs. Annulus fugacissimus.

¹⁾ Sämmtliche Species wurden in der Umgebung von Malmedy (Rheinpreussen) gesammelt. — Die No. bezieht sich auf die Zahl, unter welcher die Art im Herbar

- Panus stipticus* Fr. Epicr. p. 399.
 In ramis aridis. Aut. — Supl. No. 836.
- Cantharellus lutescens* Fr. Epicr. p. 366.
 In terra nuda. — Supl. No. 839. (*Cantharellus undulatus* Fr.)
- Polyporus molluscus* Fr. Syst. mycol. I. p. 384.
 var. *epiphyllus* Thüm. — *Poria epiphylla* Pers.
 Ad folia putridissima et in Hypno vivo. — Supl. No. 593.
- Irpeex paradoxus* Fr. Epicr. p. 522.
 In Quercus cortice. — Supl. No. 863. (*Sistotrema digitatum* Pers.)
- Radulum orbiculare* Fr. El. fung. I. p. 149.
 In cortice, ut videtur Cerasi — Supl. No. 595.
- Phlebia merismoides* Fr. Syst. mycol. II. p. 427.
 In cortice emortuo — Supl. No. 988. (*Thelephora* sp.)
- Thelephora byssoides* Pers. Syn. fung. p. 577.
 Ad gramina, culmos etc. — Supl. No. 990.
- Thelephora sebacea* Fr. Epicr. p. 542.
 In muscis variis vivis. — Supl. No. 991.
- Stereum purpureum* Fr. Epicr. p. 548.
 Ad ramos aridos. — Supl. No. 992.
- Corticium giganteum* Fr. Epicr. p. 559.
 In Pini sylvestris Lin. cortice. — Supl. No. 983. (*Thelephora gigantea* Fr.)
- Corticium ochroideum* Fr. Epicr. p. 561.
 In foliis putridis Fagi sylvaticae Lin. — Supl. No. 985.
- Corticium incarnatum* Fr. Epicr. p. 564.
 In ramulis emortuis. — Supl. No. 989, 979.
- Corticium cinereum* Fr. Epicr. p. 563.
 In Syringae vulgaris Lin. ramis. — Supl. No. 987. (*Thelephora cinerea* Pers.)
- Corticium ochraceum* Fr. Epicr. p. 563.
 In arborum truncis emortuis. — Supl. No. 986.
- Corticium lacteum* Fr. Epicr. p. 560.
 In ramulis emortuis. — Supl. No. 596.
- Hirneola Auriculae* Judae Berk. Outl. fung. p. 289.
 In ramis Sambuci nigrae Lin. — Supl. No. 847. (*Exidia Auriculae* Judae Fr.)
- Puccinia Stellariae* Duby. Bot. gall. II. p. 887.
 Ad folia viva Stellariae Holosteae Lin. — Supl. No. 609b. (*Puccinia Lychnidearum* Lk.)
- Puccinia Glechomae* De C. Fl. franc. VI. p. 55.
 In Glechomae hederaceae Lin. foliis vivis. — Supl. No. 954.
- Puccinia graminis* Pers. Disp. fung. p. 39.
 Ad Aperaee Spicae venti Beauv. culmos aridos. — Supl. No. 953.
- Puccinia Galiorum* Lk. in Linné Spec. plant. c. Willd. VI. 2. p. 76.
 In foliis vivis Galii Molluginis Lin. — Supl. No. 951.
- Puccinia Nolitangeris* Cda. Icon. fung. IV. p. 16. Tab. 5. fig. 57.
 In foliis vivis Impatiensis Nolitangeris Lin. — Supl. No. 957.
- Puccinia Lapsanae* Fuck. Enum. fung. Nass. p. 13.
 Ad folia viva Lapsanae communis Lin. — No. 949. (*Puccinia Compositarum* Lk.)
- Puccinia calthaeicola* Schröt. in Cohn Beitr. z. Biol. d. Pf. III. p. 61.
 Ad Calthae palustris Lin. folia viva. — Supl. No. 946. (*Puccinia Calthae* Lk.)

- Puccinia Iridis* Wallr. sec. Rabh. Deutschl. Krypt. Fl. p. 23.
Ad folia viva *Iridis gramineae* Lin. — Supl. No. 958. (*Puccinia punctum* Lk.)
Obs. Stylo- et Teleutosporae.
Uromyces Orobi Fuck. Symb. mycol. p. 62.
In *Orobi tuberosi* Lin. foliis et caulibus vivis. — Supl. No. 956.
(*Puccinia Orobi tuberosi* Lib.)
Melampsora Euphorbiae Cast. Observ. II. p. 18.
Ad *Euphorbiae Helioscopiae* Lin. folia viva. — Supl. No. 1035.
(*Xyloma Euphorbiae* Lib.)
Triphragmium Ulmariae Lk. in Linné Spec. plant. c.
Willd. VI. 2. 84.
In foliis vivis *Spiraeae Ulmariae* Lin. — Supl. No. 961.
Aecidium Epilobii De C. Fl. franc. II. p. 238.
Ad *Epilobii montani* Lin. folia viva. — Supl. No. 428. (*Caeoma epilobiatum* Lk.)
Chaetomium elatum Knz. et Schm. Crypt. exsicc. no. 184.
In culmis et ligni reliquis putridis. — Supl. No. 446.
Sphaerella allicina Awd. in Rabh. et Gonnerm. Myc. europ.
V. p. 19.
In *Allii Porri* Lin. foliis subputridis. — Supl. No. 643. (*Sphaeria allicina* Fr.)
Rhaphidospora rubella Fuck. Symb. mycol. p. 125.
Ad caules herbarum putridarum. — Supl. No. 746. (*Sphaeria rubella* Pers.)
Melanospora chionea Cda. Icon. fung. I. p. 25. Tab. 7.
fig. 297. B.
Ad folia *Pini sylvestris* Lin. putrida. — Supl. No. 658.
Leptospora spermoides Fuck. Symb. mycol. p. 143.
In ligno putrido. — Supl. No. 755. (*Sphaeria spermoides* Hoffm.)
Pleospora Pisi Fuck. Symb. mycol. p. 131.
Ad caules aridos *Pisi sativi* Lin. — Supl. No. 734. (*Sphaeria Pisi* Fr.)
Pleospora herbarum Rabh. in Kl. Herb. mycol. II. no. 547.
In *Asparagi officinalis* Lin. caulibus emortuis. — Supl. No. 734^b.
Melanomma pulvis pyrius Fuck. Symb. mycol. p. 160.
Ad truncos et ramos siccos. — Supl. No. 742.
Bertia moriformis Fr. Sum. veget. Scand. p. 395.
In ramulis variis emortuis. — Supl. No. 723. (*Sphaeria moriformis* Fr.)
Cucurbitaria Laburni Fr. Sum. veget. Scand. p. 390.
In ramis emortuis *Laburni vulgaris* Grieseb. — Supl. No. 713, 713^b.
Nitschkia Fuckelii Nke. sec. Fuck. Symb. mycol. p. 165.
In ramis exsiccatis *Aceris Pseudoplatani* Lin. — Supl. No. 674.
(*Sphaeria cupularis* Pers.)
Gibbera pulicaris Fr. Syst. mycol. II. p. 402.
In *Sambuci nigrae* Lin. ramis emortuis. — Supl. No. 739.
(*Sphaeria pulicaris* Fr.)
Nectria punicea Fuck. Symb. mycol. p. 180.
In *Rhamni Frangulae* Lin. ramis aridis. — Supl. No. 681.
Nectria cinnabarina Fr. Sum. veget. Scand. p. 388.
In cortice *Aceris Pseudoplatani* Lin. — Supl. No. 680. (*Sphaeria decolorans* Pers.)
Hypocrea citrina Fr. Sum. veget. Scand. p. 388.
var. *ochracea* Pers. Syn. fung. p. 18.
Ad folia putrida *Fagi sylvaticae* Lin. — Supl. No. 728. (*Sphaeria ochracea* Pers.)

- Hypomyces aurantius* Fuck. Symb. mycol. p. 183.
var. *fulgens* Thüm.
In *Hymenio cujusdam* Polypori. — Supl. No. 651. (*Sphaeria aurantia* Fr.)
- Hypomyces rosellus* Tul. Sel. fung. Carp. III. p. 45.
In *Fagi sylvaticae* Lin. foliis putridis. — Supl. No. 745.
- Diaporthe Carpini* Fuck. Symb. mycol. p. 205.
Ad ramos aridos *Carpini Betuli* Lin. — Supl. No. 657.
- Diaporthe pulla* Nke. Pyr. german. I. p. 249.
In *Hederae Helicis* Lin. ramis decorticatis. — Supl. No. 756^b.
(*Sphaeria spiculosa* Pers.)
- Diaporthe Strumella* Fuck. Symb. mycol. p. 205.
In ramulis emortuis *Ribis Grossulariae* Lin. — Supl. No. 763.
(*Sphaeria Strumella* Fr.)
- Valsa Sorbi* Fr. Sum. veget. Scand. p. 411.
In *Sorbi Aucupariae* Lin. ramis aridis. — Supl. No. 716. (*Sphaeria polyspora* Fr.)
- Valsa Prunastri* Fr. Sum. veget. Scand. p. 411.
Ad ramos emortuos *Pruni spinosae* Lin. et *P. insititiae* Lin. —
Supl. No. 737.
- Valsa nivea* Fr. Sum. veget. Scand. p. 411.
In cortice *Populi nigrae* Lin. — Supl. No. 726. (*Sphaeria nivea* Fr.)
- Diatrypella quercina* Nke. Pyr. germ. I. p. 71.
In *Quercus pedunculatae* Ehrh. ramis emortuis. — Supl. No. 743.
- Diatrypella verrucaeformis* Nke. Pyren. german. I. p. 76.
Ad ramos emortuos *Coryli*, *Carpini* et *Quercus*. — Supl. No. 779.
(*Sphaeria verrucaeformis* Pers.)
- Melogramma Bulliardii* Tul. Sel. fung. carpol. II. p. 81.
In *Carpini Betuli* Lin. cortice. — Supl. No. 722. (*Sphaeria melogramma* Fr.)
- Dothidea Sambuci* Fr. Syst. mycol. II. p. 551.
Ad *Sambuci racemosae* Lin. ramos emortuos. — Supl. No. 750.
(*Sphaeria Sambuci* Pers.)
- Hypoxylon udum* Fr. Sum. veget. Scand. p. 384.
In ligno putrido quercino. — Supl. No. 775.
- Hypoxylon fuscum* Fr. Sum. veget. Scand. p. 384.
In *Fagi sylvaticae* Lin. cortice. — Supl. No. 701. (*Sphaeria fusca* Lk.)
- Xylaria digitata* Grev. Fl. Edinb. p. 356.
In ligno putrido. — Supl. No. 1038.
- Rhytisma Andromedae* Fr. Syst. mycol. II. p. 567.
In *Andromedae polifoliae* Lin. foliis vivis. — Supl. No. 1032.
(*Xyloma Andromedae* Pers.)
- Durella commutata* Fuck. Symb. mycol. p. 281.
In ligno secco *Quercus*. — Supl. No. 564.
- Triblidium caliciiforme* Reb. Fl. Neomarch. p. 388.
In *Quercus pedunculatae* Ehrh. cortice antiquo. — Supl. No. 607.
- Lophodermium Pinastri* Chev. Fl. paris. I. p. 430.
Ad folia arida *Pini sylvestris* Lin., *Pini Strobi* Lin. et *Piceae vulgaris* Lam. — Supl. No. 874.
- Lophodermium juniperinum* De Not. in Giorn. bot. Ital. II. p. 40.
Ad folia emortua adhuc pendula *Juniperi communis* Lin. —
Supl. No. 875. (*Hysterium Pinastri* Fr. var.)
- Onygena equina* Pers. Syn. fung. p. 203.
In *Equi Caballi* Lin. ossis putridis. — Supl. No. 884.

- Schmitzomia nivea* De Not. in Comment. Soc. critt. Ital. II. p. 562.
 In foliis aridis Pini sylvestris Lin. — Supl. No. 973. (*Stictis nivea* Pers.)
- Vibrissea truncorum* Fr. Syst. mycol. II. p. 31.
 Ad ligna et ramulos inundatos in turfosis. — Supl. No. 1031.
- Trichopeziza sulfurea* Fuck. Symb. mycol. p. 296.
 Ad caules emortuos. — Supl. 581. (*Peziza sulphurea* Fr.)
- Trichopeziza mollissima* Fuck. Symb. mycol. p. 296.
 In caulibus subputridis. — Supl. No. 582. (*Peziza villosa* Pers.)
- Pyronema confluens* Tul. Sel. fung. carpol. III. p. 197.
 Ad terram in locis udis. — Supl. No. 573. (*Peziza omphalodes* Bull.)
- Prosthemium betulinum* Knz. et Sch. Myk. Hefte I. p. 18.
 In Betulae verrucosae Ehrh. cortice. — Supl. No. 206.
- Dichaena strobilina* Fr. Sum. veget. Scand. p. 403.
 Ad Piceae vulgaris Lam. conos dejectos. — Supl. No. 762. (*Sphaeria strobilina* Fr.)
- Micropera Sorbi* Thüm. nov. spec.
 M. peritheciis numerosis, dense gregariis sed semper solitariis et numquam confluentibus, sub epidermide nidulantibus, appanato-erumpentibus, orbiculatis vel oblongis, primo clausis demum epidermide disrumpente regulariter cinctis, nigris; sporis cylindricis, subrectis vel arcuatis, utrinque subtruncatis, simplicibus, annucleatis, hyalinis, 3—4 mm. long., 1—1.5 mm. crass.
- In Sorbi Aucupariae Lin. cortice. — Supl. No. . . . (*Dothichiza Sorbi* Lib.)
- Micropera Pinastri* Sacc. in Michelia II. (No. 6.) p. 104.
 In ramulis junioribus emortuis Pini sylvestris Lin. — Supl. No. . . . (*Dothichiza Pinastri* Lib.)
- Myxosporium carneum* Thüm. nov. spec.
 M. acervulis primo subepidermalibus demum superficialibus et epidermide disrumpente cinctis, plano-convexis, magnis, dilute carneis; sporis numerosissimis, cylindrico-ellipticis, utrinque subangustato-rotundatis, rectis vel raro subcurvis, simplicibus, hyalinis, in massa gelatinosa nidulantibus, 8—10 mm. long., 2.5—4 mm. crass.
- In Coryli Avellanae Lin. (ut videtur) ramis aridis. — Supl. No. 882.
- Sphaeropsis corylina* Thüm. nov. spec.
 S. peritheciis dense gregariis sed semper solitariis et numquam confluentibus, primo epidermide tectis demum perforantibus et prominulis, plano-hemisphaericis, opaco-nigris; basidiis fasciculatim dispositis, brevibus, tenuibus, flexuosis, hyalinis; sporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, simplicibus, episporio subcrasso, hyalinis, 13—18 mm. long., 8—10 mm. crass.
- Ad ramos aridos Coryli Avellanae Lin. — Supl. No. 846. (*Excipula turgida* Fr.)
- Melasmia acerina* Lév. in Ann. sc. natur. 1846. V. p. 276.
 Ad folia viva Aceris platanoidis Lin. — Supl. No. 944. (*Rhytisma acerinum* Fr.)
- Aposphaeria Brassicae* Thüm. nov. spec.
 A. peritheciis majusculis, dense aggregatis, saepe confluentibus, hemisphaericis, plicatis, e obscure fusco-nigris, superficialibus; sporis numerosis, cylindraceis, rectis, utrinque

rotundatis, continuis, anucleatis, hyalinis, 3—4 mm. long., 1.5—2 mm. crass. — An Gibberae Saubinetii Matg. conditio.?

In Brassicae oleraceae Lin. caulibus putridis. — Supl. No. 798.
Vermicularia Dematium Fr. Syst. mycol. III. p. 253.

Ad caules exsiccatos Heraclei Sphondylii Lin. — Supl. No. 1027.
Vermicularia trichella Fr. Sum. veget. Scand. p. 420.

Ad Hederae Helicis Lin. folia arida. — Supl. No. 771. (Sphaeria trichella Fr.)

Sacidium Libertianum Thüm. nov. spec.

S. peritheciis sparsis, hypophyllis, superficialibus, applanato-hemisphaericis, parvulis, opaco-atris, contexta fuligineo; sporis plerumque regulariter globosis, raro e mutua pressione initio subangulosis, episporio subcrasso, simplicibus, pallidissime luteis, eguttulatis, 3.5—4.5 mm. diam.

Ad folia languida Pruni Padi Lin. — Supl. No. 624. (Sclerotium speirum Fr.)

Septoria stemmatea Berk. in Ann. Mag. Natur. Hist. no. 192.

In foliis vivis Vaccinii Vitis Idaeae Lin. — Supl. No. 758.
(Sphaeria stemmatea Fr.)

Actinonema Crataegi Fr. Sum. veget. Scand. p. 424.

Ad folia arida Viburni Opuli Lin. — Supl. No. 404.

Asteroma subadians Fr. Sum. veget. Scand. p. 425.

Ad Convallariae majalis Lin. folia emortua. — Supl. No. 655.
(Sphaeria brunnea Fr.), No. 797 (Sphaeria subadians Fr.)

Helminthosporium Genistae Fr. Syst. mycol. III. p. 360.

In cortice Sarothamni scoparii Koch. — Supl. No. 853.

Helminthosporium malmédiense Thüm. nov. spec.

H. caespitibus late effusis, velutinis, obscure atro-fuscis; hyphis erectis, simplicibus, longis, aequalibus, septatis, obscure fuscis, 12—20 mm. crassis, apice rotundatis; sporis anguste clavatis, vertice obtuso-rotundatis, basi augustatis, sursum sensim longe attenuatis, octo-duodecimseptatis, multiguttulatis, ochraceo-fuscis, 80 mm. long., 13—17 mm. crass.

In Spiraeae salicifoliae Lin. ramis emortuis. — Supl. No. 852.

Helminthosporium nanum Nees ab Es. Syst. fung. II. p. 67.

In Fagi sylvaticae Lin. ligno putrescente. — Supl. No. 854.

Helminthosporium velutinum Lk. Obs. mycol. I. p. 8.

In ramis variis. — Supl. No. 851.

Sporotrichum Cerealis Thüm. nov. spec.

S. caespitibus detergibilibus, variis, irregularibus, parvulis, plerumque laxis, saepe confluentibus, pulverosis, submembranaceis, nigris; hyphis paucis, simplicibus, multi- et breviseptatis, 2.5 mm. crassis, fuscis; sporis globosis, homogenis, dilute fusco-olivaceis, numerosissimis, 3—4 mm diam.

In culmis, foliis et vaginis aridis Secalis cerealis Lin. — Supl. No. 881, 996.

Sporotrichum pulviniforme Thüm. nov. spec.

S. caespitibus pulvinatis, maximis, longe lateque effusis, crassiusculis, mollibus, lanosis, e aurantiaco albidis, irregularibus; hyphis perpaucis, tenuissimis, achrois, continuis; sporis numerosissimis, cylindraceutis, utrinque subrotundatis, continuis, rectis, hyalinis, 4—5 mm long., 2—2.5 mm. crass.

In Fagi sylvaticae Lin. foliis putridis. — Supl. No. 417.
(Botrytis densa Lk.)

Fusidium Buxi Schm. sec. Lk. in Linné Spec. plant. c. Willd. VI. 1. p. 97.

Ad folia arida Buxi sempervirentis Lin. — Supl. No. 603. (*Psilonia Buxi* Fr.)

Selenosporium Brassicae Thüm. nov. spec.

S. sporodochiis verrucaeformibus, dense gregariis, interdum sed raro confluentibus, compactis, duriusculis, superficialibus, opaco-fuscis; sporis lunulatis, fusiformibus, utrinque acutiusculis, biseptatis sed ad septa non constrictis, interdum guttulatis, hyalinis, 30–36 mm long., 3–4,5 mm crass., basidiis brevibus, cylindraceis fultis.

In caulibus putridis nudis Brassicae oleraceae Lin. — Supl. No. 611, 798. (*Sclerotium castaneum* Lib.)

Mastigosporium album Riess in Fres. Beitr. z. Myk. p. 56.

Ad folia viva Airae caespitosae Lin. — Supl. No. 538. (*Monothecium graminis* Lib.)

Melanconium ramulorum Cda. Icon. fung. I. p. 2. Tab. 1 Fig. 34.

In Carpini Betuli Lin. cortice. — Supl. No. 535. (*Melanconium effusum* Lk.)

Exosporium Fraxini Niessl. Crypt. Fl. v. Mähren p. 24.

Ad Fraxini excelsioris Lin. folia viva sublanguidave. — Supl. No. 721. (*Sphaeria maculaeformis* Fr.)

Stemonites ferruginea Ehrb. Sylv. Berol. p. 25.

Ad corticem coriarii in caldariis. — Supl. No. 968. (*Stemonites fasciculata* DeC.)

Sclerotium Iridis Thüm. nov. spec.

S. tuberculis submagnis, orbiculatis, semiimmersis, plano-hemisphaericis vel fere lenticularibus, opaco fusco-ferrugineis, intus albidis, durissimis. — A *Sclerotio Tulipae* Lib. longe diversum.

In Iridis germanicae Lin. scapis emortuis. — Supl. No. 629.

Sclerotium udum Fr. Syst. mycol. II. p. 250.

In locis umbrosis ad graminum folia. — Supl. No. 626.

Sclerotium fulvum Fr. Syst. mycol. II. p. 255.

Ad folia Graminearum emortua. — Supl. No. 614.

Ozonium candidum Mart. Fl. Erlang. p. 358.

Ad folia putrida varia. — Supl. No. 886.

Zur Frage über die möglichen genetischen Verwandtschaftsverhältnisse einiger einzelligen

Phycochromaceen.

Von Paul Richter.

(Fortsetzung und Schluss.)

Ich unternehme es, für die in voriger Nummer aufgestellten Gesichtspunkte einige Anhaltspunkte zu geben. Zu Grunde liegen Untersuchungen, oder ich möchte fast lieber sagen, Vergleichen, angestellt an eingetrocknetem Materiale, ein Umstand, der allerdings als mangelhaft zu bezeichnen ist, aber doch in anderer Hinsicht den Vortheil einer Nachcontroale darbietet, da ich mich einiger Nummern von Rabenhorst's Algen Europas und einer Aphanothece bediente, die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [19 1880](#)

Autor(en)/Author(s): Thümen Felix

Artikel/Article: [Reliquae Libertianae. 185-191](#)