

lindrische Stäbchen oder selbst Kugeln zusammengezogen. Ihr Durchmesser beträgt $\frac{1}{900}$ '''.

Ich habe eine Anzahl mikroskopischer Präparate von obigem Dibium angefertigt und bei dem hiesigen mikroskopischen Tauschverein deponirt, durch dessen Secretär, Herrn Dr. Welcker, dieselben gegen äquivalente Tauschobjecte von Interessenten bezogen werden können.

Gießen, December 1856.

H. Hoffmann.

Peronospora Umbelliferarum

var. ε. Berkeleyi. Ces. mss.

Rabenh. Herb. mycol. Ed. II. Cent. VI.

Vercellis: ad fol. Pastinacae sylvestris sub fruticibus, Sambuci praesertim, in sepibus suffocatae. — Auct. 1856. Gaudemus, quod nobis concessum sit descriptionem hic subji-cere, quam praeclarus Dr. Caspary, accuratissimus Peronosporarum illustrator in humanis literis de die 3. Decemb. 1856 nobis benevole communicabat.

Cesati.

„P. caespitibus albis liberis subrectis, $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{11}$ ''' duod. par. altis; „ordinibus ramorum duobus-quatuor, ramellis rectis, ultimi ordinis „curvatis vel rectiusculis, numero 13—30, penultimi ordinis dichotome divis. Acrosporis elliptico-subglobosis $\frac{1}{178}$ — $\frac{1}{166}$ ''' latis, „ $\frac{1}{142}$ — $\frac{1}{131}$ ''' longis, magnitudine mediocris.

„Differt sporis minoribus a P. umbelliferarum β. Ange- „llicae, a var. γ. Chaerophylli ramellis ultimi ordinis plerumque „subcurvatis.

„Eadem ac Botrytis macrospora: Berk. in Gard. chron. „1853. p. 531 cum icone. — Non B. macrospora Ung. Botan. „Zeit. 1847 p. 315, quae sporis maximis elongato pyriformibus „differt. — — —

„Neste meist 3., selten 4. Grades. — Die Brüche, welche ich in der Be- „schreibung angegeben, sind Reduktionen von Messungen mit dem Schrauben- „Mikrometer.

„Ich fand als Länge des Stammes:

$$1) 0,1391''' = \frac{1}{7}'''$$

$$3) 0,0875'''$$

$$2) 0,1208'''$$

$$4) 0,0849''' = \frac{1}{11}''' \text{ duod. par.}$$

„Sporen-Länge:

Breite:

$$1) 0,0070''' = \frac{1}{142}'''$$

$$1) 0,0056''' = \frac{1}{178}'''$$

$$2) 0,0073'''$$

$$2) 0,0057'''$$

$$3) 0,0076''' = \frac{1}{131}'''$$

$$3) 0,0060''' = \frac{1}{166}'''$$

„Die Extreme sind gemessen! — — —

Dissertationem Mycologis commemoramus ill. Auctoris: „Ueber zwei- und dreierlei Früchte einiger Schimmelpilze (Hyphomyceten) v. Dr. R. Caspary, in Actis R. Acad. Berol. 1835 diari ad mens. Mai. — et seorsim impressam Berolini eod. ao. cum tab. col., in qua revisio generis continetur, cujus speciebus lubeat subungere P. ochroleucam nostram (Rabh. hb. mycol. ed. II. No. 175) in Turrite glabra, obvia, ex Pedemontio, aliasque a cel. Tulasne descriptas. Cesati.

Redaction:

R. Rabenhorst in Dresden.

Druck von

C. Heinrich in Dresden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [1_1857](#)

Autor(en)/Author(s): Cesati

Artikel/Article: [Peronospora Umbelliferarum. 120](#)