

FEB 7 1882

N^o 12.

HEDWIGIA.

1881.

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.
6 Monat December.

Inhalt: Karsten, Fungi novi. — Nordstedt, Zusammenstellung von den in „Notes algologiques“ citirten Nummern der Algen-exsiccanten Rabenhorst's. — Oudemans, Agaricus Staringii. — Repertorium: Lojka, Lichenes hungarici. — Roumeguère et Saccardo, Reliquiae Libertianae II. — Neue Literatur. — Anzeige.

Fungi novi, lecti atqve descripti a P. A. Karsten.

Tricholoma microcephalum n. sp.

Pileus carnosus, tenuis, mollis, convexo-planus, laevis, glaber, fuligineo-lividus, siccus isabellino-livens, 2—3 cm latus. Stipes farctus, elatus, aequalis, basi apiceqve incrassatus, nudus, striatulus, pallescens, 9—12 cm altus, 3—4 mm crassus. Lamellae adnexae, denticulo striaeformi decurrentes, confertissimae, molles, albae. Sporae ellipsoideo-sphaeroideae, longit 5—6 mm, crassit 5 mm.

Prope Mustiala, in silva mixta, m. Aug. 1881. — *Trich. melaleuco* affine.

Clitocybe stenophylla n. sp.

Pileus carnosus, compactus, planiusculus, laevis, nudus, siccus nitens, fusco-cinereus, circ. 8 cm latus. Stipes solidus, basi incrassatus, inferne adpresse villosus, superne pulverulento-squamulosus, circ. 7 cm longus, apice 2, basi 3 cm crassus. Lamellae decurrentes, confertae, angustissimae, albae, demum lutescentes. Sporae ellipsoideae, longit. 5—7 mm, crassit. 2—4 mm.

Prope Mustiala, in silva frondosa, m. Oct. 1881. — *Clit. nebulari* affinis.

Clitocybe macrophylla n. sp.

Pileus carnosulus, tenuis, convexus, obtusus, orbicularis, laevis, glaber, margine striatulus, livido-albus, siccitate lutescente albus et nitens, 3—4 cm latus. Stipes e farcto cavus, tenax, elasticus, aequalis, basi subbulboso-incrassatus, teres, flexuosus, glaber, apice subsquamulosus, albidus, striatulus, siccitate nitens, 6—8 cm altus, 2 mm crassus. Lamellae adnatae, secedentes, latissimae, triangulares, tenues, subdistantes, albae, demum lutescentes. Basidia majuscula, pyriformia vel clavata. Sporae non inventae.

Prope Mustiala, in stercore vaccino, m. Aug. 1881.

Naucoria Jennyi n. sp.

Pileus carnosus, tenuis, conico-convexus, dein expansus, umbone conico, acuto, orbicularis, siccus, ferrugineo-fulvus, expallens, laevis, nitens, glaberrimus, circ. 3 cm latus. *Stipes* fistulosus, in radicem longam attenuatus, eximie cartilagineus, tenacissimus, aequalis, nudus, nitidus, fulvo-badius, apice pallidior, circ. 10 cm longus, 2—4 mm crassus. *Lamellae* leviter adnexae, secedentes, aut omnino liberae, valde confertae, postice plus minus ventricosae, nudae, e lutescente pallido fulvae, submaculatae, 1—2 mm latae. *Sporae* ovoideae, flavescente hyalinae (sub micr.), longit 4—5 mm, crassit. circ. 3 mm.

Prope Mustiala, in silva acerosa, m. Aug. 1881. — *Nauc. Christinae* proxima.

Cortinarius (Dermocybe) calopus n. sp.

Pileus carnosus, tenuis, e convexo expansus, obtusus, laevis, canescens, fibrillis secedentibus sericellus, margine e velo lilacino-purpurascens-fibrillosus, demum glaber, rubente ferrugineus, 5—10 cm latus. *Stipes* solidus, firmus, curvatus, aequalis, basi incrassatus vel subinde bulbosus, lilacino-purpurascens, inferne mox decolorans, intus sordide albidus, e velo primitus floccoso-squamosus, dein glabratus, circ. 10 cm longus et 5 mm crassus. *Lamellae* adnatae, primitus pallide cinnamomeae, subdistantes, integerrimae. *Sporae* ovoideae, fuscidulae (sub micr.), longit. 9—11 mm, crassit. 6 mm.

Prope Mustiala, in abiegnis, m. Sept. 1881. — *Cortinarius* suillo affinis. Odor et sapor nulli. *Cortina* laxa, mollis, appendiculata. Caro pilei aqvose ferruginascens.

Trametes ribicola n. sp.

Pallide ferrugineo-ochraceus. *Pileus* suberosus, tenuis, vulgo resupinatus, margine pubescente, circ. 1 cm latus. Pori inaequales, rotundati vel subangulati, medii.

Prope Mustiala, ad ramulos Ribis Uvae crispae dejectos, m. Oct. 1881.

Stereum subcostatum n. sp.

Coriaceo-molle. *Pileus* effuso-reflexus, subtomentoso-scruposus, demum glabratus laevigatusque, azonus, albus seu albidus. Hymenium nudum, exsuccum, vage costatum, lutescente album, basin versus laete incarnatum seu gilvum.

Prope Mustiala, ad ramos dejectos arborum frondosarum, m. Oct. 1881. — *Stereum* hirsuto proxime accedit.

Typhula falcata n. sp.

Glabra. Clavula cylindracea, linearis, falcata vel curvata, saepe ramosa, hyalino-alba, sicca alba, vetusta vulgo

lutescens. Stipes brevissimus, distinctus, hyalinus, siccus albus. Sporae ellipsoideae, longit. 6—8 mm, crassit. 3—4 mm.

Prope Mustiala, ad caules Epilobii angustifolii emortuos, m. Oct. 1881.

Zusammenstellung von den in „Notes algologiques“ citirten Nummern der Algenexsiccaten Rabenhorst's.

„Notes algologiques“ von Thuret und Bornet (Paris 1876 u. 1880) enthalten eine Fülle von Observationen über die Phycochromaceen und sind für Jeden, der sich mit diesen Algen beschäftigt, unentbehrlich. Darin sind sehr oft die Algenexsiccaten Rabenhorst's citirt. Da diese Exs. ziemlich verbreitet sind, aber es wahrscheinlich Mehrere giebt, die diese Algensammlung, aber nicht „Notes algologiques“ selbst besitzen, so scheint es mir für diese nützlich zu sein, dass eine Zusammenstellung von allen in Not. alg. citirten Nummern der Rabenhorst'schen Sammlung mit den Bestimmungen von Thuret und Bornet publicirt werde, und gebe ich deshalb eine solche hiermit. Zuerst steht die No. in Rabenhorst's Exs. mit dem Namen derselben, dann folgt der Name in „Notes algologiques“.

1852	Hydrocoleum versicolor	Microcoleus versicolor	Thur.
1835	Schizosiphon nigrescens		
27	Anabaena Flos aquae	Nostoc Linckia (Roth) β crispulum (Rab.)	
472	Nostoc crispulum	„ „ (Roth) β crispulum (Rab.)	
266 et 1357	Nostoc piscinale	„ piscinale Kütz.	
310	Nostoc lacustre	„ „	
1464	„ agglutinans	„ „	
1032	„ commune β fuscum	„ „	
1357b	„ piscinale	„ carneum Ag.	
88	„ purpurascens	„ „	
487, 1234 et 2286	Nostoc rufescens	„ „	
375	Anabaena intricata	„ „	
1270	Hormosiphon natans	„ spongiaeformis Ag.	
72	Nostoc parietinum	„ humifusum Carmichael	
2461 et 2462	Nostoc tepidariorum	„ „	
1438	Nostoc alpinum	„ ciniflorum Tournef. (N. commune Vauch.)	
608	„ Bohemicum	„ ciniflorum	
349	„ Cesati	„ „	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [20_1881](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten Petter Adolf

Artikel/Article: [Fungi novi, lecti atqve descripti 177-179](#)