

Riccia ciliifera Link und Riccia Breidleri Jur.

Da die *Riccia ciliifera* Link in den Herbarien selten ist, so theile ich hier mit, dass diese Species von Herrn Lojka bei Nadays in Ungarn 1874 gefunden und Herrn Juratzka übersendet wurde; Exemplare derselben wurden mir von Dr. Winter freundlichst mitgetheilt. Soweit der kleine Vorrath reicht, stelle ich davon zur Verfügung.

Unter dem Namen *Riccia sorocarpa* Bisch. findet sich in den Hepat. von Gottsche & Rabenhorst No. 23 eine *Riccia*, welche — in meinem Exemplar — *Riccia ciliifera* ist; in No. 543 derselben Sammlung wird auf diese No. 23 Bezug genommen und daselbst gesagt: „die frühere Pflanze No. 23 unserer Sammlung ist aber viel robuster als diese rheinische Pflanze.“ — Vermuthlich findet sich unter dieser Nummer auch in anderen Exemplaren etwas Anderes. —

Ich bemerke bei der Gelegenheit, dass die von Herrn Breidler 1870 bei Schladming in Steiermark entdeckte und ihm zu Ehren von Herrn Juratzka *Riccia Breidleri* benannte Art neuerdings zu *R. sorocarpa* gezogen wurde, wohin sie keineswegs zu bringen ist; sie gehört vielmehr ebenfalls der Section der *Ciliatae* an und steht durch die Form der Frons und die wenigen kurzen Cilien der *Riccia paradoxa* De Not. nahe, wenn sie derselben nicht ganz zuzählen sein sollte, was sich nach der kurzen Diagnose in der Synopsis nicht entscheiden lässt.

F. Stephani, Leipzig.

Repertorium.

Wolle, F. American Fresh-Water Algae.

(Bulletin of the Torrey botanical Club. Vol. VIII. No. 1.)

Diese Arbeit enthält eine Anzahl neuer Arten und Varietäten von Desmidiaceen, die auf einer Tafel dargestellt sind und deren Beschreibungen wir hier folgen lassen.

Micrasterias Mahabuleshwariensis, Hobson, var. *Americana*. n. var. This plant does not quite conform to the one described by Hobson. It has similar end-lobes, but the margins of the lateral ones are more like those of *M. Americana*, Ehrb. The lobes themselves are unlike; in the one they are entire, in the other they are divided into two lobules. (Cf. Figs 1 and 2.) This may be a variety referred to by Rabenhorst in his *Flora Europaea Algarum*, Vol. III., p. 196, where he says: "*M. Americanae* forma esse videtur."

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [21_1882](#)

Autor(en)/Author(s): Stephani Franz

Artikel/Article: [Riccia ciliifera Liuk und Riccía Breidleri Jur. 76](#)