

Acervuli elongati, saepe flexuosi, rarius oblongati vel orbiculares, peridermio demum rima longitudinali dehiscente velati, applanati, flavidi, longit. circ. 1 mm. Conidia elongata vel oblongata, simplicia, recta, hyalina, longit. 9—11 mmm, crassit. 2—3 mm.

Ad ramos emortuos Fraxini excelsioris in Mustiala, m. Oct.

Cercosporella Pastinacae Karst. a *Cercospora Apii* Fres. forte haud satis diversa.

Fragmenta mycologica XIX. Auctore P. A. Karsten.

Solenia crocea Karst. (N. sp.)

Tubuli dense gregarii, cylindranei, erecti, tomentosi, circiter 0,3 mm alti. Sporae clavatae, utroque apice acutatae, hyalinae, simplices, longit. 9—12 mmm, crassit. 3—4 mmm.

In frondibus *Struthiopteridis germanicae* emortuis in Fennia australi.

Helotium nectriella Karst. (N. sp.)

Apothecia gregaria vel sparsa, saepe confluentia, sessilia, convexa, subimmarginata, ceracea, incarnata, glabra, latit. 0,2—0,3 mm. Asci clavati, longit. 33—45 mmm, crassit. circiter 7 mmm. Sporae 8:nae, distichae, elongatae, longit. 6—7 mmm, crassit. 1,5—2 mmm. Paraphyses filiformes, apice incrassatae.

Ad caules aridos *Solani tuberosi* in Mustiala.

Diplodia obsoleta Karst. (N. sp.)

Pycnidia subgregaria, epidermide tecta, subsphaeroidea, ostoma vel saepius ostiolo papillato perforante, atra, latit. 0,1—0,2 mm. *Stylosporae* oblongatae vel subellipsoideae, rectae vel leniter curvulae, septulo obsoleto, flavescens, suboguttulatae, longit. 3—8 mmm, crassit. 2—3 mmm.

Ad caules exsiccatos *Solani tuberosi* in Mustiala.

Godroniella Karst. (N. gen.)

Receptacula sphaeriaeformia, primitus clausa, dein ore rotundato, integro dehiscens, e hyphis fuliginosis vel fusciscentibus composita, superficialia, sicca coriacea, atra, glabra. Conidia elongata, simplicia, hyalina. Basidia filiformia, ramosa.

Ex. *G. juncigena* Karst. (*Excipula juncigena* Karst. in Hedw. 1884, n. 2, p. 5).

Phacidiella Karst. vix dubie est *Blennoria* Fr.

Protomyces (*Exomyces*) *muscorum* Karst. *Coccospora muscorum* Karst. est nominandus.

Protomyces (*Exomyces*) *pithyophilus* Karst.
Hedw. 1884, n. 3, p. 4, forte est species *Sphaerosporii*
Schw.

Micromycetes Slavonici novi.

Recensuerunt

St. Schulzer v. Mueggenburg et P. A. Saccardo.
(Fortsetzung.)

Sphaeropsidaeae.

26. *Coniothyrium herbarum* Schulz. et Sacc. —
Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 271. — Peritheciis subgregariis,
initio epidermide velatis, lenticularibus, $1\frac{1}{5}$ - $1\frac{1}{3}$ mill. d., poro
pertusis; spermatis oblongo teretiusculis, utrinque rotundatis,
5 = 2, brunneolis.

Hab. in caulibus *Asclepiadis Syriacae* pr. Vinkovce.
— Praecipue peritheciis lenticulari-applanatis dignoscenda
species.

27. *Coniothyrium syconophilum* Schulz et Sacc. —
Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 54 et in Myc. Beitr. p. 655
(*Phoma ficoph.* var. *Zythia*). — Peritheciis subcutaneis,
globosis, ostiolo papillato erumpente, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{2}{3}$ mill. d., nigro-
faretis; spermatis ellipsoideo-oblongis, 1-nucleatis, 5-6 micr.
longis, fuligineis, basidiis bacillaribus spora duplo longioribus
suffultis.

Hab. in ramis corticatis *Fici Caricae* pr. Vinkovce.

28. *Coniothyrium populinum* Schulz. et Sacc. Ill.
Fung. Slav. n. 9. — Peritheciis sparsis, globoso-depressis,
minutis, centro dein poro irregulari dehiscentibus; spermatis
globosis, ochraceis, 5-8 micr. d., basidiis non visis.

Hab. in ramis decorticatis *Populi*, Eperjes.

29. *Podosporium Ribis* Schulz. et Sacc. — Schulz.
Ill. Fung. Slav. n. 789. — Stromate pulvinate, subcutaneo-
erumpente, apice convexo colliculoso, atro, $1\frac{1}{2}$ -1 mill. lato,
intus perithecia spuria sive loculos pallidos monostichos plures
fovente; stylosporis obovatis, utrinque obtusiusculis, 12-18
= 6,5—10 continuis fuligineis; basidiis spora paulo brevi-
oribus bacillaribus, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis *Ribis rubri* pr. Vinkovce. —
Videretur fere *Fuckelia Ribis* sed fructificatio aliena. —
Podosporium nostro sensu, sistit *Sphaeropsidis* Sacc.
species peritheciis v. loculis stromate pulvinate-verrucoso ex-
ceptis.

30. *Podosporium Nerii* Schulz. et Sacc. — Schulz.
Ill. Fung. Slav. n. 930. — Stromate verrucoso subcutaneo-
erumpente, atro $1\frac{1}{2}$ -1 mill. d., intus perithecia spuria sive loculos

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [23_1884](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten Petter Adolf

Artikel/Article: [Fragmenta mycologica XIX. 88-89](#)