

Acervuli elongati, saepe flexuosi, rarius oblongati vel orbiculares, peridermio demum rima longitudinali dehiscente velati, applanati, flavidi, longit. circ. 1 mm. Conidia elongata vel oblongata, simplicia, recta, hyalina, longit. 9—11 mmm, crassit. 2—3 mm.

Ad ramos emortuos Fraxini excelsioris in Mustiala, m. Oct.

Cercosporaella Pastinaceae Karst. a Cercospora Apii Fres. forte haud satis diversa.

Fragmenta mycologica XIX. Auctore P. A. Karsten.

*Solenia crocea* Karst. (N. sp.)

Tubuli dense gregarii, cylindracei, erecti, tomentosi, circiter 0,3 mm alti. Sporae clavatae, utroque apice acutatae, hyalinae, simplices, longit. 9—12 mmm, crassit. 3—4 mmm.

In frondibus Struthiopteridis germanicae emortuis in Fennia australi.

*Helotium nectriella* Karst. (N. sp.)

Apothecia gregaria vel sparsa, saepe confluentia, sessilia, convexa, subimmarginata, ceracea, incarnata, glabra, latit. 0,2—0,3 mm. Ascii clavati, longit. 33—45 mmm, crassit. circiter 7 mmm. Sporae 8:nae, distichae, elongatae, longit. 6—7 mmm, crassit. 1,5—2 mmm. Paraphyses filiformes, apice incrassatae.

Ad caules aridos Solani tuberosi in Mustiala.

*Diplodia obsoleta* Karst. (N. sp.)

Pycnidia subgregaria, epidermide tecta, subsphaeroidea, astoma vel saepius ostiolo papillato perforante, atra, latit. 0,1—0,2 mm. Stylosporae oblongatae vel subellipsoideae, rectae vel leniter curvulae, septulo obsoleto, flavescentes, subeguttulatae, longit. 3—8 mmm, crassit. 2—3 mm.

Ad caules exsiccatos Solani tuberosi in Mustiala.

*Godroniella* Karst. (N. gen.)

Receptacula sphaeriaeformia, primitus clausa, dein ore rotundato, integro dehiscentia, e hyphis fuligineis vel fuscescentibus composita, superficialia, sicca coriacea, atra, glabra. Conidia elongata, simplicia, hyalina. Basidia filiformia, ramosa.

Ex. *G. juncigena* Karst. (*Excipula juncigena* Karst. in Hedw. 1884, n. 2, p. 5).

*Phaciidiella* Karst. vix dubie est *Blennoria* Fr.

*Protomyces* (*Exomyces*) *muscorum* Karst. *Coccospora muscorum* Karst. est nominandus.

Protomyces (Exomyces) pithyophilus Karst.  
Hedw. 1884, n. 3, p. 4, forte est species Sphaerosporii  
Schw.

Micromycetes Slavonici novi.

Recensuerunt

St. Schulzer v. Mueggenburg et P. A. Saccardo.  
(Fortsetzung.)

Sphaeropsidaceae.

26. *Coniothyrium herbarum* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 271. — Peritheciis subgregariis, initio epidermide velatis, lenticularibus,  $1\frac{5}{6}$ - $1\frac{1}{3}$  mill. d., poro pertusis; spermatis oblongo-teretiusculis, utrinque rotundatis,  $5 = 2$ , brunneolis.

Hab. in caulibus Asclepiadis Syriacae pr. Vinkovce. — Praecipue peritheciis lenticulari-applanatis dignoscenda species.

27. *Coniothyrium syconophilum* Schulz et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 54 et in Myc. Beitr. p. 655 (*Phoma ficoph.* var. *Zythia*). — Peritheciis subcutaneis, globosis, ostiolo papillato erumpente,  $1\frac{2}{3}$ - $2\frac{2}{3}$  mill. d., nigrofarcitis; spermatis ellipsoideo-oblongis, 1-nucleatis, 5-6 micr. longis, fuligineis, basidiis bacillaribus spora duplo longioribus suffultis.

Hab. in ramis corticatis Fici Caricae pr. Vinkovce.

28. *Coniothyrium populinum* Schulz. et Sacc. Ill. Fung. Slav. n. 9. — Peritheciis sparsis, globoso-depressis, minutis, centro dein poro irregulari dehiscentibus; spermatis globosis, ochraceis, 5-8 micr. d., basidiis . . . . non visis.

Hab. in ramis decorticatis Populi, Eperjes.

29. *Podosporium Ribis* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 789. — Stromate pulvinato, subcutaneo-crumpente, apice convexo colliculoso, atro,  $1\frac{2}{3}$ -1 mill. lato, intus perithecia spuria sive loculos pallidos monostichos plures fovente; stylosporis obovatis, utrinque obtusiusculis, 12-18 = 6,5-10 continuis fuligineis; basidiis spora paulo brevioribus bacillaribus, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis Ribis rubri pr. Vinkovce. — Videretur fere *Fuckelia Ribis* sed fructificatio aliena. — *Podosporium nostro sensu*, sistit *Sphaeropsidis* Sacc. species peritheciis v. loculis stromate pulvinato-verrucoso exceptis.

30. *Podosporium Nerii* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 930. — Stromate verrucoso subcutaneo-crumpente, atro  $1\frac{2}{3}$ -1 mill. d., intus perithecia spuria sive loculos

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [23\\_1884](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten Petter Adolf

Artikel/Article: [Fragmenta mycologica XIX. 88-89](#)