

Protomyces (*Exomyces*) *pithyophilus* Karst.
Hedw. 1884, n. 3, p. 4, forte est species *Sphaerosporii*
Schw.

Micromycetes Slavonici novi.

Recensuerunt

St. Schulzer v. Mueggenburg et P. A. Saccardo.
(Fortsetzung.)

Sphaeropsideae.

26. *Coniothyrium herbarum* Schulz. et Sacc. —
Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 271. — Peritheciis subgregariis,
initio epidermide velatis, lenticularibus, $1\frac{1}{5}$ - $1\frac{1}{3}$ mill. d., poro
pertusis; spermatiis oblongo-teretiuseculis, utrinque rotundatis,
5 = 2, brunneolis.

Hab. in caulibus *Asclepiadis Syriacae* pr. Vinkovce.
— Praecipue peritheciis lenticulari-applanatis dignoscenda
species.

27. *Coniothyrium syconophilum* Schulz et Sacc. —
Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 54 et in Myc. Beitr. p. 655
(*Phoma ficoph.* var. *Zythia*). — Peritheciis subcutaneis,
globosis, ostiolo papillato erumpente, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{3}$ mill. d., nigro-
faretis; spermatiis ellipsoideo-oblongis, 1-nucleatis, 5-6 micr.
longis, fuligineis, basidiis bacillaribus spora duplo longioribus
suffultis.

Hab. in ramis corticatis *Fici Caricae* pr. Vinkovce.

28. *Coniothyrium populinum* Schulz. et Sacc. Ill.
Fung. Slav. n. 9. — Peritheciis sparsis, globoso-depressis,
minutis, centro dein poro irregulari dehiscentibus; spermatiis
globosis, ochraceis, 5-8 micr. d., basidiis non visis.

Hab. in ramis decorticatis *Populi*, Eperjes.

29. *Podosporium Ribis* Schulz. et Sacc. — Schulz.
Ill. Fung. Slav. n. 789. — Stromate pulvinato, subcutaneo-
erumpente, apice convexo colliculoso, atro, $1\frac{1}{2}$ -1 mill. lato,
intus perithecia spuria sive loculos pallidos monostichos plures
fovente; stylosporis obovatis, utrinque obtusiusculis, 12-18
= 6,5—10 continuis fuligineis; basidiis spora paulo brevi-
oribus bacillaribus, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis *Ribis rubri* pr. Vinkovce. —
Videretur fere *Fuckelia Ribis* sed fructificatio aliena. —
Podosporium nostro sensu, sistit *Sphaeropsidis* Sacc.
species peritheciis v. loculis stromate pulvinato-verrucoso ex-
ceptis.

30. *Podosporium Nerii* Schulz. et Sacc. — Schulz.
Ill. Fung. Slav. n. 930. — Stromate verrucoso subcutaneo-
erumpente, atro $1\frac{1}{2}$ -1 mill. d., intus perithecia spuria sive loculos

plures, ovatos v. subglobosos, pallidos foveate; stylosporibus ovatis v. ellipsoideis continuis, $14-19 = 8$, utrinque rotundatis ochraceo-fuliginosis; basidiis spora fere duplo longioribus, bacillaribus, hyalinis.

Hab. in ramis corticatis Nerii Oleandri pr. Vinkovce.

31. *Diplodia Grossulariae* Sacc. et Schulz. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 794. — Peritheciis gregariis peridermio pustulato tectis, globulosis, 0,3 mill. d., atris intus et extus, vertice obtusiusculis; stylosporibus ovato-oblongis, didymis, constrictis, $18-26 = 8-9$ fuliginosis.

Hab. in ramis Ribis grossulariae pr. Vinkovce.

32. *Diplodia Cydoniae* Sacc. et Schulz. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 81. f. 6 et Pilz. Quitt. n. 2. 6. 10. — Peritheciis subcutaneis, vix erumpentibus, nigro faretis, papillatis, subinde confluentibus; stylosporibus obovatis didymis, medio constrictis, $18-24$ micr. longis, basidiis brevibus suffultis. — Var. libera: Peritheciis subsuperficialibus, globoso-conicis, magis discretis; stylosporibus $17-25 = 10$, ceterum similibus.

Hab. in ramis corticatis, var. in decorticatis Cydoniae vulgaris.

33. *Fusicoccum Schulzeri* Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 686. — Pustulis corticalibus tumidulis modice erumpentibus 1 mill. lat.; peritheciis in quaque pustula 1-4, globulosis in collum breve attenuatis, ostiolo obtuso, 0,1-0,3 mill. cr.; spermatis cylindratis, curvulis, utrinque obtusis, $16-25 = 5$, hyalinis, basidiis filiformibus sesquialongioribus fasciculatis suffultis.

Hab. in ramis corticatis Rosae caninae pr. Vinkovce. — A genere Fusicocco spermatis curvulis aliquid recedit.

34. *Dendrophoma crassicollis* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 842. — Peritheciis laxe gregariis globoso-depressis, $1/2$ mill. cr., peridermio tectis, intus pallidis; ostiolo conico, obtuso vix erumpente; spermatis subballontoides, hyalinis, $5-6 = 2$, hyalinis; basidiis spermatis triplo longioribus, filiformibus, furcatis, ramosisve.

Hab. in ramis corticatis Fraxini excelsioris pr. Vinkovce. Videretur Cytispora simplex.

35. *Dendrophoma lignorum* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 620. — Peritheciis gregariis, minutis, superficialibus, globosis vertice acutiuscule papillatis, 0,16-0,20 mill. d., atris, spermatis teretiusculis, utrinque obtusis, hyalinis, 4 micr. longis, basidiis filiformibus, ramosis, suffultis.

Hab. in ligno Populi albae superficie dealbato pr. Vinkovce.

36. *Dendrophoma juglandina* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 162. — Peritheciis subsuperficialibus, gregariis globoso-conicis $\frac{1}{3}$ mill. d., obtuse papillatis, nigris, intus albidis; spermatiis oblongis utrinque rotundatis, 4 micr. longis, hyalinis; basidiis repetito-dichotome ramosis, spermatio octuplo longioribus, hyalinis.

Hab. in ligno emortuo Juglandis pr. Vinkovce.

37. *Dendrophoma populina* Schulz. et Sacc. — Ill. Fung. Slav. n. 8. — Peritheciis gregariis, tenue membranaceis, globoso-depressis, lignicolis, crustula stromatica atra basi infossis; basidiis dichotomo-ramosis, denticulatis, hyalinis; spermatiis cylindraceis utrinque obtusis rectiusculis, acro-pleurogenis, basidio 5-6plo brevioribus, hyalinis.

Hab. in ramis decorticatis populinis, Eperjes Slav.

38. *Phoma Urticae* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 700. — Peritheciis globulosis depressis, gregariis, caule immersis v. subsuperficialibus, 0,14-0,4 micr. d., intus pallidis poro pertusis; spermatiis oblongo-teretiusculis, hyalinis, 4-6 micr. longis.

Hab. in caule Urticae dioicae p. Vinkovce. An forma Phomae herbarum?

39. *Phoma Ebuli* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 701. — Peritheciis globosis epidermide velatis, subastomis, 0,2 mill. d., intus albidis; spermatiis ovatis v. oblongis, hyalinis, perexiguis, 1,5-2,5 micr. longis.

Hab. in caule Sambuci Ebuli, pr. Vinkovce.

40. *Phoma ebulina* Sacc. et Schulz. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 703. — Ut *Phoma Ebuli*, sed spermatiis ovoideo oblongis utrinque obtusiuscule attenuatis, biguttulatis, hyalinis, 6-12 micr. longis.

Hab. in caule Sambuci Ebuli prope Vinkovce. — Probabiliter status spermogonicus *Diaporthes*.

41. *Phoma ebulicola* Sacc. et Schulz. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 702. — Peritheciis ut in *Phoma Ebuli*; spermatiis 5-10 micr. longis, hyalinis, cylindraceis, curvulis.

Hab. in caule Sambuci Ebuli pr. Vinkovce.

42. *Phoma Mali* Schulz. et Sacc. — Schulz. Ill. Fung. Slav. n. 783. — Peritheciis gregariis subcutaneis, depressis, ostiolo vix erumpente; spermatiis oblongo-fusoides 8 micr. longis, 2-guttatis, basidiis duplo longioribus, filiformibus suffultis.

Hab. in ramis Piri Mali pr. Vinkovce. — Status spermogonicus probabiliter *Diaporthes ambiguae*.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [23 1884](#)

Autor(en)/Author(s): Schulzer von Muggenburg Stephan Joseph

Artikel/Article: [Micromycetes Slavonici novi. Recensuerunt \(Forstsetzung\). Sphaeropsidae. 89-91](#)