

Notizblatt für kryptogamische Studien,  
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Inhalt: Repertorium: Kützing, Tabulæ phycologicæ. Bd. XIV.  
(Fortsetzung). — A. Grunow, über neue oder ungenügend bekannte Algen  
(Fortsetzung). — W. Nylander, Sphaeriæ novæ et Lichenes novi. —  
Westendorp, 8e notice sur quelques espèces nouvelles pour la  
flore belge. — De Bary, Cæoma pinitorum. — A. Braun, die  
Isoëtes-Arten der Insel Sardinien, &c. — Kryptogamischer Reiseverein.

### Repertorium.

F. T. Kützing, Tabulae phycologicae. Bd. XIV.  
(Fortsetzung.)

*Polysiphonia Rœana.* (Harv.) P. mediocris, capillaris,  
mollis, gelatinosa, roseo-coccinea, laxe ramosa; articulis non  
corticatis, inferioribus diametro 5—6plo longioribus, ramulorum  
subæqualibus, omnibus oligosiphoneis; geniculis inferioribus le-  
viter tumidulis. „Fremantle, Western Australia“.

*Polysiphonia mutabilis.* (Harv.) P. mediocris, mollis,  
carneo-rosea, basi setacea; ramis virgatis, ramulis elongatis,  
nec piliferis, apice lanceolatis acutis; articulis inferioribus ob-  
solete et longitudinaliter corticatis, 4—5siphoneis, siphonibus  
tenuissimis, latiusculis, inferioribus hyalinis. „Fremantle,  
Western Australia“. Harvey.

*Polysiphonia Victoriae.* (Harv.) P. pedalis et ultra,  
carnea, mollis, gelatinosa, basi crassa, ramis paucis elongatis,  
ramulis approximatis tenuissimis, ambitu lanceolatis, nec pili-  
feris; articulis inferioribus corticatis ramulorum superioribus  
nudis; diametro æqualibus vel subdupo longioribus, 9—10si-  
phoneis, siphonibus tenuissimis angustis; carpocloniis propriis  
pedicellatis, obovato-lanceolatis, tetrachocarpiis biserialibus.  
„Brighton beach, Port Philipp“ Harvey.

*Dasya extensa.* (Sonder herb.) D. pedalis et ultra,  
phycomate crasso, ramis ramulisque elongatis flagelliformibus,  
suboppositis, basi attenuatis, ramulis a basi dense villosis,  
pilis callithamnoideis, dichotomis gracilibus, basi fructiferis;  
carpocloniis elongato-lanceolatis sessilibus. Nova Hollandia.

*Dasya pallescens.* (Rg. nov. sp.) D. palmaris, pallide  
carnea, phycomate caulescente crassiusculo, carnoso, erecto,  
basi constricto, ramis paucis patentibus, hinc oppositis, illinc  
alternis, sterilibus tenuissime villosis, fructiferis denudatis;  
pilis subdichotomis, interdum simplicibus, apicem versus muco-  
sis, deliquescentibus, summis intermixtis filis tenuioribus mo-

niliformibus subcorymbosis; cystocarpiis oblique rostratis, basi calcaratis. In mari adriatico.

*Dasya Tumanowiczi*. (Galty in herb. Sonder.) D. palmaris, pallide rosea; ramis gracilibus, ramulis articulatis, minutim spinulosis, a basi ad apicem usque villosis; pilis tenerimis dichotomis, antheridia magna elongata pedicellata gerentibus. „Key West, Florida“. Dr. Blodgett.

*Dasya hapalathrix*. (Harv.) D. coccinea, ultra pedalis, pyramidatim ramosa, phycamate crasso, carnoso, ramulis continuis, reticulatim corticatis, villosis, pilis terminalibus brevissime articulatis, in capitulum globosum intense coccineum arcte congestis. „Georgetown, Van Diemensland“ Harvey.

*Dasya jadertina*. (Sandri in herb. Sonder.) D. palmaris, tota villosa; phycamate crassiusculo, pyramidatim et regulariter ramoso, ramis erecto-patentibus; ramellis callithamnoideis gracilibus, valde attenuatis; antheridiis lanceolatis, longe apiculatis. In mari adriatico: Sandri.

*Dasya Feredayæ*. (Harv.) D. pedalis, intense coccinea, phycamate crasso, dense ramoso, ramis patentibus inaequalibus, pyramidatim ramulosis; ramellis callithamnoideis squarroso-dichotomis, rigidulis, acutis. „Georgetown, Van Diemensland“. Harvey.

*Dasya frutescens*. (Harv.) D. 3—4uncialis, intense coccinea, phycomata rigidulo, irregulariter ramoso; ramellis dichotomis, arcte contractis, apicibus acutis; carpocloniis oblongis, validis, solidis, acutis. „Fremantle, Western, Australia“. Harvey.

*Dasya Haffia*. (Harv.) D. palmaris vel ultra, phycamate crasso, ramis ramulisque approximatis, tomentoso-hirsutis, gelatinosis, coccineis; ramellis patenti-dichotomis gracilibus, acutissimis; carpocloniis oblongis, oblique apiculatis, pedicellatis. „Western Port, Victoria“.

---

A. Grunow, neue und ungenügend bekannte Algen.  
(Verh. d. f. f. zool.-bot. Ges. in Wien. 1862.)

(Fortsetzung.)

*Denticula* Kg. (e parte). Frustula quadrangula singula vel fascias brevissimas formantia, valvis convexis, costatis, subcarinatis, carina margini altero approximata, costis vel abbreviatis unilateralibus vel perviis omnibus in punctis noduliformibus carinalibus terminantibus.

*Denticula Tabellaria* nov. spec. *Denticula parva* valvis subrhomboideis plerumque medio ventricoso inflatis apicibus styliformibus productis, costis dimidium valvae latitudinis occupantibus 16—20 in 0,001", striis transversis tenuissimis.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [3\\_1864](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Repertorium 81-82](#)